

子どもと女性の健康相談室

22



福島医大ふくしま子ども・女性医療支援センター長
水沼 英樹氏

子宮がんは、子宮頸癌（けいがん）と子宮体癌に分けられますが、今回は子宮頸部、すなわち子宮の入り口にできる子宮頸癌についてお話しします。

ワクチン接種で予防

子宮頸癌はヒトパピロームウイルス（HPV）

の感染が原因で発病します。HPVは性交渉により日常的に広がり、性交渉のある女性では半数以上が一度は感染すると言われています。このため、

子宮頸癌①

子宮がんは、子宮頸癌 早い性交開始年齢、多産（けいがん）と子宮体癌 ・多妊娠、複数のセックスに分けられますが、今回は子宮頸部、すなわち子宮の入り口にできる子宮頸癌についてお話しします。

の服用などはHPV感染に関連した子宮癌のリスク因子となっています。当然のことながら、HPVの感染率は性活動の高い若年層での陽性率が高く、二十歳代では20〜30%が陽性を示します。ただ、感染があっても90

早い性交開始年齢、多産 ・多妊娠、複数のセックスに分けられますが、今回は子宮頸部、すなわち子宮の入り口にできる子宮頸癌についてお話しします。

のタイプがありますが、子宮頸癌の発生に関連するのはその一部で、これを高リスク型と呼んでいます。ヒトにはHPV感染に対する防御機構（免疫機構）が存在します。HPVの感染があっても、直ちに発がん

早い性交開始年齢、多産 ・多妊娠、複数のセックスに分けられますが、今回は子宮頸部、すなわち子宮の入り口にできる子宮頸癌についてお話しします。

のためには、繰り返しのHPV感染や感染した細胞の遺伝子変異が必要であり、実際HPVの感染が成立してから癌化するまでに十年もの歳月を要すると言われています。

早い性交開始年齢、多産 ・多妊娠、複数のセックスに分けられますが、今回は子宮頸部、すなわち子宮の入り口にできる子宮頸癌についてお話しします。

国で接種が行われていますが、わが国でも二〇〇九年以降にワクチンの使用が承認され、女子中高生を対象としたワクチン接種の公費事業が開始されました。

早い性交開始年齢、多産 ・多妊娠、複数のセックスに分けられますが、今回は子宮頸部、すなわち子宮の入り口にできる子宮頸癌についてお話しします。

痛み（複合性局所疼痛）とうつ病候群・CRPSを訴えるケースが報告され、厚生労働省は政策として積極的な接種の呼びかけを中止したために、現在では接種率は著しく低い状態が続いています。ただし、ワクチン接種とCRPSの関係については科学的因果関係は明らかではありません。詳細は省略しますが、世界保健機関（WHO）はわが国のこのような現状に対し、「若い女性が本来なら避けられるはずのHPV感染に攻撃されるままになっており、結果として真の被害を招きうる」とわが国を名指して非難しています。 〓次回は2月19日掲載〓