

# 当院採用薬等一覧 2026. 1

〈採用薬・院外処方専用薬〉

(2026(令和8)年1月13日より適用開始)

## 目 次

内用薬リスト	1
外用薬リスト	30
注射薬リスト	39
生 薬	52
緊急限定期申請薬	54

### 一覧中の記号注釈

本資料	オーダーリング
マーク	表示マーク
↓	↓
記号無：採用薬	：◎
(院内・院外処方可)	
※：削除予定薬	：◎
●：院外処方専用薬	：●
☆：院外処方専用予定薬	：◎
○：院内専用後発品である薬	：○
→：使用開始日に特に注意を要する採用薬	

### 注意点

- 「削除予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、院内・院外とも全面削除になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
- 「院外処方専用予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、「院外処方専用薬」になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
- 2019(平成31)年2月1日より院外処方で一般名処方を開始しました。

## 内用薬リスト

### 【ア】

劇アイカルシグ錠15mg

劇アイセントレス錠400mg

● テイトロール錠20mg (院内は一硝酸イソソルビド錠20mg「サイ」)  
 (【般】一硝酸イソソルビド錠20mgへ切替)

● アイビーディカプセル100 100mg

● アイビーディドライシロップ5%

● 劇アイミクス配合錠H D

(【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替)

劇アイミクス配合錠H D

(【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠へ切替)

○ テーガメイト20%ゼリー25g【後】

(ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」へ  
 名称変更)

(【般】ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25gへ切替)

● 【般】アカルボース錠50mg (グルコバイ)

● 【般】アカルボース錠100mg (グルコバイ)

● アキネトナ細粒1% (【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%へ切替)

アキネトナ錠1mg (院内はビペリデン塩酸塩錠1mg「アル」)

(【般】ビペリデン塩酸塩錠1mgへ切替)

● 【般】アクタリット錠100mg (モバー)

(2026年3月31日経過措置終了)

● アクタスO D錠15mg (院内はピオグリタゾンO D錠15mg「VTRS」)  
 (【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mgへ切替)

● アクタスO D錠30mg (【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mgへ切替)

● 劇アクトネル錠2.5mg (【般】リセドロン酸Na錠2.5mgへ切替)

● 劇アクトネル錠17.5mg (【般】リセドロン酸Na錠17.5mgへ切替)

劇アクトネル錠75mg (リセドロン酸Na錠75mg「トワ」へ切替)

● 劇アグリリンカプセル0.5mg

● アコニンサン錠 166.67mg ST-01

アコファイド錠100mg

● アサヨール錠400mg (院内はメサラジン腸溶錠400mg「サイ」)

(【般】メサラジン腸溶錠400mgへ切替)

アザルフィジンEN錠500mg

(【般】サラゾスルファビリジン腸溶錠500mgへ切替)

● 【般】アシクロビル顆粒40% (ゾビラックス)

アシクロビル錠200mg「カ」 【後】 (【般】なし)

● 【般】アシクロビル錠200mg (ゾビラックス)

○ アジスロマイシン錠250mg「トワ」 【後】

アシテアダニ舌下錠100単位 (IR)

● アシテアダニ舌下錠300単位 (IR)

アシノン錠75mg

● 【般】アジスロマイシン細粒10% (ジスロマック)

● 【般】アジスロマイシン錠250mg (ジスロマック)

● 【般】アジルサルタン錠10mg (アジルバ)

● 【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠10mg (アジルバ)

● 【般】アジルサルタン錠20mg (アジルバ)

● 【般】アジルサルタン錠40mg (アジルバ)

● 劇【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 (ザクラス配合錠H D)

○ アジルサルタンO D錠10mg「DSEP」 【後】

● アジルバ顆粒1%

アジルバ錠10mg (【般】アジルサルタン錠10mgへ切替)

アジルバ錠20mg (【般】アジルサルタン錠20mgへ切替)

アジルバ錠40mg (【般】アジルサルタン錠40mgへ切替)

● 劇アジレクト錠0.5mg

劇アジレクト錠1mg

● 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 1g/包 (シナール)

アストミン錠10mg

アストミンシロップ0.25%

アスペラカリウム錠300mg

● アスペラ配合錠

アスピリン原末「マ」

● 【般】アスピリン腸溶錠100mg (バイアスピリン)

● 劇アスピレーシンカプセル10mg (院内はアスピレーシン塩酸塩カプセル10mg「NP」)

(【般】アスピレーシン塩酸塩カプセル10mgへ切替)

アスペリン散10%

アスペリンシロップ0.5%

● 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒0.67g (マーズレンS)

アズロキサ錠15mg

● 【般】アセトアミノフェン細粒50% (カロナール)

● 【般】アセトアミノフェン錠200mg (カロナール)

● 【般】アセトアミノフェン錠300mg (カロナール)

○ アセトアミノフェン錠300mg「マ」 【後】

● 劇アセトアミノフェン錠500mg「マ」 【後】

(アセトアミノフェン錠300mg「マ」へ切替)

● 【般】アセトアミノフェン錠500mg (カロナール)

● 【般】アセトアミノフェンシロップ2% (カロナール)

● 【般】アセトアミノフェンシロップ用40% (カロナール)

アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」 20mL/瓶

アセノペルル徐放錠500mg

● アゼブチニン錠1mg

● 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg (アゼブチニン)

○ アゼルニジビン錠16mg「トワ」 【後】

● 【般】アゼルニジビン錠16mg (カルプロック)

○ アゾセミド錠30mg「JG」 【後】

● 【般】アゾセミド錠30mg (ダイアート)

● アゾセミド錠60mg「JG」 【後】

● 【般】アゾセミド錠60mg (ダイアート)

● アダブチノール錠5mg

● アタラックス錠10mg

● 劇アダラートL錠10mg

(【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続) へ切替)

● 劇アダラートL錠20mg (院内はニフェジピンL錠20mg「サイ」)

(【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続) へ切替)

● 劇アダラートC R錠20mg

(【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) へ切替)

● 劇アダラートC R錠40mg

(【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) へ切替)

● テチスト錠2.5mg (院内はカルベジロール錠2.5mg「トワ」)

(【般】カルベジロール錠2.5mgへ切替)

● テチスト錠10mg (院内はカルベジロール錠10mg「トワ」)

(【般】カルベジロール錠10mgへ切替)

● アデカット15mg錠

● アデカット30mg錠

● アテディオ配合錠

● アテノロール錠50mg「NikP」 【後】

● 【般】アテノロール錠50mg (テノーミン)

アデホスコーウ顆粒10% [1g/P]

● アデホスコーウ腸溶錠20 20mg (【般】なし)

劇アデムバス錠0.5mg

劇アデムバス錠1.0mg

- アテレック錠10—10mg (【般】シルニジビン錠10mgへ切替)
- アテレック錠20—20mg (【般】シルニジビン錠20mgへ切替)
- アーテン散1% (【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%へ切替)  
アーテン錠(2mg) (【般】加算なし)  
アドシルカ錠20mg (タダラフィル錠20mg A D「TE」へ切替)
- アトーゼット配合錠D-D  
(【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠へ切替)  
アドソルベシ原末 (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了予定)
- アドナ散10% (【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%へ切替)  
アドナ錠30mg (カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」へ切替)  
(【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mgへ切替)
- 【般】アトモキセチンカプセル5mg (ストラテラ)
- 【般】アトモキセチンカプセル10mg (ストラテラ)
- 【般】アトモキセチンカプセル25mg (ストラテラ)
- 【般】アトモキセチンカプセル40mg (ストラテラ)
- 創アトモキセチン錠5mg「トワ」 【後】  
(院外は【般】アトモキセチン錠5mgへ切替)
- 創アトモキセチン錠25mg「トワ」 【後】  
(院外は【般】アトモキセチン錠25mgへ切替)
- 【般】アトモキセチン錠5mg
- 【般】アトモキセチン錠25mg
- 【般】アトモキセチン経口液0.4% (ストラテラ)
- アトルバスタチン錠10mg「日医工」 【後】
- 【般】アトルバスタチン錠10mg (リビトール)
- アトルバスタチンOD錠5mg「トワ」 【後】
- 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg (リビトールOD)  
毒アトロピン硫酸塩水和物「ロイ」原末
- 創アナストロゾール錠1mg「トワ」 【後】
- 【般】アナストロゾール錠1mg (アリミデックス)
- 創アナストロゾール錠1mg「明治」 【後】  
アナフラニール錠10mg
- アナフラニール錠25mg
- アベブロ錠50mg (【般】イルベサルタン錠50mgへ切替)  
アベブロ錠100mg (イルベサルタン錠100mg「DSPB」へ切替)  
(【般】イルベサルタン錠100mgへ切替)
- アベブロ錠200mg (【般】イルベサルタン錠200mgへ切替)
- 【般】アビラテロン酢酸エステル錠250mg (ザイティガ)
- 創アフィニートール錠2.5mg  
劇アフィニートール錠5mg
- 麻劇アブストラル舌下錠100μg
- 麻劇アブストラル舌下錠200μg
- 麻劇アブストラル舌下錠400μg
- 創アブリジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 【後】
- 【般】アブリジン塩酸塩カプセル10mg (アスペノン)  
アブレゾリン錠10mg
- アブレピタントカプセル80mg「NK」 【後】
- 【般】アブレピタントカプセル80mg (イメント)
- アブレピタントカプセル125mg「NK」 【後】
- 【般】アブレピタントカプセル125mg (イメント)
- 創アベロックス錠400mg
- 創アボルブカプセル0.5mg  
(【般】デュタステリドカプセル0.5mg : A Vへ切替)
- 創アマージ錠2.5mg (【般】ナラトリプタン錠2.5mgへ切替)
- 創アマリール0.5mg錠 (【般】グリメピリド錠0.5mgへ切替)
- 創アマリール1mg錠 (院内はグリメピリド錠1mg「トワ」)
- 創アマリール3mg錠 (【般】グリメピリド錠3mgへ切替)
- アマンタジン塩酸塩錠50mg「ロイ」 【後】
- アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 【後】
- 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10% (シンメトレル)
- 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg (シンメトレル)
- 毒アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 【後】  
(【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg)
- 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg (アンカロン)  
アミティーザカプセル12μg
- アミティーザカプセル24μg  
アミノレバソE N配合散 (フルーツ味) [50g/P]
- アミノレバソE N配合散 (コーヒー味) [50g/P]
- アミュー配合顆粒 [2.5g/P]  
劇アムノレイク錠2mg
- 創アムバロ配合OD錠「トワ」 【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)
- 創アムバロ配合OD錠「日医工」 【後】
- 【般】アムロジン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠 (カデュエット2番)
- 【般】アムロジン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠 (カデュエット4番)
- 創アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 【後】
- 創アムロジピンOD錠2.5mg「ロイ」 【後】
- 創アムロジピンOD錠5mg「ロイ」 【後】
- 創アムロジピンODフィルム5mg「QQ」 【後】
- 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 【般】アムロジピン錠2.5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 【般】アムロジピン錠5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 創アムロジン錠2.5mg
- 創アムロジンOD錠2.5mg
- 創アムロジンOD錠5mg  
○ アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg (リズミック)  
アメナリーフ錠200mg
- アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 【後】 (【般】なし)
- 【般】アモキシシリンカプセル250mg (サワシリン)
- 【般】アモキシシリン細粒20% (ワイドシリント細粒)
- 向アモバント錠7.5—7.5mg (2027年3月31日経過措置終了)  
(【般】ゾビクロン錠7.5mgへ切替)
- 【般】アラセブリル錠25mg (セタブリル)  
アラベル内用剤1.5g [1.5g/瓶]
- アリッサ配合錠  
劇アリセプトドライシロップ1%
- 創アリセプト錠3mg (【般】ドネベジル塩酸塩錠3mgへ切替)
- 創アリセプト錠5mg (【般】ドネベジル塩酸塩錠5mgへ切替)
- 創アリセプトOD錠3mg  
(【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mgへ切替)
- 劇アリセプトOD錠5mg (院内はドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」)  
(【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 創アリセプトD錠10mg  
(【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- 劇アーリーダ錠60mg  
25mgアリナミンF糖衣錠 (院内はフルスルチアミン錠25mg「トワ」)  
(【般】フルスルチアミン錠25mgへ切替)
- 創アリビプラゾール錠1mg「ロイ」 【後】  
(エビリファイ錠1mgから切替)
- 【般】アリビプラゾール散1% (エビリファイ)
- 【般】アリビプラゾール口腔内崩壊錠24mg (エビリファイ)
- 【般】アリビプラゾール錠1mg (エビリファイ)
- 【般】アリビプラゾール錠3mg (エビリファイ)
- 【般】アリビプラゾール錠6mg (エビリファイ)
- 【般】アリビプラゾール錠12mg (エビリファイ)

- 【般】アリピプラゾール経口液0.1%1mL (エビリファイ)
- 【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mL (エビリファイ)
- 【般】アリピプラゾール経口液0.1%6mL (エビリファイ)
- 【般】アリピプラゾール経口液0.1%12mL (エビリファイ)  
劇アサミデッカス錠1mg (アナストロゾール錠1mg「トワ」へ切替)  
(【般】アナストロゾール錠1mgへ切替)
- アリメジンシロップ0.05%  
アルギU配合顆粒  
毒アルケラン錠2mg [冷]
- アルサルミン内用液10% [10mL/P]  
(院内はスクラルファート内用液10%「NIG」)  
(【般】スクラルファート経口液10%へ切替)
- 劇アルシオドールカプセル1μg 【後】  
(【般】アルファカルシドールカプセル1μgへ切替)  
アルダクトンA細粒10%  
アルダクトンA錠25mg (スピロノラクトン錠25mg「トワ」へ切替)  
(【般】スピロノラクトン錠25mgへ切替)
- アルタットカプセル75mg  
(【般】叶サジン酢酸エスル塩酸塩徐放カプセル75mgへ切替)  
アルドメット錠250 250mg
- 劇アルファカルシドールカプセル0.25μg「トワ」 【後】  
(【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg (アルファロール)
- 劇アルファカルシドールカプセル1μg「トワ」 【後】  
(【般】アルファカルシドールカプセル1μg (アルファロール)  
劇アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 【後】
- 劇アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 【後】  
(アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」へ切替)
- 【般】アルファカルシドール錠0.25μg (ワンアルファ)
- 【般】アルファカルシドール錠0.5μg (ワンアルファ)  
劇アルファロールカプセル0.25μg  
(【般】アルファカルシドールカプセル0.25μgへ切替)  
劇アルファロールカプセル1μg  
(【般】アルファカルシドールカプセル1μgへ切替)  
劇アルファロール内用液0.5μg/mL [10mL/瓶]
- 向アルプラゾラム錠0.4mg「トワ」 【後】  
● 【般】アルプラゾラム錠0.4mg (ソラナックス)  
アルロイドG内用液5% [600mL/瓶]
- 劇アルンブリグ錠30mg
- 劇アルンブリグ錠90mg
- テレギサール錠10mg (【般】ペミロラストK錠10mgへ切替)
- テレギサールドライシロップ0.5%  
(【般】ペミロラストKシロップ用0.5%へ切替)
- テレグラ錠30mg (【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mgへ切替)
- テレグラ錠60mg (院内はフェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トワ」)  
(【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mgへ切替)  
アレジオンドライシロップ1%  
(院内はエビナスチン塩酸塩D-S小児用1%「トワ」)  
(【般】エビナスチン塩酸塩シロップ用1%へ切替)  
アレジオンドライシロップ20mg (【般】エビナスチン塩酸塩錠20mgへ切替)  
(エビナスチン塩酸塩錠20mg「ケミア」へ切替)
- 劇アレセンサカプセル150mg  
劇アレビアチン散10%  
アレビアチン錠100mg
- アレロック顆粒0.5% [0.5g/P]  
(【般】オバタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g (包) へ切替)
- アレロックOD錠5mg  
(院内はオロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トワ」)  
(【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 【般】アレンドロン酸錠5mg (ボナロン)  
○ 劇アレンドロン酸錠35mg「トワ」 【後】
- 【般】アレンドロン酸錠35mg (ボナロン)  
アローゼン顆粒 [0.5g/P]  
(【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包へ切替)
- アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」  
(アルマール錠10より名称変更)
- 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg (アルマール)
- アロチノロール錠100mg「タベ」 【後】  
(アロシトール錠100mgから名称変更)  
(アロブリノール錠100mg「ニフロ」へ名称変更)
- アロブリノール錠100mg「ニフロ」 【後】
- 【般】アロブリノール錠100 (アロシトール)
- アロマシン錠25mg (【般】エキセメスタン錠25mgへ切替)  
● 毒アソンカロン錠100mg (アミオダロン塩酸塩錠100mg「TE」へ切替)  
(【般】アミオダロン塩酸塩錠100mgへ切替)  
劇アンコチル錠500mg
- アンジュ28 (保険適用外)
- 劇安息香酸ナトリウムカフェイン末  
劇安息香酸ナトリウム「コザカイ・M」 (院内製剤)
- アンブローダ錠50mg  
(院内はサルボグレラート塩酸塩錠50mg「トワ」)  
(【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mgへ切替)
- アンブローダ錠100mg  
(【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mgへ切替)
- 【般】アンブリセンタン錠2.5mg (ヴォリブリス)
- アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トワ」 【後】
- 【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg (ムコソルバン)
- 【般】アンプロキソール塩酸塩徐放錠45mg (ムコソルバン)
- 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3% (ムコソルバン)
- 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5% (ムコソルバン)
- 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用3% (ムコソルバン)
- 【イ】  
● イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg  
イグザレルト錠2.5mg  
イグザレルトOD錠10mg  
(【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mgへ切替)  
イグザレルトOD錠15mg  
(【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mgへ切替)
- 劇イクスタンジ錠40mg
- 劇イクスタンジ錠80mg  
劇イグラチモド錠25mg「あゆみ」
- 【般】イグラチモド錠25mg (ケアラム)  
イケプラドライシロップ50% (レベチラセタムDS50%「トワ」へ切替)  
(【般】レベチラセタムシロップ用50%へ切替)  
イケプラ錠500mg (レベチラセタム錠500mg「カイ」へ切替)
- 【般】レベチラセタム錠500mgへ切替)
- 【般】イコサベント酸エチルカプセル300mg (エバデール)
- イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 【後】
- 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg (エバデール)  
イスコチン原末  
イスコチン錠100mg
- 劇イスツリサ錠1mg [25°C以下]
- イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 【後】  
(2026年3月31日経過措置終了)
- イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」  
(メニレット70%ゼリー20gから名称変更)

- イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」  
(メニレット70%ゼリー30gから名称変更)
- 【般】イソソルビド経口液70%40mL (イソバイト)  
(2026年3月31日削除予定)
- イソバイトシロップ70%分包20mL  
イソバイトシロップ70%分包30mL
- インブリノシン錠400mg
- 【般】イソソルビド錠4.74g/包 (サーカル)  
○ 一硝酸イソソルビド錠20mg「サイ」 【後】  
(アイトロール錠20mgより切替)
- 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg (アイトロール)
- イトブリド塩酸塩錠50mg「サイ」 【後】
- 【般】イトブリド塩酸塩錠50mg (ガナトン)
- イトラコナゾール錠50mg「科研」 【後】
- 【般】イトラコナゾールカプセル50mg (イトリゾール)
- イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 【後】  
(【般】イトラコナゾール経口液1%)
- イトリゾールカプセル50mg  
(【般】イトラコナゾールカプセル50mg)  
イトリゾール内用液1%  
(イトラコナゾール内用液1%「VTRS」へ切替)
- 【般】イトラコナゾール経口液1% (イトリゾール)  
劇イニシング配合錠  
イノソリッド配合経腸用半固形剤
- イノベロン錠200mg  
イノラス配合経腸用液(紅茶フレーバー) [125mL/袋]  
イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) [125mL/袋]  
イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー) [187.5mL/袋]  
イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー) [187.5mL/袋]  
イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー) [187.5mL/袋]
- E-P-Lカプセル250mg 【後】 (2026年3月31日経過措置終了)  
(【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mgへ切替)  
劇イフェクサーS Rカプセル37.5mg  
劇イフェクサーS Rカプセル75mg  
麻劇イーフェンバッカル錠50μg  
● 麻劇イーフェンバッカル錠400μg  
● 麻劇イーフェンバッカル錠600μg  
● 麻劇イーフェンバッカル錠800μg
- イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 【後】
- 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg (セロクラール)  
イブロフェン錠100mg「NIG」 【後】 (【般】なし)  
劇イブランス錠25mg  
劇イブランス錠125mg  
○ 劇イマチニブ錠100mg「サイ」 【後】
- 【般】イマチニブ錠100mg (グリベック)
- 劇イマチニブ錠200mg「明治」 【後】
- 【般】イマチニブ錠200mg (グリベック)
- 劇イミグラン錠50-50mg (【般】スマトリプタン錠50mgへ切替)
- 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg (ステーブラ O D)  
○ イミダブリル塩酸塩錠5mg「オーラ」 【後】
- 【般】イミダブリル塩酸塩錠5mg (タナトリル)  
劇イムセラカプセル0.5mg  
劇イムブルピカカプセル140mg  
イムラン錠50mg  
イメンドカプセル80mg  
(アプレビタントカプセル80mg「NK」へ切替)  
(【般】アプレビタントカプセル80mgへ切替)
- イメンドカプセル125mg  
(アプレビタントカプセル125mg「NK」へ切替)  
(【般】アプレビタントカプセル125mgへ切替)
- 劇イリボーオ D錠2.5μg
- 劇イリボーオ D錠5μg
- 【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠4mg (ガスロンN)
- イルトラ配合錠L D
- イルトラ配合錠H D
- 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 (アイミクスL D)
- 【般】イルベサルタン・アムロジン10mg配合錠 (アイミクスH D)
- イルベサルタン錠100mg「DSPB」 【後】
- 【般】イルベサルタン錠50mg (アバプロ)
- 【般】イルベサルタン錠100mg (アバプロ)
- 【般】イルベサルタン錠200mg (アバプロ)  
劇イレーサ錠250-250mg (ゲフィチニブ錠250mg「NK」へ切替)  
(【般】ゲフィチニブ錠250mgへ切替)
- 劇インヴェガ錠3mg
- インクレミンシロップ5% 【後】  
(【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%へ切替)
- 劇インチニブ錠1mg
- 劇インチニブ錠3mg  
劇インデラル錠10mg (【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mgへ切替)
- インヒペース錠0.5-0.5mg (【般】シラザブリル錠0.5mgへ切替)
- 劇インフリーSカプセル200mg
- 劇インプロメン細粒1% (【般】プロムペリドール細粒1%へ切替)
- 劇インプロメン錠1mg (【般】プロムペリドール錠1mgへ切替)
- 劇インプロメン錠3mg (【般】プロムペリドール錠3mgへ切替)  
劇インライタ錠1mg  
劇インライタ錠5mg
- 【ウ】
- 劇ヴァイトラックビカプセル25mg
- 劇ヴァイトラックビカプセル100mg  
劇ヴァンフリタ錠17.7mg  
劇ヴァンフリタ錠26.5mg
- 劇ウインタミン細粒(10%)  
劇ウェリレグ錠40mg  
劇ヴォトリエント錠200mg  
ヴォリブリス錠2.5mg (【般】アンブリセンタン錠2.5mgへ切替)
- ウチダのオウギ末M  
ウチダの八味丸M [20丸/P]  
ウテメリシ錠5mg (【般】リトドリン塩酸塩錠5mgへ切替)  
(院内はリトドリン塩酸塩錠5mg「日新」)  
ウプトライビ錠0.2mg  
ウプトライビ錠0.4mg  
毒ウブレチド錠5mg
- ウラリットU配合散 [1g/P]  
(【般】ケン酸カリウム・ケン酸ナトリウム配合散 1g/包へ切替)
- ウラリット配合錠  
(【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠へ切替)
- ウリアデック錠40mg
- ウルグートカプセル200mg  
ウルソ顆粒5%  
ウルソ錠100mg (ウルソデオキシコール酸錠100mg「ト-7」へ切替)
- 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg
- ウルソデオキシコール酸錠50mg「ト-7」 【後】
- 【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg
- ウルソデオキシコール酸錠100mg「ト-7」 【後】
- ウロカルン錠225mg

【エ】

- エカード配合錠HD  
(【般】カンデサルタン4mg・ヒドロチアジド配合錠へ切替)
- エカード配合錠HD  
(【般】カンデサルタン8mg・ヒドロチアジド配合錠へ切替)
- 【般】エカペトN-a顆粒66.7% 1.5g/包(ガストローム)
- 【般】エキセメスタン錠25mg(アロマシン)  
エクテ錠50mg(【般】ビルダグリブチン錠50mgへ切替)  
(ビルダグリブチン錠50mg「ト-7」へ切替)
- 劇エクセグラン散20% (【般】ゾニサミド散20%へ切替)
- 劇エクセグラン錠100mg (【般】ゾニサミド錠100mgへ切替)  
劇エクフィナ錠50mg  
劇エクメット配合錠L D  
(院外は【般】ビルダグリブチン・メトルミン塩酸塩250mg配合錠へ切替)
- 劇エクメット配合錠HD  
(院外は【般】ビルダグリブチン・メトルミン塩酸塩500mg配合錠へ切替)  
劇エサンプトール錠250mg  
劇エジュラント錠25mg
- エースコール錠2mg (院内はテモカブリル塩酸塩錠2mg「サウ」)  
(【般】テモカブリル塩酸塩錠2mgへ切替)
- 【般】エシシタロプラム錠10mg (レクサプロ)  
● SG配合顆粒 [1g/P]
- エスゾピクロン錠1mg「日新」 【後】
- 【般】エスゾピクロン錠1mg (ルネスタ)  
● 【般】エスゾピクロン錠2mg (ルネスタ)  
● 向エスタゾラム錠2mg「アメル」 【後】
- 【般】エスタゾラム錠2mg (ユーロジン)
- 劇エストラサイトカプセル156.7mg 140mg [冷]  
● 【般】エストラジオール錠0.5mg (ジュリナ)  
● エストリール錠1mg  
○ 劇エスワンタイホウ配合OD錠T 20 【後】 (20mgテガフル相当量)  
(【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠へ切替)
- 劇エスワンタイホウ配合OD錠T 25 【後】 (25mgテガフル相当量)  
(【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠へ切替)
- エゼチミブ錠10mg「JG」 【後】
- 【般】エゼチミブ錠10mg (ゼチア)  
● 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠 (アトゼットL D)
- エソメプラゾールカプセル10mg「ト-7」 【後】
- 【般】エソメプラゾールカプセル10mg (ネキシウム)  
● エソメプラゾールカプセル20mg「ト-7」 【後】
- 【般】エソメプラゾールカプセル20mg (ネキシウム)  
● 【般】エチゾラム細粒1% (デパス)  
○ 向エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 【後】
- 【般】エチゾラム錠0.5mg (デパス)  
● 劇エッカスフォージ配合錠  
(【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠へ切替)  
劇エッカスフォージ配合OD錠  
(院内はアムバロ配合OD錠「ト-7」へ切替)  
(【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠へ切替)  
劇エディヨールカプセル0.75μg  
(【般】エルデカルシトールカプセル0.75μgへ切替)  
(エルデカルシトールカプセル0.75μg「ト-7」へ切替)
- 劇エトドラク錠200mg「SW」 【後】
- 【般】エトドラク錠200mg (ハイベン)  
劇エドルミズ錠50mg
- エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「ト-7」 【後】
- 【般】エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg (レニベース)  
○ エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「ト-7」 【後】
- 【般】エナラブリルマレイン酸塩錠5mg (レニベース)  
● 劇エナロイ錠2mg  
● 劇エナロイ錠4mg  
エネーボ配合経腸用液 [250mL/缶]
- 【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg (エバステル)
- 【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg (エバステル)
- 【般】エバスチン錠10mg (エバステル)
- エバステル錠10mg (【般】エバスチン錠10mgへ切替)
- エバステルOD錠5mg (【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- エバステルOD錠10mg  
(【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- エパデールEMカプセル2g  
● エパデールカプセル 300mg  
(【般】イコサベント酸エチルカプセル300mgへ切替)
- エパデールS 900-900mg  
(【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mgへ切替)
- 向エバミール錠1.0 1mg
- エパルレstatt錠50mg「EK」 50mg 【後】
- エパルレstatt錠50mg「VTRS」 【後】
- 【般】エパルレstatt錠50mg (キネダック)
- エビスタ錠60mg  
(【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mgへ切替)
- エピナステチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 【後】
- 【般】エピナステチン塩酸塩錠20mg  
劇エピビル錠150 150mg
- エビプロstatt配合錠SG  
(【般】オカウキサウキ1.0mg・ハコヤキエキス等配合錠へ切替)
- 劇エビリファイ散1% (【般】アリビプラゾール散1%へ切替)  
劇エビリファイ錠1mg (院内はアリビプラゾール錠1mg「サウ」へ切替)  
(【般】アリビプラゾール錠1mgへ切替)
- 劇エビリファイ錠3mg (【般】アリビプラゾール錠3mgへ切替)  
劇エビリファイ錠6mg (【般】アリビプラゾール錠6mgへ切替)
- 劇エビリファイ錠12mg (【般】アリビプラゾール錠12mgへ切替)
- 劇エビリファイOD錠24mg  
(【般】アリビプラゾール口腔内崩壊錠24mgへ切替)
- 劇エビリファイ内用液0.1% [1mL/包]  
(【般】アリビプラゾール経口液0.1%1mLへ切替)
- 劇エビリファイ内用液0.1% [3mL/包]  
(【般】アリビプラゾール経口液0.1%3mLへ切替)
- 劇エビリファイ内用液0.1% [6mL/包]  
(【般】アリビプラゾール経口液0.1%6mLへ切替)
- 劇エビリファイ内用液0.1% [12mL/包]  
(【般】アリビプラゾール経口液0.1%12mLへ切替)
- エフィエント錠2.5mg  
エフィエント錠3.75mg  
エフィエントOD錠20mg
- エプクルーサ配合錠  
覚劇エフピーOD錠2.5 2.5mg  
(【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mgへ切替)
- エフメノカプセル100mg  
エブランチルカプセル15mg  
劇エプリスディドライシロップ60mg [25°C以下]
- 【般】エプレレノン錠25mg (セララ)
- エプレレノン錠50mg「杏林」 【後】
- 【般】エプレレノン錠50mg (セララ)
- エペリゾン塩酸塩錠50mg「ト-7」 【後】
- 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg (ミオナール)

劇エベレンゾ錠20mg  
劇エベレンゾ錠50mg  
● エボザックカプセル30mg  
●劇エミレース錠3mg  
麻劇MSコンチン錠10mg  
●麻劇MSコンチン錠60mg  
エリキユース錠2.5mg  
エリキユース錠5mg  
エリスロシンドライシロップW20%  
エリスロシン錠100mg  
エルカルチンFF錠250mg  
(レボカルニチンFF錠250mg「ト-7」へ切替)  
(【般】レボカルニチンFF錠250mgへ切替)  
エルカルチンFF内用液10%  
(レボカルニチンFF内用液10%「ト-7」へ切替)  
(【般】レボカルニチンFF経口液10%へ切替)  
L-ケフレックス顆粒 [1g/包]  
○ エルデカルシトールカプセル0.75 μg「ト-7」 【後】  
● 【般】エルデカルシトールカプセル0.75 μg (エディロールカプセル)  
● 【般】エルロチニブ錠25mg (タルセバ)  
● 【般】エルロチニブ錠100mg (タルセバ)  
● 【般】エルロチニブ錠150mg (タルセバ)  
エレンタール配合内用剤 [80g/P]  
● エレンタール配合内用剤 [80g/グラマック容器] (販売中止)  
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 [80g/P]  
劇塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」  
● エンシア・H (バニラ) [250mL/缶]  
● エンシア・H (バナナ) [250mL/缶]  
エンシア・H (コーヒー) [250mL/缶]  
● エンシア・H (黒糖) [250mL/缶]  
● エンシア・H (メロン) [250mL/缶]  
● エンシア・リキッド [250mL/缶]  
○ エンタカボン錠100mg「JG」 【後】  
● 【般】エンタカボン錠100mg (コムタン)  
● 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg (バラクルード)  
○劇エンテカビルOD錠0.5mg「サリ」 【後】  
劇エンドキサン錠50mg  
● エンレスト錠50mg  
エンレスト錠100mg  
エンレスト錠200mg  
【オ】  
● 【般】オカガサウエキ1.0mg・ハコヤギエキス等配合錠 (エビプロスタット)  
● 【般】オキサトミド錠30mg (セルテクト)  
● 【般】オキサトミドシロップ用2% (セルテクト)  
○麻劇オキシドン錠2.5mg N X「第一三共」 【後】  
(【般】オキシコドン錠2.5mg (乱用防止製剤) へ切替)  
○麻劇オキシドン錠5mg N X「第一三共」 【後】  
(【般】オキシコドン錠5mg (乱用防止製剤) へ切替)  
○麻劇オキシドン錠10mg N X「第一三共」 【後】  
(【般】オキシコドン錠10mg (乱用防止製剤) へ切替)  
○麻劇オキシドン錠20mg N X「第一三共」 【後】  
(【般】オキシコドン錠20mg (乱用防止製剤) へ切替)  
●麻劇【般】オキシコドン錠2.5mg (乱用防止製剤)  
●麻劇【般】オキシコドン錠5mg (乱用防止製剤)  
●麻劇【般】オキシコドン錠10mg (乱用防止製剤)  
●麻劇【般】オキシコドン錠20mg (乱用防止製剤)  
麻劇オキシコドン徐放錠5mg N X「第一三共」 【後】 (【般】なし)  
(オキシコンチンTR錠5mgへ切替)  
麻劇オキシコドン徐放錠10mg N X「第一三共」 【後】 (【般】なし)  
(オキシコンチンTR錠10mgへ切替)  
麻劇オキシコドン徐放錠20mg N X「第一三共」 【後】 (【般】なし)  
(オキシコンチンTR錠20mgへ切替)  
麻劇オキシコドン徐放錠40mg N X「第一三共」 【後】 (【般】なし)  
(オキシコンチンTR錠40mgへ切替)  
●麻劇【般】オキシコドン経口液2.5mg (オキシコドン内服液)  
●麻劇【般】オキシコドン経口液5mg (オキシコドン内服液)  
●麻劇【般】オキシコドン経口液10mg (オキシコドン内服液)  
●麻劇【般】オキシコドン経口液20mg (オキシコドン内服液)  
○麻劇オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」 2.5mL/包 【後】  
(【般】オキシコドン経口液2.5mgへ切替)  
●麻劇オキシコドン内服液5mg「日本臓器」 2.5mL/包 【後】  
(【般】オキシコドン経口液5mgへ切替)  
●麻劇オキシコドン内服液10mg「日本臓器」 5mL/包 【後】  
(【般】オキシコドン経口液10mgへ切替)  
●麻劇オキシコドン内服液20mg「日本臓器」 5mL/包 【後】  
(【般】オキシコドン経口液20mgへ切替)  
麻劇オキシコンチンTR錠5mg (【般】なし)  
麻劇オキシコンチンTR錠10mg (【般】なし)  
麻劇オキシコンチンTR錠20mg (【般】なし)  
麻劇オキシコンチンTR錠40mg (【般】なし)  
● 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg (ポラキス)  
● 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg (ポラキス)  
●麻劇オキノーム散2.5mg (院内はオキドン錠2.5mg N X「第一三共」)  
●麻劇オキノーム散5mg (院内はオキドン錠5mg N X「第一三共」)  
●麻劇オキノーム散10mg (院内はオキドン錠10mg N X「第一三共」)  
●麻劇オキノーム散20mg (院内はオキドン錠20mg N X「第一三共」)  
オーグメンチン配合錠250RS  
● オスピ 桂枝加苓朮附湯エキスG [3.0g]SG-18R  
オスピ 小半夏加茯苓湯エキスG [1.0g]SG-21  
オスピ 大黃甘草湯エキスT錠 [2錠/P]SG-84T  
● オスボロット錠50mg  
● オゼックヌス細粒小児用15%—150mg/g  
(【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%へ切替)  
● オゼックス錠150 150mg  
(【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mgへ切替)  
○ オセルタミビルカプセル75mg「サリ」 【後】  
● 【般】オセルタミビルカプセル75mg (タミフル)  
● 【般】オセルタミビルシロップ用3% (タミフル)  
●劇オダイン錠125mg (【般】フルタミド錠125mgへ切替)  
●劇オテズラ錠10mg  
●劇オテズラ錠20mg  
●劇オテズラ錠30mg  
劇オデフシ配合錠  
オノンドライシロップ10%  
(プランルカストドライシロップ10%「AFP」へ切替)  
(【般】プランルカストシロップ用10%へ切替)  
● オノンカプセル112.5mg  
(院内はプランルカストカプセル112.5mg「サリ」)  
(【般】プランルカストカプセル112.5mgへ切替)  
● オパルモジ錠5μg  
(【般】リマプロストアルファデクス錠5μgへ切替)  
劇オフェブカプセル100mg  
劇オフェブカプセル150mg  
劇オプスミット錠10mg  
●麻劇オゾン内服液5mg [2.5mL/P]  
●麻劇オゾン内服液10mg [5mL/P]

劇オペブリム 1カプセル500mg

○ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ト-7」 【後】

● 【般】 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g (ロトリガ)

● 【般】 オメプラゾール錠10mg (オメプラール)

● オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」 【後】

● 【般】 オメプラゾール錠20mg (オメプラール)

● オメプラゾール錠10mg (【般】 オメプラゾール錠10mgへ切替)

● オメプラゾール錠20mg (【般】 オメプラゾール錠20mgへ切替)

オラベネム小児用細粒10% 100mg/g

● 【般】 オランザピン細粒1% (ジプレキサ)

○ 劇オランザピン錠2.5mg「アメル」 【後】

● 【般】 オランザピン錠2.5mg

○ 劇オランザピンOD錠5mg「トワ」 【後】

● 【般】 オランザピン口腔内崩壊錠5mg

● 【般】 オランザピン口腔内崩壊錠10mg (ジプレキサ)

劇オルケディア錠1mg

● 劇オルケディア錠4mg

● 劇オルミエント錠2mg

劇オルミエント錠4mg

○ オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 【後】

● 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg (オルメテック)

● 【般】 オルメサルタンOD錠10mg (オルメテック)

● 【般】 オルメサルタンOD錠20mg (オルメテック)

● 【般】 オルメサルタンOD錠40mg (オルメテック)

● オルメテックOD錠5mg

● オルメテックOD錠10mg

● オルメテックOD錠20mg

(院内はオルメサルタンOD錠20mg「DSEP」)

● オルメテックOD錠40mg

● 【般】 カバダジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g (包) (アレロック)

○ オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トワ」 【後】

● 【般】 オロバタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg (アレロック)

● オンダリザ錠2.5mg (【般】 サキサグリブチン錠2.5mgへ切替)

● オンダリザ錠5mg (【般】 サキサグリブチン錠5mgへ切替)

劇オンジェンティス錠25mg

【カ】

劇カイトリル錠1mg

ガスヨン錠40mg (ジメチコン錠40mg「YD」へ切替)

(【般】 ジメチコン錠40mgへ切替)

ガスコンドロップ内用液2%

(【般】 ジメチコンシロップ2%へ切替)

● ガスター散2% [10mg/0.5g] (院内はファモチジン散2%「トワ」)

(【般】 ファモチジン散2% 0.5g/包へ切替)

● ガスターD錠10mg (院内はファモチジンOD錠10mg「トワ」)

(【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠10mgへ切替)

● ガスターD錠20mg (院内はファモチジンOD錠20mg「トワ」)

(【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠20mgへ切替)

ガストログラフイン経口・注腸用 [100mL]

● ガストロゼビン錠25mg

(【般】 ピレンゼビン塩酸塩錠25mgへ切替)

ガストローム顆粒66.7% [1.5g/P]

(【般】 エカペトN-a顆粒66.7% 1.5g/包へ切替)

● ガスマチン錠5mg (院内はモサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」)

● ガスロN-OD錠4mg

(【般】 イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠4mgへ切替)

劇カソデックスOD錠80mg (ピカルタミドOD錠80mg「トワ」へ切替)

(【般】 ピカルタミド口腔内崩壊錠80mgへ切替)

カタプレス錠75μg

カチーフN散10mg/g

● 劇カデュエット配合錠2番

(【般】 アムジビン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：2へ切替)

劇カデュエット配合錠4番

(【般】 アムジビン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：4へ切替)

カナダル錠100mg

カナダルOD錠100mg

● ガナトナ錠50mg (院内はイトブリド塩酸塩錠50mg「サリ」)

(【般】 イトブリド塩酸塩錠50mgへ切替)

カナマイシンカプセル250mg「明治」

※ カナリア配合錠 (カナリア配合OD錠へ切替予定)

→ カナリア配合OD錠 (カナリア配合錠が無くなり次第切替)

カーバゲル分散錠200mg

● 劇カバサール錠0.25mg (【般】 なし)

● 劇カバサール錠1.0mg (院内はカベルゴリン錠1.0mg「サリ」)

ガバペン錠200mg

● ガバペン錠300mg

カプトリル錠12.5mg

● カプトリル-Rカプセル18.75mg

劇カブレラ錠100mg

○ 劇カペシタビン錠300mg「サリ」 【後】

● 【般】 カペシタビン錠300mg (ゼローダ)

● 【般】 カベルゴリン錠0.25mg (カバサール)

劇カベルゴリン錠1.0mg「サリ」 【後】 (【般】 なし)

● 【般】 カベルゴリン錠1mg (カバサール)

劇カボメティクス錠20mg

劇カボメティクス錠60mg

● 劇カムザイオスカプセル1mg

劇カムザイオスカプセル2.5mg

● 劇カムザイオスカプセル5mg

○ カモスタットメシル酸塩錠100mg「トワ」 【後】

● 【般】 カモスタットメシル酸塩錠100mg (フオイパン)

● ガランターゼ散50% [0.5g/P]

● 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠4mg (レミニールOD)

● 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠8mg (レミニールOD)

● 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠12mg (レミニールOD)

● 【般】 カリジノゲナーゼ錠50単位 (カルナクリン)

カリメート散 [5g/P]

● カリメートドライシロップ92.59% [5.4g/P]

● カリメート経口液20% [25g/P] (【般】 なし)

カルゲート錠10-10mg (【般】 デノパミン錠10mgへ切替)

(院内はデノパミン錠10mg「日医工」)

劇カルケンスカプセル100mg

劇カルケンス錠100mg

● 【般】 カルシリオールカプセル0.25μg (ロカルトロール)

● 劇カルスロット錠10-10mg (【般】 マニジビン塩酸塩錠10mgへ切替)

● 【般】 カルテオロール塩酸塩錠5mg (ミケラン)

● カルデナリンOD錠1mg (院内はドキサゾシン錠1mg「カベ」)

● カルデナリンOD錠4mg (院内はドキサゾシン錠4mg「カベ」)

カルナクリン錠50-50単位

(【般】 カリジノゲナーゼ錠50単位へ切替)

● 【般】 カルバゾクロムスルホン酸N-a散10% (アドナ)

○ カルバゾクロムスルホン酸N-a錠30mg「YD」 【後】

● 【般】 カルバゾクロムスルホン酸N-a錠30mg (アドナ)

→ カルバマゼビン細粒50%「アメル」

(テグレトール細粒50% (供給停止) が無くなり次第使用開始)

- 【般】カルバマゼピン細粒50%（テグレトール）
- 【般】カルバマゼピン錠100mg（テグレトール）
- 【般】カルバマゼピン錠200mg（テグレトール）
- カルプロッカ錠16mg（院内はアゼルニジビン錠16mg「トワ」）  
（【般】アゼルニジビン錠16mgへ切替）
- カルベジロール錠2.5mg「トワ」【後】
- 【般】カルベジロール錠2.5mg（アーチスト）
- カルベジロール錠10mg「トワ」【後】
- 【般】カルベジロール錠10mg（アーチスト）
- カルボシスティインDS50%「トワ」【後】
- 【般】カルボシスティインシロップ用50%（ムコダイン）
- カルボシスティイン錠250mg「トワ」【後】
- 【般】カルボシスティイン錠250mg（ムコダイン）
- カルボシスティインシロップ小児用5%「トワ」【後】
- 【般】カルボシスティインシロップ5%  
カルメロースナトリウム原末「マルイ」（院内製剤原料）
- 劇カレトラ配合錠  
劇カログラ錠120mg  
劇カロナール細粒50%【後】（【般】なし）
- 劇カロナール錠300—300mg【後】  
(【般】アセトアミノフェン錠300mgへ切替)
- 劇カロナールシロップ2%【後】  
(【般】アセトアミノフェンシロップ2%へ切替)
- カロリールゼリ 40.496% 16.05g[ラテックスとして6.5g含有]【後】
- 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒
- 【般】カンデサルタン錠2mg（プロプレス）
- カンデサルタン錠4mg「あすか」【後】
- 【般】カンデサルタン錠4mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン錠8mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン錠12mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン・アムロジビン2.5mg配合錠（ユニシアLD）
- 【般】カンデサルタン・アムロジビン5mg配合錠（ユニシアHD）
- 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロキシプロアジド配合錠（エカードLD）
- 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロキシプロアジド配合錠（エカードHD）
- 【キ】  
キシロカインビスカス2% [100mL]  
キックリン顆粒86.2%
- キックリンカプセル250mg
- キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」  
キプレス細粒4mg [4mg/P]  
(【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包へ切替)
- キプレスチアブル錠5mg  
(院内はモンテルカストチアブル錠5mg「トワ」へ切替)  
(【般】モンテルカストチアブル錠5mgへ切替)
- キプレス錠5mg（【般】モンテルカスト錠5mgへ切替）
- キプレス錠10mg（【般】モンテルカスト錠10mgへ切替）
- キプレスOD錠10mg（院内はモンテルカストOD錠10mg「カム」）  
(【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- ギボンズ錠1mg【後】（【般】チザニジン錠1mgへ切替）  
劇ギヤバロン錠10mg  
キャブピリン配合錠
- 【般】球形吸着炭カプセル200mg（クレメジン）  
○ 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 [2g/P]【後】
- 【般】球形吸着炭細粒 2g/包（クレメジン）
- 【ク】  
● 【般】ケアゼパム錠15mg（ドラール）
- 【般】クエチアピン細粒50%（セロクエル）

- 劇クエチアピン錠12.5mg「アル」【後】
- 【般】クエチアピン錠12.5mg（セロクエル）
- 劇クエチアピン錠25mg「アル」【後】
- 【般】クエチアピン錠25mg（セロクエル）
- 劇クエチアピン錠100mg「アル」【後】
- 【般】クエチアピン錠100mg（セロクエル）
- 【般】クエチアピン錠200mg（セロクエル）
- 【般】ケン酸カリム・ケン酸ナトリム配合散 1g/包（ウラリットU）
- 【般】ケン酸カリム・ケン酸ナトリム配合錠（ウラリット）
- ケエン酸第一鉄Na錠50mg「カム」【後】
- 【般】ケン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）（フェロミア）  
ケエン酸ナトリウム末  
ケーピック錠25mg
- ケーピック錠50mg  
グーフィス錠5mg  
グラクティブ錠12.5mg
- グラクティブ錠25mg  
グラクティブ錠50mg
- グラクティブ錠100mg  
グラケーカプセル15mg  
(【般】メナテトレノンカプセル15mgへ切替)
- クラジ 加味帰脾湯エキス細粒 [2.5g] EK-49  
クラジ 桂枝茯苓丸エキス細粒 [2.0g] EK-25  
クラジ 神秘湯エキス細粒 [2.0g] EK-85
- クラジ 大柴胡湯エキス細粒 [2.0g] EK-8  
クラジ 人參養榮湯エキス細粒 [2.5g] EK-108
- 劇グラセプターカプセル0.5mg
- 劇グラセプターカプセル1mg
- クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg/g
- クラビット錠250mg（【般】レボフロキサシン錠250mgへ切替）
- クラビット錠500mg（院内はレボフロキサシン錠500mg「カム」）  
(【般】レボフロキサシン錠500mgへ切替)
- グラマリール細粒10%（【般】チアブリド塩酸塩細粒10%へ切替）
- グラマリール錠25mg（【般】チアブリド塩酸塩錠25mgへ切替）  
グラマリール錠50mg（チアブリド錠50mg「カム」へ切替）  
(【般】チアブリド塩酸塩錠50mgへ切替)
- クラリシッド錠50mg小児用  
(クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」へ切替)
- 【般】クラリスロマイシン錠50mg（クラリシッド、クラリス）
- クラリシッド錠200mg（院内はクラリスロマイシン錠200mg「トワ」）
- クラリス錠200—200mg  
クラリスロマイシンDS小児用10%「カム」【後】（【般】なし）
- クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」【後】（【般】なし）  
クラリスロマイシン錠200mg「トワ」【後】（【般】なし）
- クラリチンドライシロップ1% [5mg/0.5g/P]  
(【般】ロラタジンシロップ用1% 0.5g (包)へ切替)
- クラリチン錠10mg（【般】ロラタジン錠10mgへ切替）
- グランダキシン錠50—50mg（【般】トフィソバム錠50mgへ切替）
- 劇クリアミン配合錠S 0.5  
クリアナール錠200mg
- 【般】グリクラジド錠20mg（グリミクロン）  
(2026年3月31日削除予定)
- 【般】グリクラジド錠40mg（グリミクロン）  
(2026年3月31日削除予定)  
グリチロン配合錠
- クリノリル錠100 100mg  
劇グリベック錠100mg（イマチニブ錠100mg「カム」へ切替）  
(【般】イマチニブ錠100mgへ切替)

- 【般】 グリベンクラミド錠1.25mg (ダオニール)
- 【般】 グリベンクラミド錠2.5mg (ダオニール)
- 劇グリミクロンH A錠20mg (【般】 グリクラジド錠20mgへ切替)
- 劇グリミクロン錠40mg (【般】 グリクラジド錠40mgへ切替)
- 劇グリメピリド錠1mg「ト-7」 【後】 (【般】なし)
- 【般】 グリメピリド錠0.5mg (アマリール)
- 【般】 グリメピリド錠3mg (アマリール)
- グルコバイ錠50mg (【般】 アカルボース錠50mgへ切替)
- グルコバイ錠100mg (【般】 アカルボース錠100mgへ切替)  
グルコンサンK細粒4mEq/g
- 【般】 グルタチオン錠100mg (タチオン)
- グルヲースト錠10mg (【般】 ミチグリニドC a錠10mgへ切替)
- グルペス配合錠  
グルペス配合OD錠  
ケレスナールOD錠2.5mg (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
(院内はロスバスタチンOD錠2.5mg「サリ」)  
(【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mgへ切替)
- ケレスナール錠5mg (【般】ロスバスタチン錠5mgへ切替)  
グレースピット錠50mg (シタフロキサシン錠50mg「サリ」へ切替)
- 劇クレセンバカプセル40mg  
劇クレセンバカプセル100mg
- 【般】 クレマスチンシロップ用0.1% (テルギンG)  
○ 劇クレマスチンDS 0.1%「タタ」 【後】  
(テルギンGドライシロップ0.1%より名称変更)
- 劇クレミン錠25mg
- ケレメジン細粒分包2g (院内は球形吸着炭細粒分包2g「日医工」)  
(【般】球形吸着炭細粒 2g/包へ切替)
- ケレメジン速崩錠500mg
- 【般】 ケレンブテロール塩酸塩錠10μg (スピロベント)  
劇クロザリル錠25mg  
劇クロザリル錠100mg
- 向クロチアゼパム錠5mg「サリ」 【後】
- 【般】 クロチアゼパム錠5mg
- 【般】 クロピドグレル・アスピリン配合錠 (コンプラビン配合錠)
- 【般】 クロピドグレル錠25mg (プラビックス)
- クロピドグレル錠75mg「ト-7」 【後】
- 【般】 クロピドグレル錠75mg (プラビックス)
- クロフェクトン顆粒10%
- クロフェクトン錠10mg
- クロフェクトン錠25mg  
クロミッド錠50mg
- d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 【後】
- 【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg (ポララミン)
- クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 【後】  
(プロスター錠25から切替)
- 【般】 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg (プロスター)  
【ケ】
- 劇ケアラム錠25mg (【般】 イグラチモド錠25mgへ切替)  
劇アロードLA錠60μg  
ケイキサレートドライシロップ76% [3.27g/P]
- ケイツーカプセル5mg  
ケイツーシロップ0.2% [1mL/P]  
ケタスカプセル10mg
- 【般】 ケトチフェンカプセル1mg (ザジテン)
- ケトチフェンDS小児用0.1%「サリ」 【後】
- 【般】 ケトチフェンシロップ用0.1% (ザジテン)

- 劇ゲフィチニブ錠250mg「NK」 【後】 (2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】 ゲフィチニブ錠250mg (イレッサ)  
ケフラール細粒小兒用100mg
- ケルロシグ錠10mg (【般】 ベタキソロール塩酸塩錠10mgへ切替)  
ケレンディア錠10mg  
ケレンディア錠20mg
- ケーワン錠5mg (【般】 フィトナジオン錠5mgへ切替)  
劇ゲンボイヤ配合錠
- 【コ】
- コスパノンカプセル40mg
- 劇コセルゴカプセル10mg
- 劇コセルゴカプセル25mg  
コタロ- 葛根湯加辛夷川芎エキス細粒 [3.0g]N2  
コタロ- 桂梗石膏エキス細粒 [2.0g]N324  
コタロ- 九味欒榔湯エキス細粒 [2.0g]N311  
コタロ- 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 [2.5g]N12  
コタロ- 柴胡清肝湯エキス細粒 [3.0g]N80  
● コタロ- 桔子柏皮湯エキス細粒 [2.0g]N314  
コタロ- 大柴胡湯去大黃エキス細粒 [3.0g]N319  
コタロ- 腸癰湯エキス細粒 [2.0g]N320  
コタロ- 半夏白朮天麻湯エキス細粒 [3.0g]N37
- コデイオ配合錠E-X  
(【般】 バルサルタム・ヒドロキシド 12.5mg配合錠へ切替)  
劇コデインリン酸塩散1%「サリ」  
麻劇コデインリン酸塩散10%「タタ」  
コートリル錠10mg
- コートン錠25mg
- 劇ヨニール錠4mg (院内はベニジピン塩酸塩錠4mg「ト-7」)  
(【般】ベニジピン塩酸塩錠4mgへ切替)
- ※ コバシル錠4mg (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了)  
(【般】ベリンドブリエルブミン錠4mgへ切替)  
ヨムターン錠100mg (エンタカボン錠100mg「JG」へ切替)  
コメリアンヨーワ錠 50mg (シラセブ塩酸塩錠50mg「ト-7」へ切替)
- コメリアンヨーワ錠 100mg (シラセブ塩酸塩錠100mg「ト-7」へ切替)  
(【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mgへ切替)  
劇コララン錠2.5mg
- 劇コララン錠5mg
- 劇コララン錠7.5mg  
劇コルヒチン錠0.5mg「タタ」
- コレチメント錠9mg
- コレバイン錠500mg
- コレバインミニ83% [1.81g/P]  
向劇コンサータ錠18mg
- 向劇コンサータ錠27mg  
コントミン糖衣錠12.5mg
- コンプラビン配合錠 (【般】なし)  
(【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠へ切替)
- 【サ】
- サアミオシ錠5mg (院内はニセルゴリン錠5mg「ト-7」へ切替)  
(【般】ニセルゴリン錠5mgへ切替)
- 劇ザイアジエン錠300mg  
サイクロセリンカプセル250mg「明治」  
ザイザル錠5mg (レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」へ切替)  
(【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mgへ切替)  
ザイザルシロップ0.05%  
(レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ト-7」へ切替)  
(【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%へ切替)

劇ザイティガ錠250mg

●劇ザイティガ錠500mg  
劇サイトテック錠100 100 $\mu$ g

●劇サイバインコ錠50mg

●劇サイバインコ錠100mg

●劇サイバインコ錠200mg  
ザイボックス錠600mg (【般】リネゾリド錠600mgへ切替)

●向サイレース錠1mg (フルニトラゼパム錠1mg「アル」へ切替)  
(【般】フルニトラゼパム錠1mgへ切替)

劇サインバルタカプセル20mg  
(院内はデュロキセチンOD錠20mg「ニコ」へ切替)  
(【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mgへ切替)

● 【般】サキサグリブチン錠2.5mg (オングリザ)  
● 【般】サキサグリブチン錠5mg (オングリザ)

○劇酢酸亜鉛顆粒5%「サイ」 【後】

●劇【般】酢酸亜鉛顆粒5% (ノベルジン)

○劇酢酸亜鉛錠25mg「サイ」 【後】

●劇【般】酢酸亜鉛錠25mg (ノベルジン)

●劇【般】酢酸亜鉛錠50mg (ノベルジン)  
劇ザクラス配合錠七D  
劇ザクラス配合錠H-D (院内はジルムロ配合錠H-D「武田テバ」へ切替)

●劇ザーコリカプセル200mg  
劇ザーコリカプセル250mg  
ザジテンドライシロップ0.1%  
(ケトチフェンDS 小児用0.1%「サイ」へ切替)

● ザジテンカプセル1mg (【般】ケトチフェンカプセル1mgへ切替)  
劇サーティカン錠0.25mg

●劇サーティカン錠0.5mg

●劇サーティカン錠0.75mg

●向劇サノレックス錠0.5mg  
ザファテック錠100mg  
劇サブリル散分包500mg [500mg/P]  
劇サムスカ顆粒1% (【般】トルバブタン顆粒1%へ切替)

※劇サムスカOD錠7.5mg  
(トルバブタンOD錠7.5mg「オーツ」へ切替予定 (適応が揃い次第))  
(【般】トルバブタン口腔内崩壊錠7.5mgへ切替)

●劇サムスカOD錠15mg  
(【般】トルバブタン口腔内崩壊錠15mgへ切替)  
劇サムスカOD錠30mg  
サムチレール内用懸濁液15% [5mL/P]

●劇サラジエン顆粒0.5% [5mg/1g/P]  
劇サラジエン錠5mg

● 【般】サラゾスルファビリジン錠500mg (サラゾビリン)  
● サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」 【後】

● 【般】サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg (アザルフィジンEN)  
● サラゾビリン錠500mg

● ザルティア錠2.5mg (【般】タダラフィル錠2.5mg: Z Aへ切替)  
ザルティア錠5mg (【般】タダラフィル錠5mg: Z Aへ切替)

● 【般】ザルトプロフェン錠80mg (ペオン錠80mg)  
サルプレッピ配合内用液 480mLV

○ サルポグレラート塩酸塩錠50mg「ト-7」 【後】

● 【般】サルポグレラート塩酸塩錠50mg (アンプラーグ)  
● 【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg (アンプラーグ)  
毒サレドカプセル25 25mg  
毒サレドカプセル100 100mg

● ザロンチンシロップ5%

● サワニサンカプセル250-250mg  
(院内はアモキシシリンカプセル250mg「日医工」)  
(【般】アモキシシリンカプセル250mgへ切替)  
酸化マグネシウム原末「マルイシ」

● 【般】酸化マグネシウム錠250mg

○ 酸化マグネシウム錠330mg「ケイ-」 【後】

● 【般】酸化マグネシウム錠330mg

● 【般】酸化マグネシウム錠500mg

● サンバゾン錠50mg 【後】  
(【般】エペリゾン塩酸塩錠50mgへ切替)

●劇サンリズムカプセル50mg  
(院内はピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「ト-7」)  
(【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mgへ切替)  
三和 黄芩湯エキス細粒 [2.5g]S-35  
三和 葛根加朮附湯エキス細粒 [2.5g]S-07  
劇三和 桂芍知母湯エキス細粒 [3.0g]S-10  
劇三和 附子理中湯エキス細粒 [1.5g]S-09

【シ】

○向ジアゼパム錠2mg「アル」 【後】

● 【般】ジアゼパム錠2mg (セルシン)  
● 【般】ジアゼパム錠5mg (セルシン)  
劇シアナマイド内用液1%「タベ」 [100mL] [冷]

● シアリス錠10mg  
[男性不妊の治療目的で処方された場合のみ保険適用]  
劇ジェイゾロフト錠25mg (院内はセルトラリン錠25mg「アル」)  
(【般】セルトラリン錠25mgへ切替)

●劇ジェイゾロフト錠50mg (【般】セルトラリン錠50mgへ切替)

●劇ジェセリ錠40mg  
ジェニナック錠200mg

○ ジエノゲスト錠0.5mg「モチ」 【後】

● 【般】ジエノゲスト錠0.5mg (ディナゲスト)  
● 【般】ジエノゲスト錠1mg (ディナゲスト)

● ジエミーナ配合錠

●劇ジオトリフ錠20mg  
劇ジオトリフ錠30mg  
劇ジオトリフ錠40mg  
劇ジカディア錠150mg

● シグマ-1錠5mg (院内はニコランジル錠5mg「サイ」)  
(【般】ニコランジル錠5mgへ切替)

劇シクレスト舌下錠5mg  
劇シクレスト舌下錠10mg

●劇シクロスボリン細粒17%「アサ」 【後】

● 【般】シクロスボリン細粒17%

○劇シクロスボリンカプセル10mg「ト-7」 【後】

● 【般】シクロスボリンカプセル10mg: N E (ネオーラル)

○劇シクロスボリンカプセル25mg「ト-7」 【後】

● 【般】シクロスボリンカプセル25mg: N E (ネオーラル)

○劇シクロスボリンカプセル50mg「ト-7」 【後】

● 【般】シクロスボリンカプセル50mg: N E (ネオーラル)

● 【般】ジクロフェナクN a徐放カプセル37.5mg (ボルタレンSR)

○劇ジクロフェナクN a錠25mg「ト-7」 【後】

● 【般】ジクロフェナクN a錠25mg (ボルタレン)  
劇ジゴシン散0.1%  
劇ジゴシン錠0.25mg  
劇ジゴシンエリキシル0.05mg/mL

●劇ジスバルカプセル40mg  
ジスロマック細粒小児用10%  
(【般】アジスロマイシン細粒10%へ切替)

- ジスロマッカ錠250mg（【般】アジスロマイシン錠250mgへ切替）
- 効セレカ錠100mg
- 効セレカ錠200mg
- 【般】ジソピラミドカプセル50mg（リスモダン）
- 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg（リスモダンR）
- シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
- シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
- シタフロキサシン錠50mg「サリ」【後】（【般】なし）
- 【般】シタフロキサシン錠50mg（グレースピット）  
シナール配合顆粒 [1g/P]  
(【般】アコルビン酸・パンテン酸C a配合顆粒 1g/包へ切替)
- ジビリダモール散12.5%「JG」【後】
- 【般】ジビリダモール散12.5%（アンギナール）
- ジビリダモール錠25mg「トワ」【後】
- 【般】ジビリダモール錠25mg（ペルサンチン）
- ジビリダモール錠100mg「トワ」【後】
- 【般】ジビリダモール錠100mg（ペルサンチン）
- ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」【後】
- ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タヨ」【後】  
(ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」へ名称変更)
- 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg（セファドール）
- ジフルカノンカプセル100mg  
(【般】フルコナゾールカプセル100mgへ切替)
- 効ジプレキサ細粒1%  
(【般】オランザピン細粒1%へ切替)
- 効ジプレキサザイディス錠5mg（院内はオランザピンOD錠5mg「トワ」）  
(【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 効ジプレキサザイディス錠10mg  
(【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mgへ切替)  
シベクトロ錠200mg
- 効シベノール錠50mg（院内はシベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サリ」）  
○ 効シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サリ」【後】  
○ 効シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トワ」【後】（販売中止）  
(2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg（シベノール）
- 【般】ジメチコンシロップ2%（ガスコン）
- ジメチコン錠40mg「YD」【後】
- 【般】ジメチコン錠40mg（ガスコン）
- 【般】ジメチジン錠200mg（タガメット）
- 【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25%（アストミシロップ）  
劇ジャカビ錠5mg  
劇ジャカビ錠10mg  
劇ジャカビ内用液小児用0.5% [2~8°C]  
ジャディアヌス錠10mg
- ジャディアヌス錠25mg  
劇ジャドニュ顆粒分包90mg（【般】デフェラシロックス顆粒90mgへ切替）  
劇ジャドニュ顆粒分包360mg（【般】デフェラシロックス顆粒360mgへ切替）  
ジャスビア錠12.5mg（グラクティブ錠12.5mgへ切替）
- ジャスビア錠25mg  
ジャスビア錠50mg（グラクティブ錠50mgへ切替）  
劇ジャルカ配合錠  
臭化カリウム「ヤマゼン」  
ジュリナ錠0.5mg（【般】エストラジオール錠0.5mgへ切替）
- ジュンコウ四物湯FCエキス細粒医療用 [2.5g]FC71
- 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg（ニトロールR）
- 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg（フランドル錠）
- 小児用エコソルベンシロップ0.3%  
(【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3%へ切替)
- 【般】シラザブリル錠0.5mg（インヒベース）
- 【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg（コメリアンコーウ）
- 【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mg（コメリアンコーウ）
- ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サリ」【後】
- 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg（ヘルベッサーR）
- ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トワ」【後】
- 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg（ヘルベッサー）
- ジルテック錠10~10mg（販売中止）  
(【般】セチリジン塩酸塩錠10mgへ切替)
- 【般】シルデナフィル錠20mg: R E（レバチオ）
- シルニジピン錠10mg「JG」【後】  
(【般】シルニジピン錠10mgへ切替)
- 【般】シルニジピン錠10mg（アテレック錠）
- 【般】シルニジピン錠20mg（アテレック錠）
- 効ジルムロ配合錠HD「武田バ」【後】  
(ザクラス配合錠HDから切替)
- 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg（プレタール）
- シロスタゾールOD錠50mg「サリ」【後】  
(シロスタゾールOD錠50mg「サリ」へ切替)
- 【般】シロスタゾールOD錠100mg「サリ」【後】  
(シロスタゾールOD錠50mg「サリ」へ切替)
- 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg（プレタール）
- 【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg（ユリーフOD）
- 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg（ユリーフOD）
- シングレア細粒4mg [4mg/P]  
(【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包へ切替)
- シングレアチュアブル錠5mg  
(【般】モンテルカストチュアブル錠5mgへ切替)
- シングレア錠10mg（【般】モンテルカスト錠10mgへ切替）
- 効ジンタス錠50mg
- シンバスタチン錠5mg「アル」【後】
- 【般】シンバスタチン錠5mg（リポバス）
- シンメタレル細粒10%（【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%へ切替）  
シンメタレル錠50mg（アマンタジン塩酸塩錠50mg「サリ」へ切替）  
(【般】アマンタジン塩酸塩錠50mgへ切替)

【ス】

- 脾外分泌機能検査用P-FD内服液500mg 5% [10mL/瓶]
- スイニー錠100mg  
スインプロイク錠0.2mg
- スオード錠100 100mg  
スーグラ錠50mg
- スクランブルファート内用液10%「NIG」 [10mL/P] 【後】
- 【般】スクランブルファート経口液10%  
スージャヌ配合錠
- スターシス錠30mg（【般】なし）（販売中止）  
(2026年3月31日経過措置終了)
- スターシス錠90mg（【般】ナテグリニド錠90mgへ切替）（販売中止）  
(2026年3月31日経過措置終了)
- 効スタラシドカプセル50 50mg
- スタレボ配合錠L 50
- スタレボ配合錠L 100
- 効スチバーガ錠40mg
- ステーブラOD錠0.1mg  
(【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mgへ切替)
- 劇スチーブルカプセル12.5mg（【般】スニチニブカプセル12.5mgへ切替）  
劇スチーブルカプセル200mg  
ストミンA配合錠

- 劇ストラテラカプセル5mg (【般】アトモキセチンカプセル5mgへ切替)
- 劇ストラテラカプセル10mg (【般】アトモキセチンカプセル10mgへ切替)
- 劇ストラテラカプセル25mg (【般】アトモキセチンカプセル25mgへ切替)
- 劇ストラテラカプセル40mg (【般】アトモキセチンカプセル40mgへ切替)
- 劇ストラテラ内用液0.4% (【般】アトモキセチン経口液0.4%へ切替)
  - ストロカイン錠5mg
  - 劇ストロメクトール錠3mg
  - 【般】スニチニブカプセル12.5mg (スチートン)
    - スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」
  - スピロノラクトン錠25mg「トワ」 【後】
  - 【般】スピロノラクトン錠25mg (アルダクトン)
    - スピロペント錠10μg (【般】クレングテロール塩酸塩錠10μgへ切替)
  - ズファジラン錠10mg
  - 【般】スプラタストトシル酸塩カプセル100mg (I-P-D)
    - 劇スプリセル錠20mg (ダサチニブ錠20mg「NK」へ切替予定)
      - (【般】ダサチニブ錠20mgへ切替)
    - 劇スプリセル錠50mg (ダサチニブ錠50mg「NK」へ切替予定)
      - (【般】ダサチニブ錠50mgへ切替)
  - 劇スマイラフ錠50mg
  - 劇スマイラフ錠100mg
  - 【般】スマトリブタン錠50mg (イミグラン)
  - スリンダ錠28
  - 劇スルピリド細粒50%「アメル」 【後】 (販売中止)
    - (2026年3月31日経過措置終了) (ドグマチール細粒50%へ切替)
  - 【般】スルピリド細粒50% (ドグマチール)
    - (2026年3月31日削除予定)
  - スルピリド錠50mg「アメル」 【後】
    - 【般】スルピリド錠50mg (ドグマチール)
    - 【般】スルピリド錠100mg (ドグマチール)
    - 【般】スルピリド錠200mg (ドグマチール)
  - 【セ】
    - セイブル錠50mg (院内はミグリトール錠50mg「トワ」)
      - (【般】ミグリトール錠50mgへ切替)
    - セキソビット錠100mg
    - 劇ゼジューラ錠100mg
    - ゼスラン小児用シロップ0.03%
    - セタブリル錠25mg (【般】アラセブリル錠25mgへ切替)
      - ゼチア錠10mg (エゼチミブ錠10mg「JG」へ切替)
        - (【般】エゼチミブ錠10mgへ切替)
    - 【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mg (テシブル錠)
    - 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%
    - 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg (ジルテック)
    - 劇セディール錠10mg (院内はタンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トワ」)
      - (【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mgへ切替)
    - 劇セディール錠20mg (【般】タンドスピロンクエン酸塩錠20mgへ切替)
      - 向セニラン錠2mg 【後】 (プロマゼバム錠2mg「サンド」へ名称変更)
        - (【般】プロマゼバム錠2mgへ切替)
    - 向セバゾン錠1 1mg
    - 劇セパミット細粒1% [10mg/1g/P] 【後】
      - (2023年3月現在、出荷停止)
        - (【般】ニフェジピン細粒1% 10mg/1g (包) へ切替)
    - セファドール錠25mg (院内はジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」)
      - (【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mgへ切替)
    - セファランチン末1%
    - 劇ゼフィックス錠100 100mg
    - セフカペン ピポキシル塩酸塩錠100mg「SW」 【後】 (【般】なし)
    - 【般】セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg (フロモックス)
    - 【般】セフジニル細粒10% (セフゾン)
    - セフゾン細粒小児用10%—100mg/g
    - セフゾンカプセル100mg (【般】加算なし)
    - 【般】セフボドキシムプロキセチルシロップ用5% (バナンD.S.)
    - 劇ゼポジアカブセル0.92mg
    - 劇ゼポジアカブセルスターター・パック
      - 劇セムブリックス錠20mg [25°C以下]
      - 劇セムブリックス錠40mg [25°C以下]
    - セララ錠25mg (【般】エプレレノン錠25mgへ切替)
      - セララ錠50mg (エプレレノン錠50mg「杏林」へ切替)
        - (【般】エプレレノン錠50mgへ切替)
    - 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg (セレクトール)
    - 劇セリンクロ錠10mg
      - 向セルシン散1%
      - 向2mgセルシン錠 (院内はジアゼバム錠2mg「アメル」)
        - (【般】ジアゼバム錠2mgへ切替)
      - 向5mgセルシン錠 (【般】ジアゼバム錠5mgへ切替)
    - 劇セルセプトカプセル250 250mg
    - セルテクトドライシロップ2%—20mg/g
      - (【般】オキサトミドシロップ用2%へ切替)
    - セルテクト錠30—30mg (【般】オキサトミド錠30mgへ切替)
    - 劇セルトラリン錠25mg「アメル」 【後】
      - 【般】セルトラリン錠25mg (ジェイゾロフト)
      - 【般】セルトラリン錠50mg (ジェイゾロフト)
      - セルニルトン錠 63mg
      - セルベックス細粒10% [0.5g/P]
      - セルベックスカプセル50mg (院内はテプレノンカプセル50mg「トワ」)
        - (【般】テプレノンカプセル50mgへ切替)
      - 劇ゼルヤンツ錠5mg
      - セレキノン錠100mg
        - (【般】トリメブチニンマレイン酸塩錠100mgへ切替)
      - 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg (エフピー)
      - 劇セレタール錠100mg
        - (【般】セリプロロール塩酸塩錠100mgへ切替)
      - 【般】セレコキシブ錠100mg (セレコックス)
      - 劇セレコキシブ錠100mg「JG」 【後】
        - 劇セレコックス錠100mg (セレコキシブ錠100mg「JG」へ切替)
          - セレジストOD錠5mg (院内はタルチレリンOD錠5mg「サリ」)
            - (【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mgへ切替)
        - セレスタミン配合錠 (院内はベタセレミン配合錠)
          - (【般】ベタメタゾン・d-クロロフェニラミン配合錠へ切替)
          - セレニカR顆粒40% (【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%へ切替)
          - セレニカR錠200mg
        - 劇セレネース細粒1% (院内はハロベリドール細粒1%「ヨシミ」)
          - (【般】ハロベリドール細粒1%へ切替)
        - 劇セレネース錠0.75mg (院内はハロベリドール錠0.75mg「ヨシミ」)
          - (【般】ハロベリドール錠0.75mgへ切替)
        - 劇セレネース錠1mg (【般】ハロベリドール錠1mgへ切替)
        - 劇セレネース錠1.5mg (院内はハロベリドール錠1.5mg「ヨシミ」)
          - (【般】ハロベリドール錠1.5mgへ切替)
        - 劇セレネース錠3mg (【般】ハロベリドール錠3mgへ切替)
        - 劇セレネース内服液0.2%
        - 劇セロクエル細粒50% (【般】クエチアピン細粒50%へ切替)
        - 劇セロクエル錠25mg (院内はクエチアピン錠25mg「アメル」)
          - (【般】クエチアピン錠25mgへ切替)
        - 劇セロクエル100mg錠 (院内はクエチアピン錠100mg「アメル」)
          - (【般】クエチアピン錠100mgへ切替)
        - 劇セロクエル200mg錠
          - (【般】クエチアピン錠200mgへ切替)

- セロカラール錠20mg  
 (【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mgへ切替)  
 劇ゼローダ錠300—300mg (カベシタビン錠300mg「サイ」へ切替)  
 (【般】カベシタビン錠300mgへ切替)  
 ゼンタコートカプセル3mg
- 【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包 (アローゼン)  
 ○ センノシド錠12mg「トワ」 【後】
- 【般】センノシド錠12mg (ブルゼニド)  
 【ソ】  
 劇ゾコーバ錠125mg  
 劇ゾスバタ錠40mg  
 ●向劇ソセゴン錠25mg  
 ソタコール錠40mg (【般】ソタロール塩酸塩錠40mgへ切替)  
 (ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」へ切替)  
 ○ ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 【後】
- 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg (ソタコール)  
 ●劇ソーティクツ錠6mg  
 ※劇ゾテビン錠25mg「カタ」 【後】 (販売中止)  
 (2026年3月31日経過措置終了) (ロドビン錠25mgへ切替)
- 【般】ゾテビン錠25mg (ロドビン) (2026年3月31日削除予定)
- 【般】ゾニサミド散20% (エクセグラン)  
 ○劇ゾニサミド錠100mg「アル」 【後】
- 劇【般】ゾニサミド錠100mg (エクセグラン)  
 ●劇【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg : T R E (トレリーフOD)  
 ●劇【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg : T R E (トレリーフOD)  
 ● 【般】ゾビクリン錠7.5mg (アモバン)  
 ゾビラックス顆粒40% (【般】アシクロビル顆粒40%へ切替)
- ゾビラックス錠200—200mg (【般】アンタロビル錠200mgへ切替)  
 ● 【般】ソファルコン錠50mg (ソロン錠)  
 (2026年3月31日削除予定)  
 ゾフルーザ錠20mg
- 劇ゾーミッゲRM錠2.5mg  
 (【般】ゾルミトリップタノ口腔内崩壊錠2.5mgへ切替)  
 ●向ゾラナックス0.4mg錠 (院内はアルプラゾラム錠0.4mg「トワ」)  
 (【般】アルプラゾラム錠0.4mgへ切替)  
 ソランタール錠100mg
- ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トワ」 【後】
- 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg (ベシケア)  
 劇ゾリンザカプセル100mg  
 ○向ゾルビデム酒石酸塩OD錠5mg「サイ」 【後】
- 【般】ゾルビデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg (マイスリー)  
 ● 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠5mg (マイスリー)  
 ● 【般】ゾルビデム酒石酸塩錠10mg (マイスリー)  
 ● 【般】ゾルミトリップタノ口腔内崩壊錠2.5mg (ゾーミッゲRM)  
 【タ】  
 ● ダイアート錠60mg (【般】アゾセミド錠60mgへ切替)  
 ダイアモックス錠250mg
- ダイオウ末  
 ●劇タイケルブ錠250mg  
 太虎堂の芎帰調血飲エキス顆粒 [2.0g]EK-230
- 【般】耐性乳酸菌散0.6% (ビオフェルミンR)  
 ●劇ダイドロネル錠200 200mg  
 ダイフェン配合顆粒  
 タウリン散98%「大正」
- 劇ダオニール錠1.25mg  
 (【般】グリベンクラミド錠1.25mgへ切替)
- 劇ダオニール錠2.5mg  
 (【般】グリベンクラミド錠2.5mgへ切替)
- タガメット錠200mg  
 (【般】シメチジン錠200mgへ切替)  
 劇ダクチル錠50mg  
 (【般】ピペリドレート塩酸塩錠50mgへ切替)
- 劇タグリッソ錠40mg  
 劇タグリッソ錠80mg  
 ● 【般】タクロリムスカプセル0.5mg (プログラフ)  
 ● 【般】タクロリムスカプセル1mg (プログラフ)  
 ○劇タクロリムス錠0.5mg「トワ」 【後】
- 【般】タクロリムス錠0.5mg  
 ○劇タクロリムス錠1mg「トワ」 【後】
- 【般】タクロリムス錠1mg  
 タケキヤブOD錠10mg  
 タケキヤブOD錠20mg
- タケプロンOD錠15mg  
 (院内はランソプラゾールOD錠15mg「サイ」)  
 (【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mgへ切替)
- タケプロンOD錠30—30mg  
 (【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mgへ切替)
- タケルダ配合錠  
 ○ 劇ダサチニブ錠20mg「NK」 【後】
- 【般】ダサチニブ錠20mg (スプリセル)  
 ○劇ダサチニブ錠50mg「NK」 【後】
- 【般】ダサチニブ錠50mg (スプリセル)  
 ●劇タシグナカプセル150mg  
 劇タシグナカプセル200mg
- 劇ターゼナカプセル0.25mg  
 ●劇ターゼナカプセル1mg  
 ● 【般】タダラフィル錠2.5mg : Z A (ザルティア)  
 ● 【般】タダラフィル錠5mg : Z A (ザルティア)  
 ○ タダラフィル錠20mg A D「TE」 【後】
- 【般】タダラフィル錠20mg : A D (アドシルカ)  
 タチオン錠100mg (【般】グルタチオン錠100mgへ切替)  
 劇タナドーバ顆粒75% [750mg/1g/P]
- タナトリル錠5mg (院内はイミダプリル塩酸塩錠5mg「オーバ」)  
 (【般】イミダプリル塩酸塩錠5mgへ切替)
- 【般】ダバグリフロジン錠5mg (フォシーガ)  
 ● 【般】ダバグリフロジン錠10mg (フォシーガ)  
 劇タバリス錠100mg
- 劇タフィンラーカプセル50mg  
 劇タフィンラーカプセル75mg  
 ダフクリア錠200mg  
 タブネオスカプセル10mg
- 劇タブレクタ錠150mg  
 ●劇タブレクタ錠200mg  
 劇ダーブロック錠2mg  
 劇ダーブロック錠4mg
- ※ タベジール錠1mg  
 タミフルドライシロップ3%  
 (【般】オセルタミビルシロップ用3%へ切替)  
 タミフルカプセル75—75mg (オセルタミビルカプセル75mg「サイ」へ切替)  
 (【般】オセルタミビルカプセル75mgへ切替)
- タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 【後】
- 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg (ハルナール)  
 ● 【般】タモキシフェン錠10mg (ノルバデックス)  
 ● 【般】タモキシフェン錠20mg (ノルバデックス)  
 ○ タモキシフェン錠20mg「サイ」 【後】  
 ダラシンカプセル150mg

- タリーゼ錠10mg (【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mgへ切替)
- タリーゼOD錠5mg  
(【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)  
タリーゼOD錠10mg  
(ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トワ」へ切替)  
(【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- タリーゼ錠2.5mg
- タリーゼ錠15mg
- タリーゼOD錠2.5mg  
タリーゼOD錠5mg  
タリーゼOD錠10mg
- タリーゼOD錠15mg  
劇タルグレチンカプセル75mg
- 劇タルセバ錠25mg (【般】エルロチニブ錠25mgへ切替)  
※劇タルセバ錠100mg (【般】エルロチニブ錠100mgへ切替)  
劇タルセバ錠150mg (【般】エルロチニブ錠150mgへ切替)
- タルチレリンOD錠5mg「ヰ」 【後】
- 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg (セレジスト)  
炭酸水素ナトリウム末
- 【般】炭酸ランタン顆粒250mg (ホスレノール)  
劇炭酸リチウム錠100mg「大正」 100mg 【後】
- 【般】炭酸リチウム錠100mg (リーマス)  
○劇炭酸リチウム錠200mg「大正」 200mg 【後】
- 【般】炭酸リチウム錠200mg (リーマス)  
単シロップ (丸石)
- 劇タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アル」 【後】
- 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg (セディール)
- 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠20mg (セディール)  
ダントリウムカプセル25mg  
タンニン酸アルブミン末  
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 (タンニン酸アルブミンより切替)
- 劇タンボコール細粒10%  
劇タンボヨール錠50mg (フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」へ切替)  
(【般】フレカイニド酢酸塩錠50mgへ切替)
- 【チ】
- 【般】チアブリド塩酸塩細粒10% (グラマリール)
- チアブリド錠25mg「ヰ」 【後】
- 【般】チアブリド塩酸塩錠25mg (グラマリール)
- チアブリド錠50mg「ヰ」 【後】
- 【般】チアブリド塩酸塩錠50mg (グラマリール)
- 劇チオデロンカプセル5mg [冷]  
劇チガソンカプセル10 10mg  
○ チクロビジン塩酸塩錠100mg「トワ」 【後】 (パナルジン)
- 【般】チクロビジン塩酸塩錠100mg (パナルジン)
- チザニジン錠1mg「トワ」 【後】
- 【般】チザニジン錠1mg (テルネリン)
- 【般】チミペロン細粒1% (トロペン)  
(2026年3月31日削除予定)
- 劇チャンピックス錠0.5mg
- 劇チャンピックス錠1mg  
(0.5mg×11錠, 1mg×14錠を「服用のしかた」が記載された  
台紙にセットした「チャンピックス スタート用パック」もある。  
処方に「スタート用パック」とコメントを記載する)  
調剤用パンビタン末
- チヨコラA末1万単位/g
- 劇チラーデンS錠12.5μg  
劇チラーデンS錠25μg  
劇チラーデンS錠50μg
- 5mcgチロナミン錠 5μg  
沈降炭酸カルシウム末  
沈降炭酸カルシウム「ケンエー」粉末
- 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 【後】
- 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)  
【ツ】  
ツイミーグ錠500mg  
ツインラインNF配合経腸用液 [A液200mL, B液200mL]  
つくしA・M配合散 [1.3g/P]  
劇ツートラム錠25mg  
劇ツートラム錠50mg  
劇ツートラム錠100mg
- 劇ツートラム錠150mg  
ツベルミン錠100mg  
ムラ 安中散エキス顆粒 [2.5g]5  
ムラ 茵陳蒿湯エキス顆粒 [2.5g]135  
ムラ 茵陳五苓散エキス顆粒 [2.5g]117  
ムラ 温経湯エキス顆粒 [2.5g]106  
ムラ 温清飲エキス顆粒 [2.5g]57  
ムラ 越婢加朮湯エキス顆粒 [2.5g]28  
ムラ 黄耆建中湯エキス顆粒 [3.0g]98  
ムラ 黄連解毒湯エキス顆粒 [2.5g]15
- ムラ 黄連湯エキス顆粒 [2.5g]120  
ムラ 乙字湯エキス顆粒 [2.5g]3  
ムラ 葛根湯エキス顆粒 [2.5g]1  
ムラ 加味帰脾湯エキス顆粒 [2.5g]137  
ムラ 加味逍遙散エキス顆粒 [2.5g]24  
ムラ 甘麦大棗湯エキス顆粒 [2.5g]72  
ムラ 桔梗湯エキス顆粒 [2.5g]138  
ムラ 菖蒲湯エキス顆粒 [3.0g]77  
ムラ 荊芥連翹湯エキス顆粒 [2.5g]50  
ムラ 桂枝加芍藥大黃湯エキス顆粒 [2.5g]134  
ムラ 桂枝加芍藥湯エキス顆粒 [2.5g]60  
ムラ 桂枝加附湯エキス顆粒 [2.5g]18  
ムラ 桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 [2.5g]26  
ムラ 桂枝湯エキス顆粒 [2.5g]45  
ムラ 桂枝人参湯エキス顆粒 [2.5g]82  
ムラ 桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒 [2.5g]125  
ムラ 啓脾湯エキス顆粒 [2.5g]128  
ムラ 香蘇散エキス顆粒 [2.5g]70  
ムラ 五虎湯エキス顆粒 [2.5g]95  
ムラ 五積散エキス顆粒 [2.5g]63  
ムラ 牛車腎氣丸エキス顆粒 [2.5g]107  
ムラ 吳茱萸湯エキス顆粒 [2.5g]31  
ムラ 五苓散エキス顆粒 [2.5g]17  
ムラ 柴陷湯エキス顆粒 [2.5g]73  
ムラ 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 [2.5g]12  
ムラ 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 [2.5g]11  
ムラ 柴胡桂枝湯エキス顆粒 [2.5g]10  
ムラ 柴朴湯エキス顆粒 [2.5g]96  
ムラ 柴芩湯エキス顆粒 [3.0g]114  
ムラ 三黃瀉心湯エキス顆粒 [2.5g]113  
ムラ 酸棗仁湯エキス顆粒 [2.5g]103  
ムラ 三物黃芩湯エキス顆粒 [2.5g]121  
ムラ 滋陰降火湯エキス顆粒 [2.5g]93  
ムラ 滋陰至宝湯エキス顆粒 [3.0g]92  
ムラ 四逆散エキス顆粒 [2.5g]35  
ムラ 七物降下湯エキス顆粒 [2.5g]46

ムラ 四物湯エキス顆粒 [2.5g]71  
 ムラ 炙甘草湯エキス顆粒 [3.0g]64  
 ムラ 芍薬甘草湯エキス顆粒 [2.5g]68  
 ムラ 十全大補湯エキス顆粒 [2.5g]48  
 ムラ 十味敗毒湯エキス顆粒 [2.5g]6  
 ムラ 潤腸湯エキス顆粒 [2.5g]51  
 ムラ 小建中湯エキス顆粒 [2.5g]99  
 ムラ 小柴胡湯エキス顆粒 [2.5g]9  
 ムラ 小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 [2.5g]109  
 ムラ 小青竜湯エキス顆粒 [3.0g]19  
 ムラ 消風散エキス顆粒 [2.5g]22  
 ムラ 辛夷清肺湯エキス顆粒 [2.5g]104  
 ムラ 真武湯エキス顆粒 [2.5g]30  
 ムラ 清上防風湯エキス顆粒 [2.5g]58  
 ムラ 清暑益氣湯エキス顆粒 [2.5g]136  
 ムラ 清心蓮子飲エキス顆粒 [2.5g]111  
 ムラ 清肺湯エキス顆粒 [3.0g]90  
 ムラ 川芎茶調散エキス顆粒 [2.5g]124  
 ムラ 疎經活血湯エキス顆粒 [2.5g]53

● ムラ 大黄甘草湯エキス顆粒 [2.5g]84  
 ムラ 大黄牡丹皮湯エキス顆粒 [2.5g]33  
 ムラ 大建中湯エキス顆粒 [2.5g]100  
 ムラ 大柴胡湯エキス顆粒 [2.5g]8  
 ムラ 大承気湯エキス顆粒 [2.5g]133  
 ムラ 竹筍溫胆湯エキス顆粒 [2.5g]91  
 ムラ 治打撲一方エキス顆粒 [2.5g]89  
 ムラ 調胃承気湯エキス顆粒 [2.5g]74  
 ムラ 釣藤散エキス顆粒 [2.5g]47  
 ムラ 猪苓湯エキス顆粒 [2.5g]40  
 ムラ 通導散エキス顆粒 [2.5g]105  
 ムラ 桃核承気湯エキス顆粒 [2.5g]61  
 ムラ 当帰飲子エキス顆粒 [2.5g]86  
 ムラ 当帰建中湯エキス顆粒 [2.5g]123  
 ムラ 当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒 [2.5g]38  
 ムラ 当帰芍薬散エキス顆粒 [2.5g]23  
 ムラ 当帰湯エキス顆粒 [2.5g]102  
 ムラ 二朮湯エキス顆粒 [2.5g]88  
 ムラ 女神散エキス顆粒 [2.5g]67  
 ムラ 人參湯エキス顆粒 [2.5g]32

● ムラ 人參養榮湯エキス顆粒 [3.0g]108  
 ムラ 排膿散及湯エキス顆粒 [2.5g]122  
 ムラ 麦門冬湯エキス顆粒 [3.0g]29  
 ムラ 八味地黃丸エキス顆粒 [2.5g]7  
 ムラ 半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]16  
 ムラ 半夏瀉心湯エキス顆粒 [2.5g]14

● ムラ 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 [2.5g]37  
 ムラ 白虎加人參湯エキス顆粒 [3.0g]34  
 ムラ 茯苓飲エキス顆粒 [2.5g]69  
 ムラ 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]116

● ムラ 平胃散エキス顆粒 [2.5g]79  
 ムラ 防已黃耆湯エキス顆粒 [2.5g]20  
 ムラ 防風通聖散エキス顆粒 [2.5g]62  
 ムラ 補中益氣湯エキス顆粒 [2.5g]41  
 ムラ 麻黃湯エキス顆粒 [2.5g]27  
 ムラ 麻黃附子細辛湯エキス顆粒 [2.5g]127  
 ムラ 麻杏甘石湯エキス顆粒 [2.5g]55  
 ムラ 麻杏薏甘湯エキス顆粒 [2.5g]78  
 ムラ 麻子仁丸エキス顆粒 [2.5g]126

ムラ 木防已湯エキス顆粒 [2.5g]36  
 ムラ 薏苡仁湯エキス顆粒 [2.5g]52  
 ムラ 抑肝散エキス顆粒 [2.5g] 54  
 ムラ 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 [2.5g]83  
 ムラ 六君子湯エキス顆粒 [2.5g]43  
 ムラ 立効散エキス顆粒 [2.5g]110  
 ムラ 竜胆瀉肝湯エキス顆粒 [2.5g]76  
 ムラ 荘甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 [2.5g]119  
 ムラ 荘姜朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]118  
 ムラ 荘桂朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]39  
 ムラ 六味丸エキス顆粒 [2.5g]87

劇ツルバダ配合錠

● 【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1% (ペラチン)  
 (2026年3月31日削除予定)

【テ】

劇ディアコミットドライシロップ分包250mg  
 劇ティーエスワン配合顆粒T20 [20mg/P]  
 劇ティーエスワン配合顆粒T25 [25mg/P]

● 劇ティーエスワン配合OD錠T20—(20mgテガフル相当量)—  
 (院内はエスワンタイホウ配合OD錠T20)  
 (【般】カーフル20mg・ギメラル・オテラシル配口腔内崩壊錠へ切替)

● 劇ティーエスワン配合OD錠T25—(25mgテガフル相当量)—  
 (院内はエスワンタイホウ配合OD錠T25)  
 (【般】カーフル25mg・ギメラル・オテラシル配口腔内崩壊錠へ切替)

● デイオバシ錠40mg (院内はバルサルタン錠40mg「サリ」)  
 (【般】バルサルタン錠40mgへ切替)  
 デイオバシ錠80mg  
 (【般】バルサルタン錠80mgへ切替)

● デイオバシ錠160mg  
 (【般】バルサルタン錠160mgへ切替)

● デイオバシOD錠40mg  
 (【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mgへ切替)

● デイオバシOD錠80mg  
 (【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mgへ切替)

● デイオバシOD錠160mg  
 (【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mgへ切替)  
 デイナゲスト錠0.5mg (ジエノゲスト錠0.5mg「モダ」へ切替)  
 (【般】ジエノゲスト錠0.5mgへ切替)

● デイナゲスト錠1mg (【般】ジエノゲスト錠1mgへ切替)  
 劇ティゾボ錠250mg

● デイレグラ配合錠  
 (【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠へ切替)  
 デエビゴ錠2.5mg  
 デエビゴ錠5mg

● デエビゴ錠10mg

● テオドール錠100mg (院内はテオフィリン徐放錠100mg「サリ」)  
 (【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) へ切替)

○ 劇テオフィリンドライシロップ20%「カタ」 【後】  
 劇テオフィリン錠200mg「TYK」  
 (【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) へ切替)

○ テオフィリン徐放錠100mg「カタ」 【後】

● 【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) (テオドール)

● 劇【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) (テオドール)

○ 劇テオフィリン徐放U錠200mg「トワ」 【後】

● 【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) (ユニフィルL A)

● 【般】テオフィリンシロップ用20% (テオドールドライシロップ)  
 デカドロン錠0.5mg  
 デカドロン錠4mg

- 【般】 テガフ 20mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合顆粒 (ティーエスワン)
- 【般】 テガフ 25mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合顆粒 (ティーエスワン)
- 【般】 テガフ 20mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠 (ティーエスワン)
- 【般】 テガフ 25mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠 (ティーエスワン)
- 【般】 デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% (メジコン)  
テクフィデラカプセル120mg
- テクフィデラカプセル240mg  
テグレトール細粒50% (【般】なし)  
(カルバマゼピン細粒50%「アエル」へ切替)  
テグレトール錠100mg (【般】カルバマゼピン錠100mgへ切替)  
テグレトール錠200mg (【般】カルバマゼピン錠200mgへ切替)
- デザレックス錠5mg  
劇デシコビ配合錠L T  
劇デシコビ配合錠H T
- 劇テシブール錠1mg (【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mgへ切替)
- 劇デジレル錠25-25mg (【般】トラゾドン塩酸塩錠25mgへ切替)  
デソバン錠60mg
- デタントール錠1mg
- デタントールR錠3mg  
テトラミド錠10mg
- テトラミド錠30mg
- テネリア錠40mg  
テネリアOD錠20mg
- テネリアOD錠40mg  
劇テノゼット錠300mg  
デノタスチュアブル配合錠
- デノバミン錠10mg「日医工」 【後】
- 【般】 デノバミン錠10mg (カルグート)  
テノーミン錠50-50mg (【般】アテノロール錠50mgへ切替)
- デパケン細粒40% (【般】なし)
- デパケン錠200mg (【般】なし)  
デパケンR錠100mg  
(バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg「トワ」へ切替)  
デパケンR錠200mg  
(バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トワ」へ切替)  
(【般】バルプロ酸Na徐放錠200mgへ切替)
- デパケンシロップ5% (院内はバルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」)  
(【般】バルプロ酸Naシロップ5%へ切替)  
向デパス細粒1%  
(【般】エチゾラム細粒1%へ切替)
- 向デパス錠0.5mg (院内はエチゾラム錠0.5mg「EMEC」)  
(【般】エチゾラム錠0.5mgへ切替)  
劇デビケイ錠50mg
- 【般】 デフェラシロクス顆粒90mg (ジャドニュ)
- 【般】 デフェラシロクス顆粒360mg (ジャドニュ)
- 劇テブミトコ錠250mg
- 【般】 テプレノン細粒10% 0.5g/包 (セルベックス)
- テプレノンカプセル50mg「トワ」 【後】
- 【般】 テプレノンカプセル50mg (セルベックス)
- デプロメール錠25-25mg  
(院内はフルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NPJ」)  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替)
- デプロメール錠50-50mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替)
- デプロメール錠75-75mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替)  
デベルザ錠20mg
- 劇デムサーカプセル250mg
- テモカブリル塩酸塩錠2mg「サリ」 【後】
- 【般】 テモカブリル塩酸塩錠2mg (エースコール)
- 毒テモゾロミド錠20mg「NK」 【後】
- 毒 【般】 テモゾロミド錠20mg (テモダール)
- 毒 【般】 テモゾロミド錠100mg「NK」 【後】
- 毒 【般】 テモゾロミド錠100mg (テモダール)  
毒テモダールカプセル20mg (テモゾロミド錠20mg「NK」へ切替)  
毒テモダールカプセル100mg (テモゾロミド錠100mg「NK」へ切替)  
デュオドーバ配合経腸用液 [100mL/カセット] [2~8°C]
- 【般】 デュタステリドカプセル0.5mg : A V (アボルブカプセル)
- デュファストン錠5mg
- 劇 【般】 デュロキセチンカプセル20mg (サインバルタ)  
○ 劇デュロキセチンOD錠20mg「ニブロ」 【後】  
(サインバルタカプセル20mgから切替)  
(【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mgへ切替)
- 【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg (サインバルタ)  
→○ 劇テラムロ配合錠A P「EE」 【後】  
(テラムロ配合錠A P「ニブロ」が無くなり次第切替)
- ※ 劇テラムロ配合錠A P「ニブロ」 【後】 (販売中止)  
(テラムロ配合錠A P「EE」へ切替)  
(【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠へ切替)
- 劇テルギンGドライシロップ0.1% 【後】  
(クレマスチンD S 0.1%「タタ」へ名称変更)  
(【般】クレマスチンシロップ用0.1%へ切替)
- テルチア配合錠A P「トワ」 【後】
- 劇デルティバ錠50mg  
テルネリン錠1mg (チザニジン錠1mg「トワ」へ切替)  
(【般】チザニジン錠1mgへ切替)
- 劇テルバセンスD S 20% 【後】  
(【般】テオフィリンシロップ用20%へ切替)
- テルビナфин錠125mg「VTRS」 【後】
- 【般】 テルビナфин錠125mg (ラミシール)
- テルミサルタン錠40mg「ニブロ」 【後】
- 【般】 テルミサルタン錠40mg (ミカルディス)
- 【般】 テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 (ミカムロ A P)
- 【般】 テルミサルタン40mg・ヒドロキシアジド配合錠 (ミコンビ A P)
- 【般】 テルミサルタン錠80mg (ミカルディス)
- 【般】 テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠 (ミカムロ B P)
- 【般】 テルミサルタン80mg・ヒドロキシアジド配合錠 (ミコンビ B P)
- 【ト】
- 劇トアラセット配合錠「日新」 【後】  
(【般】トラマドール・アセトアミノフェンへ切替)  
劇ドウベイト配合錠  
トウモロコシデンプン末  
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒 [2.0g] TY-026
- [東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒 [2.0g] TY-027
- [東洋]四君子湯エキス細粒 [2.0g] TY-054
- ドキサゾシン錠1mg「タベ」 【後】  
(院内はドキサゾシン錠1mg「テバ」へ切替)
- ドキサゾシン錠1mg「テバ」 【後】
- 【般】 ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg (カルデナリン)
- 【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg (カルデナリン)
- ドキサゾシン錠4mg「テバ」 【後】
- 【般】 ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠4mg (カルデナリン)
- 【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg (カルデナリン)  
劇ドグマチール細粒50%  
● ドグマチール錠50mg (【般】スルピリド錠50mgへ切替)  
● 劇ドグマチール錠100mg (【般】スルピリド錠100mgへ切替)

- 劇ドグマチール錠200mg（【般】スルピリド錠200mgへ切替）
  - トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハ」【後】
  - 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒20%（ユベラ）
  - トコフェロール酢酸エステル錠50mg「ト-7」【後】
  - 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg（ユベラ）
  - 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカゼル100mg（ユベラN）
  - 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%（オゼックス）
  - 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg（オゼックス）
- トチモトのコウジン末AM  
トチモトのダイオウ末
- 劇ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」【後】
  - 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg（アリセプト）
  - 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg（アリセプト）
  - 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg（アリセプト）
  - 【般】ドネベジル塩酸塩錠3mg（アリセプト）
  - 【般】ドネベジル塩酸塩錠5mg（アリセプト）
- ドバコール配合錠L100【後】  
ドバストン散98.5%  
トビエース錠4mg
- トビエース錠8mg
- トビナ細粒10%  
トビナ錠50mg（【般】トビラマート錠50mgへ切替）
- ナビナ錠100mg
- 【般】トビラマート錠50mg（トビナ）
- 【般】トビラマート錠100mg（トビナ）
- 【般】トフイソバム錠50mg（グランダキシン）  
ドブスOD錠100mg（【般】なし）
- ドブテレット錠20mg
- トフラニール錠10mg  
トフラニール錠25mg
- トライヨア錠80mg（【般】フェノファラート錠80mgへ切替）  
劇トラクリア錠62.5mg（【般】ボセンタン錠62.5mgへ切替）
- トラセミドOD錠8mg「TE」【後】
- 【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg（ルブラック）  
トラゼンタ錠5mg
- 劇トラゾドン塩酸塩錠25mg「アル」【後】
  - 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg（デジレル、レスリン）
  - 劇トラゾドン塩酸塩錠50mg「アル」【後】
  - 【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg（デジレル、レスリン）
  - トラディアンス配合錠AP
  - トラディアンス配合錠BP
- トラニラストカプセル100mg「ト-7」【後】  
●【般】トラニラストカプセル100mg（リザベン）
- トラネキサム酸カプセル250mg「トワ」【後】  
●【般】トラネキサム酸カプセル250mg（トランサミン）
- 【般】トラネキサム酸シロップ5%（トランサミン）
- 【般】トラビジル錠100mg（ロコルナール）  
トラベルミン配合錠
- 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠（トラムセット）
- 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg（トラマール）
- 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg（トラマール）
- 劇トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」【後】  
劇トラマールOD錠25mg  
(トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」へ切替)  
(【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mgへ切替)
- 劇トラマールOD錠50mg  
(【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mgへ切替)  
劇トラハヤット配合錠（院内はトラハヤット配合錠「日新」）
- 向ドラーラ錠15-15mg（【般】クアゼパム錠15mgへ切替）
  - トランサミンカプセル250mg  
(院内はトランサミンカプセル250mg「ト-7」)  
(【般】トランサミンカプセル250mgへ切替)
  - トランサミンシロップ5%  
(【般】トランサミンシロップ5%へ切替)
- 劇トランデート錠50mg（【般】ラベタロール塩酸塩錠50mgへ切替）
- 【般】トリアゾラム錠0.25mg（ハルシオン）  
劇トリクロリールシロップ10%【冷】
- トリクロルメチアジド錠2mg「NP」【後】
- 【般】トリクロルメチアジド錠2mg（フルイトラン）
- トリテレン・カプセル50mg（2026年3月31日経過措置終了）  
トリプタノール錠10 10mg
- トリプタノール錠25 25mg
- 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%（アーテン）  
劇トリーメク配合錠
- トリメチジンマレイン酸塩錠100mg「ナ-1」【後】
- 【般】トリメチジンマレイン酸塩錠100mg（セレキノン）  
劇トリンテリックス錠10mg
- 劇トルカブ錠160mg
- 劇トルカブ錠200mg
- 劇トルバブタンOD錠7.5mg「オ-カ」【後】  
(サムスカOD錠7.5mgと適応が揃うまで切替を保留)
- 【般】トルバブタン顆粒1%（サムスカ）
- 【般】トルバブタン口腔内崩壊錠7.5mg（サムスカ）
- 【般】トルバブタン口腔内崩壊錠15mg（サムスカ）
- 劇トレドミン錠15mg（【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mgへ切替）
- 劇トレドミン錠25mg（【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mgへ切替）
- 劇トレドミン錠50mg（【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50mgへ切替）
- 【般】トレミフェン錠40mg（フェアストン）  
トレーランG液50g [150mL/瓶]（産婦人科外来専用払出し）  
トレーランG液75g [225mL/瓶]
- 劇トレリーフOD錠25mg  
(【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg:TREへ切替)
- 劇トレリーフOD錠50mg  
(【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg:TREへ切替)
- 【般】ドロキシドバドン錠100mg（ドヌス）
- 【般】トロキシビド錠100mg（アブレース）  
(2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】ドロスピレノン・エニルエストラジオール配合錠・ドロセボ錠（ヤーズ配合錠）
- 劇トロペヨン細粒1%  
(【般】ドロスピレノン細粒1%へ切替 2026年3月31日削除予定)
- 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg（ナウゼリン）
- 【般】ドンペリドン錠5mg（ナウゼリン）
- 【般】ドンペリドンシロップ用1%（ナウゼリン）
- ドンペリドン錠10mg「ナ-1」【後】
- 【般】ドンペリドン錠10mg（ナウゼリン）
- 【ナ】  
ナイキサン錠100mg  
ナウゼリンドライシロップ1%  
(【般】ドンペリドンシロップ用1%へ切替)
- ナウゼリン錠5 5mg
- ナウゼリンOD錠10mg（院内はドンペリドン錠10mg「ナ-1」)  
(【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- 劇ナゼアOD錠0.1mg
- ナディック錠30mg
- 【般】ナタグリニド錠30mg（スター-シス）
- 【般】ナタグリニド錠90mg（スター-シス）

- ナトリックス錠1 1mg
- 効ナフトジール錠2 2mg【後】 (【般】 ニルバジピン錠2mgへ切替)  
○ ナフトピジルOD錠25mg「効タ」 【後】
- 【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg (フリバス)
- 【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg (フリバス)
- 効ナポールS-Rカプセル37.5 37.5mg  
(【般】 ジクロフェナクN a徐放カプセル37.5mgへ切替)
- 【般】 ナラトリブタン錠2.5mg (アマージ)  
麻劇ナルサス錠2mg  
麻劇ナルサス錠6mg  
麻劇ナルサス錠12mg  
麻劇ナルサス錠24mg
- 【般】 ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg (レミッチ)  
● 【般】 ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg (レミッチ)  
麻劇ナルラビド錠1mg  
麻劇ナルラビド錠2mg  
麻劇ナルラビド錠4mg
- 【ニ】
- 【般】 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg (ペルジピンL A)  
● 【般】 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg (ペルジピンL A)  
○ ニコランジル錠5mg「効イ」 【後】
- 【般】 ニコランジル錠5mg (シグマート)  
● ニザチジンカプセル75mg「効イ」 【後】  
● 【般】 ニザチジンカプセル75mg (アシノン)  
● ニザチジンカプセル150mg「効イ」 【後】  
● 【般】 ニザチジンカプセル150mg (アシノン)  
● 【般】 ニザチジン錠75mg (アシノン)  
○ ニセルゴリン錠5mg「ト-7」 【後】 (サアミオン錠5mgから切替)
- 【般】 ニセルゴリン錠5mg (サアミオン)  
ニッパスカルシウム顆粒100%  
● 【般】 ニトラゼバム細粒1% (ベンザリン)  
● 【般】 ニトラゼバム錠5mg (ベンザリン)  
● 【般】 ニトレングピン錠10mg (バイロテンシン)  
○ 効ニトロベン舌下錠0.3mg 【後】
- 【般】 ニトログリセリン舌下錠0.3mg  
● ニトロールRカプセル20mg  
(【般】 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mgへ切替)
- 効ニバジール錠4mg (【般】 ニルバジピン錠4mgへ切替)  
● 【般】 ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続) (アダラートL)  
○ 効ニフェジピンL錠20mg「効イ」 【後】
- 【般】 ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続) (アダラートL)  
○ 効ニフェジピンCR錠10mg「効イ」 【後】  
○ 効ニフェジピンCR錠20mg「効イ」 【後】  
(ニフェジピンCR錠10mg「効イ」へ切替)
- 【般】 ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続) (アダラートCR)  
● 【般】 ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) (アダラートCR)  
● 【般】 ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) (アダラートCR)  
● 【般】 ニフェジピン細粒1% 10mg/1g (包) (セパミット)  
ニフレック配合内用剤 [137.155g/プラスチックバッグ]  
乳酸カルシウム「ケイ-」 [1g/P]  
(乳酸カルシウム水和物「ケイ-」原末へ名称変更)  
乳酸カルシウム水和物「ケイ-」原末  
(乳酸カルシウム「ケイ-」より名称変更)  
乳糖水和物「シオエ」  
乳糖水和物(粉末) (院内製剤原料)  
効ニュベクオ錠300mg
- 効ニューレブチル細粒10%
- ニュードターン錠25mg (院内はロサルタンK錠25mg「ト-7」)  
(【般】 ロサルタンK錠25mgへ切替)
- ニュードターン錠50mg (【般】 ロサルタンK錠50mgへ切替)
- 【般】 ニルバジピン錠2mg (ニバジール)
- 【般】 ニルバジピン錠4mg (ニバジール)
- 【般】 ニロチニブカプセル150mg (タシグナ)
- 【般】 ニロチニブカプセル200mg (タシグナ)  
毒ニンラーロカプセル2.3mg  
毒ニンラーロカプセル3mg  
毒ニンラーロカプセル4mg
- 【ネ】
- ネイリンカプセル100mg
- ネオドバストン配合錠L100 (院内はドバコール配合錠L100)  
(【般】 レボドバ100mg・カルビドバ配合錠へ切替)
- ネオマレルミンTR錠6mg【後】  
(d-ケロフェニラミンレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」へ名称変更)  
(【般】 d-ケロフェニラミンレイン酸塩徐放錠6mgへ切替)
- 効ネオーラル10mgカプセル (院内はシクロスボリンカプセル10mg「ト-7」)  
(【般】 シクロスボリンカプセル10mg : N Eへ切替)  
効ネオーラル25mgカプセル (院内はシクロスボリンカプセル25mg「ト-7」)  
(【般】 シクロスボリンカプセル25mg : N Eへ切替)
- 効ネオーラル50mgカプセル (院内はシクロスボリンカプセル50mg「ト-7」)  
(【般】 シクロスボリンカプセル50mg : N Eへ切替)  
効ネオーラル内用液10% [50mL]  
ネキシウムカプセル10mg  
(エソメプラゾールカプセル10mg「ト-7」へ切替)  
(【般】 エソメプラゾールカプセル10mgへ切替)  
ネキシウムカプセル20mg  
(【般】 エソメプラゾールカプセル20mgへ切替)  
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg  
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
- 効ネクサバール錠200mg
- ネシーナ錠6.25mg
- ネシーナ錠12.5mg
- ネシーナ錠25mg
- 【ノ】
- ネイキノン錠10mg (院内はユビデカレノン錠10mg「ト-7」)  
(【般】 ユビデカレノン錠10mgへ切替)  
ノイロトロビン錠4単位  
ノウリアスト錠20mg  
効ノクサフィル錠100mg  
ノバミン錠5mg  
効ノービア錠100mg  
効ノペルジン錠25mg (酢酸亜鉛錠25mg「ト-7」へ切替)  
(【般】 酢酸亜鉛錠25mgへ切替)
- 効ノペルジン錠50mg (【般】 酢酸亜鉛錠50mgへ切替)
- 【般】 ルエチステロン・エチニエストラジオール0.02配合錠 (ルナベルULD)  
● 【般】 ルエチステロン・エチニエストラジオール0.035配合錠 (ルナベルLD)
- 効ノルバスク錠2.5mg (【般】 アムロジピン錠2.5mgへ切替)
- 効ノルバスク錠5mg (【般】 アムロジピン錠5mgへ切替)
- 効ノルバスク錠2.5mg (【般】 アムロジピン錠2.5mgへ切替)
- 効ノルバスク錠5mg (【般】 アムロジピン錠5mgへ切替)
- 効ノルバスク錠2.5mg (【般】 アムロジピン錠2.5mgへ切替)
- 効ノルバスク錠5mg (【般】 アムロジピン錠5mgへ切替)
- ノルバデックス錠10mg (【般】 タモキシフェン錠10mgへ切替)  
ノルバデックス錠20mg (タモキシフェン錠20mg「ト-7」へ切替)  
(【般】 タモキシフェン錠20mgへ切替)  
ノルレボ錠1.5mg

【ハ】

- バイアグラ錠50mg  
 [男性不妊の治療目的で処方された場合のみ保険適用]
- バイアスピリン錠100mg 【後】  
 (【般】アスピリン腸溶錠100mgへ切替)  
 ハイシー顆粒25% [250mg/1g/P]  
 劇ハイドレアカプセル500mg
- 劇ハイベン錠200mg (院内はエトドラク錠200mg「SWJ」)  
 (【般】エトドラク錠200mgへ切替)
- ハイボン錠20mg (【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mgへ切替)  
 劇ハイヤスタ錠10mg
- パイロテニン錠10mg (【般】ニトレニジン錠10mgへ切替)
- 劇パキシル錠5mg (【般】パロキセチン錠5mgへ切替)
- 劇パキシル錠10mg (【般】パロキセチン錠10mgへ切替)
- 劇パキシル錠20mg (【般】パロキセチン錠20mgへ切替)  
 劇パキシルC R錠12.5mg
- 劇パキシルC R錠25mg  
 劇パキロビッドパック300 1シート  
 劇パキロビッドパック600 1シート  
 小児用パクシダール錠50mg
- パクタ配合錠 (院内はダイフェン配合錠)
- 麻劇バシーフカプセル30mg (2026年3月31日経過措置終了)
- 麻劇バシーフカプセル60mg (2026年3月31日経過措置終了)
- 麻劇バシーフカプセル120mg (2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】バゼドキシフェン錠20mg (ビビアント)  
 パセトシン細粒10%—100mg/g (ワイドシリコン細粒20%へ切替)
- 日本薬局方ハチミツ  
 ハッカ水「ケンエー」  
 ハッカ油「ニコー」(製剤原料)  
 パッフオーナー錠10—10mg  
 (【般】プロビペリン塩酸塩錠10mgへ切替)
- パナルジン錠100mg (院内はチクロビジン塩酸塩錠100mg「トワ」)  
 (【般】チクロビジン塩酸塩錠100mgへ切替)
- パナンドライシロップ5%—50mg/g  
 (【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5%へ切替)  
 劇ハーフジゴキシンK Y錠0.125 0.125mg
- 劇バフセオ錠150mg
- 劇バフセオ錠300mg
- ハーボニー配合錠  
 劇バラクルード錠0.5mg (エンテカビルOD錠0.5mg「カイ」へ切替)  
 (【般】エンテカビル錠0.5mgへ切替)
- 【般】バラシクロビル顆粒50% (バルトレックス)  
 ○ バラシクロビル錠500mg「トワ」 【後】
- 【般】バラシクロビル錠500mg (バルトレックス)
- 劇バラミヂンカプセル300mg  
 パリエット錠5mg (ラベプラゾールN a錠5mg「YD」へ切替)  
 (【般】ラベプラゾールN a錠5mgへ切替)
- パサエット錠10mg (院内はラベプラゾールN a錠10mg「トワ」)  
 (【般】ラベプラゾールN a錠10mgへ切替)
- パリエット錠20mg (【般】ラベプラゾールN a錠20mgへ切替)
- 毒バリキサドライシロップ5000mg  
 毒バリキサ錠450mg
- 劇ハリゾンシロップ100mg/mL [24mL] 【後】  
 パリトップHD [400g/本]
- 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠(エクスフォージ)  
 ● 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠(エクスフォージ)  
 ● 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg (ディオバン)  
 ● 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg (ディオバン)

- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mg (ディオバン)
- バルサルタン錠40mg「カイ」 【後】
- バルサルタン錠40mg「日新」 【後】  
 (バルサルタン錠40mg「カイ」へ切替)
- 【般】バルサルタン錠40mg (ディオバン)
- バルサルタン錠80mg「日新」 【後】
- 【般】バルサルタン錠80mg (ディオバン)
- 【般】バルサルタン錠160mg (ディオバン)
- 【般】バルサルタン・ヒドロクロチアジド 12.5mg配合錠 (コディオEX)
- 向ハルシオン0.125mg錠
- 向ハルシオン0.25mg錠 (【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替)  
 バルトレックス顆粒50% (【般】バラシクロビル顆粒50%へ切替)
- バルトレックス錠500mg (院内はバラシクロビル錠500mg「トワ」)  
 (【般】バラシクロビル錠500mgへ切替)
- ハルナールD錠0.2mg  
 (院内はタムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」)  
 (【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mgへ切替)
- バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 500mL瓶 【後】
- 【般】バルプロ酸Na細粒40% (デバケン)
- 【般】バルプロ酸Na錠200mg (デバケン)
- 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% (デバケンR, セレニカR)  
 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg「トワ」 【後】
- 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg (デバケンR, セレニカR)
- バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トワ」 【後】
- 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg (デバケンR, セレニカR)
- 【般】バルプロ酸Naシロップ5% (デバケン)
- バルモディア錠0.1mg  
 バルモディアXR錠0.2mg
- バルモディアXR錠0.4mg
- 向ハルラック錠0.25mg 【後】 (【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替)
- バレリンシロップ5% 【後】  
 (【般】バルプロ酸Naシロップ5%へ切替)  
 (バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」へ名称変更)
- 【般】バルプロ酸Naシロップ5% (パキシル)
- 【般】バルキセチン錠10mg (パキシル)
- 【般】バルキセチン錠20mg (パキシル)  
 劇パーオデル錠2.5mg  
 (【般】プロモクリプチニル酸塩錠2.5mgへ切替)
- 劇ハロベリドール細粒1%「ヨシミ」 【後】
- 【般】ハロベリドール細粒1% (セレニース)
- 劇ハロベリドール錠0.75mg「ヨシミ」 【後】
- 【般】ハロベリドール錠0.75mg (セレニース)
- 【般】ハロベリドール錠1mg (セレニース)  
 ○ 劇ハロベリドール錠1.5mg「ヨシミ」 【後】
- 【般】ハロベリドール錠1.5mg (セレニース)
- 【般】ハロベリドール錠3mg (セレニース)  
 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
- 【般】バンテチン散20% (バントシン)
- バントシン散20% (バントシン)
- 【ヒ】
- ピアーレシロップ65% 500mL 【後】  
 (ラクツロースシロップ65%「カタ」へ名称変更)  
 (【般】ラクツロースシロップ65%へ切替)  
 腎外分泌機能検査用P-F-D内服液500mg 5% [10mL/瓶]  
 P-L配合顆粒 [1g/P]  
 (【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 1g/包へ切替)  
 幼児用P-L配合顆粒 [1g/P]

○ ピオグリタゾンOD錠15mg「トワ」 【後】  
● 【般】 ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg (アクトス)  
● 【般】 ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg (アクトス)  
ピオスリー配合OD錠  
ピオチン散0.2%「ヰ」  
● ピオフェルミン散剤 【後】  
● ピオフェルミンR散 【後】 (【般】 耐性乳酸菌散0.6%へ切替)  
ピオフェルミン錠剤 【後】 (【般】 ピフィズス菌錠12mgへ切替)  
○ 劇ピカルタミDOD錠80mg「トワ」 【後】  
● 【般】 ピカルタミD口腔内崩壊錠80mg (カソデックス)  
劇ピクタリビ配合錠  
○ ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 [10mL/瓶] 【後】  
● 【般】 ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL (ラキソペロン)  
● 【般】 ピコスルファートNa錠2.5mg (ラキソペロン)  
劇ビ・シフロール錠0.125mg  
(【般】 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mgへ切替)  
劇ビ・シフロール錠0.5mg  
(【般】 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mgへ切替)  
ビジクリア配合錠 [50錠/瓶]  
● ヒスロント錠200mg  
(【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mgへ切替)  
ビソプロロールフルマ酸塩錠0.625mg「ヰ」 【後】 (【般】 なし)  
○ ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トワ」 【後】  
● 【般】 ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg (メインテート)  
● 【般】 ビソプロロールフルマ酸塩錠5mg (メインテート)  
○ ピタバスタチンC a・OD錠2mg「トワ」 【後】  
● 【般】 ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠1mg (リバロ)  
● 【般】 ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠2mg (リバロ)  
● 【般】 ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠4mg (リバロ)  
● ピタメジン配合カプセルB25-25mg (B1として)  
(【般】 ピタメジン25mg(B1)・B6・B12配合カプセルへ切替)  
● ヒダントール錠25mg  
ピドキサール錠10mg (ピリドキサール錠10mg「ヰ」へ切替)  
(【般】 ピリドキサールリン酸エステル錠10mgへ切替)  
● ピートル顆粒分包250mg  
● ピートルチュアブル錠250mg  
○ 毒ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「ヰ」 【後】  
(【般】 ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg (院外は) へ切替)  
● 毒【般】 ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg (プラケニル)  
覚劇ビパンセカカプセル20mg  
覚劇ビパンセカカプセル30mg  
● ピベアント錠20mg (【般】 バゼドキシフェン錠20mgへ切替)  
● 【般】 ピフィズス菌錠12mg (ピオフェルミン)  
ピフェルトロ錠100mg  
● ピプラマイシン錠100mg  
劇ビプレッソ徐放錠50mg  
● 劇ビプレッソ徐放錠150mg  
● ピペリデン塩酸塩細粒1%「ヰ」 【後】  
● 【般】 ピペリデン塩酸塩細粒1% (アキネトン)  
○ ピペリデン塩酸塩錠1mg「ヰ」 【後】  
● 【般】 ピペリデン塩酸塩錠1mg (アキネトン)  
● 【般】 ピペリドレート塩酸塩錠50mg (ダクチル)  
● 劇ヒポカ5mgカプセル  
● 劇ヒポカ15mgカプセル  
劇ビムバット錠50mg  
● 劇ビムバット錠100mg  
劇ビムバットドライシロップ10%  
○ ピモベンダン錠1.25mg「TE」 【後】  
● 【般】 ピモベンダン錠1.25mg (アカルディ)  
● ピヨントラ錠400mg  
ピラノアOD錠20mg  
劇ピラフトビカプセル50mg  
ピラマイド原末  
劇ピリアード錠300mg  
ピリドキサール錠10mg「ヰ」 【後】  
○ ピリドキサール錠10mg「ヰ」 【後】 (供給停止)  
(ピリドキサール錠10mg「ヰ」へ切替)  
● 【般】 ピリドキサール錠10mg (ピドキサール)  
○ 劇ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トワ」 【後】  
● 【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg (サンリズム)  
○ ピルダグリブチン錠50mg「トワ」  
● 【般】 ピルダグリブチン錠50mg (エクア)  
● 【般】 ピルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠 (エクメット配合錠L D)  
● 【般】 ピルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠 (エクメット配合錠H D)  
● ピルタサ懸濁用散分包8.4g [2~8°C]  
ゼルトナシド錠600mg  
● 劇ヒルナミン細粒10%  
ヒルナミン錠(5mg)  
ヒルナミン錠(25mg)  
(【般】 レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mgへ切替)  
○ ピルフェニドン錠200mg「日医工」 【後】  
● 【般】 ピルフェニドン錠200mg (ピレスバ)  
劇ピレスバ錠200mg (ピルフェニドン錠200mg「日医工」へ切替)  
(【般】 ピルフェニドン錠200mgに切替)  
● 劇ビレチア細粒10%  
ビレチア錠(25mg)  
● 【般】 ピレンゼビン塩酸塩錠25mg (ガストロゼビン)  
劇ビンダケルカプセル20mg  
● 劇ビンマックカプセル61mg  
【フ】  
劇ファダブス錠10mg  
劇ファビハルタカプセル200mg  
● 【般】 ファムシクロビル錠250mg (ファムビル)  
● ファムゼル錠250mg (【般】 ファムシクロビル錠250mgへ切替)  
○ ファモチジン散2%「トワ」 [0.5g/P] 【後】  
● 【般】 ファモチジン散2% 0.5g/包 (ガスター)  
○ ファモチジンOD錠10mg「トワ」 【後】  
● ファモチジンOD錠20mg「トワ」 【後】  
● 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠10mg (ガスター)  
● 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg (ガスター)  
● ファロムドライシロップ小兒用10% 100mg/g  
ファロム錠200mg  
● フィコンバ細粒1%  
フィコンバ錠2mg  
フィコンバ錠4mg  
● 【般】 フィトナジオン錠5mg (ケーワン)  
劇ビフェンドドライシロップ2800mg [2~8°C]  
劇デイフェンド錠50mg (ポリコナゾール錠50mg「トワ」へ切替)  
劇デイフェンド錠200mg (ポリコナゾール錠200mg「トワ」へ切替)  
劇フィンテプラ内用液2.2mg/mL  
● 劇フェアストン錠40-40mg (【般】 トレミフェン錠40mgへ切替)  
● 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg (アレグラ)  
○ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トワ」 【後】

- 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg（アレグラ）
- 【般】フェキソフェナジン・ゾイドエフェドリン配合錠（デイクル）  
 向劇フェノバール散10%  
 向劇フェノバールエリキシル0.4%
- フェノフィラート錠80mg「武田テバ」【後】  
 (リピディル錠80mgから切替)
- フェブキソスタット錠10mg「JG」【後】
- 【般】フェブキソスタット錠10mg（フェブリク）
- 【般】フェノフィラート錠80mg（リピディル）
- フェブキソスタット錠20mg「JG」【後】  
 フェブリク錠20mg（フェブキソスタット錠20mg「JG」へ切替）  
 (【般】フェブキソスタット錠20mgへ切替)
- 【般】フェブキソスタット錠20mg（フェブリク）
- 劇フェマーラ錠2.5mg（【般】レトロゾール錠2.5mgへ切替）  
 フェロミア顆粒8.3%  
 フェロミア錠50mg  
 (【般】ケン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）へ切替)
- フオイパン錠100mg  
 (院内はカモスタットメシル酸塩錠100mg「トワ」)  
 (【般】カモスタットメシル酸塩錠100mgへ切替)
- 劇フォサマツカ錠35mg（【般】アレンドロン酸錠35mgへ切替）  
 フォシーガ錠5mg  
 フォシーガ錠10mg  
 フオスプロック錠250mg  
 フォゼベル錠5mg  
 フォゼベル錠10mg  
 フォリアミン錠 5mg  
 向ブコラム口腔用液2.5mg 0.5mL  
 向ブコラム口腔用液5mg 1mL  
 向ブコラム口腔用液7.5mg 1.5mL
- 向ブコラム口腔用液10mg 2mL  
 劇ブシ末（調剤用）「ツムラ」3023  
 ブスコパン錠10mg
- 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg（ブスコパン）  
 ブフェニール顆粒94%
- ブライアント錠500mg【後】  
 (【般】エデト酸カルシウム二ナトリウム錠500mgへ切替)  
 毒デラケニル錠200mg  
 (ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「ツイ」へ切替)  
 (【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mgへ切替)  
 プラザキサカプセル75mg  
 プラザキサカプセル110mg  
 フラジール内服錠250mg
- 【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mg（エフィエント）
- 【般】プラスグレル錠2.5mg（エフィエント）
- 【般】プラスグレル錠3.75mg（エフィエント）
- ブラダロン錠200mg（院内はブラボキサート塩酸塩錠200mg「ツイ」）  
 ブラノバール配合錠
- ブラバスタチンNa錠5mg「ツイ」【後】
- 【般】ブラバスタチンNa錠5mg（メバロチン）  
 ○ ブラバスタチンNa錠10mg「トワ」【後】
- 【般】ブラバスタチンNa錠10mg（メバロチン）
- ブラビタシロップ0.3%（【般】FADシロップ0.3%へ切替）
- ブラビックス錠25mg（【般】クロピドグレル錠25mgへ切替）
- ブラビックス錠75mg（院内はクロピドグレル錠75mg「ツル」）  
 (【般】クロピドグレル錠75mgへ切替)
- ブラボキサート塩酸塩錠200mg「ツイ」【後】
- 【般】ブラボキサート塩酸塩錠200mg（ブラダロン）  
 ● 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg（ビ・シフロール）
- 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg（ビ・シフロール）
- 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg（ミラベックスLA）
- 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg（ミラベックスLA）
- ブランドル錠20mg（【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mgへ切替）
- ブランルカストドライシロップ10%「AFP」【後】
- 【般】ブランルカストシロップ用10%（オノン）
- ブランルカストカプセル112.5mg「ツイ」【後】
- 【般】ブランルカストカプセル112.5mg（オノン）
- 【般】ブランルカスト錠112.5mg（オノン）
- 【般】ブランルカスト錠225mg（オノン）  
 ブリビアクト錠25mg
- ブリビアクト錠50mg
- ブリュエル配合錠L「モチ」【後】  
 (【般】ルイストロン・エニエストラン オール0.035配合錠へ切替)  
 劇ブリジスタ錠600mg
- ブリバースOD錠25mg（院内はナフトビジルOD錠25mg「あすか」）  
 (【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠25mgへ切替)
- ブリバースOD錠75mg  
 (【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠75mgへ切替)
- ブリミド錠99.5%「日医工」
- ブリモボラン錠5mg  
 劇ブリュザクラカプセル1mg  
 劇ブリュザクラカプセル5mg
- ブリリンタ錠60mg  
 ブリリンタ錠90mg
- ブリンペラン錠5-5mg（院内はメトクロプラミド錠5mg「NIG」）  
 (【般】メトクロプラミド錠5mgへ切替)  
 ブリンペランシロップ0.1%  
 (【般】メトクロプラミドシロップ0.1%へ切替)
- ブルイトラン錠2mg（院内はトリクロルメチアジド錠2mg「NP」）  
 (【般】トリクロルメチアジド錠2mgへ切替)  
 フルコナゾールカプセル100mg「ツイ」【後】(【般】なし)
- 【般】フルヨナゾールカプセル100mg（ジフルカン）
- フルスルチアミン錠25mg「トワ」【後】
- 【般】フルスルチアミン錠25mg（アリナミンF）
- 【般】フルタミド錠125mg（オダイン錠）
- 劇フルダラ錠10mg
- 劇フルツロンカプセル200 200mg  
 ○ 向フルニトラゼパム錠1mg「アル」【後】
- 【般】フルニトラゼパム錠1mg（サイレース）
- 【般】フルバスタチン錠30mg（ローコール）
- ブルフェン錠100mg（院内はイブプロフェン錠100mg「タヨ」）  
 (【般】イブプロフェン錠100mgへ切替)
- ブルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」【後】  
 (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了(予定))
- ブルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ツイ」【後】
- 【般】ブルボキサミンマレイン酸塩錠25mg（デプロメール）
- 【般】ブルボキサミンマレイン酸塩錠50mg（デプロメール）
- 【般】ブルボキサミンマレイン酸塩錠75mg（デプロメール）
- 劇フルメジン散0.2%
- ブルメジン糖衣錠(0.25) 0.25mg  
 ○ 劇フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【後】
- 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg（タンポコール）
- ブレガバリンOD錠25mg「明治」【後】
- ブレガバリンOD錠75mg「明治」【後】

- 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠25mg (リリカ)
- 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠75mg (リリカ)
- 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠150mg (リリカ)  
劇プレジコビックス配合錠
- プレタールOD錠50mg  
(【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠50mgへ切替)
- プレタールOD錠100mg (院内はシロスタゾールOD錠100mg「サリ」)  
(【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠100mgへ切替)
- プレディニン錠25 25mg
- プレディニン錠50-50mg  
プレディニンOD錠50 50mg
- プレドニゾロン散「タダ」1%  
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
- プレドニン錠5mg  
劇プレバイミス錠240mg
- プレマリン錠0.625mg  
プレミネント配合錠L-D  
(【般】 マルタン50mg・ヒドロキシアルギド配合錠へ切替)
- プレミネント配合錠H-D  
(【般】 マルタン100mg・ヒドロキシアルギド配合錠へ切替)
- 【般】 プロカテロール塩酸塩錠0.025mg (メブチン)
- 【般】 プロカテロール塩酸塩錠0.05mg (メブチン)
- プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」 【後】
- 【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% 5μg/mL (メブチン)
- 劇プログラフ顆粒0.2mg [0.2mg/包]
- 劇プログラカプセル0.5mg (タクロリムス錠0.5mg「トワ」へ切替)  
(【般】 タクロリムスカプセル0.5mgへ切替)
- 劇プログラカプセル1mg (タクロリムス錠0.5mg「トワ」へ切替)  
(【般】 タクロリムスカプセル1mgへ切替)
- プロゲストン錠2.5mg—【後】  
(メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」へ名称変更)  
(【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mgへ切替)
- 劇プログラサイサン錠20μg (院内はペラプロストNa錠20μg「サリ」)  
(【般】 ペラプロストNa錠20μgへ切替)
- 劇プロスタグラニジンE<sub>2</sub>錠0.5mg「科研」  
プロスター錠25-25mg  
(院内はクロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」へ切替)  
(【般】 クロルマジノン酢酸エステル錠25mgへ切替)
- プロセキソール錠0.5mg  
プロセミド細粒4%「EMEC」 【後】 (【般】 なし)
- 【般】 プロセミド細粒4%
- プロセミド錠20mg「NIG」 【後】
- 【般】 プロセミド錠20mg (ラシックス)
- 【般】 プロセミド錠40mg (ラシックス)
- プロチアデン錠25 25mg (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)
- 向プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 【後】
- 【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg (レンドルミン)  
プロテカゾンOD錠10-10mg (ラチジン錠10mg「トワ」へ切替)  
(【般】 ラチジン口腔内崩壊錠10mgへ切替)  
プロナーゼMS 20000単位 [0.5g/P]
- 【般】 プロナセリン錠4mg (ロナセン)
- 【般】 プロナセリン錠8mg (ロナセン)
- 劇プロノン錠150mg (【般】 プロパフェノン塩酸塩錠150mgへ切替)  
プロバジール錠50mg  
○ 劇プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オハラ」 【後】
- 【般】 プロパフェノン塩酸塩錠150mg (プロノン)
- プロ・バンサイン錠15mg [2~8°C]
- 【般】 プロピペリン塩酸塩錠10mg (バップフォー)
- 【般】 プロプラノロール塩酸塩錠10mg (インデラル)
- プロプレネ錠2mg (【般】 カンデサルタン錠2mgへ切替)
- プロプレネ錠4mg (院内はカンデサルタン錠4mg「あすか」)  
(【般】 カンデサルタン錠4mgへ切替)
- プロプレネ錠8mg (【般】 カンデサルタン錠8mgへ切替)
- プロプレネ錠12mg (【般】 カンデサルタン錠12mgへ切替)
- 劇プロペシア錠0.2mg (保険適用外)
- 劇プロペシア錠1mg (保険適用外)  
プロペラ錠2.5mg (プロゲストン錠2.5mgへ切替)
- 向プロマゼバム錠2mg「サド」 【後】 (セニラン錠2mgより名称変更)
- 【般】 プロマゼバム錠2mg (レキソタン)
- プロマック顆粒15% [75mg/0.5g/P]  
(【般】 ポラプレジンク顆粒15% 75mg/0.5g (包) へ切替)
- プロマックD錠75mg (院内はポラプレジンクOD錠75mg「サリ」)  
(【般】 ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mgへ切替)
- 【般】 プロムベリドール細粒 1% (インプロメン)
- 【般】 プロムベリドール錠1mg (インプロメン)
- 【般】 プロムベリドール錠3mg (インプロメン)
- 【般】 プロモタジン1.35%等配合非ピリ系感冒剤 1g/包 (P-L)
- 【般】 プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg (パーロデル)
- フロモックス小児用細粒100mg (【般】 なし)  
(【般】 セカベニピボキシル塩酸塩細粒10%へ切替)
- フロモックス錠100mg  
(院内はセフカベン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SWJ」)  
フロリードゲル経口用2% 5g
- 劇フロリネフ錠0.1mg
- プロレナール錠5μg  
(院内はリマプロストアルファデクス錠5μg「サリ」)  
(【般】 リマプロストアルファデクス錠5μgへ切替)
- 【ヘ】
- ベイスンOD錠0.2mg  
(【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mgへ切替)
- ベイスンOD錠0.3mg (院内はボグリボースOD錠0.3mg「トワ」)  
(【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mgへ切替)  
ベオーバ錠50mg
- 劇ペオニ錠80-80mg (【般】 ザルトプロフェン錠80mgへ切替)
- ベザトールS-R錠200mg (院内はベザフィブロート徐放錠200mg「トワ」)  
劇ベサノイドカプセル10mg
- ベザフィブロート徐放錠200mg「トワ」 【後】
- 【般】 ベザフィブロート徐放錠200mg (ベザトール)  
ベシケテOD錠5mg  
(ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トワ」へ切替)
- 劇ベージニオ錠50mg
- 劇ベージニオ錠150mg
- 【般】 β-ガラクトシダーゼ (アスペルギルス) 散50% (ガランターゼ)
- 【般】 ベタキソロール塩酸塩錠10mg (ケルロング)
- ベタセレミン配合錠 【後】  
(【般】 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠へ切替)
- 向ベタナミン錠50mg—【後】 (【般】 ペモリン錠50mgへ切替)  
劇ベタニス錠50mg
- ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トワ」 【後】
- 【般】 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg (メリスロン)
- 【般】 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 (セレスタミン)
- 【般】 ベタメタゾン錠0.5mg (リンデロン)
- 劇ベニジビン塩酸塩錠4mg「トワ」 【後】
- 【般】 ベニジビン塩酸塩錠4mg (コニール)

劇ペネクレクスタ錠10mg  
劇ペネクレクスタ錠50mg  
劇ペネクレクスタ錠100mg  
●劇ペネット錠2.5mg  
(【般】リセドロン酸N a錠2.5mgへ切替)  
●劇ペネット錠17.5mg  
(【般】リセドロン酸N a錠17.5mgへ切替)  
●ヘパンE D配合内用剤 [80g/P]  
●劇ペセラ錠10—10mg  
劇ペブリヨール錠50mg (ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」へ切替)  
(【般】ペブリジル塩酸塩錠50mgへ切替)  
劇ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」 【後】  
●劇【般】ペブリジル塩酸塩錠50mg (ペブリコール)  
○ペボタスチンペシル酸塩OD錠10mg「トワ」 【後】  
●【般】ペボタスチンペシル酸塩口腔内崩壊錠5mg (タリオン)  
●【般】ペボタスチンペシル酸塩口腔内崩壊錠10mg (タリオン)  
●【般】ペボタスチンペシル酸塩錠10mg (タリオン)  
劇ペマジール錠4.5mg  
劇ヘマンジオルシロップ小兒用0.375%  
●【般】ペミロラストK錠10mg (アレギサール)  
●【般】ペミロラストKシロップ用0.5% (アレギサール)  
劇ベムリディ錠25mg  
●【般】ペモリン錠50mg (ペタナミン錠)  
劇ペラサスルA錠60 $\mu$ g (ケアロードL A錠60 $\mu$ gへ切替)  
●【般】ペラパミル塩酸塩錠40mg (ワソラン)  
○劇ペラプロストN a錠20 $\mu$ g「サリ」 【後】  
●【般】ペラプロストN a錠20 $\mu$ g (プロサイリン)  
ペリアクチン錠4mg  
ペリアクチンシロップ0.04%  
ペリキューP錠2.5mg  
●ペリキューP錠5mg  
ペリキューP錠10mg  
ペリチーム配合顆粒 [1g/P]  
●ペリンドブリルエルズミン錠4mg「サリ」  
●【般】ペリンドブリルエルズミン錠4mg (コバシル)  
●【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50 $\mu$ g (ペルマックス)  
●【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250 $\mu$ g (ペルマックス)  
●ペルサンチン錠25mg (院内はジピリダモール錠25mg「トワ」)  
(【般】ジピリダモール錠25mgへ切替)  
●ペルサンチン錠100mg (院内はジピリダモール錠100mg「トワ」)  
(【般】ジピリダモール錠100mgへ切替)  
●ペルジピシルAカプセル20mg  
(【般】ニカルジビン塩酸塩徐放カプセル20mgへ切替)  
●ペルジピシルAカプセル40mg  
(【般】ニカルジビン塩酸塩徐放カプセル40mgへ切替)  
ペルソムラ錠15mg  
ペルソムラ錠20mg  
ペルペッサー錠30—30mg  
(ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トワ」へ切替)  
ペルペッサーRカプセル100mg  
(ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サリ」へ切替)  
(【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mgへ切替)  
●劇ペルマックス錠50 $\mu$ g (【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50 $\mu$ gへ切替)  
●劇ペルマックス錠250 $\mu$ g (【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250 $\mu$ gへ切替)  
劇ペレキシブル錠80mg  
○劇ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アル」 【後】  
●【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg (ルーラン)  
●ペングッド錠250mg

●向ペシザン細粒1% (【般】ニトラゼバム細粒1%へ切替)  
●向ペシザン錠5—5mg (【般】ニトラゼバム錠5mgへ切替)  
○劇ベンズプロマロン錠50mg「NIG」 【後】  
●【般】ベンズプロマロン錠50mg (ユリノーム)  
●ベンタサ顆粒94% [250mg/P]  
●ベンタサ顆粒94% [1000mg/P]  
ベンタサ顆粒94% [2000mg/P]  
ベンタサ錠500mg (【般】メサラジン錠500mgへ切替)  
●【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル(ビタミン)  
【ホ】  
劇トイデヤ錠50mg  
ポカブリア錠30mg  
ホクナリンドライシロップ0.1%小兒用  
○ボグリボースOD錠0.3mg「トワ」 【後】  
●ボグリボースODフィルム0.2「QQ」—0.2mg— 【後】  
●ボグリボースODフィルム0.3「QQ」—0.3mg— 【後】  
●【般】ボグリボース口腔内崩壈錠0.2mg (ペイシン)  
●【般】ボグリボース口腔内崩壈錠0.3mg (ペイシン)  
●劇ボシュリフ錠100mg  
ボースデル内用液10 [250mL/袋]  
ホスミシンドライシロップ400 400mg/g  
●ホスミシン錠500 500mg  
ホスリボン配合顆粒  
●ホスレノール顆粒分包250mg (【般】炭酸ランタン顆粒250mgへ切替)  
●ホスレノールチュアブル錠250mg  
●ホスレノールチュアブル錠500mg  
●【般】ボセンタン錠62.5mg (トラクリア)  
●劇ボナロジン錠5mg (【般】アレンドロン酸錠5mgへ切替)  
●劇ボナロジン錠35mg (院内はアレンドロン酸錠35mg「トワ」)  
(【般】アレンドロン酸錠35mgへ切替)  
劇ボナロン経口ゼリー—35mg  
●ボノサップパック400 1シート  
●ボノビオンパック 1シート  
毒ボマリストカプセル1mg  
毒ボマリストカプセル2mg  
毒ボマリストカプセル3mg  
毒ボマリストカプセル4mg  
●ボラキス錠2—2mg (【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mgへ切替)  
●ボラキス錠3—3mg (【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mgへ切替)  
○ボラブレジンクOD錠75mg「サリ」 【後】  
●【般】ボラブレジンク顆粒15% 75mg/0.5g (包) (プロマック)  
●【般】ボラブレジンク口腔内崩壈錠75mg (プロマック)  
●【般】ボリエンホスファチジルコリンカプセル250mg (EPLカプセル)  
(2026年3月31日削除予定)  
ボリカルボフィルC a細粒83.3%「日医工」 [1.2g/P] 【後】  
○劇ボリコナゾール錠50mg「トワ」 【後】  
○劇ボリコナゾール錠200mg「トワ」 【後】  
●【般】ボリコナゾール錠50mg (ブイフェンド)  
●【般】ボリコナゾール錠200mg (ブイフェンド)  
○ボリスチレンスルホン酸C a経口ゼリー—20%分包25g「三和」 【後】  
(アーガメイト20%ゼリー—25g より名称変更)  
●【般】ボリオキシム酸C a経口液20%—25g/包 (カリメート)  
●【般】ホリナート錠25mg (ロイコボリン)  
劇ボルタレン錠25mg (【般】ジクロフェナクN a錠25mgへ切替)  
(院内はジクロフェナクN a錠25mg「トワ」)  
ボルトラック原末 [6g/P]  
●ボンゾール錠100mg

ポンタールシロップ3.25%

●劇ポンビバ錠100mg

【マ】  
向マイスタン錠5mg  
●向マイスタン錠10mg  
●向マイスリー錠5mg (院内はゾルビデム酒石酸塩OD錠5mg「サリ」)  
(【般】ゾルビデム酒石酸塩錠5mgへ切替)  
●向マイスリー錠10mg (【般】ゾルビデム酒石酸塩錠10mgへ切替)

● マヴィレット配合錠  
マグロール散68%分包50g  
劇マクサルトR-P-D錠10mg  
(リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」へ切替)  
(【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mgへ切替)

● マグミット錠500mg—【後】— (【般】酸化マグネシウム錠500mgへ切替)

●劇マスレッド錠5mg

●劇マスレッド錠12.5mg

●劇マスレッド錠25mg

● マーズレンS配合顆粒 [0.67g/P]  
(【般】アズレクスルカンNa・L-ケルタミン配合顆粒 0.67g/包へ切替)

● マーズレン配合錠1.0E S  
マドパー配合錠 (マドパー配合錠L 100へ名称変更)

● マドパー配合錠L 50  
マドパー配合錠L 100

●劇マニジピン塩酸塩錠10mg「サリ」—【後】—

● 【般】マニジピン塩酸塩錠10mg (カルスロット)

●劇マニジピン塩酸塩錠20mg「サリ」—【後】—

● 【般】マニジピン塩酸塩錠20mg (カルスロット)

● 【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg (ルジオミール)

● 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg (ルジオミール)

● マーベロン21 (保険適用外)

● マリゼブ錠12.5mg

● マリゼブ錠25mg

【ミ】  
● ミオカーム内服液33.3% [125mL/瓶]  
● ミオナール錠50mg (院内はエペリゾン塩酸塩錠50mg「トワ」)  
(【般】エペリゾン塩酸塩錠50mgへ切替)

●劇ミカトリオ配合錠  
劇ミカムロ配合錠A-P (テラムロ配合錠A-P「ニコロ」へ切替)

●劇ミカムロ配合錠B-P  
(【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠へ切替)  
ミカルディス錠40mg (院内はテルミサルタン錠40mg「ニコロ」)  
(【般】テルミサルタン錠40mgへ切替)

● ミカルディス錠80mg (【般】テルミサルタン錠80mgへ切替)  
ミグリス錠5mg

○ ミグリトール錠50mg「トワ」—【後】—

● 【般】ミグリトール錠50mg (セイブル)  
小児用ミケラン細粒0.2%

● ミケラン錠5mg (【般】カルテオロール塩酸塩錠5mgへ切替)

● ミケランL Aカプセル15mg

● ミコブティンカプセル150mg  
ミコンビ配合錠A-P (院内はテルチア配合錠A-P「トワ」)  
(【般】テルミサルタン40mg・ヒドロキシジド配合錠へ切替)

● ミコンビ配合錠B-P  
(【般】テルミサルタン80mg・ヒドロキシジド配合錠へ切替)

● 【般】ミチグリニドC a錠10mg (グルファスト)

● ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU

● ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU

○ ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」—【後】—

● 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg (メトリジン)  
劇ミニリンメルトOD錠25μg  
劇ミニリンメルトOD錠60μg

●劇ミニリンメルトOD錠120μg  
ミネプロOD錠1.25mg  
ミネプロOD錠2.5mg  
ミネプロOD錠5mg

● 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg (ミノマイシン)

○ ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トワ」—【後】—

● 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg (ミノマイシン)

● 【般】ミノドロン酸錠1mg (ボノテオ)

● 【般】ミノドロン酸錠50mg (ボノテオ)  
ミノマイシン顆粒2% 20mg/g

● ミノマイシン錠50mg

● ミノマイシンカプセル100mg  
(院内はミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トワ」)  
(【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mgへ切替)  
ミヤB M細粒 [1g/P]  
劇ミラベックスL A錠0.375mg  
(【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mgへ切替)

●劇ミラベックスA錠1.5mg  
(【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mgへ切替)

○劇ミルタザピン錠15mg「トワ」—【後】—

● 【般】ミルタザピン錠15mg (リフレックス)

● 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg (トレドミン)

○劇ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アベル」—【後】—

● 【般】ミルナシプラン塩酸塩25mg (トレドミン)

● 【般】ミルナシプラン塩酸塩50mg (トレドミン)  
ミンクリア内用散布液0.8%

【ム】  
● ムコサールドライシロップ1.5% (【般】なし)  
(【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5%へ切替)

● ムコスタ錠100mg (院内はレバミピド錠100mg「トワ」)  
(【般】レバミピド錠100mgへ切替)

● ムコソルバーンD-S 3%—[0.5g/P]  
(【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用3%へ切替)

● ムコソルバーン錠15mg  
(【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mgへ切替)

● ムコソルバーン錠45mg  
(【般】アンプロキソール塩酸塩徐放錠45mgへ切替)

● 小児用ムコソルバーンシロップ0.3%  
(【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3%へ切替)

● ムコダイーンD-S 50% (院内はカルボシスティインD-S 50%「トワ」)  
(【般】カルボシスティインシロップ用50%へ切替)

● ムコダイーン錠250mg (院内はカルボシスティイン錠250mg「トワ」)

● ムコダイーンシロップ5%  
(院内はカルボシスティインシロップ小児用5%「トワ」)  
(【般】カルボシスティインシロップ5%へ切替)

ムコブリン錠15mg—【後】—  
(院内はアンプロキソール塩酸塩錠15mg「トワ」へ切替)  
(【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mgへ切替)

● ムルブレタ錠3mg  
劇ムンデシンカプセル100mg

【メ】  
メイアクトM S 小児用細粒10% 100mg/g

● メイアクトM S錠100mg

- 向メイタックス錠1mg (院内はロフラゼブ酸エチル錠1mg「サイ」)  
(【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mgへ切替)
- メインテート錠2.5mg  
(院内はビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トワ」)  
(【般】ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mgへ切替)
- メインテート錠5mg  
(【般】ビソプロロールフルマ酸塩錠5mgへ切替)
- 劇メキシチールカプセル50mg
- 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg (メキシチール)  
劇メキシチールカプセル100mg  
(【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mgへ切替)
- 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg (メキシチール)  
劇メキニスト錠0.5mg [冷]  
劇メキニスト錠2mg [冷]  
劇メクトビ錠15mg
- 【般】メコバミン細粒0.1%500mg 500μg/0.5g包 (メチコバール)
- 【般】メコバラミン錠0.5mg (メチコバール)  
麻劇メサペイン錠5mg  
麻劇メサペイン錠10mg
- 【般】メサラジン錠500mg (ベンタサ)  
○ メサラジン腸溶錠400mg「サイ」 【後】
- 【般】メサラジン腸溶錠400mg (アサコール)  
劇メジコン散10%  
劇メスチノン錠60mg  
劇メーゼント錠0.25mg [冷]  
劇メーゼント錠2mg [冷]  
劇メソトレキセート錠2.5mg
- 劇メタクト配合錠L D
- 劇メタクト配合錠H D  
劇メタライト250カプセル 250mg [冷]  
メタルカブターゼカプセル50mg  
メチコバール細粒0.1% 500μg/0.5g包 【後】  
(【般】メコバミン細粒0.1%500mg 500μg/0.5g包へ切替)
- メチコバール錠500μg 【後】  
(【般】メコバラミン錠0.5mgへ切替)  
劇メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」
- 劇メトアナ配合錠L D
- 劇メトアナ配合錠H D  
劇メトグルコ錠250mg
- 劇メトグルコ錠500mg (【般】なし)  
○ メトクロラミド錠5mg「NIG」 【後】
- 【般】メトクロラミド錠5mg (プリンベラン)
- 劇【般】メトトレキサートカプセル2mg (リウマトレックス)  
(【般】メトトレキサート錠2mgへ切替)  
○ 劇メトレキサート錠2mg「JG」 【後】
- 劇【般】メトレキサート錠2mg  
メトピロンカプセル250mg
- 【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg (ロプレソール)
- 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mgMT (メトグルコ)  
● メトサジン錠2mg (【般】ミドドリン塩酸塩錠2mgへ切替)
- メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 【後】  
(プロゲストン錠2.5mgより名称変更)
- 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg (ワロラ)  
● 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg (ヒスロH)  
メドロール錠2mg  
メドロール錠4mg
- 【般】メナテトレノンカプセル15mg (グラケー)
- メニレット70%ゼリー20g/個  
(イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」へ名称変更)
- メニレット70%ゼリー30g/個  
(イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」へ名称変更)  
メネシット配合錠250—250mg  
(【般】レボドバ250mg・カルビドバ配合錠へ切替)
- メバロチン錠5—5mg  
(【般】プラバスタチンN a錠5mgへ切替)
- メバロチン錠10—10mg (院内はプラバスタチンN a錠10mg「トワ」)  
(【般】プラバスタチンN a錠10mgへ切替)
- メプチンドライシロップ0.005%  
メプチミニ錠25μg  
(【般】プロカテロール塩酸塩錠0.025mgへ切替)
- メプチン錠50μg  
(【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mgへ切替)
- メプチシロップ5μg/mL  
(院内はプロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」)  
(【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% 5μg/mLへ切替)
- 【般】メベンゾラート臭化物錠7.5mg (トランコロン)
- 劇メマリー錠5mg (【般】メマンチニン塩酸塩錠5mgへ切替)
- 劇メマリー錠10mg (【般】メマンチニン塩酸塩錠10mgへ切替)
- 劇メマリー錠20mg (【般】メマンチニン塩酸塩錠20mgへ切替)  
劇メマリーOD錠5mg (メマンチニン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」へ切替)  
(【般】メマンチニン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 劇メマリーOD錠10mg  
(【般】メマンチニン塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- 劇メマリーOD錠20mg  
(【般】メマンチニン塩酸塩口腔内崩壊錠20mgへ切替)
- 劇メマンチニン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 【後】  
● 【般】メマンチニン塩酸塩錠5mg (メマリー)
- 【般】メマンチニン塩酸塩錠10mg (メマリー)
- 【般】メマンチニン塩酸塩錠20mg (メマリー)
- 【般】メマンチニン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg (メマリーOD)
- 【般】メマンチニン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg (メマリーOD)
- 【般】メマンチニン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg (メマリーOD)  
メラトペル顆粒小児用0.2% g
- メリスローン錠6mg (院内はベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トワ」)  
(【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mgへ切替)
- メルカゾール錠2.5mg  
メルカゾール錠5mg
- メレックス錠0.5mg (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了)
- メロキシカム錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】メロキシカム錠10mg (モーピック)  
【モ】  
○ モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」 【後】
- 【般】モサブリドクエン酸塩散1% (ガスモチン)
- モサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」 【後】
- 【般】モサブリドクエン酸塩錠5mg (ガスモチン)
- 向劇モディオダール錠100mg
- モニラックシロップ65% [600mL]  
(院内はラクツロースシロップ65%「エタ」)
- モニラックシロップ65% [10mL/包]
- モーバー錠100mg  
(【般】アクタリット錠100mgへ切替 2026年3月31日削除予定)
- モビコール配合内用剤H D  
モビコール配合内用剤L D (モビコール配合内用剤より名称変更)  
劇モーバー錠10mg (院内はメロキシカム錠10mg「トワ」)  
(【般】メロキシカム錠10mgへ切替)

モビプレップ配合内用剤

麻毒モルヒネ塩酸塩水和物「タダ」原末 g  
麻劇モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「ジモト」 0.5g/包 【後】  
(モルペス細粒2%から名称変更)

●麻劇【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg (12時間持続) (モルペス)

●麻劇モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」

麻劇モルペス細粒2%—[0.5g/包]—【後】

(モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「ジモト」へ名称変更)

○ モンテルカストOD錠10mg「タダ」 【後】

● 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg (キプレス, シングレア)

● 【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包 (キプレス, シングレア)

● 【般】モンテルカスト錠5mg (キプレス, シングレア)

● 【般】モンテルカスト錠10mg (キプレス, シングレア)

○ モンテルカストチュアブル錠5mg「トワ」 【後】

(キプレスチュアブル錠5mgから切替)

● 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg (キプレス, シングレア)

【ヤ】

薬用炭「日医工」 (50g)

● ヤーズ配合錠 1シート

(【般】ドロスピレン・エチニエストラジオール配合錠・アセボ錠へ切替)

● ヤーズフレックス配合錠 1シート

【ユ】

●劇ユーエティE配合顆粒T100 [100mg/0.5g/P]

●劇ユーエティE配合顆粒T150 [150mg/0.75g/P]

●劇ユーエティE配合顆粒T200 [200mg/1g/P]

●劇ユーエティ配合カプセルT100

● ユゼル錠25mg (【般】ホリナート錠25mgへ切替)

ユナシン細粒小児用10% 100mg/g

● ユナシン錠375mg

●劇ユニシア配合錠H-D

(【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠へ切替)

●劇ユニシア配合錠H-D

(【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替)

劇ユニファイルA錠200mg

(院内はテオフィリン徐放U錠200mg「トワ」)

(【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) へ切替)

●劇ユバンシ配合錠

ユーピット錠100mg

○ ユビデカレノン錠10mg「トワ」 【後】

● 【般】ユビデカレノン錠10mg (ノイキノン)

ヨベラ顆粒20% (販売中止)

(トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハ」へ切替)

ヨベラ錠50mg (トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トワ」へ切替)

(【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mgへ切替)

● ヨベラNカプセル100mg

(【般】トコフェロールニコチニ酸エステルカプセル100mgへ切替)

ユリス錠1mg

● ユリス錠2mg

●劇ユリノム錠50mg (院内はベンズプロマロン錠50mg「NIG」)

(【般】ベンズプロマロン錠50mgへ切替)

●劇ユーラード錠2mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mgへ切替)

●劇ユーラード錠4mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mgへ切替)

●向ユーロジン2mg錠 (【般】エスタゾラム錠2mgへ切替)

【ヨ】

劇ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 (院内製剤原料)

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」

ヨウ化カリウム末

ヨウ化カリウム内服ゼリー16.3mg「日医工」 (備蓄用) [1g/P]

幼児用P-L配合顆粒—[1g/P]

● 【般】溶性ビロリン酸第二鉄シロップ5% (インクレミン)

● ヨクイニンエキス錠「コロ-」T72

【ラ】

● ラキソペロン錠2.5mg (【般】なし)

—(【般】ピコスルファートNa錠2.5mgへ切替)—

● ラキソペロン内用液0.75% [75mg/10mL/瓶]

—(【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mLへ切替)—

○ ラクツロースシロップ65%「タダ」 【後】

(ビアーレシロップ65%より名称変更)

● 【般】ラクツロースシロップ65% (モニラック)

● 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g/包 (ラグノスN Fゼリー)

○ ラグノスN F経口ゼリー分包12g 【後】

(【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g/包へ切替)

劇ラゲブリオカプセル200mg (ラゲブリオ錠400mgへ切替予定)

劇ラゲブリオ錠400mg (ラゲブリオカプセル200mgが無くなり次第切替)

● 【般】ラコサミドシロップ用10% (ビムバット)

● 【般】ラコサミド錠50mg (ビムバット)

● 【般】ラコサミド錠100mg (ビムバット)

ラコールN F配合経腸用半固体剤 [300g/袋]

(イノソリッド配合経腸用半固体剤へ切替)

ラコールN F配合経腸用液(ミルタフレーバー) [200mL/袋]

● ラコールN F配合経腸用液(コーンフレーバー) [200mL/袋]

ラコールN F配合経腸用液 [400mL/袋]

ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL/瓶 [2~8°C]

ラシックス細粒4% (院内はフロセミド細粒4%「EMEC」)

(【般】フロセミド細粒4%へ切替)

ラシックス錠20mg (フロセミド錠20mg「NIG」へ切替)

(【般】フロセミド錠20mgへ切替)

● ラシックス錠40mg (【般】フロセミド錠40mgへ切替)

ラジレス錠150mg

劇ラズクルーズ錠80mg

劇ラステットSカプセル25mg

ラスピック錠75mg

ラックビー微粒N 1% [1g/P]

劇ラツーダ錠20mg

●劇ラツーダ錠40mg

●劇ラツーダ錠80mg

ラディオガルダーゼカプセル500mg

劇ラニラピッド錠0.05mg (【般】なし)

劇ラニラピッド錠0.1mg (【般】メチルジゴキシン錠0.1mgへ切替)

劇ラパリムス顆粒0.2%

劇ラパリムス錠1mg

ラフチジン錠10mg「トワ」 【後】

● 【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg (プロテカジン)

● ラベキュアパック400 1シート

(販売終了) (2026年3月31日経過措置終了)

● 【般】ラベタロール塩酸塩錠50mg (トランデート)

(2026年3月31日削除予定)

● ラペファインパック 1シート

○ ラベプラゾールN a錠5mg「YD」 【後】

○ ラベプラゾールN a錠10mg「トワ」 【後】

● 【般】ラベプラゾールN a錠5mg (バリエット)

● 【般】ラベプラゾールN a錠10mg (バリエット)

● 【般】ラベプラゾールN a錠20mg (バリエット)

向劇ラボナ錠50mg

● 【般】ラマトロバン錠75mg (バイナス)

- ラミアン錠5mg【後】（【般】シンバスタチン錠5mgへ切替）
- 劇ラミクタール錠小児用2mg
- 劇ラミクタール錠小児用5mg（【般】ラモトリギン錠5mgへ切替）  
 劇ラミクタール錠25mg（院内はラモトリギン錠25mg「アル」）  
 （【般】ラモトリギン錠25mgへ切替）
- 劇ラミクタール錠100mg（【般】ラモトリギン錠100mgへ切替）  
 ラミシール錠125mg（テルビナフィン錠125mg「VTRS」へ切替）
- ラメルテオン錠8mg「JG」【後】
- 【般】ラメルテオン錠8mg（ロゼレム）
- 【般】ラモトリギン錠2mg（ラミクタール）
- 【般】ラモトリギン錠5mg（ラミクタール）
- 劇ラモトリギン錠25mg「アル」【後】
- 【般】ラモトリギン錠25mg（ラミクタール）
- 劇ラモトリギン錠100mg「アル」【後】
- 【般】ラモトリギン錠100mg（ラミクタール）
- 劇ラモトリギン錠小児用5mg「ト-7」【後】
- 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg（エビスタ）
- ランソープラゾールOD錠15mg「サイ」【後】
- 【般】ランソープラゾール口腔内崩壊錠15mg（タケプロン）
- 【般】ランソープラゾール口腔内崩壊錠30mg（タケプロン）
- 劇ランデル錠20 20mg  
 ランブレンカプセル50mg [35°C以上禁]

【リ】

- リアルダ錠1200mg [冷]
- 劇リウマトレックスカプセル2mg  
 (メトトレキサート錠2mg「JG」へ切替)  
 (【般】メトトレキサート錠2mgへ切替)
- リオナ錠250mg
- リオベル配合錠L D
- リオベル配合錠H D
- 劇リカルボン錠1mg（【般】ミノドロン酸錠1mgへ切替）
- 劇リカルボン錠50mg（【般】ミノドロン酸錠50mgへ切替）  
 リクシアナOD錠15mg  
 リクシアナOD錠30mg  
 リクシアナOD錠60mg
- 劇リザトリブタンOD錠10mg「VTRS」【後】
- 【般】リザトリブタン口腔内崩壊錠10mg（マクサルトR P D）
- サザベンカプセル100mg  
 (【般】トラニラストカプセル100mgへ切替)
- 劇リスピダール細粒1%
- 劇リスピダールOD錠1mg
- 劇リスピダール内用液1mg/mL [30mL/瓶]
- 劇リスピダール内用液1mg/mL [0.5mL/包]
- 劇リスピダール内用液1mg/mL [1mL/包]
- 劇リスピダール内用液1mg/mL [2mL/包]
- 劇リスペリドン細粒1%「ト-7」【後】
- 【般】リスペリドン細粒1%（リスピダール）
- リスペリドン錠0.5mg「ヨドミ」【後】（【般】なし）
- 【般】リスペリドン錠0.5mg（リスピダール）
- 【般】リスペリドン錠1mg（リスピダール）
- 劇リスペリドンOD錠1mg「アル」【後】
- 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg（リスピダール）
- 劇リスペリドン内用液1mg/mL「カタ」【後】
- 劇リスペリドン内用液分包0.5mg「アル」 [0.1%0.5mL/包]【後】
- 【般】リスペリドン経口液0.1% 0.5mL（リスピダール）
- 【般】リスペリドン経口液0.1% 1mL（リスピダール）
- 【般】リスペリドン経口液0.1% 2mL（リスピダール）
- 【般】リスペリドン経口液0.1% 3mL（リスピダール）

- リスミー錠1mg（【後】なし）
- リスミー錠2mg（【般】なし）
- サズミック錠10mg  
 (院内はアメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「ト-7」)  
 （【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mgへ切替）
- 劇リスモダンカプセル50mg  
 (院内はジソピラミドカプセル50mg「サイ-」)  
 (【般】ジソピラミドカプセル50mgへ切替)
- 劇リスモダンR錠150mg  
 (【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mgへ切替)
- 向リーゼ錠5mg（院内はクロチアゼバム錠5mg「サイ」）  
 (【般】クロチアゼバム錠5mgへ切替)
- 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg（アクトネル）
- 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg（アクトネル）
- 【般】リセドロン酸Na錠75mg（アクトネル）
- 劇リセドロン酸Na錠75mg「ト-7」【後】
- 向劇リタリン錠10mg
- サックル配合顆粒 [4.74g/P]【後】（販売中止）  
 (リーバクト配合顆粒へ切替)  
 (【般】イヨシ・ヨシ・バリン配合顆粒 4.74g/包へ切替)
- 劇リットフーロカプセル50mg
- 劇リトゴビ錠4mg
- リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」【後】
- 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg（ウテメリソ）  
 リーバクト配合顆粒 [4.15g/P]
- リーバクト配合経口ゼリー [20g/個]
- リパクレオン顆粒300mg分包  
 リパクレオンカプセル150mg
- リバゼブ配合錠L D
- リバゼブ配合錠H D
- サバロOD錠1mg  
 (【般】ピタバスタチンC a 口腔内崩壊錠1mgへ切替)
- サバロOD錠2mg（院内はピタバスタチンC a・OD錠2mg「ト-7」）  
 (【般】ピタバスタチンC a 口腔内崩壊錠2mgへ切替)
- サバロOD錠4mg  
 (【般】ピタバスタチンC a 口腔内崩壊錠4mgへ切替)
- 【般】リバロキサバン口腔内崩壊錠10mg（イグザレルト）
- 【般】リバロキサバン口腔内崩壊錠15mg（イグザレルト）  
 サビデイル錠80mg  
 (院内はフェノフィラート錠80mg「武田テバ」へ切替)  
 (【般】フェノフィラート錠80mgへ切替)
- サピトール錠10mg（【般】アトルバスタチン錠10mgへ切替）
- リファジンカプセル150mg  
 (院内はリファンピシンカプセル150mg「サンド」)  
 リファンピシンカプセル150mg「サンド」【後】（【般】なし）
- 【般】リファンピシンカプセル150mg（リファジン）  
 リスキマ錠200mg
- 劇リプロテニティ錠200mg
- リフヌア錠45mg  
 劇リフレックス錠15mg（ミルタザビン錠15mg「ト-7」へ切替）  
 (【般】ミルタザビン錠15mgへ切替)
- 劇リベルサス錠3mg
- 劇リベルサス錠7mg
- 劇リベルサス錠14mg  
 向リポトリール細粒0.5%  
 向リポトリール錠0.5mg
- サボバース錠5-5mg（【般】シンバスタチン錠5mgへ切替）
- 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg（ハイボン）

劇サーマス錠100—100mg (炭酸リチウム錠100「大正」へ切替)

●劇サーマス錠200—200mg (院内は炭酸リチウム錠200「大正」)  
(【般】炭酸リチウム錠200mgへ切替)

●劇リマチル錠100mg

○ リマプロストアルファデクス錠5μg「サリ」【後】

● 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg (オバルモン、ブロナール)  
劇リムバーザ錠100mg  
劇リムバーザ錠150mg  
毒硫酸アトロビン「ホウ」  
(アトロビン硫酸塩水和物「ホウ」原末へ名称変更)  
硫酸マグネシウム「東海」 (院内製剤原料) (販売中止)  
サリカO-D錠25mg (プレガバリンO-D錠25mg「明治」へ切替)  
(【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mgへ切替)  
サリカO-D錠75mg (プレガバリンO-D錠75mg「明治」へ切替)  
(【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mgへ切替)

● サリカO-D錠150mg  
(【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mgへ切替)

○ リルゾール錠50mg「ヒト」【後】

● 【般】リルゾール錠50mg (リルテック)  
サルテック錠50—50mg (リルゾール錠50mg「ヒト」へ切替)  
(【般】リルゾール錠50mgへ切替)

●劇リンヴォック錠7.5mg

●劇リンヴォック錠15mg

●劇リンヴォック錠30mg  
劇リンヴォック錠45mg  
劇リン酸コデイン散1%「ホウ」  
● リン酸水素カルシウム水和物「ヒト」  
(リン酸水素カルシウム水和物「ヨウ」から切替)  
リンゼス錠0.25mg  
リンデロン錠0.5mg (【般】ベタメタゾン錠0.5mgへ切替)  
リンデロンシロップ0.01%

【ル】

● ルジオミール錠10mg

● ルジオミール錠25mg (【般】マプロチリン塩酸塩錠25mgへ切替)  
ルセフィ錠2.5mg

● ルセフィO-Dフィルム2.5mg  
ルトラール錠2mg

● ルナペル配合錠U-L-D  
(【般】ルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02mg配合錠)

● ルナペル配合錠L-D  
(【般】ルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035mg配合錠へ切替)  
ルネスタ錠1mg (エスゾビクロン錠1mg「日新」へ切替)

● ルネスタ錠2mg  
ルバフィン錠10mg  
劇ルブキネスカプセル7.9mg  
ルブリック錠8mg (トラセミドO-D錠8mg「TE」へ切替)

● ルボタックス錠25—25mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替)

● ルボタックス錠50—50mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替)

● ルボタックス錠75—75mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替)  
劇ルマケラス錠120mg

●劇ルーラン錠4mg (院内はペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」)  
(【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mgへ切替)

【レ】

●劇レイボー錠50mg

●劇レイボー錠100mg

劇レキサルティO-D錠0.5mg  
劇レキサルティO-D錠1mg

●劇レキサルティO-D錠2mg

●向レキソタン錠2—2mg (採用薬はプロマゼバム錠2mg「サント」へ切替)  
(【般】プロマゼバム錠2mgへ切替)

●劇レキップ錠0.25mg (【般】ロビニロール錠0.25mgへ切替)  
劇レキップ錠1mg (院内はロビニロールO-D錠1mg「アメル」)  
(【般】ロビニロール口腔内崩壊錠1mgへ切替)

●劇レキップ錠2mg (【般】ロビニロール錠2mgへ切替)  
劇レキップC-R錠2mg (院内はロビニロール徐放錠2mg「ト-7」)  
(【般】ロビニロール徐放錠2mgへ切替)

●劇レキップC-R錠8mg (【般】ロビニロール徐放錠8mgへ切替)  
劇レクサプロ錠10mg (【般】エスシタロプラム錠10mgへ切替)  
レクチゾール錠25mg  
レグテクト錠333mg

● レグナイト錠300mg

● レグバラ錠12.5mg  
レグバラ錠25mg

● レザルタス配合錠L-D  
レザルタス配合錠H-D  
レスタミンコーウ錠10mg  
レスピア静注・経口液60mg 3mL瓶  
レスプレン錠20mg

●劇レスリング錠50—50mg (【般】トラゾドン塩酸塩錠50mgへ切替)  
劇レズロック錠200mg

●劇レットヴィモカプセル40mg

●劇レットヴィモカプセル80mg

●劇レトロゾール錠2.5mg「サリ」【後】

● 【般】レトロゾール錠2.5mg (フェマーラ)  
劇レトロビルカプセル100mg  
レナデックス錠4mg

○毒レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」【後】

●毒【般】レナリドミドカプセル2.5mg (レブラミド)

○毒レナリドミドカプセル5mg「BMSH」【後】

●毒【般】レナリドミドカプセル5mg (レブラミド)

● レニペース錠2.5—2.5mg  
(【般】エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mgへ切替)

● レニペース錠5mg (院内はエナラブリルマレイン酸塩錠5mg「ト-7」)  
(【般】エナラブリルマレイン酸塩錠5mgへ切替)

○劇レパグリニド錠0.25mg「サリ」【後】

● 【般】レパグリニド錠0.25mg (シュアポスト)

●劇レパグリニド錠0.5mg「サリ」【後】

● 【般】レパグリニド錠0.5mg (シュアポスト)  
レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg  
レバチオ錠20mg (【般】シルデナフィル錠20mg: R-Eへ切替)

○ レバミピド錠100mg「ト-7」 (【般】加算なし)

● 【般】レバミピド錠100mg (ムコスタ)  
毒レブラミドカプセル2.5mg  
(【般】レナリドミドカプセル2.5mgへ切替)

毒レブラミドカプセル5mg  
(【般】レナリドミドカプセル5mgへ切替)

○ レベチラセタムD S 50%「ト-7」【後】

○ レベチラセタム錠500mg「サリ」【後】

● 【般】レベチラセタム錠500mg (イーケプラ)

● 【般】レベチラセタムシロップ用50% (イーケプラドライシロップ)

○ レボカルニチンF-F錠250mg「ト-7」【後】

● 【般】レボカルニチンF-F錠250mg (エルカルチン)

○ レボカルニチン F F 内用液10%「トワ」 【後】  
● 【般】 レボカルニチン F F 経口液10% (エルカルチン)  
○ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サド」 【後】  
○ レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トワ」 【後】  
● 【般】 レボセチリジン塩酸塩錠5mg (ザイザル)  
● 【般】 レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% (ザイザルシロップ)  
● 劇レボチロキシン N a 錠25 μg「サド」  
● 劇レボチロキシン N a 錠50 μg「サド」  
● 【般】 レボドバ100mg・カルビドバ配合錠 (ネオドバストン L)  
● 【般】 レボドバ250mg・カルビドバ配合錠 (メネシット)  
● 【般】 レボフロキサン錠250mg  
レボフロキサン錠500mg「サウ」 【後】  
● 【般】 レボフロキサン錠500mg (クラビット)  
● 【般】 レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg (ヒルナミン)  
劇レボレード錠12.5mg  
● 劇レミッヂカプセル2.5 μg (販売中止)  
(【般】 ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μgへ切替)  
劇レミッヂ O D 錠2.5 μg  
(【般】 ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 μgへ切替)  
劇レミニール O D 錠4mg  
(【般】 ガランタミン口腔内崩壈錠4mgへ切替)  
劇レミニール O D 錠8mg  
(【般】 ガランタミン口腔内崩壈錠8mgへ切替)  
● 劇レミニール O D 錠12mg  
(【般】 ガランタミン口腔内崩壈錠12mgへ切替)  
● レリフェン錠400mg  
劇レルミナ錠40mg  
● 向レンドルミン D 錠0.25mg  
(【般】 プロチゾラム口腔内崩壈錠0.25mgへ切替)  
劇レンビマカプセル4mg  
劇レンビマカプセル10mg  
【口】  
劇ロイケリン散10%  
ロイコボリン錠5mg  
ロイコン錠10mg  
● 劇ロカルトロールカプセル0.25—0.25 μg  
(【般】 カルシリオールカプセル0.25 μgへ切替)  
● ローガン錠10mg  
● 【般】 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg (アルタット)  
● ロキソニン錠60mg (院内はロキソプロフェン N a 錠60mg「トワ」)  
(【般】 ロキソプロフェン N a 錠60mgへ切替)  
● 【般】 ロキソプロフェン N a 錠60mg (ロキソニン)  
○ ロキソプロフェン N a 錠60mg「トワ」 【後】  
ロケルマ懸濁用散分包5g 1包  
● ロケルマ懸濁用散分包10g 1包  
● ローコール錠30mg (【般】 フルバスタチン錠30mgへ切替)  
● ロコルナール錠100mg (【般】 トラピジル錠100mgへ切替)  
○ ロサルタン K 錠25mg「トワ」 【後】  
● 【般】 ロサルタン K 錠25mg (ニューロタン)  
● 【般】 ロサルタン K 錠50mg (ニューロタン)  
● 【般】 ロルタン100mg・ヒドロクロチアジド 配合錠 (プレミネット H D)  
● 【般】 ロルタン50mg・ヒドロクロチアジド 配合錠 (プレミネット L D)  
ロスーゼット配合錠 H D  
○ ロスバスタチン O D 錠2.5mg「サウ」 【後】  
● 【般】 ロスバスタチン口腔内崩壈錠2.5mg (クレストール)  
● 【般】 ロスバスタチン錠5mg (クレストール)  
劇ロズリートレクカプセル100mg  
劇ロズリートレクカプセル200mg

ロゼレム錠8mg (ラメルテオン錠8mg「JG」へ切替)  
(【般】 ラメルテオン錠8mgへ切替)  
劇ロタリックス内用液 1.5mL/本 [冷]  
● 劇ロートエキス散 10%  
→ 劇ロドビン錠25mg (ゾテビン錠25mg「カタ」 2026年3月31日経過措置終了  
が無くなり次第切替)  
ロトリガ粒状カプセル2g [2g/包]  
(オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トワ」へ切替)  
(【般】 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2gへ切替)  
劇ロナセン錠4mg (【般】 プロナセリン錠4mgへ切替)  
● 劇ロナセン錠8mg (【般】 プロナセリン錠8mgへ切替)  
○ 劇ロピニロール O D 錠1mg「アメル」 【後】  
● 【般】 ロピニロール口腔内崩壈錠1mg (レキップ)  
● 【般】 ロピニロール錠0.25mg (レキップ)  
● 【般】 ロピニロール錠1mg (レキップ)  
● 【般】 ロピニロール錠2mg (レキップ)  
○ 劇ロピニロール徐放錠2mg「トワ」 【後】  
● 【般】 ロピニロール徐放錠2mg (レキップ C R)  
● 【般】 ロピニロール徐放錠8mg (レキップ C R)  
○ 向ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サウ」 【後】  
● 【般】 ロフラゼブ酸エチル錠1mg (メイラックス)  
劇ロプレソール錠20mg (【般】 メトプロロール酒石酸塩錠20mgへ切替)  
劇ローブレナ錠25mg  
劇ローブレナ錠100mg  
ロペミン細粒0.1% (【般】 ロペラミド塩酸塩細粒0.1%へ切替)  
● ロペミンカプセル1mg (院内はロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サウ」)  
○ ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サウ」 【後】  
● 【般】 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg (ロペミン)  
○ 向ロラゼパム錠0.5mg「サウ」 【後】  
● 【般】 ロラゼパム錠0.5mg (ワイパックス)  
● 【般】 ロラタジン錠10mg (クラリチン)  
● 【般】 ロラタジンシロップ用1% 0.5g (包) (クラリチン)  
劇ロルカム錠4mg (ロルノキシカム錠4mg「KO」へ切替)  
○ 劇ロルノキシカム錠4mg「KO」 【後】  
● 【般】 ロルノキシカム錠4mg (ロルカム)  
劇ロンサーフ配合錠 T 15  
劇ロンサーフ配合錠 T 20  
【ワ】  
● 劇ワイテンス錠2mg  
○ ワイドシリソ細粒20% 【後】  
● 向ワイパックス錠0.5—0.5mg (【般】 ベモリン錠50mgへ切替)  
(【般】 ロラゼパム錠0.5mgへ切替)  
劇ワゴスチグミン散(0.5%)  
ワソラン錠40mg (【般】 ベラバミル塩酸塩錠40mgへ切替)  
● ワーファリン顆粒0.2%  
ワーファリン錠0.5mg  
ワーファリン錠1mg  
○ ワルファリン K 細粒0.2%「NS」 【後】  
● 【般】 ワルファリン K 細粒0.2% (ワーファリン)  
● 劇ワンアルファ錠0.5 μg  
(【般】 アルファカルシドール錠0.5 μgへ切替)  
劇ワントラム錠100mg

## 外用薬リスト

### 【ア】

劇アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL1個

※ アイドロイシン1%点眼液 5mL 【後】 (販売中止)  
(コンドロイチン点眼液1%「日点」へ切替)  
(【般】コドロイシ硫酸1スルN a点眼液1% 5mLへ切替)

劇アイノフロー吸入用800ppm (N I C Uの限定使用)  
テイフアガン点眼液0.1%—5mL  
(プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」へ切替)  
(【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%へ切替)

- アイベータ配合点眼液 5mL/瓶
- アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/瓶
- 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ 【後】
- 【般】亜鉛華単軟膏10% (サトウザルベ)  
アクアチムタリーM1%—10g (院内はナジフロキサシンクリーM1%「トワ」)  
(【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g/本へ切替)  
アクアチムローション1%—20mL  
(ナジフロキサシンローション1%「トワ」へ切替)  
(【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本へ切替)  
アクトシン軟膏3% 30g [冷]  
アクトシン軟膏3% 200g [冷]  
アジマイシン点眼液1% 2.5mL/瓶 [冷]
- 劇亜硝酸アミル「AFP」 0.25mL1管 [冷]
- アスタッツ軟膏1% 10g (【般】なし)  
(【般】ラノコナゾール軟膏1%—10mg/本へ切替)  
アズノール軟膏0.033% 20g  
アズノール軟膏0.033%—500g (供給停止)  
(アズノール軟膏0.033% 20gへ切替)  
アズノールS T錠口腔用5mg  
アスプロル液(0.5%)—50mL/瓶
- アズマネックスツイストヘラ—100μg60吸入 6mg1キット  
(販売中止) (2026年3月31日経過措置終了(予定))
- アズレンうがい液4%「ケンエー」 5mL 【後】
- 【般】アズレンスルホン酸N a含嗽用液4% 5mL/瓶
- 【般】アズレンスルホン酸N a・炭酸水素カリウム配合含嗽剤2g/包 (ハザズレ)  
劇アセサイド6%消毒液(第一剤、第二剤とも800mLセット) [1~25°C]  
[内視鏡洗浄消毒装置OER-4専用]
- 劇アセサイド6%消毒液(第一剤、第二剤とも875mLセット) [1~25°C]  
[内視鏡洗浄消毒装置OER-3専用]
- アセチロールタリーM20%—25g 【後】  
(尿素クリーム20%「SUN」へ名称変更)  
(【般】尿素クリーム20% 25g/本へ切替)
- 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg (アンヒバ)
- アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL
- 【般】アダパレンゲル0.1% 15g/本 (ディフェリンゲル)
- アテキュラ吸入用カプセル低用量  
アテキュラ吸入用カプセル中用量  
アテキュラ吸入用カプセル高用量  
アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g1瓶  
アドエア100ディスカス60吸入用 60gリスター1キット
- アドエア250ディスカス60吸入用 60gリスター1キット
- アドエア500ディスカス60吸入用 60gリスター1キット
- アドフィードバップ40mg 10cm×14cm(7枚入)  
劇日点アトロビン点眼液1% 5mL
- アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 1キット
- アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 1キット
- アノーロエリプタ7吸入用 1キット  
アノーロエリプタ30吸入用 1キット
- アフターシール25μg—1枚(10枚入) 【後】  
(トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」へ名称変更)  
アボコート軟膏0.1%—5g 【後】
- アポハイドローション20% 4.32g/本  
アラセナ-A軟膏3% 5g (【般】ビダラビン軟膏3% 5g/本へ切替)  
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g1キット  
(【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用へ切替)
- アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 5mg10g1キット  
(【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用へ切替)  
アリケイス吸入液590mg 8.4mL瓶 [2~8°C]
- 劇アリドネバッヂ27.5mg 1枚
- 劇アリドネバッヂ55mg 1枚
- 【般】アルコメタゾンロビオ酸エステル軟膏0.1%—5g/本 (アルメタ軟膏)  
アルト原末 500mg1管
- アルメタ軟膏 0.1%5g (【般】なし)  
(【般】アルコメタゾンロビオ酸エステル軟膏0.1%—5g/本へ切替)
- アレサガテープ4mg 1枚
- アレサガテープ8mg 1枚  
アレジオンL X点眼液0.1% 5mL/瓶  
(【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%へ切替)  
アレジオン眼瞼クリーム0.5% 2g/本  
アロノアルファA「三共」—0.5g1管 [冷] (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了(予定))
- 劇アンテベート軟膏0.05%—5g  
(院内はベタメタゾン酸エステルロビオ酸エステル軟膏0.05%「MYK」)
- 劇アンテベートクリーM0.05%—5g  
(院内はベタメタゾン酸エステルロビオ酸エステルクリーム0.05%「MYK」)
- 劇アンテベートローション0.05%—10g  
(院内はベタメタゾン酸エステルロビオ酸エステルローション0.05%「JG」)  
アンヒバ坐剤小児用100mg [冷]  
アンヒバ坐剤小児用200mg [冷]  
(【般】アセトアミノフェン坐剤200mgへ切替)
- 麻劇アンペック坐剤10mg

### 【イ】

イオウ・カンフルローション「東豊」 500mL [冷]  
劇イクセロンパッヂ4.5mg 1枚  
(【般】リバスチグミンテープ4.5mgへ切替)

● 劇イクセロンパッヂ9mg 1枚  
(【般】リバスチグミンテープ9mgへ切替)

● 劇イクセロンパッヂ13.5mg 1枚  
(【般】リバスチグミンテープ13.5mgへ切替)

劇イクセロンパッヂ18mg 1枚  
(【般】リバスチグミンテープ18mgへ切替)  
産婦人科用イソジンクリーム5% 250g  
イソジンガーガル液7%—30mL  
(ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mLへ切替)  
(【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本へ切替)  
イソジンゲル10% 90g

○ イソジンシガーパスタ軟膏100g 【後】 (販売中止)  
(【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100g/瓶へ切替)

○ イソジンシガーパスタ軟膏500g 【後】

● 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL/瓶 (レスキュラ)  
イナビル吸入粉末剤20mg 1キット

● 劇イミグラン点鼻液20 20mg0.1mL1個  
劇イムノブラダー膀胱用80mg 1瓶 (溶解液付) [冷]

● インターラー吸入液1%—2mL1管 (クモモリ酸N a吸入液1%「サウイ」)

- インテバンクリーム1% 50g
- インテバン外用液1%—50mL
  - (【般】 インドメタシン外用液1% 50mL/本へ切替)
- 【般】 インドメタシン外用液1% 50mL/本 (インテバン)
- 【ウ】
  - ※ ウエルアップハンドローション0.5% 1L  
 (ヒビスコール液A 1% 1Lへ切替)
  - ウトロゲスタン塗用カプセル200mg
  - ウルティプロ吸入用カプセル  
 ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3% 3L
- 【エ】
  - エイゾープト懸濁性点眼液1%—5mL
    - (【般】 プリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶へ切替)
  - 劇エイベリス点眼液0.002% 2.5mL [2~8°C]  
 エキザルベ軟膏 5g  
 エキザルベ軟膏 500g  
 エクラーブラスター20  $\mu\text{g}/\text{cm}^2$  (1.5mg)7.5cm × 10cm
  - エクリラ400  $\mu\text{g}$ ジェヌエア30吸入用
  - エクリラ400  $\mu\text{g}$ ジェヌエア60吸入用
  - エクロックゲル5%
  - エコリシン眼軟膏 3.5g  
 A C D-A液 500mL1袋  
 エスクレ坐剤「250」 250mg [冷]
  - エストラーナテープ0.09mg 1.125cm<sup>2</sup>1枚
  - エストラーナテープ0.18mg 2.25cm<sup>2</sup>1枚
  - エストラーナテープ0.36mg 4.5cm<sup>2</sup>1枚  
 エストラーナテープ0.72mg 9cm<sup>2</sup>1枚  
 エストリール腔錠0.5mg
  - 【般】 エストリオール腔錠0.5mg
  - S Pトローチ0.25mg「明治」 【後】
    - (【般】 デカリニウム塩化物トローチ0.25mgへ切替)
  - エタノール[局] 500mL
  - 【般】 エタノール外用液  
 エタノール[無水] 500mL  
 エナジア吸入用カプセル中用量  
 エナジア吸入用カプセル高用量
  - 効エビデュオゲル 15g
  - 【般】 エビナステン塩酸塩点眼液0.1% (アレジオンL X)
  - 【般】 エフィナコナゾール外用液10% (クレナフィン爪外用液)  
 効エムラクリーム 5g [凍結を避け30°C以下]  
 効エムラバッチ 1枚 [禁凍結]
  - エリザスカブセル外用400  $\mu\text{g}$
  - エリザス点鼻粉末200  $\mu\text{g}$ 28噴霧用 5.6mg1瓶  
 エルエイジー10液—10%500mL【後】 (販売中止)  
 (サテニジン液10へ切替) (2026年3月31日経過措置終了)  
 塩化アルミニウム(6水和物) 500g  
 塩化ナトリウム 500g  
 塩化ベンザルコニウム液 (=逆性石ケン液0.025「ヨシダ」) 0.025%5L
  - エンクラッセ62.5  $\mu\text{g}$ エリプタ30吸入用  
 エンペシド外用液1%—10mL  
 (クロトリマゾール外用液1%「日医工」へ切替)
  - エンペシドクリム1%—10g
    - (【般】 クロトリマゾールクリーム1% 10g/本へ切替)
  - 【オ】
    - オイラックスクリーム10% 500g  
 オイラックスHクリーム 5g  
 オオサキCHG消毒綿0.2% [2枚/包] (物品供給センターで取扱い)
  - 劇オキサロール軟膏25  $\mu\text{g}/\text{g}$  10g
    - (【般】 マキサカルシートル軟膏0.0025% 10g/本へ切替)
  - 効オキサロールローション25  $\mu\text{g}/\text{g}$  10g
  - オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」 【後】
  - 【般】 オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg (オキナゾール)  
 オーキシス9  $\mu\text{g}$ タービュヘイラーブ吸入 252  $\mu\text{g}$ 1キット  
 オキシドール「ケンエー」 500mL  
 オキナゾール腔錠600mg (オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」)  
 オクソラレン軟膏0.3%—10g  
 オクソラレンローション0.3%—60mL  
 オスバン消毒液10% 500mL
  - (【般】 ベンザルコニウム塩化物外用液10% 500mL/本へ切替)  
 オフミック点眼液 5mL/瓶 【後】
  - オフロキサシングル化点眼液0.3%「わかもと」 5mL [冷] 【後】  
 オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 3.5g  
 (オフロキシン眼軟膏0.3%より名称変更)  
 オフロキシン眼軟膏0.3%—3.5g  
 (オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」へ名称変更)  
 オペガードMA眼灌流液 20mL
  - オペガンドハイ0.85眼粘弾剤1%—0.85mL筒 [冷] 【後】  
 (ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」へ名称変更)  
 オラネジン液1.5%OR消毒用アソリカ10mL  
 オラネジン液1.5%OR消毒用アソリカ25mL  
 オラビ錠口腔用50mg  
 オリブ油 (丸石) 500mL  
 オリブ油「ヨシダ」 (滅菌済) 100mL
  - オルテクサーオ口腔用軟膏0.1% 5g 【後】  
 (【般】 ドラムシロニアセトド口腔用軟膏0.1% 5gへ切替)
  - オルベスコ100  $\mu\text{g}$ インヘラーナー112吸入用 11.2mg6.6g 1キット  
 オルベスコ200  $\mu\text{g}$ インヘラーナー56吸入用 11.2mg3.3g 1キット
  - 【般】 オロバタジン点眼液0.1% (バタノール)
  - オンプレス吸入用カプセル150  $\mu\text{g}$
  - 【カ】
    - カタリンK点眼用0.005% 15mL
    - ガチフロ点眼液0.3% 5mL  
 カデックス軟膏0.9% 40g
    - カトレップテープ35mg 7cm × 10cm(7枚入)  
 (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了)
    - カルテオロール塩酸塩L A点眼液2%「わかもと」 2.5mL 【後】
    - 【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL/瓶 (ミケランL A)
    - 【般】 カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本 (フロジン外用液)
  - 【キ】
    - キサラターン点眼液0.005%—2.5mL—[冷]  
 (院内はラタノプロスト点眼液0.005%「サリ」)
    - (【般】 ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/瓶へ切替)  
 キシロカイン液「4%」 100mL  
 キシロカイン点眼液4% 20mL/瓶 [冷]
    - 劇キシロカインポンプスプレー8% 80g 【後】  
 キシロカインゼリー2% 30mL  
 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 (=塩化ベンザルコニウム液 0.025%) 5L  
 (販売中止) (500mL/瓶へ切替)  
 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」  
 (=塩化ベンザルコニウム液 0.025%) 500mL/瓶
    - キュバール50エアゾール 7mg8.7g  
 ● キュバール100エアゾール 15mg8.7g  
 効ギリアデル脳内留置用剤7.7mg 1箱 (8枚入) [-15°C以下]



- 【般】ジフルコルトン吉草酸エステルクリム0.1% 5g/本 (ネリゾナ)
- 【般】ジフルコルトン・リドカイン配合坐剤 (ネリプロクト)
- 【般】ジフルコルトン・リドカイン配合軟膏 2g/本 (ネリプロクト)  
(2026年3月31日削除予定)
- 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05% 5g/本 (マイザー)  
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イキ」10g/本【後】 (【般】なし)
- 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% 10g/本 (マイザー)  
ジムソ膀胱内注入液50% 50mL/瓶  
シムビコートターピュヘイラ-60吸入 1キット  
(【般】ブテソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入へ切替)  
笑気ガス
- 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 1枚 【後】
- 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg (フランドルテープ)  
劇硝酸銀「VTRS」原末 (院内製剤原料)  
消毒用エタノール「カエ-」 500mL/瓶  
消毒用エタプロコール 500mL 【後】  
親水ワセリン 500g  
新レシカルポン坐剤 [冷]
- 【ス】  
スクラビインS 4%液 500mL  
スタデルム軟膏5% 10g  
ステリクロンW液0.05 (=グルコン酸クロルヘキシン液 0.05%)  
0.05%500mL 【後】  
(【般】ケルヘキシングルコン酸塩外用液0.05% 500mLへ切替)  
劇ステリハイド20w/v% 500mL  
スピオルトレスピマット28吸入 1キット
- スピオルトレスピマット60吸入 1キット  
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 150μg1キット
- スピリーバ吸入用カプセル18μg [冷]  
スピール膏M 25cm<sup>2</sup>1枚
- スプレキュア点鼻液0.15% 10mL  
(【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 15.75mg10mL/瓶へ切替)  
劇スープレン吸入麻醉液 240mL/瓶  
スボンゼル 5cm×2.5cm (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)
- スミルスチック3% 40g 【後】 (販売中止)  
(【般】フェルビナク軟膏3% 40g/本へ切替)
- スミルテープ35mg 7cm×10cm 【後】  
(【般】フェルビナケーブ35mg(7×10cm非温感) 14枚/袋へ切替)
- 【セ】  
精製水 オダ 単位mL [院外処方専用]  
【般】精製白糖・ボビドンヨド配合軟膏 100g/瓶 (イソジンシュガーバスター)  
生理食塩液 (洗浄用:細口開栓) 500mL  
生理食塩液 (洗浄用:広口開栓) 1L  
生理食塩液「ヒカリ」 (広口開栓型) 500mL/瓶  
セクターローション3% 50mL
- ゼビアックスローション2% 10g
- ゼフナート外用液2% 10mL
- ゼフナートクリーム2% 10g
- ゼペリント点眼液0.1% 5mL  
劇セボフルラン吸入麻醉液「ニコ-」 250mL 【後】  
劇セボフルラン吸入麻醉液 250mL  
(セボフルラン吸入麻醉液「ニコ-」に切替)
- ゼボラステープ40mg 10cm×14cm (7枚/袋)  
(【般】フルビブロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)
- ゼボラスバップ40mg 10cm×14cm (7枚/袋)
- セルタッチテープ70 10cm×14cm (7枚/袋)  
(【般】フェルビナケーブ70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)

- セルタッチバップ70 10cm×14cm (7枚/袋)  
(院内はフェルビナクバップ70mg「NPJ」)  
(【般】フェルビナケーブ70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)
- セルタッチバップ140 20cm×14cm (7枚/袋)  
(【般】フェルビナケーブ140mg(20×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)
- セレベント50ディスカス 50μg60アリスト-1キット
- 【ソ】  
ゾビラックス眼軟膏3% 5g  
ソフラチュール貼付剤10cm (10.8mg)10cm×10cm1枚
- 【タ】  
向ダイアップ坐剤4 4mg  
向ダイアップ坐剤6 6mg  
向ダイアップ坐剤10 10mg
- 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 2g/本 (強力ホステリゾン)
- タオル外用液1% 15mL 【後】  
(クロトリマゾール外用液1%「日医王」へ名称変更)  
(【般】クロトリマゾール外用液1% 15mL/本へ切替)
- タクロリムス軟膏0.1% 5g/本 (プロトピック軟膏)  
タコシール組織接着用シート (ハーサイズ) 4.8cm×4.8cm [1~30°C]  
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ) 9.5cm×4.8cm [1~30°C]
- 劇タプロコム配合点眼液 2.5mL  
(【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液へ切替)
- 【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL (タプロコム)
- 【般】タフルプロスト点眼液0.005%1mL 2.5mL (タプロス)  
劇タプロス点眼液0.0015% 2.5mL  
(【般】タフルプロスト点眼液0.005%1mLへ切替)
- ダラシントゲル1% 10g  
(【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% 10g/本へ切替)
- タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g (院内はオフロキシン眼軟膏0.3%)  
タリビッド耳科用液0.3% 5mL
- 劇タリムス点眼液0.1% 5mL
- 【チ】  
チモプロトールXE点眼液0.5% 2.5mL  
チモロールXE点眼液0.5%「セジュ」 2.5mL 【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)
- チモロールXE点眼液0.5%「ニット」 2.5mL 【後】
- 【般】チモロール点眼液0.5%(持続性) 2.5mL/瓶 (チモプロトールXE)  
注射用水 (洗浄用) 500mL  
注射用水 (洗浄用) 1L
- 【ツ】  
ツムラ紫雲膏 [500g]501
- 【般】ツロブテロールテープ0.5mg
- ツロブテロールテープ1mg「QQ」 【後】
- 【般】ツロブテロールテープ1mg
- ツロブテロールテープ2mg「QQ」 【後】
- 【般】ツロブテロールテープ2mg
- 【テ】  
劇ディスオーバ消毒液0.55% 3.8L  
(フタラール消毒液0.55%「オエ」3.8Lへ切替)
- ディビゲル1mg 1包
- 劇ディフェリゲル0.1% 15g  
(【般】アダパレンゲル0.1% 15g/本へ切替)
- 【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg (SPトローチ)  
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 (2g/本) 【後】 (販売中止)
- デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 (5g/本) 【後】
- 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 5g/本  
デゴ-51消毒液10% 3L (サテニジン液10へ切替)  
デスパコーウ口腔用クリーム 5g

劇デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」  
125μg5mL/瓶 [10°C以下]

● 【般】デスマプレシン点鼻スプレー0.01% 500μg 5mL/瓶  
(2026年3月31日削除予定)

● デタントール0.01%点眼液 5mL

● デュオトラバ配合点眼液 2.5mL  
(【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液2.5mLへ切替)  
麻劇デュロテップM Tパッチ2.1mg 1枚  
(【般】フェンタニルテープ2.1mg (3日用)へ切替)  
麻劇デュロテップM Tパッチ4.2mg 1枚  
(【般】フェンタニルテープ4.2mg (3日用)へ切替)

● 麻劇デュロテップM Tパッチ8.4mg 1枚 (【般】なし)  
(【般】フェンタニルテープ8.4mg (3日用)へ切替)  
テラ・コートリル軟膏 5g  
テリルジー100エリプタ30吸入用 1キット  
テリルジー200エリプタ30吸入用 1キット

○ テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サヰ」 10g 【後】

● 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本 (ラミシール)

● 劇デルモベート軟膏0.05%—5g (2026年3月31日経過措置終了)  
(院内はケベタプロピオ酸エステル軟膏0.05%「イキ」)  
(【般】ケベタプロピオ酸エステル軟膏0.05% 5g/本へ切替)  
※劇デルモベートスカルプローション0.05% 10g (販売中止)  
(グリジールスカルプローション0.05%へ切替)  
(【般】ケベタプロピオ酸エステル外用液0.05% 10g/本へ切替)  
テレミンソフト坐薬2mg [2~8°C]  
テレミンソフト坐薬10mg  
デンターグル含嗽用散20mg 1包

【ト】  
劇トービイ吸入液300mg 5mL管 [2~8°C]  
劇トプシム軟膏0.05% 5g  
(【般】フルオシノニド軟膏0.05% 5g/本へ切替)

● 劇トプシムローション0.05% 10g  
劇トブラシン点眼液0.3% 5mL  
劇ドボネックス軟膏50μg/g—0.005%—10g

● 劇ドボベットゲル 15g  
劇ドボベット軟膏 15g

● 劇ドボベットフォーム 60g/本

● 【般】トラニラスト点眼液0.5% 5mL/瓶 (リザベント点眼液)  
● ハラバタシズ点眼液0.004%—2.5mL [1~25°C]

● 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL/瓶 (デュオトラバ配合点眼液)

● 【般】トラボプロスト点眼液0.004% 2.5mL/瓶 (トラバタンズ)  
劇トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 10mL[~100mL]

● トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」  
(アフターシール25μgより名称変更)

● 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% 5g/本 (ケナログ)  
トルソプト点眼液1% 5mL

● 【般】トルソプト・チモロール配合点眼液 5mL/瓶 (コソプト配合点眼液)  
劇トレプロスト吸入液1.74mg 2.9mL/管  
トルンビン液モチダソフトボトル1万 1万単位10mL1キット [冷]  
○ ドンペリドン坐剤10mg「日新」 【後】

● 【般】ドンペリドン坐剤10mg (ナウゼリン)  
【ナ】  
● ナイスピード点鼻液50μg—8.5mg8.5g—【後】  
(【般】ヘキロメタゾン・ヒドロキシ酸エチル点鼻液50μg 8.5g/瓶へ切替)  
● ナウゼリン坐剤10mg (院内はドンペリドン坐剤10mg「日新」)  
(【般】ドンペリドン坐剤10mgへ切替)  
ナウゼリン坐剤60 60mg

● 【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本 (アクアチム)  
○ ナジフロキサシンクリーム1%「トワ」 10g 【後】

● 【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g (アクアチム)  
○ ナジフロキサシンローション1%「トワ」 【後】

● ナゾネックス点鼻液50μg—5mg10g1瓶  
(【般】モメタゾン点鼻液50μg 10gへ切替)  
ナゾネックス点鼻液50μg—9mg18g1瓶  
(【般】モメタゾン点鼻液50μg 18gへ切替)

● ナナドラーA Qネーザル50μg—8.5mg8.5g1瓶—【後】  
(【般】ヘキロメタゾン・ヒドロキシ酸エチル点鼻液50μg 8.5g/瓶へ切替)

【ニ】  
● ニコチネルT T S 10 17.5mg10cm<sup>2</sup>1枚  
● ニコチネルT T S 20 35.0mg20cm<sup>2</sup>1枚  
● ニコチネルT T S 30 52.5mg30cm<sup>2</sup>1枚  
[上記3種については、ニコチン依存症管理料の算定に伴う  
処方時のみ保険適用]  
ニゾラールクリーム2%—10g  
(院内はケトコナゾールクリーム2%「イキ」へ切替)  
(【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g/本へ切替)

● 劇ニトロダームT T S 25mg 10cm<sup>2</sup>1枚  
● ニトロールスプレー1.25mg 10g瓶

● 【般】ニプラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶 (ハイパジールコーウ)  
○ ニプラジロールP F点眼液0.25%「日点」—5mL/瓶—【後】

● 劇ニュープロバッチ2.25mg 2.25mg1枚  
劇ニュープロバッチ4.5mg 4.5mg1枚  
劇ニュープロバッチ9mg 9mg1枚

● 劇ニュープロバッチ13.5mg 13.5mg1枚  
● 劇ニュープロバッチ18mg 18mg1枚

○ 尿素クリーム20%「SUN」 25g/本 【後】  
(アセチロールクリーム20%より名称変更)

● 【般】尿素クリーム20% 25g/本 (ケラチナミンコーウ)  
【ネ】  
● ネオキシテープ73.5mg 1枚  
ネオクリーナー「セキ」 10%30mL (歯科専用薬)  
ネオシネジンコーウ5%点眼液 10mL  
ネオメドロールE E軟膏 3g  
ネキソブリッド外用ゲル5g [2~8°C]  
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL

※劇ネリザ軟膏 2g 【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
(【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 2g/本へ切替)

● 劇ネリザナクリーム0.1%—5g  
(【般】ジフルコルトロン・吉草酸エチルクリーム0.1% 5g/本へ切替)

● 劇ネリザプロクト坐剤  
(【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤へ切替)

【ノ】  
向劇ノルスパンテープ5mg 1枚

● 向劇ノルスパンテープ10mg 1枚

● 向劇ノルスパンテープ20mg 1枚

【ハ】  
ハイパジールコーウ点眼液0.25%—5mL  
(院内はニプラジロールP F点眼液0.25%「日点」)  
(【般】ニプラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶へ切替)  
ハイポエタノール 8% (=ケンエーハイポアルコール (健栄)) 500mL

○ ハイポライト消毒液10% 有効塩素として10% 500g  
[なるべく10°C以下] 【後】  
白色ワセリン 500g

● 劇パクスミー点鼻粉末剤3mg V

バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g

- パタノール点眼液0.1%—5mL  
(【般】オロバタジン点眼液0.1%へ切替)
- 含嗽用ハチアズレ顆粒—0.1%2g1包  
(【般】アズレキル酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 2g/包へ切替)  
パッチテストパネル (S) 2枚1組 [2~8°C]
- 劇バビロックミニ点眼液0.1% 0.4mL1個  
パラオキシ安息香酸エチル (院内製剤原料)  
パラマイシン軟膏—10g  
パラマイシン軟膏—250g  
パルミコート吸入液0.25mg 2mL1管  
(【般】デソニド吸入液0.25mgへ切替)
- パルミコート吸入液0.5mg—2mL1管  
(【般】デソニド吸入液0.5mgへ切替)
- パルミコート200 μgタービュヘイラーレー112吸入 22.4mg1瓶  
劇ハルロピテープ8mg 枚
- 劇ハルロピテープ16mg 枚
- 劇ハルロピテープ24mg 枚
- 劇ハルロピテープ32mg 枚
- 劇ハルロピテープ40mg 枚  
パンコマイシン眼軟膏1% 5g [2~8°C]
- パンデル軟膏0.1% 5g
- パンデルローション0.1% 10mL

## 【ヒ】

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 0.85mL  
(オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%より名称変更)

- 【般】ヒアルロン酸Na a点眼液0.1% 5mL (ヒアレイン)
- 【般】ヒアルロン酸Na a点眼液0.3% 5mL (ヒアレイン)  
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL  
(【般】ヒアルロン酸Na a点眼液0.1% 5mLへ切替)
- ヒアレイン点眼液0.3%—5mL  
(【般】ヒアルロン酸Na a点眼液0.3% 5mLへ切替)  
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL1個
- ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL1個  
PA・ヨード点眼・洗眼液 0.2%20mL1瓶 [冷]  
ビースエスブレタ500眼灌流液0.0184%—0.46%20mL1瓶 (希釈液(瓶)付)  
ビースエスブレタ500眼灌流液0.0184% 0.46%20mL1瓶 (希釈液(袋)付)  
ビソノテープ2mg 1枚  
ビソノテープ4mg 1枚
- 【般】ビダラビン軟膏3% 5g/本 (アラセナA)
- 【般】ヒドロキシソルビド・フジオマイシン等配合軟膏 2g/本 (プロトセティル)  
ヒビスコール液A 1% 1L  
5%ヒビテン液 500mL  
(【般】クロヘキシジン・ルコン酸塩外用液5% 500mL/本へ切替)
- 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% (ルミガン)  
ピマリシン点眼液5%「セシヌ」 5mL  
ピュアラビング 250mL
- セルドイドクリーム0.3%  
(【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%へ切替)  
セルドイドソフト軟膏0.3%—25g  
(ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「プロロ」へ切替)  
(【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本へ切替)
- セルドイドフォーム0.3%—92g  
(【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%へ切替)
- セルドイドローション0.3%—25g  
(【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 25g/本へ切替)  
ビレーズトリエアロスフィア120吸入 キット  
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリソルジ0.6mL 筒 [冷]

## 【フ】

- プイタマークリーム1%  
フィプラスストスプレー500 500 μg1瓶 (溶解液付) [冷]  
劇液状フェノール「ケイエ」 500mL
- フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
- 【般】フェルビナク軟膏3%—40g/本
- 【般】フェルビ「ナカーブ」 35mg(7×10cm非温感) 14枚/袋
- 【般】フェルビ「ナカーブ」 70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋
- フェルビナクバッブ70mg「東光」 10cm×14cm(7枚入)【後】
- 【般】フェルビ「ナカバッブ」 70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋
- 【般】フェルビ「ナカバッブ」 140mg(20×14cm非温感) 7枚/袋  
(2026年3月31日削除予定)
- 麻劇【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 0.5mg (1日用) 1枚 (フェントステープ)
- 麻劇【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 1mg (1日用) 1枚 (フェントステープ)
- 麻劇【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 2mg (1日用) 1枚 (フェントステープ)
- 麻劇【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 4mg (1日用) 1枚 (フェントステープ)
- 麻劇【般】フェンタニルルテープ0.84mg (1日用) (ワンデュロバッヂ)
- 麻劇【般】フェンタニルルテープ1.7mg (1日用) (ワンデュロバッヂ)
- 麻劇【般】フェンタニルルテープ3.4mg (1日用) (ワンデュロバッヂ)
- 麻劇【般】フェンタニルルテープ5mg (1日用) (ワンデュロバッヂ)
- 麻劇【般】フェンタニルルテープ6.7mg (1日用) (ワンデュロバッヂ)
- 麻劇【般】フェンタニルルテープ2.1mg (3日用) (デュオテープ Mトバッヂ)
- 麻劇【般】フェンタニルルテープ4.2mg (3日用) (デュオテープ Mトバッヂ)
- 麻劇【般】フェンタニルルテープ8.4mg (3日用) (デュオテープ Mトバッヂ)  
麻劇フェントステープ0.5mg 1枚  
麻劇フェントステープ1mg 1枚  
麻劇フェントステープ2mg 1枚  
麻劇フェントステープ4mg 1枚  
複方ヨード・グリセリン「ゴルカイ・M」 500mL  
フシンレオ軟膏2% 10g
- 【般】ブセリン酢酸塩点鼻液0.15% 15.75mg10mL/瓶  
劇フタラール消毒液0.55%「オエ」 3.8L (ディスオーバ)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本 (メンタックス)  
(2026年3月31日削除予定)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本 (ボレー)  
(2026年3月31日削除予定)
- 【般】ブデソニド吸入液0.25mg (パルミコート)
- 【般】ブデソニド吸入液0.5mg (パルミコート)
- 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 (シムコト)  
フラジール腔錠250mg
- フラシドルテープ40mg—1枚  
(院内は硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」)  
(【般】硝酸イソソルビドテープ40mgへ切替)
- ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 mL/瓶 【後】
- 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% (アイファガム)
- 【般】ブリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶 (エイゾプト)
- 【般】フルオシノニド軟膏0.05% 5g/本 (トプシム)
- フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 5mL 【後】
- フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 5mL 【後】  
(フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」へ名称変更)
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% 5mL/瓶
- フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 5mL 【後】
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% 5mL/瓶  
フルタイド50 μgエアゾール120吸入用 8.83mg10.6g1瓶
- フルタイド100 μgエアゾール60吸入用 11.67mg7.0g1瓶
- フルタイド200ディスカス 200 μg60アリスター1個
- 【般】フルカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5 μg56噴霧用 (アラミスト)
- 【般】フルカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5 μg120噴霧用 (アラミスト)

- 【般】 フルカゼンブロビオノン酸エチル点鼻液50μg/56噴霧用 8mL (フルカゼン)
- フルティフォーム50エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム50エアゾール120吸入用 1瓶
- フルティフォーム125エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム125エアゾール120吸入用 1瓶
- フルナーゼ点鼻液50μg/56噴霧用 4.08mg/8mL 1瓶  
(【般】 フルカゼンブロビオノン酸エチル点鼻液50μg/56噴霧用 8mLへ切替)
- 小児用フルナーゼ点鼻液25μg/56噴霧用 2.04mg/4mL 1瓶  
(2026年3月31日経過措置終了)
- 劇フルメタ軟膏 0.1% 5g
- 【般】 フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)  
(ゼボラステープ)
- 劇ブレオS軟膏5mg/g 0.5% 5g
- 劇ブレグランディン瞳坐剤1mg [冷]
- 【般】 ブレニゾン吉草酸エチル酢酸エチル外用液0.3% 15g/本  
(リドメックスコーウ)
- 【般】 ブレニゾン吉草酸エチル酢酸エチルクリーム0.3% 5g/本  
(リドメックスコーウ)
- 【般】 ブレニゾン吉草酸エチル酢酸エチル軟膏0.3% 5g/本  
(リドメックスコーウ)
- ブレドネマ注腸20mg 【後】 (2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】 ブレドニゾロンリン酸エチルNa注腸剤20mg (ブレドネマ)  
(2026年3月31日削除予定)
- 劇プロウペス腫用剤10mg 個 [-20°C以下]
- ブロクトセディル軟膏 2g  
(【般】 ヒドロコルチゾン・フルタミン等配合軟膏 2g/本へ切替)  
フロジン外用液5% 30mL 【後】  
(【般】 カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本へ切替)
- 劇プロスタンディン軟膏0.003% 10g  
局方プロテイン銀末 25g
- 劇プロトピック軟膏0.1% 5g  
(【般】 タクロリムス軟膏0.1% 5g/本へ切替)
- 劇プロトピック軟膏0.03% 小児用 5g
- ブロナック点眼液0.1% 5mL  
(院内はプロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」)  
(【般】 プロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶へ切替)  
プロペト 500g
- ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 5mL 【後】  
(プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」へ切替)
- ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」 5mL/瓶 【後】
- 【般】 ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶 (ブロナック)
- ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タヨ」 45mL 【後】
- 【般】 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL/瓶 (ビソルボン)  
プロメライン軟膏5万単位/g 20g
- フロリード瞳坐剤100mg [冷]  
フロリードDクリーム1% 10g (【般】 なし)
- 【ヘ】  
ペガモックス点眼液0.5% 5mL  
(モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」へ切替)  
(【般】 モキシフロキサシン点眼液0.5%へ切替)  
ヘキザックAL 1% O R液16mm綿棒セット (物品供給セタ取扱い)
- ペキロンクリーム0.5% 10g
- 【般】 ベタメタゾンブロビオノン酸エチル点鼻液50μg 8.5g/瓶 (リノコート)
- 【般】 ベタメタゾンブロビオノン酸エチル点鼻粉末25μg 1.50mg/瓶  
(リノコートパウダースプレー)
- ベシカムクリーム5% 10g  
ベストロン耳鼻科用1% 5mL  
ベストロン点眼用0.5% 5mL
- ペセルナクリーム5% 250mg 1包
- 【般】 ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶 (ベトブティック)
- 【般】 ベタメタゾン吉草酸エチル軟膏0.12% 5g/本 (リンデロンV)
- 【般】 ベタメタゾン吉草酸エチル外用液0.12% 10mL/本 (リンデロンV)
- 劇ベタメタゾンジプロピオノン酸エチル軟膏0.064%「ティコ」 5g 【後】
- 【般】 ベタメタゾンブロビオノン酸エチル軟膏0.064% 5g/本  
(リンデロンD P軟膏)
- ベタメタゾンリン酸エチルNa a・P F眼耳鼻科用液0.1%「日点」 5mL 【後】
- 【般】 ベタメタゾン酪酸アミド・オノ酸エチル外用液0.05% 10g/本 (アンペート)  
劇ベタメタゾン酪酸エチルブロビオノン酸エチルクリーム0.05%「MYK」 5g 【後】  
(【般】 なし)
- 【般】 ベタメタゾン酪酸アミド・オノ酸エチルクリーム0.05% 5g/本 (アンペート)  
劇ベタメタゾン酪酸エチルブロビオノン酸エチル軟膏0.05%「MYK」 5g 【後】  
(【般】 なし)
- 【般】 ベタメタゾン酪酸アミド・オノ酸エチルクリーム0.05% 5g/本 (アンペート)  
劇ベタメタゾン酪酸エチルブロビオノン酸エチルローション0.05%「JG」 10g 【後】  
(【般】 なし)
- 【般】 ベタメタゾンリソ酸エチルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mL (リンデロン)
- ベタブティック点眼液0.5% 5mL  
(【般】 ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)  
ベネトリン吸入液0.5% 30mL  
ペノキシール点眼液0.4% 5mL/瓶
- 【般】 ベパリン類似物質外用液0.3% (乳剤性) 25g/本 (ヒルドイド)
- 【般】 ベパリン類似物質クリーム0.3% (ヒルドイドクリーム)
- 【般】 ベパリン類似物質スプレー0.3% (ヒルドイド)
- 【般】 ベパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本 (ヒルドイド)
- ベパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニコ」 25g/本 【後】
- ベパリン類似物質ローション0.3%「カール」 50g/本 【後】
- ベピオウォッシュゲル5% 20g/本
- ベピオゲル2.5% 15g/本 [25°C以下][禁凍結]
- ベピオローション2.5% 15g/本 [25°C以下][禁凍結]
- ベモリゾン軟膏 2g/本 【後】  
ペリオフィール歯科用軟膏2% 10mg/0.5g [冷] 【後】  
(ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」へ名称変更)  
ペリプラストPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組 [冷]  
ペリプラストPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組 [冷]  
ペリプラストPコンビセット組織接着用 5mL2キット1組 [冷]  
ペルペゼンF点眼・点鼻液 5mL [冷] 【後】
- 【般】 ベンザルコニウム塩化物外用液10% 500mL/本 (オスバン)
- ベンタサ坐剤1g  
ベンタサ注腸1g  
劇ベンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm 1枚  
(院内はリドカインテープ18mg「YP」)
- 【ホ】  
● ボアラ軟膏0.12% 5g
- ホタナサンテープ1mg 1枚 (【般】 ツロブテロールテープ 1mgへ切替)
- ホタナサンテープ2mg 1枚 (【般】 ツロブテロールテープ 2mgへ切替)  
強力ボステリザン(軟膏) 2g (ヘモリゾン軟膏へ切替)  
(【般】 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 2g/本へ切替)
- ホスミシンS耳科用3% 10mL  
ホスミシン外用液0.1% 500mL
- ボビドンヨード外用液10%「明治」 250mL 【後】
- 【般】 ボビドンヨード外用液10% (エタノール非含有)
- ボビドンヨードガーグル液7%「明治」 30mL 【後】
- 【般】 ボビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本
- 【般】 ボビドンヨードゲル10% 20g/本 (イソジンゲル)  
ボビヨドンスクラブ7.5% 500mL 【後】
- ボラザG軟膏 2.4g

無印：採用薬  
※：削除予定薬  
●：院外処方専用薬  
☆：院外処方専用予定薬  
【後】：後発医薬品  
○：院内専用後発品である薬

### 劇ポルタレンサポ12.5mg【冷】

(院内はジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」)

(【般】ジクロフェナクナ坐剤12.5mgへ切替)

### 劇ポルタレンサポ25mg【冷】

(院内はジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」)

(【般】ジクロフェナクナ坐剤25mgへ切替)

### 劇ポルタレンサポ50mg【冷】

(院内はジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」)

(【般】ジクロフェナクナ坐剤50mgへ切替)

### ● ポルタレンテープ15mg 7cm×10cm (7枚入)

(【般】ジクロフェナクナテープ 15mg(7×10cm非温感) 7枚/袋へ切替)

### ● ポルタレンテープ30mg 10cm×14cm (7枚入)

### ● ポルタレンヨーション1% 50g

(【般】ジクロフェナクナ外用液1% 50g/本へ切替)

特生ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組 【冷】

特生ボルヒール組織接着用 3mL4瓶1組 【冷】

特生ボルヒール組織接着用 5mL4瓶1組 【冷】

劇ホルマリングアヤコールF G 15mL [歯科専用薬]

### ● ポレー外用液1% 10mL

(【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本へ切替)

### ● 劇ポンアルファ軟膏2μg/g 10g

### ● 劇ポンアルファハイ軟膏20μg/g 10g

### ● 劇ポンアルファハイローション20μg/g 10g

### 【マ】

### ● マイザーソフト0.05% 5g

(院内はジフルプレドナート軟膏0.05%「イキ」)

(【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% 10g/本へ切替)

### ● マイザーカリム0.05% 5g

(【般】ジフルプレドナートクリーム0.05% 5g/本へ切替)

劇マイトイシン眼科外用液用液2mg

### ● 【般】マキサカルシートル軟膏0.0025% 10g/本 (オキサロール)

### ● 劇マーデュオックス軟膏 10g

### 【ミ】

劇ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g1缶

### ● ミオビン点眼液 5mL

### ● ミケランヘルA点眼液2% 2.5mL

(院内はカルテオロール塩酸塩L A点眼液2%「わかもと」へ切替)

(【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL/瓶へ切替)

ミケルナ配合点眼液 2.5mL

ミドリンM点眼液0.4% 5mL

ミドリンP点眼液 10mL (オフミック点眼液へ切替)

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 10mg0.5g 【後】 (ペリオフィール歯科用軟膏2%から名称変更)

### ● ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm (6枚入)

(2026年3月31日経過措置終了)

ミレーナ52mg 1個

### ● ミロル点眼液0.5% 5mL

(【般】レボプロロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)

### 【ム】

### ● ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL

ムコフィリン吸入液20% 17.62%2mL1包

### 【メ】

### ● 【般】メサラジン注腸剤1g (ペントサ)

(2026年3月31日削除予定)

### ● 減菌精製水 オーダー単位mL [院外処方専用]

メディクスワップ ポビドンヨード 4.5ml (物品供給センター取扱)

### ● 【般】メトロニダゾールゲル0.75% (ロゼックスゲル)

### ● メノエイドコンビパッチ 1枚 【冷】

メプチニエアー10μg吸入100回 0.0143%5mL1キット

メプチニ吸入液0.01% 30mL

### ● メプチニスイングヘラー10μg吸入100回 1mg1キット

### ● メンタックスクリム1% 10g

(【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本へ切替)

### 【モ】

### ● モイゼルト軟膏0.3% 10g/本

### ● モイゼルト軟膏1% 10g/本

○ モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 5mL/瓶 【後】

● 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (ベガモックス)

● 【般】モメタゾンラクタボン酸エヌル軟膏0.1% 5g/本 (フルメタ)

● 【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用

● 【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用

● モーラステープ20mg 7cm×10cm (7枚入)

(ケトプロフェンテープ20mg「BMDJ」へ切替)

(【般】カプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) 7枚/袋へ切替)

### ● モーラステープL 40mg 10cm×14cm (7枚入)

(【般】カプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)

### ● モーラスパップ30mg 10cm×14cm (7枚入)

(【般】カプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)

● モーラスパップ60mg 20cm×14cm (7枚入)

● モーラスパップX-R 120mg 10cm×14cm (7枚入)

(【般】カプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)

● モーラスパップX R 240mg 20cm×14cm (7枚入)

### 【ヤ】

### ● ヤクバンテープ60mg 15cm×14cm (7枚入)

### 【ユ】

ユベラ軟膏 56g/本 [15°C以下]

ユベラ軟膏 500g [15°C以下] (ユベラ軟膏 56g/本へ切替)

### 【ラ】

● ラクティオンパップ70mg 10cm×14cm (7枚入)

● ラクリミン点眼液0.05% 5mL瓶

● 【般】ラタノプロスト・チモール配合点眼液 2.5mL/瓶 (ザラカム配合)

○ ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッセ」 2.5mL/瓶 【後】

● 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/瓶 (キサラタン)

● 【般】ラノコナゾール軟膏1% 10mg/本 (アステット)

劇ラパリムスゲル0.2% 10g [2~8°C]

ラビジェル 60mL

ラビジェル 250mL

ラビショット 500mL

### ● ラニシールクリム1% 10g

(院内はテルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サイ」)

(【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本へ切替)

### 【リ】

### ● リザベント点眼液0.5% 5mL

(【般】トラニラスト点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)

リティンパ耳科用250μgセット 1セット (溶解液付) 【冷】

○ 劇リドカインテープ18mg「YP」 1枚 【後】

リドメックスコーア軟膏0.3% 5g

(【般】ブレドニゾン吉草酸エヌル酢酸エヌル軟膏0.3% 5g/本へ切替)

### ● サドメタクスコーアクリム0.3% 5g

(【般】ブレドニゾン吉草酸エヌル酢酸エヌルクリム0.3% 5g/本へ切替)

リドメックスコーアローション0.3% 15g (【般】なし)

(【般】ブレドニゾン吉草酸エヌル酢酸エヌル外用液0.3% 15g/本へ切替)

### ● サノコートパウダースプレー 鼻用25μg 1.50mg 0.9087g1瓶

(【般】ベクロメタゾンビン酸エヌル点鼻粉末25μg 1.50mg/瓶へ切替)

### ● 【般】リバストグミンテープ4.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)

### ● 【般】リバストグミンテープ9mg (1日用) (イクセロンパッチ)

- 【般】リバストグミンテープ13.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)
- 【般】リバストグミンテープ18mg (1日用) (イクセロンパッチ)  
硫酸ポリミキシンB散50万単位「アガード」1瓶  
リレンザ 5mg17'リスト (1枚 : 47'リスト)
- リンデロン坐剤0.5mg
- リンデロン点眼液0.01% 5mL
- サンデヨン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL  
(【般】ヘタタソソリソ酸エチルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mLへ切替)
- 点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL [冷]  
眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g
- 効率サンデヨンD-P軟膏 0.064% 5g  
(院内はヘタタソソリソビオソ酸エチル軟膏0.064%「ティコク」)  
(【般】ヘタタソソリソビオソ酸エチル軟膏0.064% 5g/本へ切替)
- リンデロン-V軟膏0.12% 5g  
(【般】ヘタタソソ吉草酸エチル軟膏0.12% 5g/本へ切替)  
リンデロン-Vローション0.12% 10mL
- リンデロン-V吉草酸エチル外用液0.12% 10mL/本へ切替)
- リンデロン-V G軟膏0.12% 5g (院内はルリクールVG軟膏0.12%)  
リンデロン-V Gクリーム0.12% 5g  
リンデロン-V Gローション 0.12% 10mL
- 【ル】
  - ル・エストロジェル0.06% 80g
  - ルコナック爪外用液5% 3.5g  
ルティナス錠100mg [1~30°C]
  - ルテウム腔用坐剤400mg [25°C以下]  
ルミガン点眼液0.03% 2.5mL  
(【般】ビマトプロスト点眼液0.03%へ切替)  
ルリクールVG軟膏0.12% 5g 【後】
  - ルリコナゾールクリーム1%「イキ」 【後】
  - 【般】ルリコナゾールクリーム1% (ルリコン)  
ルリコソクリーム1% 10g (ルリコナゾールクリーム1%「イキ」へ切替)  
ルリコン液1% 10mL
- 【レ】
  - レクタブル2mg注腸フォーム14回 48mg30.8g1瓶
  - レスキューラ点眼液0.12% 5mL [冷]  
(【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL/瓶へ切替)  
レスタミンコーチゾン軟膏[強力] 10g  
レスタミンコーウクリーム1% 1kg
  - レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 5mL 【後】  
(【般】レバミピド点眼液2% 5mLへ切替)
  - 【般】レバミピド点眼液2% 5mL (ムコスタ)
  - 向劇レペタン坐剤0.2mg
  - 向劇レペタン坐剤0.4mg
  - 【般】レボブノロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶 (ミロル)
  - レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 5mL/瓶 【後】
  - 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/瓶 (クラビット)
  - レルペア100エリプタ14吸入用 1キット
  - レルペア100エリプタ30吸入用 1キット
  - レルペア200エリプタ14吸入用 1キット  
レルペア200エリプタ30吸入用 1キット
- 【ロ】
  - ロキソニンゲル1% 50g  
(【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 50g/本へ切替)
  - ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm (7枚入)
  - ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm (7枚入)
  - ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm (7枚入)  
(院内はロキソプロフェンNaパップ100mg「JG」)
- 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 50g/本 (ロキソニンゲル)  
(2026年3月31日削除予定)
- 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感)  
7枚/袋 (ロキソニンテープ)
- 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温感)  
7枚/袋 (ロキソニンテープ)
- ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」  
10cm×14cm (7枚入) 【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了予定)
- ロキソプロフェンNaパップ100mg「JG」  
10cm×14cm 7枚/袋 【後】
- 劇ロコアテープ 10cm×14cm (7枚入)  
ロコイドクリーム0.1% 5g  
ロコイド軟膏0.1% 5g  
ロゼックスゲル0.75% 15g/本 (50g/本から切替)  
(【般】メトロニダゾールゲル0.75%へ切替)  
ロゼックスゲル0.75% 50g/本 (15g/本へ切替)
- 劇ロナセンテープ20mg 枚  
劇ロナセンテープ40mg 枚
- 【ワ】
  - 向劇ワコビタール坐剤15 15mg [冷]
  - 向劇ワコビタール坐剤50 50mg [冷]
  - ワンクリノン腔用ゲル90mg
  - 麻劇ワンデュロパッチ0.84mg 1枚  
(【般】フェンタニルテープ0.84mg (1日用) へ切替)
  - 麻劇ワンデュロパッチ1.7mg 1枚  
(【般】フェンタニルテープ1.7mg (1日用) へ切替)
  - 麻劇ワンデュロパッチ3.4mg 1枚  
(【般】フェンタニルテープ3.4mg (1日用) へ切替)
  - 麻劇ワンデュロパッチ5mg 1枚  
(【般】フェンタニルテープ5mg (1日用) へ切替)
  - 麻劇ワンデュロパッチ6.7mg 1枚  
(【般】フェンタニルテープ6.7mg (1日用) へ切替)

# 注射薬リスト

【ア】

アイモビーグ皮下注70mgペン 1mLキット [2~8°C]  
劇アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL  
2mg0.05mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
劇アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL 0.07mLV [2~8°C]  
劇アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL  
0.07mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
劇アウクリ注 フレックスタッフ 総量300単位 1キット [2~8°C]  
劇アーウィナーゼ筋注用10000 10,000単位V [2~8°C]  
アエントリベンタート静注1055mg V  
劇アガルシダーゼ ベータ B S点滴静注5mg「JCR」 1mLV [2~8°C] 【後】  
劇アガルシダーゼ ベータ B S点滴静注35mg「JCR」 7mLV [2~8°C] 【後】  
劇アキネトシ注射液5mg—1mLA (乳酸ビペリデン注5mg「ヨシミ」へ切替)  
劇アキヤルックス点滴静注250mg 50mLV [2~8°C]  
劇アクテムラ点滴静注用200mg 10mLV [2~8°C]  
●劇アクテムラ皮下注162mgオトイシジエクター 0.9mLキット [2~8°C]  
劇アクテムラ皮下注162mgシリソジ 0.9mL筒 [2~8°C]  
劇アクトヒブ 10 μgV [冷]  
毒アクプラ静注用50mg V  
劇アクラシノン注射用20mg V  
アコアラン静注用600 600国際単位V (溶解液付) [冷]  
アコアラン静注用1800 1800国際単位V (溶解液付) [冷]  
アザクタム注射用1g V  
○劇アザシチジン注射用100mg「サウ」 V 【後】  
アシクロビル点滴静注液250mg「トワ」 A 【後】  
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター 1.5mLキット [2~8°C]  
アスコルビン酸注500mgP B「日新」 A 【後】  
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 17.12%10mLキット 【後】  
アセテート維持液3G「HK」 500mLP  
アセトキープ3G注(ソフトパッケージ) 500mLP 【後】 (販売中止)  
(アセテート維持液3G「HK」へ切替)  
劇アセリオ静注液1000mgパッケージ 100mLP  
劇アセレンド注100 μg 2mLV  
アタラックス-P注射液 (25mg/mL) A  
アタラックス-P注射液 (50mg/mL) A  
●劇アダリムマブB S皮下注40mgシリソジ0.8mL「FKB」筒 [2~8°C] 【後】  
●劇アダリムマブB S皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」キット [2~8°C] 【後】  
●劇アダリムマブB S皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」キット [2~8°C] 【後】  
●劇アダリムマブB S皮下注40mgペン0.8mL「FKB」キット [2~8°C] 【後】  
アディノベイト静注用キット1000  
1000国際単位キット (溶解液付) [冷]  
アディノベイト静注用キット2000  
2000国際単位キット (溶解液付) [冷]  
アデノシン負荷用静注60mgシリソジ「FRI」 20mL筒 【後】  
アデノスキヤン注60mg—20mLV  
アデホス-L コーワ注10mg A [冷]  
アデラビン9号注2mL-A (販売中止) (2025年9月31日経過措置終了)  
劇アトガム点滴静注液250mg 5mLA [2~8°C]  
劇アドセトリス点滴静注用50mg V [2~8°C]  
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL  
劇アドトラーザ皮下注150mgシリソジ 1mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
劇アドトラーザ皮下注300mgペン 2mLキット [2~8°C]  
アドナ注 (静脈用) 50mg 10mLA  
(カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」へ切替)  
アトニン-O注5単位 A [冷]

無印：採用薬  
※：削除予定薬  
●：院外処方専用薬  
☆：院外処方専用予定薬  
【後】：後発医薬品  
○：院内専用後発品である薬

劇アドレナリン注0.1%シリソジ「テルモ」 1mL筒 【後】  
(エピネフリン注0.1%シリソジ「テルモ」から名称変更)  
劇アトロビン注0.05%シリソジ「テルモ」 1mL筒 【後】  
劇アトロビン硫酸塩注0.5mg「ニフロ」 0.05%1mLA  
劇アナフランニール点滴静注液25mg A  
劇アナペイン注2mg/mL 100mLP  
劇アナペイン注7.5mg/mL 10mLA  
(ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」へ切替)  
アネメトロ点滴静注液500mg 100mLV  
向アネレム静注用50mg V  
劇アバスチン点滴静注用400mg/16mL V [冷]  
劇アービタックス注射液100mg 20mL V [冷]  
劇アピドラ注ソロスター 300単位キット [冷]  
アブニション静注15mg 3mLA  
毒アブラキサン点滴静注用100mg V  
劇アブリスピロ筋注用 V (溶解液付) [2~8°C]  
アブレゾリン注射用20mg A  
劇アポカイン皮下注30mg 3mL筒  
●劇アボネックス筋注用シリソジ30 μg 0.5mL筒 [冷]  
●劇アボネックス筋注30 μgペン 0.5mLキット [2~8°C]  
劇アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 3mLA 【後】  
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 2mLA  
アミサリン注100mg—10%1mLA  
アミノレバノ点滴静注 500mLP  
アミパレン輸液200mL 1袋  
アムビトラ皮下注25mgシリソジ 0.5mL筒 [禁凍結]  
毒アムビゾーム点滴静注用50mg V [冷]  
アラセナ-A点滴静注用300mg V  
劇アラノンジー静注用250mg 50mLV  
アリクストラ皮下注2.5mg—0.5mL筒  
アリクストラ皮下注7.5mg—0.6mL筒  
アリナミンF50注 50mg20mLA  
(フルスルチアミン注50mg「日新」へ切替)  
アリナミン注射液10mg—2mLA (販売中止)  
劇アリムタ注射用100mg—V  
(ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」へ切替)  
劇アリムタ注射用500mg—V  
(ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」へ切替)  
○ アルガトロバンH I注10mg/2mL「ツー」 A 【後】 (スノノ/HI注)  
アルギニン点滴静注30g「AY」 10%300mLP  
毒アルケラン静注用50mg V (溶解液付)  
アルスロマチック関節手術用灌流液 3L1P  
麻劇アルチバ静注用5mg—V  
(レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」に切替)  
アルツディスピオ関節注25mg 2.5mL筒  
劇アルプロスタジル注5 μg「サウ」 1mLA [冷] 【後】  
劇アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μg「カタ」 V  
劇アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μg「カタ」 V  
献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V  
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V  
献血アルブミン20%静注4g/20mL「カタ」 V  
献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」 20%50mLV  
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV  
献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV  
劇アレックスペー筋注用 120 μgV (溶解液付) [2~8°C]  
※劇アレピアチン注250mg 5mLA

アレルゲンエキス診断用対照液 1.8mLV  
アレルゲンエキス治療用希釈液 1.8mLV  
アレルゲンスクラッチャキス陽性対照液「トイ」  
ヒスタミン二塩酸塩 2mLV [冷]  
診断用アレルゲンスクラッチャキス「トイ」 1mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」エマ1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」大麦1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」かめら花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」かめら花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」クレ1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」米1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」ギ 花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」スキ花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」トモヨシ1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」ヒメガマ花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」タツサ花粉1:1,000 2mLV [冷]  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トイ」タツサ花粉1:100 2mLV [冷]  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トイ」  
「タツサ花粉1:1,000 2mLV [冷]  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トイ」  
ホウ草花粉1:100 2mLV [冷]  
アロカリス点滴静注235mg 10mLV [2~8°C]  
アロキシ静注0.75mg—5mLV  
アロフィセル注 4瓶1組 [専用輸送用容器で15~22°C]  
(発注管理は診療科で実施)  
アンカロン注150—150mg3mLA  
(アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」へ切替)  
アンサー皮下注20μg 1mLA  
安息香酸Naカフェイン注200mg「フ-」 20%1mLA 【後】  
(アンナカ注「フ-」-20%より名称変更)  
アンチレクス静注10mg 1%1mLA  
アンナカ注「フ-」-20% 1mLA 【後】  
(安息香酸Naカフェイン注200mg「フ-」へ名称変更)  
イオパーク300注100mL 64.71% V 【後】  
(イオヘキソール300注100mL「F」へ名称変更)  
イオパーク300注シリング80mL 64.71% 筒 【後】  
(イオヘキソール300注シリング80mL「F」へ名称変更)  
イオパーク350注50mL 75.49% V 【後】  
(イオヘキソール350注50mL「F」へ名称変更)  
イオパーク350注100mL 75.49% V 【後】  
(イオヘキソール350注100mL「F」へ名称変更)  
イオパーク350注シリング100mL 75.49% 筒 【後】  
(イオヘキソール350注シリング100mL「F」へ名称変更)  
イオパミドール300注20mL「F」 61.24%20mL 【後】  
(オイパロミン300注20mLより名称変更)  
イオパミドール300注50mL「F」 61.24%50mL 【後】  
(オイパロミン300注50mLより名称変更)  
イオパミドール300注100mL「F」 61.24%100mL 【後】  
(オイパロミン300注100mLより名称変更)  
イオパミドール370注20mL「F」 75.52%20mL 【後】  
(オイパロミン370注20mLより名称変更)  
イオパミドール370注50mL「F」 75.52%50mL 【後】  
(オイパロミン370注50mLより名称変更)  
イオパミドール370注100mL「F」 75.52%100mL 【後】  
(オイパロミン370注100mLより名称変更)  
イオパミドール300注シリング100mL「F」 61.24%100mL筒 【後】  
(オイパロミン300注シリング100mLより名称変更)

イオパミドール300注シリソル150mL「F」 61.24%150mL筒 【後】  
(イオパロミン300注シリソル150mLより名称変更)

イオパミドール370注シリソル100mL「F」 75.52%100mL筒 【後】  
(イオパロミン370注シリソル100mLより名称変更)

※ イオパミロン注300 61.24%20mLV (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)

イオパミロン注300シリソル 61.24%100mL筒

※ イオパミロン注370 75.52%20mLV (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)

イオパミロン注370 75.52%100mLV

イオパミロン注370シリソル 75.52%80mL筒

イオパミロン注370シリソル 75.52%100mL筒

E O B・プリモビスト注シリソル 18.143%10mL筒

イオプロミド300注シリソル50mL「BYL」 62.34%50mL筒 【後】  
イオプロミド300注シリソル100mL「BYL」 62.34%100mL筒 【後】  
イオヘキソール300注100mL「F」 64.71%100mLV 【後】  
(イオパーク300注100mLより名称変更)

イオヘキソール350注50mL「F」 75.49%50mLV 【後】  
(イオパーク350注50mLより名称変更)

イオヘキソール350注100mL「F」 75.49%100mLV 【後】  
(イオパーク350注100mLより名称変更)

イオヘキソール300注シリソル80mL「F」 64.71%80mL筒 【後】  
(イオパーク300注シリソル80mLより名称変更)

イオヘキソール350注シリソル100mL「F」 75.49%100mL筒 【後】  
(イオパーク350注シリソル100mLより名称変更)

イオメロン300注100mL 61.24%V

イオメロン300注シリソル100mL 61.24%筒

イオメロン350注100mL 71.44%V

イオメロン350注シリソル100mL 71.44%筒

イオメロン350注シリソル135mL (CT・尿路用) 71.44%筒

イーケプラ点滴静注500mg 5mLV  
(レベチラセタム点滴静注500mg「アル」へ切替)

劇イジュド点滴静注25mg 1.25mLV [2~8°C]

劇イジュド点滴静注300mg 15mLV [2~8°C]

劇イズカーゴ点滴静注用10mg V [2~8°C][禁凍結]

イスコチン注100mg A

劇イストダックス点滴静注用10mg 10mg V (溶解液付)

イソビスト注240 51.26%10mLV

イソビスト注300 64.08%10mLV

毒イダマイシン静注用5mg 5mgV

イデルビオント点滴静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [2~25°C]

イデルビオント点滴静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [2~25°C]

● イデルビオント点滴静注用3500 3500国際単位V (溶解液付) [2~25°C]

劇イノバン注0.3%シリソル 50mL筒

劇イノバン注100mg 5mLA

劇イブグリース皮下注250mgオートインジェクター 2mLキット [2~8°C]

イベニティ皮下注105mgシリソル 1.17mLV筒 [2~8°C]

劇注射用イホマイド1g V

●劇イミグランキット皮下注3mg 0.5mL筒

劇イミフィンジ点滴静注120mg 2.4mLV [2~8°C]

劇イミフィンジ点滴静注500mg 10mLV [2~8°C]

劇イムデトラ点滴静注用1mg V (輸液安定化液付) [2~8°C]

劇イムデトラ点滴静注用10mg V (輸液安定化液付) [2~8°C]

劇イムネース注35 35万国内標準単位V (溶解液付) [冷]

劇イムノマックス-γ注100 100万国内標準単位 V (溶解液付)  
[凍結を避け10°C以下]

劇イモバックスポリオ皮下注 0.5mLV筒 [2~8°C]

劇イラリス皮下注射液150mg 1mLV [2~8°C]

劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト-7」 2mLV 【後】  
劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト-7」 5mLV 【後】  
劇イルミア皮下注100mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]  
● イロクティト静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
● イロクティト静注用1500 1500国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
● イロクティト静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
● イロクティト静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
● イロクティト静注用4000 4000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
インジゴカルミン注20mg「AFP」 0.4%5mLA  
劇インスリンアスパルトB S注ソロスターN R「サ/ワイ」  
300単位キット [2~8°C] 【後】  
●劇インスリングラルギンB S注カート「リ-」 300単位キット [2~8°C] 【後】  
●劇インスリングラルギンB S注キット「FFP」 300単位キット [2~8°C] 【後】  
劇インスリングラルギンB S注ミリオペン「リ-」  
300単位キット [2~8°C] 【後】  
劇インスリンリスプロB S注ソロスターH U「サ/ワイ」  
300単位キット [2~8°C] 【後】  
劇インダシン静注用1mg V  
劇インデラル注射液2mg 2mLA  
イントラリポス輸液20% 100mLP 【後】  
劇インフリキシマブB S点滴静注用100mg「NK」 V [2~8°C] 【後】  
劇インフルエンザH Aワクチン 1mLV [冷]  
【ウ】  
劇ウイフガート点滴静注400mg 20mLV [2~8°C]  
ヴィーンD輸液 500mLP (袋)  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注0.5g/5mL V [冷]  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注2.5g/25mL V [冷]  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注5g/50mL V [冷]  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注10g/100mL V [冷]  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注20g/200mL V [冷]  
劇ウゴービ皮下注0.25mg SD 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇ウゴービ皮下注0.5mg SD 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇ウゴービ皮下注1.0mg SD 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇ウゴービ皮下注1.7mg SD 0.75mLキット [2~8°C]  
●劇ウゴービ皮下注2.4mg SD 0.75mLキット [2~8°C]  
ウログラフイン注60% 20mLA  
ウロナーゼ静注用6万単位 V  
ウロミテキサン注100mg 1mLA  
ウロミテキサン注400mg 4mLA  
【エ】  
劇エアワイン皮下注用45mg V [2~8°C]  
劇エアワイン皮下注用60mg V [2~8°C]  
H MG注用150単位「あすか」 V (溶解液付) [冷] 【後】  
H MG注射用75 IU「フェリング」 75単位V (溶解液付) 【後】  
(2023年3月現在 供給停止)  
乾燥H Bグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 1mLV (溶解液付) [冷]  
劇エクザール注射用10mg V [冷]  
エクストラニール腹膜透析液 (ツインパッケージ) 1.5LP  
エクストラニール腹膜透析液 (UVツインパッケージ) 1.5LP  
エクストラニール腹膜透析液 (シングルパッケージ) 2LP  
エクストラニール腹膜透析液 (シングルパッケージ・機器専用) 2LP  
● エクストラニール腹膜透析液 (ツインパッケージ) 2LP  
劇エジャイモ点滴静注1.1g 22mLV [2~8°C] [禁凍結]  
劇エヌポー注射液750 750国際単位A [冷]  
(エボエチンアルファB S注750「JCR」へ切替)  
●劇エタネルセプトB S皮下注25mgペン0.5mL「MA」  
25mg0.5mLキット [2~8°C] 【後】  
●劇エタネルセプトB S皮下注50mgペン1.0mL「TY」  
50mg1.0mLキット [2~8°C] 【後】  
劇エトキシスクレロール1%注射液 30mLV  
劇エトボシド点滴静注液100mg「サンド」 5mLV 【後】  
● エヌジエンラ皮下注60mgペン 1.2mL/キット [2~8°C]  
エネフリード輸液 550mLキット  
劇エピペン注射液0.15mg 1mg/2mL筒 (注射量は0.3mL)  
劇エピペン注射液0.3mg 2mg/2mL筒 (注射量は0.3mL)  
劇エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ 300mgキット  
劇エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ 400mgキット  
劇エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 V [2~8°C] 【後】  
劇エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 V [2~8°C] 【後】  
劇エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 V 【後】  
劇エフェドリン「カガヰ」注射液40mg 1mLA  
劇エプキンリ皮下注4mg 0.8mLV [2~8°C]  
劇エプキンリ皮下注48mg 0.8mLV [2~8°C]  
劇エポエチンアルファB S注750「JCR」  
750国際単位0.5mLV [2~8°C] 【後】  
劇エポジン皮下注シリンジ24000 24000国際単位0.5mL筒 [冷]  
劇エホチール注10mg 1%1mLA  
劇エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」 V 【後】  
劇エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」 V 【後】  
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液 50mLV  
劇エボルトラ点滴静注20mg 20mLV  
エムガルティ皮下注120mgオ-トイソ-エクタ- 1mLキット [2~8°C]  
劇エムプリシティ点滴静注用300mg V [2~8°C]  
劇エムプリシティ点滴静注用400mg V [2~8°C]  
注射用エラスパール100 100mg V  
劇エラプレース点滴静注液6mg 3mLV [2~8°C]  
劇エリル点滴静注液30mg 2mLA  
L H-R H注0.1mg「ゼット」 0.1mgA  
エルカルチントF静注1000mgシリンジ 5mL筒  
(レボカルニチンF静注1000mgシリンジ「ト-7」へ切替)  
劇エルシトニン注40単位 1mLA  
エルネオバN F1号輸液 1000mLキット  
エルネオバN F2号輸液 1000mLキット  
毒エルプラット点滴静注液100mg 20mLV  
(オキサリプラチン点滴静注100mg「ト-7」へ切替)  
劇エルレフィオ皮下注44mg 1.1mLV [2~8°C]  
劇エルレフィオ皮下注76mg 1.9mLV [2~8°C]  
塩化ナトリウム10% 20mLA  
※ 塩酸メトクロラミド注射液10mg「カタ」 0.5%2mLA 【後】  
(プリンベラン注射液10mgへ切替)  
劇エンスプリング皮下注120mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]  
劇エンタイビオ点滴静注用300mg V [2~8°C]  
劇エンタイビオ皮下注108mgペン 0.68mLキット [2~8°C]  
劇注射用エンドキサン500mg V [冷]  
劇エンハーツ点滴静注用100mg V [2~8°C]  
●劇エンブレル皮下注25mgクリックワイス用0.5mL 1カセット [2~8°C]  
●劇エンブレル皮下注50mgクリックワイス用1.0mL 1カセット [2~8°C]  
劇エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL筒 [2~8°C]  
●劇エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL筒 [2~8°C]  
●劇エンブレル皮下注50mgペン1.0mL キット [2~8°C]  
【オ】  
オイパロミン300注20mL 61.24% V 【後】  
(イオパミドール300注20mL「F」へ名称変更)  
オイパロミン300注50mL 61.24% V 【後】  
(イオパミドール300注50mL「F」へ名称変更)

オイバロニン300注100mL 61.24% V 【後】  
(イオバミドール300注100mL「F」へ名称変更)  
オイバロニン300注シリソジ100mL 61.24% 筒 【後】  
(イオバミドール300注シリソジ100mL「F」へ名称変更)  
オイバロニン300注シリソジ150mL 61.24% 筒 【後】  
(イオバミドール300注シリソジ150mL「F」へ名称変更)  
オイバロニン370注20mL 75.52% V 【後】  
(イオバミドール370注20mL「F」へ名称変更)  
オイバロニン370注50mL 75.52% V 【後】  
(イオバミドール370注50mL「F」へ名称変更)  
オイバロニン370注100mL 75.52% V 【後】  
(イオバミドール370注100mL「F」へ名称変更)  
オイバロニン370注シリソジ100mL 75.52% 筒 【後】  
(イオバミドール370注シリソジ100mL「F」へ名称変更)  
大塚生食注2ポート100mL キット 【後】  
毒オキサリチラチナ点滴静注100mg「ト-7」 20mLV 【後】  
劇オキサロール注5μg 1mLA [冷]  
麻劇オキファスト注50mg 1%5mLA  
劇オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」 1mLA [冷] 【後】  
オザグレルN a点滴静注80mg「カタ」 4mLV 【後】  
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg 0.75mL筒 [2~8°C]  
劇オゼンピック皮下注2mg 1.5mLキット [2~8°C]  
劇乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「カタ」 1人用V [冷]  
オーツカMV注  
劇オニバイド点滴静注43mg 10mLV [2~8°C]  
劇オノアクト点滴静注用150mg V  
オバホルモンデボーラ筋注5mg A  
オビザー静注用500 500単位V (溶解液付) [2~8°C]  
劇オビソート注射用0.1g A (溶解液付)  
劇オビドレル皮下注シリソジ250μg 0.5mL筒 [2~8°C]  
オフサグリーン静注用25mg V (溶解液付)  
劇オブジーボ点滴静注20mg 2mLV [2~8°C]  
劇オブジーボ点滴静注120mg 12mLV [2~8°C]  
劇オブジーボ点滴静注240mg 24mLV [2~8°C]  
オブチレイ320注シリソジ100mL 67.8%筒  
オブチレイ350注シリソジ100mL 74.1%筒  
オムニパーク240注10mL 51.77%V  
オムニパーク300注シリソジ80mL 64.71%筒  
オムニパーク300注シリソジ150mL 64.71%筒  
オムニパーク350注シリソジ45mL 75.49%筒  
オムニパーク350注シリソジ100mL 75.49%筒  
オメプラゾール注射用20mg「日医工」 V 【後】  
劇オリベス点滴用1%—200mLP 【後】  
(リドカイン点滴静注液1%「カタ」へ名称変更)  
劇オルダミン注射用1g 10%10gV  
劇オルドレブ点滴静注用150mg V  
オルプロサクス静注用3000—3000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
劇オレンシア点滴静注用250mg V [2~8°C]  
●劇オレンシア皮下注125mgオートインジェクタ-1mL キット [2~8°C]  
●劇オレンシア皮下注125mgシリソジ1mL 筒 [2~8°C]  
劇オンキッパー点滴静注用3750 3,750国際単位V [2~8°C]  
劇オンコビン注射用1mg V [冷]  
劇オンダンセトロン注4mgシリソジ「マルシ」 2mL筒 【後】  
オンデキサ静注用200mg V [2~8°C]  
劇オンパットロ点滴静注2mg/mL—8.8mg4.4mLV [2~8°C]  
(アムヴトラ皮下注25mgシリソジへ切替)

劇オンボ一点点静注300mg 15mLV [2~8°C]  
劇オンボ一点点静注100mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]  
劇オンボ一点点静注200mgオートインジェクター 2mLキット [2~8°C]  
【カ】  
劇カイソラル注3mg—3mLA  
(採用薬はグラニセトロン静注液3mg「カタ」へ切替)  
毒カイプロリス点滴静注用10mg V [2~8°C]  
毒カイプロリス点滴静注用40mg V [2~8°C]  
劇カヨージン注100mg—5mLA 【後】  
劇ガザイバ一点点静注1000mg 40mLV [2~8°C]  
ガスター注射液20mg—2mLA  
(ファモチジン静注20mg「日新」へ切替)  
注射用カタキロット40mg V  
(オザグレルN a点滴静注80mg「カタ」へ切替)  
劇カタボンH注600mg : 0.3%—200mLP  
(ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」へ切替)  
劇カドサイラ一点点静注用100mg V  
ガドテル酸メグルミン静注38%シリソジ11mL「GE」 筒 【後】  
ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ5mL 60.47%5mL筒  
ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ10mL 60.47%10mL筒  
カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 A  
●劇ガニレスト皮下注0.25mgシリソジ 0.5mL筒  
カプリビ注射用10mg V (溶解液付) [2~8°C]  
劇ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「カタ」 V 【後】  
劇ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「カタ」 V 【後】  
カーポスター透析剤・L 6L瓶  
カーミCA液 [KBS-200CA8L(C)] 200mL採血用  
カーミCA液 [KBS-400CA8L(C)] 400mL採血用  
カーミCA液 [KBT-400CA8L(C)] 400mL採血用  
劇カルセド注射用20mg V  
カルチコール注射液8.5%5mL A  
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」  
0.5%10mLA 【後】  
カルペニン点滴用0.5g V  
毒カルボプラチナ点滴静注液50mg「NK」 5mLV 【後】  
毒カルボプラチナ点滴静注液150mg「NK」 15mLV 【後】  
毒カルボプラチナ点滴静注液450mg「NK」 45mLV 【後】  
劇カンサイダス点滴静注用50mg V [2~8°C]  
毒ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 V 【後】 (デノシン)  
乾燥H Bグロブリン筋注用200単位「カタ」 1mLV (溶解液付) [冷]  
劇乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「カタ」 1人用V [冷]  
劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「カタ」 V (溶解液付) [冷]  
劇乾燥弱毒生麻疹ワクチン「カタ」 1人分V (溶解液付) [冷]  
劇乾燥弱毒生麻疹ワクチン (=ミールピック)  
1人分V (溶解液付) [冷]  
劇乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V (溶解液付) [冷]  
【キ】  
劇キイトルーダ点滴静注100mg 4mLV [2~8°C]  
劇キシロカイン注射液1% 100mLV  
劇歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mLA [冷]  
劇キシロカイン注ボリアンズ1%—10mLA  
(リドカイン塩酸塩注1%「日新」へ切替)  
劇キシロカイン注ボリアンズ2%—10mLA  
(リドカイン塩酸塩注2%「日新」へ切替)  
劇キシロカイン注射液「1%」ビレミン (1:100,000) 含有 20mLV [冷]  
キドバレン輸液  
キドミン輸液 200mLP

キムリア点滴静注 1患者あたり [液体室素気相下又は-120°C以下]  
 (輸血免疫移植部でのみ取扱い)  
 劇ギヤバロン髄注0.005% 1mLA  
 劇ギヤバロン髄注0.05% 20mLA  
 劇ギヤバロン髄注0.2% 5mLA  
 キュビシング静注用350mg V [2~8°C]  
 (ダプトマイシン静注用350mg「ニフ」へ切替)  
 キューピトル20%皮下注4g/20mL V [冷]  
 劇キロサイド注20mg A  
 劇キロサイド注100mg A  
 劇キロサイドN注1g V  
 (採用薬はシタラビン点滴静注液1g「NIG」へ切替)  
 キンダリー透析剤 A F 5号 6LV (炭酸水素ナトリウム液付)

【ク】

劇グラニセトロン静注液3mg「アンド」3mLA 【後】  
 劇グラニセトロン静注液3mg「サウ」 3mLA 【後】  
 クラビット点滴静注パック500mg/100mLキット  
 (レボフロキサン点滴静注パック500mg/100mL「DSEP」へ切替)  
 グランシリソジ75 75μg0.3mL筒 [冷]  
 グランシリソジ150 150μg0.6mL筒 [冷]  
 ※ グランシリソジM300 300μg0.7mL筒 [冷]  
 クリアクター静注用80万 80万国際単位V  
 グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mLP 【後】  
 劇クリースピータ皮下注10mg 1mLV [2~8°C]  
 劇クリースピータ皮下注20mg 1mLV [2~8°C]  
 劇クリースピータ皮下注30mg 1mLV [2~8°C]  
 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 4mLA  
 グルアセト35注 (ソフトパック) 500mLP 【後】  
 劇グルカゴンGノボ注射用1mg V (溶解液付) [冷]  
 グルトバ注1200万 1200万国際単位 V (溶解液付)  
 劇クレキサン皮下注2000IU 0.2mL筒  
 劇クレセンバ点滴静注用200mg V [2~8°C]  
 ● グロウジェクト皮下注12mg 筒 [冷]  
 ● クロスエイトMC静注用250単位 V (溶解液付)  
 ● クロスエイトMC静注用1000単位 V (溶解液付)  
 献血グロベニン- I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)  
 献血グロベニン- I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)

【ケ】

K C L 注20mEqキット「テルモ」 1モル20mLキット 【後】  
 ケイセントラ静注用500 500国際単位V (溶解液付) [25°C以下]  
 ケイセントラ静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [25°C以下]  
 ケイツーニ静注10mg A  
 劇ケサンラ点滴静注液350mg 20mLV [2~8°C]  
 劇ケシンプタ皮下注20mgベン 0.4mLキット [2~8°C]  
 麻劇ケタラール静注用50mg 5mLA  
 ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL V  
 劇ケブザラ皮下注200mgシリソジ 1.14mL筒 [2~8°C]  
 ● 劇ケブザラ皮下注150mgオトインジ ケタ- 1.14mLキット [2~8°C]  
 ● 劇ケブザラ皮下注200mgオトインジ ケタ- 1.14mLキット [2~8°C]  
 劇ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サド」 V [2~8°C] 【後】  
 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V  
 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V  
 献血アルブミン20%静注4g/20mL「タダ」 V  
 献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」 20%50mLV  
 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV  
 献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV  
 献血ヴェノグロブリン I H10%静注0.5g/5mL V [冷]  
 献血ヴェノグロブリン I H10%静注2.5g/25mL V [冷]

献血ヴェノグロブリン I H10%静注5g/50mL V [冷]  
 献血ヴェノグロブリン I H10%静注10g/100mL V [冷]  
 献血ヴェノグロブリン I H10%静注20g/200mL V [冷]  
 献血グロベニン- I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)  
 献血グロベニン- I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)  
 献血ノンスロン500注射用 500単位V (溶解液付)  
 献血ノンスロン1500注射用 1500単位V (溶解液付)  
 献血ベニロン- I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)  
 献血ベニロン- I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)  
 劇ゲンタシン注40 40mgA  

【コ】

コアテック注5mg 5mLA  
 劇コアベータ静注用12.5mg V  
 劇D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」  
 (=ローブリン) V (溶解液付) [冷]  
 劇コスメゲン静注用0.5mg V [冷]  
 劇コセンティクス皮下注150mgベン 1mLキット [2~8°C]  
 ● 劇コセンティクス皮下注300mgベン 2mLキット [2~8°C]  
 コートロシン注射用0.25mg V (溶解液付) [冷]  
 コートロシンZ筋注0.5mg V [冷]  
 劇ゴナックス皮下注用80mg V (溶解液付)  
 劇ゴナックス皮下注用120mg V (溶解液付)  
 ゴナトロビン注射用5000単位 V [冷] (アンプルからバイアルへ切替)  
 ● ゴナールエフ皮下注ベン300 300国際単位0.5mL筒 [冷]  
 ゴナールエフ皮下注ベン450 450国際単位0.75mL筒 [冷]  
 ● ゴナールエフ皮下注ベン900 900国際単位1.5mL筒 [冷]  
 コバキソン皮下注20mgシリソジ 1mL筒 [2~8°C]  
 コバールトリイ静注用250 250国際単位V (溶解液付) [冷]  
 ● コバールトリイ静注用500 500国際単位V (溶解液付) [冷]  
 ● コバールトリイ静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [冷]  
 ● コバールトリイ静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [冷]  
 ● コバールトリイ静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [冷]  
 劇ゴーピック水性懸濁注シリソジ 0.5mL筒 [10°C以下]  
 劇コミナティ筋注シリソジ12歳以上用 0.03mg0.3mL1筒 [2~8°C]  
 劇コントミン筋注25mg 5mLA  
 コンファクトF静注用500単位 500単位V (溶解液付) [10°C以下]

【サ】

ザイポックス注射液600mg 300mLP  
 劇注射用サイメリン50mg V [冷]  
 劇サイモグロブリン点滴静注用25mg V [冷]  
 劇サイラムザ点滴静注液100mg 10mLV [冷]  
 劇サイラムザ点滴静注液500mg 50mLV [冷]  
 向サイレース静注2mg A  
 劇サークリサ点滴静注100mg 5mLV [2~8°C]  
 劇サークリサ点滴静注500mg 25mLV [2~8°C]  
 劇ザノサード点滴静注用1g V [2~8°C]  
 ザバクサ配合点滴静注用 V [2~8°C]  
 劇サーパリックス-0.5mL筒 [冷]  
 (シリガード9水性懸濁筋注シリソジへ切替)  
 劇サビーン点滴静注用500mg V  
 劇サフネロード点滴静注300mg 2mLV [2~8°C]  
 サブパック血液ろ過用補充液-B i 2020mLキット 【後】  
 サブラッド血液ろ過用補充液B-S G-2020mLキット  
 劇サムタス点滴静注用8mg V  
 劇ザルトラップ点滴静注100mg 4mLV [2~8°C]  
 劇サンディミュン点滴静注用250mg 5%5mLA

劇サンドスタチン皮下注用50 $\mu$ g—1mLA—[冷]  
(採用薬はオクトレオチド酢酸塩皮下注50 $\mu$ g「サンド」へ切替)  
劇サンドスタチンLAR筋注用キット20mg 筒 (溶解液付) [2~8°C]  
劇サンラビン点滴静注用250mg V [冷]  
劇サンリズム注射液50 50mg5mLA

【シ】

ジアグノグリーン注射用25mg V (溶解液付)  
向ジアゼパム注射液10mg「NIG」 A 【後】  
シアノキット注射用5gセット 5gV (溶解液付)  
注射用G H R P 研究100 100 $\mu$ gV [10°C以下] [禁凍結]  
(注射用G H R P 研究100 (溶解液付) より切替)  
注射用G H R P 研究100—100 $\mu$ gV (溶解液付)—[冷]  
● ジエノトロビンゴーキック注射用5.3mg キット [冷]  
ジエノトロビンゴーキック注射用12mg キット [冷]  
● ジエノトロビンT C 注用5.3mg 5.33mg筒 (溶解液付) [冷]  
● ジエノトロビンT C 注用12mg 筒 (溶解液付) [冷]  
劇ジエービックV (=乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン) V (溶解液付) [冷]  
毒ジエブタナ点滴静注60mg 1.5mLV (溶解液付) [15~30°C]  
劇ジエムザール注射用1g—V  
(ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サンド」へ切替)  
劇シオゾール注10mg 1mLA (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了 (予定))  
劇ジオン注無痛化剤付 10mLV (希釈液付)  
劇ジギラノゲン注0.4mg 2mLA  
劇シグニフォーラ R 筋注用キット40mg 1キット (溶解液付) [2~8°C]  
シグマート注2mg V [冷]  
シグマート注48mg V [冷]  
(ニコランジル点滴静注用48mg「サイン」へ切替)  
シザナリン配合点滴静注液 2mLA 【後】  
毒シスプラチニン点滴静注10mg「マルコ」 20mLV 【後】  
毒シスプラチニン点滴静注50mg「マルコ」 100mLV 【後】  
ジスロマック点滴静注用500mg V  
劇歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 3%1.8mLA [冷]  
○劇シタラビン点滴静注液1g「NIG」 50mLV 【後】  
シチコリン注500mg/10mL「日医工」 A 【後】 (販売中止)  
(2025年9月30日経過措置終了)  
ジトリペンタートカル静注1000mg V  
シナジス筋注液50mg 0.5mLV [2~8°C]  
シナジス筋注液100mg 1mLV [2~8°C]

● ジビビ静注用3000 3,000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
劇ジフォルタ注射液20mg 1mLV [2~8°C]  
劇洗降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タガ」 1mLV [冷]  
劇ジブレキサ筋注用10mg V  
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニーロ」 200mLP 【後】  
シベクトロ点滴静注用200mg V  
劇シベノール静注70mg 5mL筒  
劇シムジア皮下注200mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]  
劇シムジア皮下注200mgオートクリックス 1mLキット [2~8°C]  
劇シムレクト静注用20mg V (溶解液付) [冷]  
シメチジン注200mg「NP」 2mLA 【後】  
ジョイカル関節注30mg 3mL筒 [2~8°C]  
ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL筒 [2~8°C]  
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド 0.36mLキット [2~8°C]  
劇シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]  
劇ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ 0.574mL筒 [2~8°C]  
劇シングリックス筋注用 一人分V (溶解液付) [2~8°C]  
劇シンピット静注用50mg V

劇シンボニー皮下注50mgシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]  
劇シンボニー皮下注50mgオートインジェクター 0.5mLキット [2~8°C]

【ス】

劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビ'ケン」 V (溶解液付) [冷]  
水溶性プレドニン20mg A  
スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルシ」 2mL筒 【後】  
劇スキヤンドネストカートリッジ3% 1.8mLA  
劇スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL 筒 [2~8°C]  
劇スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL 筒 [2~8°C]  
劇スキリージ皮下注360mgオートドーザー 2.4mLキット [2~8°C]  
劇スキリージ点滴静注600mg 10mLV [2~8°C]  
ステミラック注 1回分 [-80°C以下]  
(輸血免疫移植部でのみ取扱い)  
劇ステラーラ点滴静注130mg 26mLV [2~8°C]  
劇ステラーラ皮下注45mgシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]  
ステルライズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ 筒 [2~8°C]  
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 V  
スピノラザ酸注12mg 5mLV [2~8°C]  
劇ズファジラン筋注5mg 0.5%1mLA  
劇スミフェロン注D S 300万IU 筒 (注射針同梱) [冷]  
劇スミフェロン注D S 600万IU 筒 (注射針同梱) [冷]  
スルバシリン静注用1.5g—V  
スルバシリン静注用3g V  
スロノンソノンH I 注10mg/2mL—A  
(アルガトロバンH I 注10mg/2mL「ツー」へ切替)

【セ】

劇一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25 $\mu$ gV (溶解液付) [冷]  
生食注シリンジ「NP」10mL 筒 【後】  
● 生食注シリンジ「オカ」10mL 筒 【後】  
生食注シリンジ50mL「ニーロ」 筒 【後】  
生理食塩液 20mLA  
生理食塩液 50mLV  
生理食塩液 100mLV  
生理食塩液 250mLP  
生理食塩液 500mLP (プラボトルからバッグへ切替)  
生理食塩液「ル」 1000mLP  
生理食塩液P L「ツー」 2LP  
※毒ゼオマイン筋注用100単位 V [25°C以下]  
(ゼオマイン注用100単位へ名称変更)  
→毒ゼオマイン注用100単位 V  
●劇ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇ゼップバウンド皮下注5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇ゼップバウンド皮下注10mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇ゼップバウンド皮下注15mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
劇セトロタイド注射用0.25mg V (溶解液付) [2~8°C]  
セパセルインテグラCA 400mL採血用 [ABD-400CA8FL]  
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 V 【後】  
劇セファランチン注10mg 2mLA  
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 V 【後】  
セフォタックス注射用1g V  
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 V 【後】  
セフタジム静注用1g「VTRS」 V  
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 V  
セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 V 【後】  
※劇ゼブリオン水懸筋注25mgシリンジ 25mg1キット  
劇ゼブリオン水懸筋注50mgシリンジ 50mg1キット

劇ゼブリオン水懸筋注75mgシリソジ 75mg1キット  
劇ゼブリオン水懸筋注100mgシリソジ 100mg1キット  
劇ゼブリオン水懸筋注150mgシリソジ 150mg1キット  
劇ゼブリオンTRI水懸筋注525mgシリソジ 525mg1キット  
向セルシン注射液10mg—A（販売中止）（2026年3月31日経過措置終了）  
(ジアゼパム注射液10mg「NIG」へ切替)  
劇セレネース注5mg 1mLA

#### 【ソ】

- ソグルーヤ皮下注5mg 1.5mLキット [2~8°C]
- ソグルーヤ皮下注10mg 1.5mLキット [2~8°C]
- ソグルーヤ皮下注15mg 1.5mLキット [2~8°C]  
ゲン静注用4.5~4.5gV (タゾビペ配合静注用4.5「ニフ」ロへ切替)  
向劇ソセゴン注射液15mg A  
ゲビラックス点滴静注用—250mgV  
(アシクロビル点滴静注液250mg「トワ」へ切替)  
ソナゾイド注射用16μL V (溶解液付)  
劇ソマチュリン皮下注90mg 筒 [冷]  
劇ソマチュリン皮下注120mg 筒 [冷]- ソマトロビンB S皮下注5mg「サド」シュアパル 5mg筒 [2~8°C] 【後】
- ソマトロビンB S皮下注10mg「サド」シュアパル 10mg筒 [2~8°C] 【後】  
劇ゲメタ点滴静注4mg/100mL—V  
(ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トワ」へ切替)  
劇ゾラデックス3.6mgデボ 筒 [冷]  
劇ゾラデックスLA10.8mgデボ 筒 [冷]  
劇ソリクア配合注ソロスター キット [2~8°C]  
劇ソリリス点滴静注300mg 30mLV [冷]  
ソルアセトF輸液 500mLP 【後】  
ソル・コート注射用100mg V (溶解液付)  
ソル・コート静注用500mg V (溶解液付)  
劇ソルダクトン静注用100mg A  
ソルデム1輸液 200mLP 【後】  
ソルデム1輸液 500mLP 【後】  
ソルデム3A輸液 200mLP 【後】  
ソルデム3A輸液 500mLP 【後】  
劇ゾルトファイ配合注フレックススタッチ キット [2~8°C]  
ソル・メドロール静注用40mg 40mgV (溶解液付)  
ソル・メドロール静注用125mg 125mgV (溶解液付)  
ソル・メドロール静注用500mg 500mgV (溶解液付)  
ソルラクト輸液 500mLP 【後】  
劇ゾレア皮下注150mgベン 1mL1キット [2~8°C]  
劇ゾレア皮下注300mgベン 2mL1キット [2~8°C]  
劇ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トワ」 P 【後】

#### 【タ】

- ダイアニールN P D-2 1.5腹膜透析液(シゲルバッゲ)2LP (販売中止)  
ダイアニールN P D-2 2.5腹膜透析液(シゲルバッゲ)2LP (販売中止)
- ダイアニール-N P D-4 1.5腹膜透析液(シゲルバッゲ)1LP  
ダイアニール-N P D-4 1.5腹膜透析液(シゲルバッゲ)2LP (販売中止)
- ダイアニール-N P D-4 1.5腹膜透析液(シゲルバッゲ)5LP
- ダイアニール-N P D-4 2.5腹膜透析液(シゲルバッゲ)1LP  
ダイアニール-N P D-4 2.5腹膜透析液(シゲルバッゲ)2LP (販売中止)
- ダイアニール-N P D-4 2.5腹膜透析液(シゲルバッゲ)5LP  
ダイアニールP D-2 4.25腹膜透析液(シゲルバッゲ)2LP  
ダイアモックス注射用500mg V  
劇タイガシル点滴静注用50mg V  
劇タイサブリ点滴静注300mg 15mLV [2~8°C]

ダイホルモン・デボー注 1mLA 【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
タイロゲン筋注用0.9mg V [冷]  
劇ダウノマイシン静注用20mg V  
タガメット注射液200mg—2mLA (シメチジン注200mg「NP」へ切替)  
劇ダカルバジン注用100 100mgV [冷]  
タケブロン静注用30mg V  
劇注射用タゴシッド200mg—V  
(テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」へ切替)

タゾビペ配合静注用4.5「ニフ」ロ 4.5gV  
タチオン注射用100mg A  
劇ダトロウェイ点滴静注用100mg V [2~8°C]  
ダプトマイシン静注用350mg「ニフ」ロ V 【後】 (キュビシン)  
劇ダラキュー配合皮下注 15mLV [2~8°C]  
劇ダラザレックス点滴静注100mg—5mLV [2~8°C]  
劇ダラザレックス点滴静注400mg 20mLV [2~8°C]  
ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「日新」  
5,000低分子ヘパリン国際単位A 【後】 (フラグミン)  
劇ダルビアス点滴静注用135mg V [2~8°C]  
○劇ダルベポエチンアルファ注30μgシリソジ「KKF」  
0.5mL筒 【後】 [2~8°C] (ネスブ)  
○劇ダルベポエチンアルファ注60μgシリソジ「KKF」  
0.5mL筒 【後】 [2~8°C] (ネスブ)  
ダントリウム静注用20mg V  
劇タンボコール静注50mg 5mLA

#### 【チ】

チエナム点滴静注用0.5g V  
注射用水 20mLA  
注射用水 (=大塚蒸留水) 100mLV  
注射用水 (=大塚蒸留水) 500mLV (PET専用・物流のみ)  
注射用水 (洗浄用) 500mLV  
注射用水 (洗浄用) 1000mLV  
注射用水バッグ「ツ」 1LP  
劇チラーデンS静注液200μg 1mLA  
劇沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mLV [冷]  
劇沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タダ」 1mLA [冷]  
(DT ピックへ切替)

#### 【ツ】

劇一般診断用精製ツベルクリン (PPD)  
1人用 0.25μg V (溶解液付) [冷]

#### 【テ】

TRH注0.5mg「ニフ」ロ A [冷]  
○劇テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」 V 【後】  
劇DTピック (=沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド) 0.1mLV [冷]  
劇1%ディブリバン注-キット 500mg50mL筒  
低分子デキストラン糖注 500mLP 【後】  
デカドロン注射液1.65mg—0.5mL [冷]  
(院内はデキサート注射液1.65mg)  
デカドロン注射液6.6mg—2mL [冷]  
(院内はデキサート注射液6.6mg)  
○ デキサート注射液1.65mg 0.5mLA 【後】  
○ デキサート注射液6.6mg 2mLV 【後】  
劇デクスマデトミジン静注液200μg「ニフ」ロ 2mLV 【後】  
テスチノンデボー筋注用125mg 1mLA  
劇テゼスバライ皮下注210mgベン 1.91mLキット [2~8°C]  
劇セントリク点滴静注840mg 14mLV [2~8°C]  
劇セントリク点滴静注1200mg 20mLV [2~8°C]

テタノブリン I H 静注250単位 V [冷]  
テタノブリン I H 静注1500単位 V [冷]  
劇テッペーザ点滴静注用500mg V [2~8°C]  
デトキソール静注液2g 20mLV  
劇テトラピック皮下注シリンジ 0.5mL筒 [冷]  
毒デノシン点滴静注用500mg V  
(ガムシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」へ切替)  
劇テビムラ点滴静注100mg 10mLV [2~8°C] [禁凍結]  
デファイテリオ静注200mg 2.5mLV  
劇テブダック点滴静注用40mg V [2~8°C]  
テムセルH S 注 10.8mL1P [液体窒素 (気相中) ]  
(輸血移植免疫部でのみ取扱い)  
毒テモダール点滴静注用100mg V [2~8°C]  
劇デビクセント皮下注200mgシリンジ 1.14mL筒 [2~8°C]  
劇デビクセント皮下注300mgベン 2mLキット [2~8°C]  
劇テラルビシン注射用10mg V [冷]  
劇テラルビシン注射用20mg V [冷]  
テリパラチドB S 皮下注キット 600μg「モダ」 キット [2~8°C] 【後】  
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター キット [2~8°C]  
テルモ血液バッグC P D A 200mL採血用セット [BB-SCD200J8A]  
【ト】  
劇ドキシル注20mg 10mLV [冷]  
劇ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サド」 5mLV [冷] 【後】  
劇ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 V 【後】  
劇ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サド」 25mLV [冷] 【後】  
(販売中止) (ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」へ切替)  
毒ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニブロ」 V 【後】  
毒ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニブロ」 V 【後】  
ドバストン静注50mg 0.25%20mLA  
劇ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 0.3%200mL袋 【後】  
(ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」が無くなり次第切替)  
劇ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」 0.3%200mL袋 【後】  
(ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」へ切替予定)  
劇ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「サイ」 5mLA 【後】  
劇ドバミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 50mL筒 【後】  
(ドバミン持続静注150mgシリンジ「テモ」へ名称変更)  
劇ドバミン持続静注150mgシリンジ「テモ」 0.3%50mL筒 【後】  
(ドバミン持続静注150mgシリンジ「KKC」より名称変更)  
劇ドブテレックス注射液100mg A  
(ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「サイ」へ切替)  
劇ドボボン注0.3%シリンジ 50mL 【後】  
(ドバミン持続静注150mgシリンジ「KKC」へ名称変更)  
(ドブトレックスK注600mgより切替)  
劇ドブランシ注60mg A  
劇ドブラム注射液400mg 20mLV  
劇ドボテシシ点滴静注40mg 2mLV  
(院内はイリノテカント酸塩点滴静注液40mg「トワ」)  
劇ドボテシシ点滴静注100mg 5mLV  
(院内はイリノテカント酸塩点滴静注液100mg「トワ」)  
トラスツズマブB S 点滴静注用60mg「NK」 V [2~8°C] 【後】  
トラスツズマブB S 点滴静注用150mg「NK」 V [2~8°C] 【後】  
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 10%10mLA 【後】  
劇トラマール注100 100mgA  
トランサミン注10% 10mLA  
毒トリセノックス点滴静注12mg 6mLV  
劇トリビック (=沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン)  
0.5mLV [10°C以下] [禁凍結]  
劇トルツ皮下注80mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]

向ドルミカム注射液10mg 2mLA (ミダゾラム注10mg「サント」へ切替)  
劇トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL1キット [2~8°C]  
劇トレアキシン点滴静注液100mg/4mL V [2~8°C]  
劇トレシーバ注フレックスタッチ 300単位キット [2~8°C]  
劇トレプロスト注射液200mg 20mLV  
劇トレムフィア点滴静注200mg 20mLV [2~8°C]  
劇トレムフィア皮下注100mgシリンジ 100mg1mL筒 [2~8°C]  
劇トレムフィア皮下注200mgベン 2mLキット [2~8°C]  
劇トロデルビ点滴静注用200mg V [2~8°C]  
劇ドロレブタン注射液25mg 10mLV  
【ナ】  
●劇ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター 0.375mLキット [2~8°C]  
劇ナゾラ皮下注30mgシリンジ 0.375mL筒 [2~8°C]  
劇ナファモstatt注射用10mg「SW」 V 【後】  
毒ナードロック筋注2500単位 0.5mLV [2~8°C]  
毒ナベルビン注40 4mLV [冷] (ロゼウス静注液40mgへ切替)  
麻劇ナルベイン注2mg 1mLA  
劇ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mLA  
【ニ】  
劇ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 2mLA 【後】  
(サリベックス注 0.1% 2mg2mLより名称変更)  
劇ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 10mLA 【後】  
(サリベックス注0.1% 10mg10mLより名称変更)  
●ニコベリック腹膜透析液1.5L 袋 (排液用バッグ付) 【後】  
ニコランジ点滴静注用48mg「サイ」 V [冷] 【後】  
ニコランジ注射液500mg 10mLA  
毒ニトプロ持続静注液6mg 2mLA [冷]  
劇ニドラン注射用50mg V  
劇ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 A 【後】  
劇ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テモ」 筒 【後】  
劇ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テモ」 筒 【後】  
(ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テモ」へ名称変更)  
ニトロール注5mgシリンジ 10mL筒  
ニトロール持続静注25mgシリンジ 50mL筒  
劇乳酸ビペリデン注5mg「ミドミ」 0.5%1mLA 【後】  
劇ニューモバックスN P シリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]  
【ヌ】  
劇ヌーカラ皮下注100mgベン 1mLキット [2~8°C]  
【ネ】  
ネオアミュー輸液 200mLP  
劇ネオシネジンコーワ注1mg 1mLA  
劇ネオビタカイン注シリンジ5mL 筒  
ネオファーゲン静注20mL A  
ネオフィリン注250mg 10mLA  
劇ネスプ注射液30μg「ラシリンジ」 0.5mL筒 [2~8°C]  
(ダルベボエチナルファ注30μgシリンジへ切替)  
劇ネスプ注射液60μg「ラシリンジ」 0.5mL筒 [2~8°C]  
(ダルベボエチナルファ注60μgシリンジへ切替)  
劇ネスプ注射液120μg「ラシリンジ」 0.5mL筒 [2~8°C]  
【ノ】  
マイアート静注用1500単位 V (溶解液付)  
(献血ノンスロン1500注射用へ切替)  
ノイトロジン注50μg V (溶解液なし)  
ノイトロジン注100μg V (溶解液なし)  
ノイトロジン注250μg V (溶解液なし)  
ノイロトロビン注射液3.6単位 3mLA  
劇ノクサフィル点滴静注300mg 16.7mLV [2~8°C]  
ナバミン筋注5mg 1mLA (販売中止)

毒ノバントロン注10mg 5mLV

向劇ノーベルバール静注用250mg V

● ノボエイト静注用1500 1500国際単位V (溶解液付) [2~8°C]

ノボセブンH I静注用5mgシリンジ 5mLV (溶解液付) [冷]

劇ノボラピッド注100単位/mL 10mLV [冷]

●劇ノボラピッド注フレックスタッチ 300単位キット [冷]

(院内はインスリンアスパルトB S注ソロスターN R「サワイ」へ切替予定)

●劇ノボラピッド注フレックスペン 300単位キット [冷]

●劇ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]

●劇ノボラピッド50ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]

●劇ノボリンR注フレックスペン 300単位キット [冷]

●劇ノボリンN注フレックスペン 300単位キット [2~8°C]

劇ノルアドリナリン注1mg 0.1% 1mLA

● ノルディトロピン フレックスプロ注5mg キット [冷]

● ノルディトロピン フレックスプロ注10mg キット [冷]

献血ノンスロン500注射用 500単位V (溶解液付)

献血ノンスロン1500注射用 1500単位V (溶解液付)

【ハ】

劇ハイカムチン注射用1.1mg V

ハイカリックR F輸液 500mLP

バイクロット配合静注用 V (溶解液付) [10°C以下]

(バイクロット配合静注用2.5mLへ名称変更)

特生バイクロット配合静注用2.5mL V (2.5mL溶解液付)

ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL V [2~25°C]

水溶性ハイドロコートン注射液100mg 2mLV

バクトラミン注 5mLA

毒パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 V 【後】

毒パクリタキセル注射液100mg「NP」 16.7mLV 【後】 (販売中止)

(2026年3月31日経過措置終了)

劇バーサビブ静注透析用シリンジ5mg 2mL筒 [2~8°C]

劇バージェタ点滴静注420mg/14mL V [2~8°C]

劇沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mLV [冷]

ハーセプチノン注射用150 150mgV (溶解液なし) [2~8°C]

劇バドセブ点滴静注用30mg V [2~8°C]

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 1mLA

劇バビースモ硝子体内注射液120mg/mL 0.05mLV [2~8°C]

劇バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg/0.05mL筒 [2~8°C]

ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100mLV [冷]

劇ハベカシン注射液200mg 4mLA

劇バベンチオ点滴静注200mg 10mLV [2~8°C]

パム静注500mg 20mLA

毒ハラヴェン静注1mg 2mLV

毒パラプラチノン注射液50mg 5mLV

(カルボプラチノン点滴静注液50mg「NK」へ切替)

毒パラプラチノン注射液150mg 15mLV

(カルボプラチノン点滴静注液150mg「NK」へ切替)

毒パラプラチノン注射液450mg 45mLV

(カルボプラチノン点滴静注液450mg「NK」へ切替)

バル筋注100mg「AFP」 10% 1mLA [冷]

劇パルクス注5μg 1mLA [冷]

(採用薬はアルプロスタジル注5μg「サリ」へ切替)

劇パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タロ」 P 【後】

劇ハロマンス注100mg 1mLA

パンコマイシン点滴静注用0.5g「トワ」 V 【後】

パンテノール注500mg「KCC」 A 【後】 (供給停止)

パントール注射液500mg A

劇ハンブ注射用1000 1000 μgV

【ヒ】

劇ピアスカイ注340mg 2mLV [2~8°C]

劇ピヴラッツ点滴静注液150mg 6mLV

ピカネイト輸液 500mLP (ピカーボン輸液から切替)

ピカネイト輸液 1000mLP

ピカーボン輸液 500mLP (ピカネイト輸液 500mLへ切替)

劇ピキセオス配合静注用 (144mg) V [2~8°C]

ピクシリン注射用2g V

注射用ピクシリンS 500 500mgV 【後】

劇ピクトザ皮下注18mg 3mLキット [冷]

劇B C Gワツン(ディズル 乾燥) 12mg 1人用V [冷]

劇ピシバニール注射用1KE V (溶解液なし) [10°C以下]

劇ピシバニール注射用5KE V (溶解液なし) [10°C以下]

劇ピスダイン静注用15mg V

ピスタグロビン皮下注用 V (溶解液付) [冷]

ピソルボン注4mg 0.2% 2mLA

(プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タヨー」へ切替)

劇ピダーザ注射用100mg V

(アザシチジン注射用100mg「サリ」へ切替)

ピタシミン注射液500mg A [冷]

(アスコルビン酸注500mg P B「日新」へ切替)

ピタメジン静注用 V

※ ピドキサール注10mg A (ピリドキサール注10mg「サリ」へ切替)

→ ピリドキサール注10mg「サリ」 A

(ピドキサール注10mgが無くなり次第切替)

ヒトC R H静注用100μg「ニブロ」 V (溶解液付)

ピトレシン注射液20 20単位1mLA [冷]

劇ヒフデュラ配合皮下注 5.6mLV [2~8°C]

ピーフリード輸液 500mLキット

ピペラシリンN a注射用1g「NIG」 V 【後】

(ペントシリン注射用1gVから切替)

ヒベルナ注25mg 2.5% 1mLA

劇ビームゲン注「HBワツン」 5 μg 0.25mLV [冷]

劇ビームゲン注「HBワツン」 10 μg 0.5mLV [冷]

(ヘプタバックス-IIへ切替)

劇ビムパット点滴静注100mg 10mLV

劇ビムパット点滴静注200mg 20mLV

● ヒューマトローブ注射用6mg 筒 (溶解液付) [冷]

(販売終了) (2026年3月31日経過措置終了)

● ヒューマトローブ注射用12mg 筒 (溶解液付) [冷]

(販売終了) (2026年3月31日経過措置終了)

劇ヒューマリンR注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]

●劇ヒューマリンR注カート 300単位筒 [冷]

劇ヒューマリンR注ミリオベン 300単位キット [冷]

劇ヒューマリンN注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]

劇ヒューマリンN注ミリオベン 300単位キット [冷]

●劇ヒューマリン3/7注ミリオベン [冷]

●劇ヒューマログ注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]

●劇ヒューマログ注カート 300単位筒 [冷]

●劇ヒューマログ注ミリオベン 300単位キット [冷]

●劇ヒューマログ注ミリオベンHD 300単位キット [冷]

●劇ヒューマログミックス25注ミリオベン 300単位キット [冷]

●劇ヒューマログミックス50注ミリオベン 300単位キット [冷]

●劇ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL 筒 [冷]

●劇ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL 筒 [冷]

劇ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL キット [冷]

●劇ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL 筒 [冷]

劇ヒュミラ皮下注80mgベン0.8mL キット [冷]

ピリヴィジエン10%静注2.5g/25mL V [2~25°C] [禁凍結]  
ピリヴィジエン10%静注5g/50mL V [2~25°C] [禁凍結]  
ピリヴィジエン10%静注10g/100mL V [2~25°C] [禁凍結]  
ピリスコピン点滴静注50 10.55% 100mLV  
劇ピーリンサイト点滴静注用35μg V [2~8°C]  
ピルテプソ点滴静注250mg 5mL V [冷]  
ヒルトニン0.5mg注射液 A  
劇ピロイ点滴静注用100mg V [2~8°C]  
劇ビンゼレックス皮下注160mgオトインジェクター 1mLキット [2~8°C]  
●劇ビンゼレックス皮下注320mgオトインジェクター 2mLキット [2~8°C]  
【フ】  
ファイバ静注用1000 20mLV [2~8°C]  
劇5-FU注250mg V [2~8°C]  
(フルオロウラシル注250mg「トワ」へ切替)  
ファーストシン静注用1g V  
劇ファセンラ皮下注30mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]  
劇ファセンラ皮下注30mgペン 1mLキット [2~8°C]  
劇ファプラザイム点滴静注用5mg V [冷]  
劇ファプラザイム点滴静注用35mg V [冷]  
劇ファルモルビシン注射用10mg V  
(エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」へ切替)  
ファモチジン静注20mg「日新」 20mLA 【後】  
劇ファンガード点滴用50mg V  
(ミカファンギンN a点滴静注用50mg「ニブロ」へ切替)  
フィコンバ点滴静注用2mg V  
ライジオ35輸液 500mLP (グルアセト35注 500mLへ切替)  
フィジオ140輸液 500mLP  
フィニバックス点滴静注用0.5g V  
劇ブイフェンド200mg静注用 V  
ファブリノゲンHT静注用1g「JB」 V (溶解液付) [冷]  
フィプロガミンP静注用 V [冷]  
● フィラジル皮下注30mgシリンジ 3mL筒 [冷]  
フィルグラスチムB S注75μgシリンジ「NK」  
0.3mL/筒 [2~8°C] 【後】  
フィルグラスチムB S注150μgシリンジ「NK」  
0.6mL/筒 [2~8°C] 【後】  
フィルグラスチムB S注300μgシリンジ「F」  
0.7mL/筒 [10°C以下 禁凍結] 【後】  
劇注射用フィルデシン1mg V [冷]  
フェインジェクト静注500mg 10mLV  
フェジン静注40mg 2mLA  
劇フェスゴ配合皮下注MA 10mLV [2~8°C]  
劇フェスゴ配合皮下注IN 15mLV [2~8°C]  
劇フェソロデックス筋注250mg 5mL筒 [冷]  
フェトロージャ点滴静注用1g V [2~8°C]  
劇フェノバール注射液100mg 1mLA  
○麻劇フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 0.005%2mLA 【後】  
○麻劇フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 0.005%10mLA 【後】  
● フォルテオ皮下注キット600μg 0.005%10mLA  
劇注射用フサン10-10mg V  
(ナファモスマット注射用10mg「SW」へ切替)  
劇注射用フサン50 50mgV  
劇ブスコパン注20mg 2%1mLA  
劇ブスルフェクス点滴静注用60mg V [冷]  
ブドウ糖 5% 20mLA  
ブドウ糖 5% 50mLV  
ブドウ糖 5% 100mLV  
ブドウ糖 5% 250mLP (トボトルからバックへ切替)

ブドウ糖 5% 500mLP (トボトルからバックへ切替)  
ブドウ糖 10% 20mLA  
ブドウ糖 20% 20mLA  
ブドウ糖 50% 20mLA (50%ブドウ糖注射液「ニッシ」へ切替)  
ブドウ糖 70% 350mLP  
50%ブドウ糖注射液「ニッシ」 20mLA  
フラグミン静注5000単位/5mL 0.005%10mLA 【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
(ダルテバリンN a 静注5000単位/5mL「日新」へ切替)  
劇デラリテ皮下注60mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]  
劇プラリアH I 皮下注60mgシリンジ0.5mL 筒 [2~8°C] [禁凍結]  
プリズバインド静注液2.5g 50mLV [2~8°C]  
プリディオン静注200mg 2mLV  
(スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルシ」へ切替)  
ブリンペラン注射液10mg 0.5%2mLA  
(塩酸メトクロラミド注射液10mg「効タ」が無くなり次第切替)  
フルオレサイト静注500mg 5mLV 【後】  
劇フルオロウラシル注250mg「トワ」 V [2~8°C] 【後】  
劇フルオロウラシル注1000mg「トワ」 V [2~8°C] 【後】  
フルカリック1号輸液 903mLキット  
フルカリック2号輸液 1003mLキット  
フルカリック3号輸液 1103mLキット  
フルコナゾール静注液50mg「セイ」 0.1%50mLV 【後】  
フルスルチアミン注50mg「日新」 20mLA 【後】  
劇フルデラ静注用50mg V  
劇フルデカシン筋注25mg 1mLV  
劇フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 5mL筒 【後】  
フルマリン静注用1g V  
ブレアミン-P注射液 200mLP  
劇ブレオ注射用15mg V  
劇ブレセデックス静注液200μg「マク」 2mLV  
(デクスマデトミジン静注液200μg「ニブロ」へ切替)  
劇ブレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「アイゼン」 筒  
水溶性ブレドニン20mg A  
劇ブレバニミス点滴静注240mg 12mLV  
劇ブレビブロック注100mg 10mLV  
劇ブレベナー20水性懸濁注 0.5mLキット [2~8°C]  
デロイメント点滴静注用150mg V [2~8°C]  
(ホスアブレピタント点滴静注用150mg「NK」へ切替)  
プロギノン・デポー筋注10mg 1mLA  
劇プログラフ注射液2mg 0.4mLA  
デロゲデボー筋注125mg 1mLA (販売中止)  
デロゲホルモン筋注用25mg 1mLA (販売中止)  
プロジフ静注液200 8%2.5mLV [冷]  
劇プロスタルモン・F注射液1000 1mg1mLA  
劇デロスタンデイン注射用20μg V  
(アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「効タ」へ切替)  
劇デロスタンデイン 500μg V  
(アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「効タ」へ切替)  
フロセミド注20mg「トワ」 A 【後】  
劇プロタノールL注0.2mg 0.02%1mLA  
ブロタミン硫酸塩静注100mg「モダ」 1%10mLV  
(ノボ・硫酸ブロタミン静注用100mgから名称変更)  
プロハンス静注シリンジ13mL 筒  
劇プロポフォール静注1%20mL「マルシ」 200mg20mLA 【後】  
劇プロポフォール静注1%100mL「マルシ」 1g100mLV 【後】  
プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タヨ」 0.2%2mLA 【後】

劇静注用フローラン0.5mg V (溶解液無)  
劇静注用フローラン1.5mg V (溶解液無)  
静注用フローラン専用溶解液 50mLV

【ヘ】  
ペイフォータス筋注50mgシリソジ 0.5mL筒 [2~8°C]  
ペイフォータス筋注100mgシリソジ 1mL筒 [2~8°C]  
劇ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg/0.05mL筒 [2~8°C]  
劇ペガニス皮下注180μg 1mLV [冷]  
劇ベクティビックス点滴静注100mg 5mLV [冷]  
ベクルリ一点滴静注用100mg V  
毒ベスピサ点滴静注用1mg V [2~8°C]  
劇ベスレミ皮下注250μgシリソジ 0.5mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
●劇ベタフェロン皮下注用960万国際単位 V (溶解液付)  
麻ペチヨルファン注射液 1mLA  
麻ペチロルファン配合注HD 1mLA  
劇ベナンバックス注用300mg V  
注射用ペニシリソGカリウム100万単位 V  
献血ベニロン-I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)  
献血ベニロン-I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)  
ベネフィクス静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [1~30°C]  
●ベネフィクス静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [1~30°C]  
劇ベバシズマブB-S点滴静注100mg「CTNK」4mLV [2~8°C] 【後】  
劇ペバシズマブB-S点滴静注100mg「第一三共」  
4mLV [2~8°C] 【後】 (販売中止)  
劇ベバシズマブB-S点滴静注400mg「CTNK」16mLV [2~8°C] 【後】  
劇ペバシズマブB-S点滴静注400mg「第一三共」  
16mLV [2~8°C] 【後】 (販売中止)  
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリソジ「モダ」筒 【後】  
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリソジ  
「オツカ」10mL (ルア-スリップタイプ) 筒 【後】  
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリソジ  
「オツカ」5mL (ルア-ロックタイプ) 筒 【後】  
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリソジ  
「オツカ」10mL (ルア-スリップタイプ) 筒 【後】  
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」A  
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」V  
劇ペプシド注100mg 5mLV  
(エトボシド点滴静注液100mg「サンド」へ切替)  
ヘブスプリンI H静注1000単位 5mLV [冷]  
劇ヘプタバックス-II水溶性懸濁注シリソジ0.5mL 筒 [2~8°C]  
ヘムライブラ皮下注60mg 0.4mLV [2~8°C]  
ヘムライブラ皮下注90mg 0.6mLV [2~8°C]  
ヘムライブラ皮下注105mg 0.7mLV [2~8°C]  
ヘムライブラ皮下注150mg 1mLV [2~8°C]  
劇ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 4mLV 【後】  
劇ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 20mLV 【後】  
ペラニンデポー筋注5mg 1mLA (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
(プロギノン・デポー筋注10mgへ切替)  
●ペリセート360N腹膜透析液 1.5LP (排液用バッグ付)  
●ペリセート400N腹膜透析液 1.5LP  
(排液用バッグ付) [セ-キヤップシステム用]  
ペリナートP静注用500  
(正常人血漿1mL中含量の500倍(溶解液付)) V [冷]  
毒ペルケイド注射用3mg V  
ヘルニコア椎間板注用1.25単位 V [冷]  
劇ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ト-7」 V [2~8°C] 【後】

ペシタリソジ注射用1g V  
(ペペラシリンNa注射用1g「NIG」V 【後】へ切替)  
劇ベンリスタ点滴静注用120mg V [2~8°C]  
劇ベンリスタ点滴静注用400mg V [2~8°C]  
劇ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]

【ホ】  
ポカブリア水懸濁注600mg 3mLV  
ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」 V [2~8°C] 【後】  
毒点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 6g/250mLV  
劇ホストイン静注750mg 10mLV [冷]  
ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」 V 【後】  
劇ボスマシン注1mg 0.1%1mLA  
●ボックスゾゴ皮下注用0.4mg V (溶解液付) [2~8°C]  
●ボックスゾゴ皮下注用0.56mg V (溶解液付) [2~8°C]  
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg V (溶解液付) [2~8°C]  
劇ボテリジオ点滴静注20mg 5mLV [2~8°C]  
毒ボトックス注用50単位 V [冷]  
劇ボートラーザ点滴静注液800mg 50mLV [2~8°C]  
劇ボナロン点滴静注バッグ900μg 100mLP  
劇ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL P  
劇ボプスカイン0.5%注50mg/10mL A  
劇ボプスカイン0.75%注75mg/10mL A  
ホメピゾール点滴静注1.5g「タダ」 V  
劇ボライビー点滴静注用30mg V [2~8°C]  
劇ボライビー点滴静注用140mg V [2~8°C]  
ポララミン注5mg 1mLA  
劇ボリドカスケレロール0.5%注2mL A  
劇ボリドカスケレロール1%注2mL A  
劇ボリドカスケレロール3%注2mL A  
毒ボルテゾミブ注射用3mg「ト-7」 V 【後】  
ボルベン輸液6% 500mLP  
劇ボンビバ静注1mgシリソジ 1mLA  
ポンベンディ静注用1300 1300国際単位V (溶解液付)

【マ】  
劇マイトマイシン注用2mg V  
毒マイロターグ点滴静注用5mg V [2~8°C]  
劇マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mLA  
劇マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mLA  
注射用マキシビム1g V  
(セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」へ切替)  
マキユエイド眼用40mg V  
マグセント注100mL V  
マグネスコープ静注38%シリソジ13mL 筒  
マグネスコープ静注38%シリソジ15mL 筒  
劇乾燥弱毒生麻しんワクチン「タダ」 1人分V (溶解液付) [冷]  
劇乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン (=ミールビック)  
1人分V (溶解液付) [冷]  
劇乾燥ましウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V (溶解液付) [冷]  
劇マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
劇マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇マンジャロ皮下注10mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇マンジャロ皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇マンジャロ皮下注15mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
20%マンニットール注射液「YD」(袋) 300mL袋

【ミ】  
劇ミオコール静注5mg 10mLA 【後】  
(ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」へ名称変更)

ミオテクター冠血管注 A液 495mLV  
ミオテクター冠血管注 B液 5mLA  
劇ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニグロ」 V 【後】  
(ファンガード点滴用50mgから切替)  
向ミダゾラム注射液10mg「NIG」 2mLA 【後】  
向ミダゾラム注射液10mg「サド」 2mLA 【後】 (出荷停止)  
(ミダゾラム注射液10mg「NIG」へ切替)  
向ミダゾラム点滴静注0.1% 10mg 10mLV  
劇ミチーガ皮下注用30mgバイアル V [2~8°C]  
劇ミチーガ皮下注用60mgシリソジ 筒  
ミッドペリック135腹膜透析液 1.5LP (排液用パッジ付)  
● ミッドペリック135腹膜透析液 2LP (排液用パッジ付)  
ミッドペリック135腹膜透析液 2LP (排液用パッジ無し)  
● ミッドペリック250腹膜透析液 1.5LP (排液用パッジ付)  
ミッドペリック250腹膜透析液 2LP (排液用パッジ無し)  
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」 V 【後】  
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タヨ」 V 【後】  
(ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」へ名称変更)  
ミノマイシン点滴静注用100mg V  
(ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」へ切替)  
ミラクリッド注射液5万単位 1mLA  
ミラクリッド注射液10万単位 2mLA  
劇ミリプロ動注用70mg V [冷]  
ミリプロ用懸濁用液4mL A  
劇ミルセラ注シリソジ25μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミルセラ注シリソジ50μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミルセラ注シリソジ75μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミルセラ注シリソジ100μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミルセラ注シリソジ150μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミルリノン注10mg「カタ」 10mLA 【後】  
劇ミルリノン注射液10mg 10mLA (ミルリノン注10mg「カタ」へ切替)  
【ム】  
無水エタノール注「ソ」 5mLA  
【メ】  
メイロン静注7% 20mLA  
メイロン静注7% 250mLP  
メイロン静注8.4% 20mLA  
劇メグルダーゼ静注用1000 1000単位V [2~8°C]  
○ メコバラミン注500μg「NP」 0.5mgA 【後】  
劇注射用メソトレキセート50mg V  
劇メソトレキセート点滴静注液200mg 8mLV  
劇メソトレキセート点滴静注液1000mg 40mLV  
メチヨバール注射液500μg A  
(院内はメコバラミン注500μg「NP」)  
劇メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 0.02%1mLA [冷] 【後】  
劇メチレンブルー静注50mg「第一三共」 10mLA  
●劇メトジエクト皮下注7.5mgシリソジ0.15mL 筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(院内はメトジエクト皮下注7.5mgベン0.15mL切替)  
●劇メトジエクト皮下注10mgシリソジ0.20mL 筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(院内はメトジエクト皮下注10mgベン0.20mL切替)  
●劇メトジエクト皮下注12.5mgシリソジ0.25mL 筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(院内はメトジエクト皮下注12.5mgベン0.25mL切替)  
●劇メトジエクト皮下注15mgシリソジ0.30mL 筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(院内はメトジエクト皮下注15mgベン0.30mL切替)  
劇メトジエクト皮下注7.5mgベン0.15mL キット [25°C以下][禁凍結]  
(メトジエクト皮下注7.5mgシリソジ0.15mLが無くなり次第切替)  
劇メトジエクト皮下注10mgベン0.20mL キット [25°C以下][禁凍結]  
(メトジエクト皮下注10mgシリソジ0.20mLが無くなり次第切替)

劇メトジエクト皮下注12.5mgベン0.25mL キット [25°C以下][禁凍結]  
(メトジエクト皮下注12.5mgシリソジ0.25mLが無くなり次第切替)  
劇メトジエクト皮下注15mgベン0.30mL キット [25°C以下][禁凍結]  
(メトジエクト皮下注15mgシリソジ0.30mLが無くなり次第切替)  
劇メナクトラ筋注 0.5mLV [2~8°C]  
(メンクアッドフィ筋注へ切替)  
メルカゾール注10mg A  
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 V 【後】  
メロペネム点滴静注用0.5g V  
(メロペネム点滴静注用0.5g「明治」へ切替)  
劇メンクアッドフィ筋注 0.5mLV [2~8°C]  
(メナクトラ筋注から切替)  
【モ】  
劇モゾビル皮下注24mg 1.2mLV  
モノヴァー静注1000mg 10mLV  
モリヘペミン点滴静注 500mLP  
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1%1mLA  
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液50mg「カタ」 1%5mLA  
【ヤ】  
劇ヤーボイ点滴静注液50mg 10mLV [2~8°C]  
【ユ】  
ユナシン-S 静注用1.5g V (スルバシリソ静注用1.5gへ切替)  
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g V  
劇ユニツキシン点滴静注17.5mg/5mL V [2~8°C]  
劇ユプリズナ点滴静注100mg 10mLV [2~8°C]  
劇ユルトミリスH I点滴静注300mg/3mL V [2~8°C]  
【ヨ】  
毒ヨンデリス点滴静注用0.25mg V [2~8°C]  
毒ヨンデリス点滴静注用1mg V [2~8°C]  
【ラ】  
ライザケア輸液 1L袋 (ルタテラ静注専用)  
劇ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位キット [2~8°C]  
劇ライブリバント点滴静注350mg 7mLV [2~8°C]  
ラジカット点滴静注パッジ30mg 100mLキット  
ラシックス注20mg A (フロセミド注20mg「トワ」へ切替)  
劇ラスピック点滴静注キット150mg キット (希釈液付)  
劇ラスリテック点滴静注用1.5mg V (溶解液付) [冷]  
劇ラニビズマB S 硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」  
0.5mg0.05mL筒 [2~8°C] 【後】  
ラピアクタ点滴静注液パッジ300mg 60mLP  
劇ラボナール注射用0.5g A  
毒ランダ注 10mg20mLV  
(シスプラチニ注「マルコ」 10mg20mLへ切替)  
毒ランダ注 50mg100mLV  
(シスプラチニ注「マルコ」 50mg100mLへ切替)  
●劇ランタス注ソロスター 300単位キット [冷]  
劇ランタスX R注ソロスター 450単位キット [冷]  
劇ランマーク皮下注120mg 1.7mLV [2~8°C]  
劇ランマークH I皮下注120mgシリソジ1.0mL 1mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
【リ】  
劇リカムビス水懸筋注900mg 3mLV [2~8°C]  
劇リクラスト点滴静注液5mg(パッジ) 100mLP  
リコモジュリン点滴静注用12800 12800単位 V  
劇リサイオ点滴静注液100mg 2.5mLV [2~8°C]  
劇リスティーゴ皮下注280mg 2mLV [2~8°C]  
劇サヌバダールコンスタ筋注用25mg キット (懸濁用液付) [冷]  
劇リスモダンP 静注50mg 5mLA (2026年3月31日経過措置終了)

無印：採用薬  
※：削除予定薬  
●：院外処方専用薬  
☆：院外処方専用予定薬  
【後】：後発医薬品  
○：院内専用後発品である薬

リツキサン点滴静注100mg 10mLV [2~8°C]  
リツキサン点滴静注500mg 50mLV [2~8°C]  
リツキシマブB S点滴静注100mg「KHK」 10mLV [2~8°C] 【後】  
リツキシマブB S点滴静注500mg「KHK」 50mLV [2~8°C] 【後】  
劇リドカイン点滴静注液1%「効々」 200mLP 【後】  
劇リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mLA 【後】  
劇リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mLA 【後】  
劇リドカイン静注用2%シリソジ「テルモ」 5mL筒 【後】  
劇リドリント塩酸塩点滴静注液50mg「F」 1%5mLA  
[2~8°C]—【後】 (販売中止) (2027年3月31日経過措置終了(予定))  
劇リドリント塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 1%5mLA  
[5°C以下] 【後】  
リピオドール480注10mL A  
劇リブタヨ点滴静注350mg 7mLV [2~8°C]  
劇リブレガル点滴静注用3.5mg V [冷]  
劇リメタゾン静注2.5mg 1mLA  
硫酸M g補正液1mEq/mL 0.5mL20mLA  
劇リュープリン注射用キット1.88mg一筒  
(リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」へ切替)  
劇リュープリン注射用キット3.75mg一筒  
(リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」へ切替)  
劇リュープリンP R O注射用キット22.5mg 筒  
劇リュープリンS R注射用キット11.25mg 筒  
劇リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 筒 【後】  
劇リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 筒 【後】  
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 0.5mL20mLA  
リンデロン注2mg(0.4%) A [冷]

#### 【ル】

劇ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL 0.5mg/0.05mLV [2~8°C]  
劇ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL  
0.5mg/0.05mL筒 [2~8°C]  
劇ルミセフ皮下注210mgシリソジ 1.5mL筒 [2~8°C]  
劇ルムジエブ注ミリオベン 300単位キット [冷]  
【レ】  
レギチーン注射液5mg 0.5%1mLV [冷]  
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(ウイバッガ) 1.5LP  
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(UVウイバッガ) 1.5LP  
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(ウイバッガ) 2LP  
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(UVウイバッガ) 2LP  
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(シングルバッガ・機器専用) 2.5LP  
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(シングルバッガ・機器専用) 5LP  
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(ウイバッガ) 1.5LP  
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(UVウイバッガ) 1.5LP  
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(ウイバッガ) 2LP  
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(シングルバッガ・機器専用) 2.5LP  
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(シングルバッガ・機器専用) 5LP  
レギュニールH C a 4.25腹膜透析液(シングルバッガ) 2LP  
レギュニールL C a 4.25腹膜透析液(ウイバッガ・排液用バッガ付) 2LP  
レギュニールL C a 4.25腹膜透析液(UVウイバッガ・排液用バッガ付) 2LP  
レクビオ皮下注300mgシリソジ 1.5mL筒  
劇レケンビ点滴静注200mg 2mLV [2~8°C]  
劇レケンビ点滴静注500mg 5mLV [2~8°C]

- レコベル皮下注12μgペン 0.36mLキット [2~8°C]

- レコベル皮下注36μgペン 1.08mLキット [2~8°C]

- レコベル皮下注72μgペン 2.16mLキット [2~8°C]

劇注射用レザフィリン100mg V [冷]

レスビア静注・経口液60mg 3mLV

セパーサ皮下注420mgオートミニドーザ  
3.5mLキット [2~8°C] (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
レバーサ皮下注140mgペン 1mLキット [2~8°C]  
劇レブロジル皮下注用25mg V [2~8°C]  
劇レブロジル皮下注用75mg V [2~8°C]  
劇レベスティブ皮下注用0.95mg V (溶解液付) [2~8°C][禁凍結]  
向劇レペタン注0.2mg A  
○ レベチラセタム点滴静注500mg「アル」 5mLA 【後】 (イーケプラ)  
劇レベミル注フレックスペン 300単位キット [冷]  
● 創レベミル注ベンフィル 300単位筒 [冷]  
○ レボカルニチンF F 静注1000mgシリソジ「トワ」 5mL/筒(ルアーロック) 【後】  
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 キット 【後】  
(クラビット点滴静注バッグ500mg/100mLから切替)  
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤカル」 V 【後】  
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤカル」 V 【後】  
劇レミケード点滴静注用100 100mgV [冷]  
劇レミトロ点滴静注用300μg V [2~8°C]  
麻劇レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 V 【後】  
麻劇レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 V 【後】  
【ロ】  
ロイコボリン注3mg 1mLA  
劇ロイナーゼ注用10000 10000K単位V [冷]  
劇ロカイン注1% 5mLA  
毒ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルシ」 V 【後】  
毒ロゼウス静注液40mg 4mLV 【後】 (ナベルビン注より切替)  
ロゼバラミン筋注用25mg V  
ロセファイン静注用1g V  
(セフトリアキソナトリウム静注用1g「NP」へ切替)  
劇ロピオン静注50mg 5mLA  
劇ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」 A 【後】  
ローブリン (=抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」)  
250μg V [冷]  
ロミブレート皮下注250μg調製用 V [2~8°C]  
向ロラビタ静注2mg 1mLV [2~8°C]

#### 【ワ】

ワイスター配合静注用1g V 【後】  
劇ワソラン静注5mg 2mLA  
毒ワントキソテール点滴静注20mg/1mL V  
(ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニ」へ切替)  
毒ワントキソテール点滴静注80mg/4mL V  
(ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニ」へ切替)

## 生薬

- ウチダのウイキョウM (茴香)
- 劇ウチダの烏頭 (ウズ)
- ウチダのエンゴサクM (延胡索)
- ウチダのオウギ末M (黃耆)
- ウチダのオウヒM (桜皮)
- ウチダのオンジM (遠志)
- ウチダのガイヨウM (艾葉)
- ウチダのキンギンカM (金銀花)
- ウチダのクコシM (枸杞子)
- ウチダのコウイM (膠飴)
- ウチダのコウカM (紅花)
- ウチダのゴシュユM (吳茱萸)
- ウチダのゴマM (胡麻)
- ウチダのゴミシM (五味子)
- ウチダのシコンM (紫根)
- ウチダのシソシM (紫蘇子)
- ウチダのゼンコM (前胡)
- ウチダのセンコツM (川骨)
- ウチダのソウハクヒM (桑白皮)
- ウチダのテンナンショウM (天南星)
- ウチダのテンマM (天麻)
- ウチダのテンモンドウM (天門冬)
- ウチダのトウドクカツM (唐独活)
- ウチダのニンドウM (忍冬)
- ウチダのビャクゴウM (百合)
- ウチダのビワヨウM (枇杷葉)
- 劇ウチダの附子 (ブシ)
- ウチダのボウコンM (茅根)
- 劇ウチダの炮附子 (ホウブシ)
- ウチダのマンケイシM (蔓荊子)
- ウチダのモッカM (木瓜)
- ウチダのヤクモソウM (益母草)
- ウチダのリュウガンニクM (竜眼肉)
- ウチダのリュウタンM (竜胆)
- ウチダのレンニクM (蓮肉)
- トチモトのアキョウ (阿膠)
- トチモトのイレイセン (威靈仙)
- トチモトのインチンコウ (茵陳蒿)
- トチモトのウバイ (烏梅)
- トチモトのウヤク (烏藥)
- トチモトのオウギ (黃耆)
- トチモトのオウゴン (黃芩)
- トチモトのオウバク (黃柏)
- トチモトのオウレン (黃連)
- トチモトのカシュウ (何首烏)
- トチモトのガジュツ (莪朢)
- トチモトのカッコウ (藿香)
- トチモトのカッコン (葛根)
- トチモトのカッセキ (滑石)
- トチモトのカロコン (栝樓根)
- トチモトのカロニン (栝樓仁)
- トチモトのカンキョウ (乾姜)
- トチモトのカンゾウ (甘草)
- トチモトのキキョウ (桔梗)
- トチモトのキクカ (菊花)
- トチモトのキジツ (枳殼・キコク)
- トチモトのキジツ (枳實)
- トチモトのキッピ (橘皮)
- トチモトのキョウカツ (羌活)
- トチモトのキョウニン (杏仁)
- トチモトのクジン (苦參)
- トチモトのケイガイ (荊芥)
- トチモトのケイヒ (桂皮)
- トチモトのケイヒ末 (桂皮)
- トチモトのケツメイシ (決明子)
- トチモトのゲンジン (玄參)
- トチモトのコウジン (紅參)
- トチモトのコウジン末 A M (紅參)
- トチモトのコウブシ (香附子)
- トチモトのコウベイ (粳米)
- トチモトのコウボク (厚朴)
- トチモトのゴシツ (牛膝)
- トチモトのゴボウシ (牛蒡子)
- トチモトのサイコ (柴胡)
- トチモトのサイシン (細辛)
- トチモトのサイチャ (細茶)
- トチモトのサフラン
- トチモトのサンザシ (山楂子)
- トチモトのサンシシ (山梔子)
- トチモトのサンシュユ (山茱萸)
- トチモトのサンショウ (山椒)
- トチモトのサンソウニン (酸棗仁)
- トチモトのサンヤク (山藥)
- トチモトのジオウ (乾地黃)
- トチモトのジオウ (熟地黃)
- トチモトのジオウ (生干地黃)
- トチモトのシオン (紫苑)
- トチモトのジコッピ (地骨皮)
- トチモトのシツリシ (蒺藜子)
- トチモトのシティ (柿蒂)

- トチモトのシャクヤク (芍薬)
- トチモトのシャクヤク末 (芍薬)
- トチモトのジャショウシ (蛇床子)
- トチモトのシャゼンシ (車前子)
- トチモトのジュウヤク (十薬)
- トチモトのシュクシャ (縮砂)
- トチモトのショウキョウ (生姜)
- トチモトのショウバク (小麦)
- トチモトのショウマ (升麻)
- トチモトのシンイ (辛夷)
- トチモトのセッコウ (石膏)
- トチモトのセンキュウ (川芎)
- トチモトのセンキュウ末 (川芎)
- トチモトのセンタイ (蟬退)
- トチモトのソウジュツ (蒼朮)
- トチモトのソボク (蘇木)
- トチモトのソヨウ (蘇葉)
- トチモトのダイオウ (大黃)
- トチモトのダイオウ末 (大黃)
- トチモトのタイソウ (大棗)
- トチモトのタクシャ (沢瀉)
- トチモトのタクシャ末 (沢瀉)
- トチモトのチクジョ (竹茹)
- トチモトのチクセツニンジン (竹節人参)
- トチモトのチモ (知母)
- トチモトのチョウジ (丁字)
- トチモトのチョウトウコウ (釣藤鈎)
- トチモトのチョレイ (猪苓)
- トチモトのチンピ (陳皮)
- トチモトのトウガシ (冬瓜子)
- トチモトのトウキ (当帰)
- トチモトのトウキ末 (当帰)
- トチモトのトウニン (桃仁・原形)
- トチモトのトウニン (桃仁・刻み)
- トチモトのトチュウ (杜仲)
- トチモトのニンジン (人参)
- トチモトのバイモ (貝母)
- トチモトのバクガ (麦芽)
- トチモトのバクモンドウ (麦門冬)
- トチモトのハッカ (薄荷)
- トチモトのハンゲ (半夏)
- トチモトのビャクシ (白芷)
- トチモトのビャクジュツ (白朮)
- トチモトのビャクジュツ末 (白朮)
- トチモトのビンロウジ (檳榔子)
- トチモトのブクリョウ (茯苓)
- トチモトのベッコウ (土別甲)
- トチモトのボワイ (防已)
- トチモトのボウフウ (防風)
- トチモトのボクソク (樸樹)
- トチモトのボタンピ (牡丹皮)
- トチモトのボタンピ末 (牡丹皮)
- トチモトのボレイ (牡蠣)
- トチモトのマオウ (麻黃)
- トチモトのマシニン (麻子仁)
- トチモトのモクツウ (木通)
- トチモトのモッコウ (木香)
- トチモトのヨクイニン (薏苡仁)
- トチモトのリュウコツ (竜骨)
- トチモトのリョウキョウ (良姜)
- トチモトのレンギョウ (連翹)

## 緊急限定申請薬

緊急限定薬（採用薬および院外処方専用薬）の使用期間は、原則として申請日より3ヶ月間です。継続使用が必要な場合には、次回薬事委員会までに「新規医薬品採用申請書」あるいは「院外処方専用薬登録申請書」を提出し、薬事委員会での承認が必要です。

記号なし：緊急限定採用薬

●：緊急限定院外処方専用薬

劇プログラフカプセル1mg	小児	25.10.15
劇ポシュリフ錠100mg	血内	24.03.06
ミコブティンカプセル150mg	呼内	24.09.19
劇メフィーゴパック	産婦	25.11.28
劇リマチル錠100mg	呼内	25.11.19

### 内用薬

品名	申請科	申請日
アラグリオ顆粒剤分包1.5g	泌尿	24.01.22
劇イスツリサ錠1mg	糖内	25.05.09
イソプリノシン錠400mg	脳内	24.01.22
イノベロン錠200mg	小児	25.11.19
劇ガバベンシロップ5%	薬剤	25.12.08
●劇コレアジン錠12.5mg	脳内	25.12.24
コレチメント錠9mg	消内	25.09.04
劇ジスバルカプセル40mg	心身	24.01.30
劇タグリッソ錠40mg	呼内	24.02.18
劇タブレクタ錠200mg	呼外	25.12.15
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 [治験用]	腫内	25.11.19
劇テプミトコ錠250mg	呼内	25.09.25
テルチア配合錠AP「日医工」	薬剤	25.12.12
テルミサルタン錠40mg「日医工」	薬剤	25.12.12
ネオドバストン配合錠L100	脳内	25.12.24
●ノイロビタン配合錠	脳内	26.01.06
プリンペラン錠5	薬剤	25.11.26
劇プレバイミス顆粒分包20mg	小腫	25.11.06
劇プレバイミス顆粒分包120mg	血内 小腫	25.12.10 25.11.06
劇プログラフ顆粒0.2mg	呼内 小児	26.01.05
劇プログラフカプセル0.5mg	小児	26.01.05

### 外用薬

品名	申請科	申請日
アイラミド配合懸濁性点眼液	眼科	25.12.01
アスプール液(0.5%)	小児	25.11.12
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 [治験用]	呼内	25.10.30
グラアルファ配合点眼液	眼科	25.12.01
ステロネマ注腸3mg	消内	25.05.07
●セタネオ点眼液0.002%	眼科	25.11.25
メトロニダゾールゲル0.75%「マイシ」	薬剤	25.10.28
パルミコート吸入液0.5mg	小児	25.11.10

### 注射薬

品名	申請科	申請日
劇アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL [冷]	眼科	25.11.28
アクチバシン注600万	小外	24.11.06
向アネレム静注用20mg	消内	25.11.05
●劇ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD [冷]	糖内	25.10.24
●劇ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD [冷]	糖内	25.10.24
●劇ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD [冷]	糖内	25.10.24
●劇ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD [冷]	糖内	25.10.24
●劇ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD [冷]	糖内	25.10.24
劇キャップバックス筋注シリンジ[冷]	呼内	25.12.26
劇クリースビータ皮下注20mgシリンジ [冷]	糖内	25.11.26

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

劇セプトカイン配合注カートリッジ [25°C以下]	歯科	25.12.03
劇テクベイリ皮下注30mg [冷]	血内	25.12.03
劇テクベイリ皮下注153mg [冷]	血内	25.12.03
デボ・メドロール水懸注40mg	薬剤	25.01.14
●劇トルリシティ皮下注1.5mgアテオス [冷]	糖内	25.10.24
劇小児用ヌーカラ皮下注40mgシリソジ [冷]	小児	25.11.11
劇パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サイ」	周産	26.01.06
劇ヒフデュラ配合皮下注シリソジ [冷]	脳内	25.12.15
劇ビロイ点滴静注用300mg [冷]	薬剤	26.01.05
劇メキシチール点滴静注125mg	周産	25.02.21
レギュニール LCa1.5腹膜透析液 2.5L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	26.01.05
レギュニール LCa1.5腹膜透析液 5L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	26.01.05
レギュニール LCa2.5腹膜透析液 2.5L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	26.01.05
レギュニール LCa2.5腹膜透析液 5L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	26.01.05
レギュニール LCa4.25腹膜透析液 2L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	26.01.05

※R6.9.9の薬事委員会で緊急限定採用薬の運用ルールの変更が決定されました。

- ①一つの診療科から申請され承認された緊急限定採用薬は、その診療科限定又は患者指定でのみ使用可能となる。
- ②緊急限定期間は3ヶ月間であり、購入期間は3ヶ月間で終了するが、その承認期間を終了しても在庫が残っている間はオーダ（処方・注射等）可能とする。
- ③供給停止等により直ちに代用薬を採用する必要がある場合等は、薬剤部より申請が可能となる。
- ④DPC対象病院における持参薬の取扱いに係る医薬品購入依頼書については、当該患者の入院期間が購入期間となる。他の診療科は使用不可。