

# 当 院 採 用 薬 等 一 覧 2026. 4

## 〈採用薬・院外処方専用薬〉

(2026(令和8)年4月1日より適用開始)

### 目 次

内用薬リスト	1
外用薬リスト	30
注射薬リスト	39
生 薬	53

#### 一覧中の記号注釈

本資料	オーダーリンク
マーク	表示マーク
↓	↓
記号無：採用薬 (院内・院外処方可)	：◎
※：削除予定薬	：◎
●：院外処方専用薬	：●
☆：院外処方専用予定薬	：◎
○：院内専用後発品である薬	：○
→：使用開始日に特に注意を要する採用薬	

#### 注意点

- 「削除予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、院内・院外とも全面削除になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
- 「院外処方専用予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、「院外処方専用薬」になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
- 2019(平成31)年2月1日より院外処方で一般名処方を開始しました。

2026. 3. 26  
福島県立医科大学

薬剤部

作成  
附属病院

D I室

- 無印：採用薬
- ※：削除予定薬
- ：院外処方専用薬
- ☆：院外処方専用予定薬
- 【後】：後発医薬品
- ：院内専用後発品である薬

## 内用薬リスト

### 【ア】

- 劇アイクルシ錠15mg
- 劇アイセントレス錠400mg
- アイトロール錠20mg (院内は一硝酸イソソルビド錠20mg「サリ」)
- アイピーディカプセル100 100mg
- アイピーディロシロップ5%
- 劇アイミクス配合錠H-D  
(【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替)  
劇アイミクス配合錠H-D  
(【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠へ切替)
- ~~ア~~ーガメイト20%ゼリー25g—【後】—  
(ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」へ名称変更)  
(【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25gへ切替)
- 【般】アカルボース錠50mg (グルコバイ)
- 【般】アカルボース錠100mg (グルコバイ)
- テキネトン細粒1% (【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%へ切替)  
テキネトン錠1mg (院内はビペリデン塩酸塩錠1mg「アル」)  
(【般】ビペリデン塩酸塩錠1mgへ切替)
- ~~ア~~タタリット錠100mg (2026年3月31日経過措置終了)  
(モーバー錠100mgへ切替)
- テタトスO-D錠15mg (院内はピオグリタゾンO-D錠15mg「VTRS」)  
(【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mgへ切替)
- テタトスO-D錠30mg (【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mgへ切替)
- 劇アタトネル錠2.5mg (【般】リセドロン酸Na錠2.5mgへ切替)
- 劇アタトネル錠17.5mg (【般】リセドロン酸Na錠17.5mgへ切替)  
劇アタトネル錠75mg (リセドロン酸Na錠75mg「ト7」へ切替)
- 劇アグリリンカプセル0.5mg
- アコニンサン錠 166.67mg ST-01  
アコファイド錠100mg
- アサヨール錠400mg (院内はメサラジン腸溶錠400mg「サリ」)  
(【般】メサラジン腸溶錠400mgへ切替)  
アザルフィジンEN錠500mg  
(【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mgへ切替)
- 【般】アシクロビル顆粒40% (ゾピラックス)  
アシクロビル錠200mg「サリ」 【後】 (【般】なし)
- ~~ア~~シクロビル錠200mg (ゾピラックス)—
- アジスロマイシン錠250mg「ト7」 【後】  
~~ア~~シテアダニ舌下錠100単位 (I R)—
- アシテアダニ舌下錠300単位 (I R)  
アシノン錠75mg
- 【般】アジスロマイシン細粒10% (ジスロマック)
- 【般】アジスロマイシン錠250mg (ジスロマック)
- ~~ア~~ジルサルタン錠10mg (アジルバ)—
- 【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠10mg (アジルバ)
- ~~ア~~ジルサルタン錠20mg (アジルバ)—
- ~~ア~~ジルサルタン錠40mg (アジルバ)—
- 劇【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 (サクラ配合錠H-D)
- アジルサルタンO-D錠10mg「DSEP」 【後】
- アジルバ顆粒1%  
アジルバ錠10mg (【般】アジルサルタン錠10mgへ切替)—  
アジルバ錠20mg (【般】アジルサルタン錠20mgへ切替)—  
アジルバ錠40mg (【般】アジルサルタン錠40mgへ切替)—
- 劇アジレクト錠0.5mg  
劇アジレクト錠1mg

- 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 1g/包 (シナール)  
アストミン錠10mg  
アストミンシロップ0.25%  
アスパラカリウム錠300mg
- アスパラ配合錠  
アスピリン原末「マルイ」
- 【般】アスピリン腸溶錠100mg (バイアスピリン)
- 劇アスベノンカプセル10mg (院内はアプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」)  
(【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mgへ切替)  
アスベリン散10%  
アスベリンシロップ0.5%
- 【般】アズレンホル酸Na・L-グルタミン配合顆粒0.67g (マーズレンS)
- アズロキサ錠15mg
- ~~ア~~セトアミノフェン細粒50% (カロナール)—
- 【般】アセトアミノフェン錠200mg (カロナール)
- 【般】アセトアミノフェン錠300mg (カロナール)
- アセトアミノフェン錠300mg「マルイ」 【後】
- 劇アセトアミノフェン錠500mg「マルイ」—【後】—  
(アセトアミノフェン錠300mg「マルイ」へ切替)
- 【般】アセトアミノフェン錠500mg (カロナール)
- 【般】アセトアミノフェンシロップ2% (カロナール)
- 【般】アセトアミノフェンシロップ用40% (カロナール)  
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL/瓶  
アセノベル徐放錠500mg
- アゼプチン錠1mg
- 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg (アゼプチン)
- アゼルニジピン錠16mg「ト7」 【後】
- 【般】アゼルニジピン錠16mg (カルブロック)  
アゾセミド錠30mg「JG」 【後】
- ~~ア~~ゾセミド錠30mg (ダイアート)—
- ~~ア~~ゾセミド錠60mg「JG」—【後】—
- 【般】アゾセミド錠60mg (ダイアート)
- アダプチノール錠5mg
- アタラックス錠10mg
- 劇アダラートH錠10mg
- 劇アダラートH錠20mg (院内はニフェジピンL錠20mg「サリ」)
- 劇アダラートCR錠20mg
- 劇アダラートCR錠40mg
- アーチスト錠2.5mg (院内はカルベジローレル錠2.5mg「ト7」)
- ~~ア~~ーチスト錠10mg (院内はカルベジローレル錠10mg「ト7」)  
(【般】カルベジローレル錠10mgへ切替)
- アデカット15mg錠
- アデカット30mg錠
- アテディオ配合錠
- ~~ア~~テノロール錠50mg「NikP」—【後】—
- 【般】アテノロール錠50mg (テノーミン)  
アデホスコワ顆粒10% [1g/P]
- アデホスコワ腸溶錠20 20mg (【般】なし)  
劇アデムバス錠0.5mg  
劇アデムバス錠1.0mg
- テレラック錠10—10mg (【般】シルニジピン錠10mgへ切替)
- テレラック錠20—20mg (【般】シルニジピン錠20mgへ切替)
- ~~ア~~ーテン散1% (【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%へ切替)  
アーテン錠(2mg) (【般】加算なし)  
アドニルカ錠20mg (タダラフィル錠20mg A D「TE」へ切替)
- ~~ア~~トローゼット配合錠H-D  
(【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠へ切替)  
アドニルペン原末 (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了予定)

- アドナ散10% (【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%へ切替)  
アドナ錠30mg (カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」へ切替)  
(【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mgへ切替)
- 【般】アトモセチンカプセル5mg (ストラテラ)
- 【般】アトモセチンカプセル10mg (ストラテラ)
- 【般】アトモセチンカプセル25mg (ストラテラ)
- 【般】アトモセチンカプセル40mg (ストラテラ)
- 劇アトモセチン錠5mg「ト7」 【後】  
(院外は【般】アトモセチン錠5mgへ切替)
- 劇アトモセチン錠25mg「ト7」 【後】  
(院外は【般】アトモセチン錠25mgへ切替)
- 【般】アトモセチン錠5mg
- 【般】アトモセチン錠25mg
- 【般】アトモセチン経口液0.4% (ストラテラ)
- アトルバスタチン錠10mg「日医工」【後】
- 【般】アトルバスタチン錠10mg (リピトール)
- アトルバスタチンOD錠5mg「ト7」 【後】
- 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg (リピトールOD)  
毒アトロピン硫酸塩水和物「缸」原末
- 劇アナストロゾール錠1mg「ト7」 【後】
- 【般】アナストロゾール錠1mg (アリミデックス)
- 劇アナストロゾール錠1mg「明治」【後】  
アナフラニール錠10mg
- アナフラニール錠25mg
- アバゾド錠50mg (【般】イルベサルタン錠50mgへ切替)  
アバゾド錠100mg (イルベサルタン錠100mg「DSPB」へ切替)  
(【般】イルベサルタン錠100mgへ切替)
- アバゾド錠200mg (【般】イルベサルタン錠200mgへ切替)
- 【般】アピラテロン酢酸エステル錠250mg (ザイティガ)
- 劇アフィニトール錠2.5mg  
劇アフィニトール錠5mg
- 麻劇アブストラル舌下錠100μg
- 麻劇アブストラル舌下錠200μg
- 麻劇アブストラル舌下錠400μg
- 劇アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 【後】
- 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg (アスペノン)  
アプレゾリン錠10mg
- アプレピタントカプセル80mg「NK」 【後】
- 【般】アプレピタントカプセル80mg (イメンド)
- アプレピタントカプセル125mg「NK」 【後】
- 【般】アプレピタントカプセル125mg (イメンド)
- 劇アペロックス錠400mg
- 劇アボルブカプセル0.5mg  
(【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AVへ切替)
- 劇アマージ錠2.5mg (【般】ナラトリプタン錠2.5mgへ切替)
- 劇アマサール0.5mg錠 (【般】グリメピリド錠0.5mgへ切替)
- 劇アマリール1mg錠 (院内はグリメピリド錠1mg「ト7」)
- 劇アマサール3mg錠 (【般】グリメピリド錠3mgへ切替)
- アマンタジン塩酸塩錠50mg「サウ」 【後】
- アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」【後】
- 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10% (シンメトレル)
- 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg (シンメトレル)
- 毒アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 【後】
- 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg (アンカロン)  
アミティーザカプセル12μg
- アミティーザカプセル24μg  
アミノレバンE N配合散 (フルーツ味) [50g/P]
- アミノレバンE N配合散 (コーヒー味) [50g/P]
- アミュー配合顆粒 [2.5g/P]  
劇アムノレイク錠2mg
- 劇アムバロ配合OD錠「ト7」【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)
- 劇アムバロ配合OD錠「日医工」 【後】
- 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠 (カデュエット2番)
- 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠 (カデュエット4番)
- 劇アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」【後】
- 劇アムロジピンOD錠2.5mg「サウ」 【後】
- 劇アムロジピンOD錠5mg「サウ」【後】
- 劇アムロジピンODフィルム5mg「QQ」【後】
- 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 【般】アムロジピン錠2.5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 【般】アムロジピン錠5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 劇アムロジン錠2.5mg
- 劇アムロジンOD錠2.5mg
- 劇アムロジンOD錠5mg
- アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「ト7」 【後】
- 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg (リズミック)  
アメンナリーフ錠200mg
- アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 【後】 (【般】なし)
- 【般】アモキシシリンカプセル250mg (サワシリン)
- 【般】アモキシシリン細粒20% (ワイドシリン細粒)
- 劇アモバン錠7.5→7.5mg (2027年3月31日経過措置終了)  
(【般】ゾピクロン錠7.5mgへ切替)
- 【般】アラセプリル錠25mg (セタプリル)  
アラベル内用剤1.5g [1.5g/瓶]
- アリッサ配合錠  
劇アリセプトドライシロップ1%
- 劇アサセプト錠3mg (【般】ドネペジル塩酸塩錠3mgへ切替)
- 劇アサセプト錠5mg (【般】ドネペジル塩酸塩錠5mgへ切替)
- 劇アサセプト錠3mg  
(【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mgへ切替)  
劇アサセプト錠5mg (院内はドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」)  
(【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 劇アサセプト錠10mg  
(【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- 劇アーリーダ錠60mg  
25mgアサナミンF糖衣錠 (院内はフルスルチアミン錠25mg「ト7」)  
(【般】フルスルチアミン錠25mgへ切替)
- 劇アリピラゾール錠1mg「サウ」 【後】  
(エビリファイ錠1mgから切替)
- 【般】アリピラゾール散1% (エビリファイ)
- 【般】アリピラゾール口腔内崩壊錠24mg (エビリファイ)
- 【般】アリピラゾール錠1mg (エビリファイ)
- 【般】アリピラゾール錠3mg (エビリファイ)
- 【般】アリピラゾール錠6mg (エビリファイ)
- 【般】アリピラゾール錠12mg (エビリファイ)
- 【般】アリピラゾール経口液0.1%1mL (エビリファイ)
- 【般】アリピラゾール経口液0.1%3mL (エビリファイ)
- 【般】アリピラゾール経口液0.1%6mL (エビリファイ)
- 【般】アリピラゾール経口液0.1%12mL (エビリファイ)
- 劇アサミデックス錠1mg (アナストロゾール錠1mg「ト7」へ切替)  
(【般】アナストロゾール錠1mgへ切替)
- アリメジンシロップ0.05%  
アルギU配合顆粒  
毒アルケラン錠2mg [冷]

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- テルサルミン内用液10%—[10mL/P]  
 (院内はスクラルファート内用液10%[NIG])  
 (【般】スクラルファート経口液10%へ切替)
- 劇アルシオドールカプセル1μg—【後】—  
 (【般】アルファカルシドールカプセル1μgへ切替)  
 アルダクトンA細粒10%  
 テルダクトンA錠25mg—(スピロラクトン錠25mg[ト7]へ切替)  
 (【般】スピロラクトン錠25mgへ切替)
- アルタットカプセル75mg  
 アルドメット錠250 250mg
- 劇アルファカルシドールカプセル0.25μg[ト7]—【後】—
- 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg(アルファロール)
- 劇アルファカルシドールカプセル1μg[ト7]—【後】—
- 【般】アルファカルシドールカプセル1μg(アルファロール)
- 劇アルファカルシドール錠0.25μg[アム] 【後】
- 劇アルファカルシドール錠0.5μg[アム]—【後】—  
 (アルファカルシドール錠0.25μg[アム]へ切替)
- 【般】アルファカルシドール錠0.25μg(ワンアルファ)
- 【般】アルファカルシドール錠0.5μg(ワンアルファ)
- 劇アルファロールカプセル0.25μg  
 (【般】アルファカルシドールカプセル0.25μgへ切替)  
 劇アルファロールカプセル1μg  
 (【般】アルファカルシドールカプセル1μgへ切替)  
 劇アルファロール内用液0.5μg/mL [10mL/瓶]
- 向アルプラゾラム錠0.4mg[ト7] 【後】
- 劇アルプラゾラム錠0.4mg(ソラナックス)  
 アルロイドG内用液5% [600mL/瓶]
- 劇アルンブリグ錠30mg
- 劇アルンブリグ錠90mg
- テレギサル錠10mg
- テレギサルドドライシロップ0.5%  
 (【般】ペミロラストKシロップ用0.5%へ切替)
- テレダラ錠30mg (【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mgへ切替)
- テレダラ錠60mg (院内はフェキソフェナジン塩酸塩錠60mg[ト7])  
 (【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mgへ切替)  
 テレジオンドドライシロップ1%  
 (院内はエピナスチン塩酸塩DS小児用1%[ト7])  
 (【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1%へ切替)  
 テレジオン錠20—20mg (【般】エピナスチン塩酸塩錠20mgへ切替)  
 (エピナスチン塩酸塩錠20mg[ケ7]へ切替)  
 劇アレセンサカプセル150mg  
 劇アレビアチン散10%  
 アレビアチン錠100mg
- テレロッタ顆粒0.5%—[0.5g/P]  
 (【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g(包)へ切替)
- テレロッタOD錠5mg  
 (院内はオロパタジン塩酸塩OD錠5mg[ト7])  
 (【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 【般】アレンドロン酸錠5mg(ボナロン)
- 劇アレンドロン酸錠35mg[ト7] 【後】
- 【般】アレンドロン酸錠35mg(ボナロン)  
 アローゼン顆粒 [0.5g/P]  
 (【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包へ切替)
- テロチノール塩酸塩錠10mg[DSP]  
 (アルマール錠10より名称変更)
- 【般】アロチノール塩酸塩錠10mg(アルマール)
- アロプリノール錠100mg[アハ]—【後】—  
 (アロシトル錠100mgから名称変更)  
 (アロプリノール錠100mg[ニ7]へ名称変更)
- アロプリノール錠100mg[ニ7] 【後】
- 【般】アロプリノール錠100(アロシトル)
- アロマン錠25mg (【般】エキセメスタン錠25mgへ切替)
- 毒アムカロン錠100mg(アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg[TE]へ切替)  
 劇アンコチル錠500mg
- アンジュ28(保険適用外)
- 劇安息香酸ナトリウムカフェイン末  
 劇安息香酸ナトリウム[コザカ・M](院内製剤)
- アンプレラゲ錠50mg  
 (院内はサルボグレラート塩酸塩錠50mg[ト7])  
 (【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mgへ切替)
- アンプレラゲ錠100mg  
 (【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mgへ切替)
- 【般】アンプリセンタン錠2.5mg(ヴォリプリス)
- アンプロキソール塩酸塩錠15mg[ト7] 【後】
- 【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg(ムコソルバン)
- 【般】アンプロキソール塩酸塩徐放錠45mg(ムコソルバン)
- 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3%(ムコソルバン)
- 劇アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5%(ムコソルバン)
- 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用3%(ムコソルバン)
- 【イ】
- イグザレトドライシロップ小児用103.4mg
- ※ イグザレト錠2.5mg
- ※ イグザレトOD錠10mg  
 (リバーロキサバンOD錠10mg[ハイル]へ切替)  
 (【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- ※ イグザレトOD錠15mg  
 (リバーロキサバンOD錠15mg[ハイル]へ切替)  
 (【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mgへ切替)
- 劇イクスタンジ錠40mg
- 劇イクスタンジ錠80mg  
 劇イグラチモド錠25mg「あゆみ」
- 【般】イグラチモド錠25mg(ケアラム)  
 イーケプラドドライシロップ50% (レベチラセタムDS50%[ト7]へ切替)  
 (【般】レベチラセタムシロップ用50%へ切替)  
 イーケプラ錠500mg (レベチラセタム錠500mg[サ7]へ切替)  
 (【般】レベチラセタム錠500mgへ切替)
- 【般】イコサベント酸エチルカプセル300mg(エパデール)
- イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg[TC] 【後】
- 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg(エパデール)  
 イスコチン原末  
 イスコチン錠100mg
- 劇イストリサ錠1mg [25°C以下]
- イソソルビド内用液70%分包40mL[CEO] 【後】
- イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」  
 (メニレット70%ゼリー20gから名称変更)
- イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」  
 (メニレット70%ゼリー30gから名称変更)
- 【般】イソソルビド経口液70%40mL(イソバイト)  
 (2026年3月31日削除予定)
- イソバイドシロップ70%分包20mL  
 イソバイドシロップ70%分包30mL
- イソプリノシン錠400mg
- 劇イソプリノシン錠400mg配合顆粒4.74g/包(リツケル)

- 一硝酸イソソルビド錠20mg「サウ」 【後】  
(アイトロール錠20mgより切替)
- ~~【般】一硝酸イソソルビド錠20mg~~ (アイトロール)
- イトブリド塩酸塩錠50mg「サウ」 【後】
- 【般】イトブリド塩酸塩錠50mg (ガナトン)
- イトラコナゾール錠50mg「科研」 【後】
- 【般】イトラコナゾールカプセル50mg (イトリゾール)
- イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 【後】  
(【般】イトラコナゾール経口液1%)
- イトサゾールカプセル50mg  
(【般】イトラコナゾールカプセル50mg)  
イトサゾール内用液1%  
(イトラコナゾール内用液1%「VTRS」へ切替)
- 【般】イトラコナゾール経口液1% (イトリゾール)  
劇イニシク配合錠  
イノソリッド配合経腸用半固形剤
- イノベロン錠200mg  
イノラス配合経腸用液(紅茶フレーバー) [125mL/袋]  
イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) [125mL/袋]  
イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー) [187.5mL/袋]  
イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー) [187.5mL/袋]  
イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー) [187.5mL/袋]
- ~~E-P七カプセル250mg~~【後】 (2026年3月31日経過措置終了)  
(【般】ポリエノスファチジルコリンカプセル250mgへ切替)  
劇イフェクサーSRカプセル37.5mg  
劇イフェクサーSRカプセル75mg  
麻劇イーフェンバツカル錠50μg (販売中止)
- 麻劇イーフェンバツカル錠400μg (販売中止)
- 麻劇イーフェンバツカル錠600μg (販売中止)
- 麻劇イーフェンバツカル錠800μg (販売中止)
- イフェンプロゾル酒石酸塩錠20mg「日医王」【後】
- ~~【般】イフェンプロゾル酒石酸塩錠20mg~~ (セロクラール)  
イブプロフェン錠100mg「NIG」 【後】 (【般】なし)  
劇イブランス錠25mg  
劇イブランス錠125mg
- 劇イマチニブ錠100mg「サウ」 【後】
- 【般】イマチニブ錠100mg (グリベック)
- 劇イマチニブ錠200mg「明治」【後】
- 【般】イマチニブ錠200mg (グリベック)
- 劇イミダラン錠50—50mg (【般】スマトリプタン錠50mgへ切替)
- 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg (ステープラOD)
- イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハ」 【後】
- 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg (タナトリル)  
劇イムセラカプセル0.5mg  
劇イムブルピカカプセル140mg  
イムラン錠50mg  
イメンドカプセル80mg  
(アプレピタントカプセル80mg「NK」へ切替)  
(【般】アプレピタントカプセル80mgへ切替)  
イメンドカプセル125mg  
(アプレピタントカプセル125mg「NK」へ切替)  
(【般】アプレピタントカプセル125mgへ切替)
- 劇イリボーOD錠2.5μg
- 劇イリボーOD錠5μg
- ~~【般】イルソゲラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠4mg~~ (ガスロンN)
- イルトラ配合錠LD
- イルトラ配合錠HD
- 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 (アイミクスLD)
- 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 (アイミクスHD)
- イルベサルタン錠100mg「DSPB」 【後】
- 【般】イルベサルタン錠50mg (アバプロ)
- 【般】イルベサルタン錠100mg (アバプロ)
- 【般】イルベサルタン錠200mg (アバプロ)  
劇イレッサ錠250—250mg (ゲフィチニブ錠250mg「NK」へ切替)  
(【般】ゲフィチニブ錠250mgへ切替)  
劇インヴェガ錠3mg
- インクレミンシロップ5% 【後】  
(【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%へ切替)  
劇インチュニブ錠1mg
- 劇インチュニブ錠3mg  
劇インデラル錠10mg (【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mgへ切替)
- インヒベース錠0.5—0.5mg (【般】シラザプリル錠0.5mgへ切替)
- 劇インフリーSカプセル200mg
- 劇インプロメニ細粒1% (【般】プロムペリドール細粒1%へ切替)
- 劇インプロメニ錠1mg (【般】プロムペリドール錠1mgへ切替)
- 劇インプロメニ錠3mg (【般】プロムペリドール錠3mgへ切替)  
劇インライタ錠1mg  
劇インライタ錠5mg
- 【ウ】
- 劇ヴァイトラックピカプセル25mg
- 劇ヴァイトラックピカプセル100mg  
劇ヴァンフリタ錠17.7mg  
劇ヴァンフリタ錠26.5mg
- 劇ウインタミン細粒(10%)  
劇ウェリレグ錠40mg  
劇ヴォトリエント錠200mg  
ヴォリプリス錠2.5mg (【般】アンプリセンタン錠2.5mgへ切替)  
ウチダのオウギ末M  
ウチダの八味丸M [20丸/P]  
ウテメサン錠5mg (【般】リトドリン塩酸塩錠5mgへ切替)  
(院内はリトドリン塩酸塩錠5mg「日新」)  
ウブトラビ錠0.2mg  
ウブトラビ錠0.4mg
- 毒ウブレチド錠5mg
- ウラリット-U配合散 [1g/P]
- ウラリット配合錠
- ウリアデック錠40mg
- ウルゲートカプセル200mg  
ウルソ顆粒5%  
ウルソ錠100mg (ウルソデオキシコール酸錠100mg「トワ」へ切替)
- ~~【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg~~  
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トワ」 【後】
- ~~【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg~~  
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トワ」 【後】
- ウロカルン錠225mg
- 【エ】
- エカード配合錠E-D  
(【般】カンデサルタン4mg・ヒドクロキサジド配合錠へ切替)
- エカード配合錠E-H  
(【般】カンデサルタン8mg・ヒドクロキサジド配合錠へ切替)
- ~~【般】エカベトNa顆粒66.7%—1.5g/包~~ (ガストローム)
- 【般】エキセメスタン錠25mg (アロマシン)  
エタテ錠50mg (【般】ビルダグリプチン錠50mgへ切替)  
(ビルダグリプチン錠50mg「トワ」へ切替)

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- 劇エタセゲラン散20% (【般】ゾニサミド散20%へ切替)
- 劇エタセゲラン錠100mg (【般】ゾニサミド錠100mgへ切替)  
 劇エクフィナ錠50mg  
 劇エクメット配合錠L D  
 (院外は【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠へ切替)
- 劇エタメット配合錠H D  
 (院外は【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠へ切替)  
 劇エサンプトール錠250mg  
 劇エジュラント錠25mg
- エーヌコール錠2mg (院内はテモカプリル塩酸塩錠2mg【後】)  
 (【般】テモカプリル塩酸塩錠2mgへ切替)
- 【般】エスシタロプラム錠10mg (レクサプロ)
- S G配合顆粒 [1g/P]
- エズピクロン錠1mg【日新】 【後】
- 【般】エズピクロン錠1mg (ルネスタ)
- 【般】エズピクロン錠2mg (ルネスタ)
- 向エスタゾラム錠2mg【後】
- 【般】エスタゾラム錠2mg (ユーロジン)
- 劇エストロサイトカプセル156.7mg 140mg [冷]
- 【般】エストラジオール錠0.5mg (ジュリナ)
- エストリアル錠1mg
- 劇エスワンタイホウ配合OD錠T20 【後】 (20mgテガフル相当量)  
 (【般】テガフル20mg・ギメナル・チラシル配合口腔内崩壊錠へ切替)
- 劇エスワンタイホウ配合OD錠T25 【後】 (25mgテガフル相当量)  
 (【般】テガフル25mg・ギメナル・チラシル配合口腔内崩壊錠へ切替)
- エゼチミブ錠10mg【JG】 【後】
- 【般】エゼチミブ錠10mg (ゼチアア)
- 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠 (アトベットL D)
- 【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠 (ロスベットH D)
- エソメプラゾールカプセル10mg【トワ】 【後】
- 【般】エソメプラゾールカプセル10mg (ネキシウム)
- エソメプラゾールカプセル20mg【トワ】 【後】
- 【般】エソメプラゾールカプセル20mg (ネキシウム)
- 【般】エチゾラム細粒1% (デパス)
- 向エチゾラム錠0.5mg【EMEC】 【後】
- 【般】エチゾラム錠0.5mg (デパス)
- 劇エックスタフォージ配合錠  
 (【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠へ切替)  
 劇エックスタフォージ配合OD錠  
 (院内はアムバロ配合OD錠【トワ】へ切替)  
 (【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠へ切替)  
 劇エディロールカプセル0.75μg  
 (【般】エルデカルシトールカプセル0.75μgへ切替)  
 (エルデカルシトールカプセル0.75μg【トワ】へ切替)
- 劇エトドラク錠200mg【SW】 【後】
- 【般】エトドラク錠200mg (ハイベン)
- 劇エドルミズ錠50mg
- エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg【トワ】 【後】
- 【般】エナラズサルマレイン酸塩錠2.5mg (レニベース)  
 エナプリルマレイン酸塩錠5mg【トワ】 【後】
- 【般】エナラズサルマレイン酸塩錠5mg (レニベース)
- 劇エナロイ錠2mg
- 劇エナロイ錠4mg  
 エネーゴ配合経腸用液 [250mL/缶]
- 【般】エバステル口腔内崩壊錠5mg (エバステル)
- 【般】エバステル口腔内崩壊錠10mg (エバステル)
- 【般】エバステル錠10mg (エバステル)
- エバステル錠10mg (【般】エバステル錠10mgへ切替)
- エバステルOD錠5mg (【般】エバステル口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- エバステルOD錠10mg  
 (【般】エバステル口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- エバデールE Mカプセル2g
- エバデールカプセル300mg  
 (【般】イコサベント酸エチルカプセル300mgへ切替)
- エバデールS 900—900mg  
 (【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mgへ切替)
- 向エバミール錠1.0 1mg
- エバルレスタット錠50【EK】—50mg—【後】
- エバルレスタット錠50mg【VTRS】 【後】
- 【般】エバルレスタット錠50mg (キネダック)
- エビスタ錠60mg  
 (【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mgへ切替)
- エピナスチン塩酸塩錠20mg【ケミア】 【後】
- 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg  
 劇エビビル錠150 150mg
- エビプロスタット配合錠S G  
 (【般】オキサメチン1.0mg・オキサメチン等配合錠へ切替)
- 劇エビサライア散1% (【般】アリピラゾール散1%へ切替)  
 劇エビサライア錠1mg (院内はアリピラゾール錠1mg【後】へ切替)  
 (【般】アリピラゾール錠1mgへ切替)
- 劇エビサライア錠3mg (【般】アリピラゾール錠3mgへ切替)  
 劇エビリファイ錠6mg (【般】アリピラゾール錠6mgへ切替)
- 劇エビサライア錠12mg (【般】アリピラゾール錠12mgへ切替)
- 劇エビサライアOD錠24mg  
 (【般】アリピラゾール口腔内崩壊錠24mgへ切替)  
 劇エビリファイ内用液0.1% [1mL/包]  
 (【般】アリピラゾール経口液0.1%1mLへ切替)
- 劇エビサライア内用液0.1%—[3mL/包]  
 (【般】アリピラゾール経口液0.1%3mLへ切替)
- 劇エビリファイ内用液0.1% [6mL/包]  
 (【般】アリピラゾール経口液0.1%6mLへ切替)
- 劇エビサライア内用液0.1%—[12mL/包]  
 (【般】アリピラゾール経口液0.1%12mLへ切替)
- エフィエント錠2.5mg  
 エフィエント錠3.75mg  
 エフィエントOD錠20mg
- エブクルーサ配合錠  
 覚劇エフピーOD錠2.5 2.5mg  
 (【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mgへ切替)
- エフメノカプセル100mg  
 エブランチルカプセル15mg  
 劇エブリスディドライシロップ60mg [25°C以下]
- 【般】エプレレノン錠25mg (セララ)
- エプレレノン錠50mg【杏林】 【後】
- 【般】エプレレノン錠50mg (セララ)
- エペリゾン塩酸塩錠50mg【トワ】 【後】
- 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg (ミオナール)  
 劇エベレンゾ錠20mg  
 劇エベレンゾ錠50mg
- エボザックカプセル30mg
- 劇エミレース錠3mg  
 麻劇MS コンチン錠10mg
- 麻劇MS コンチン錠60mg  
 エリキユース錠2.5mg  
 エリキユース錠5mg  
 エリスロシンドライシロップW20%

- エリスロシン錠100mg
- モルカルチンF F錠250mg  
(レボカルニチンF F錠250mg「ト」へ切替)  
(【般】レボカルニチンF F錠250mgへ切替)  
モルカルチンF F内用液10%  
(レボカルニチンF F内用液10%「ト」へ切替)  
(【般】レボカルニチンF F経口液10%へ切替)  
L-ケフレックス顆粒 [1g/包]
- エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「ト」 【後】
- 【般】エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g (エディロールカプセル)
- 【般】エルロチニブ錠25mg (タルセバ)
- 【般】エルロチニブ錠100mg (タルセバ)
- 【般】エルロチニブ錠150mg (タルセバ)
- エレンタール配合内用剤 [80g/P]
- エレンタール配合内用剤 [80g/ガラス容器] (販売中止)
- エレンタールP乳幼児用配合内用剤 [80g/P]
- 劇塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」
- エンシュア・H (バニラ) [250mL/缶]
- エンシュア・H (バナナ) [250mL/缶]
- エンシュア・H (コーヒー) [250mL/缶]
- エンシュア・H (黒糖) [250mL/缶]
- エンシュア・H (メロン) [250mL/缶]
- エンシュア・リキッド [250mL/缶]
- エンタカポン錠100mg「JG」 【後】
- 【般】エンタカポン錠100mg (コムタン)
- 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg (バラクルード)
- 劇エンテカビルO D錠0.5mg「741」 【後】
- 劇エンドキサン錠50mg
- エンレスト錠50mg
- エンレスト錠100mg
- エンレスト錠200mg
- 【オ】
- 【般】オウマガサウキ1.0mg・ハヤキキ等配合錠 (エビプロスタット)
- 【般】オキサトミド錠30mg (セルテクト)
- 【般】オキサトミドシロップ用2% (セルテクト)
- 麻劇オキシコドン錠2.5mg N X「第一三共」 【後】  
(【般】オキシコドン錠2.5mg (乱用防止製剤)へ切替)
- 麻劇オキシコドン錠5mg N X「第一三共」 【後】  
(【般】オキシコドン錠5mg (乱用防止製剤)へ切替)
- 麻劇オキシコドン錠10mg N X「第一三共」 【後】  
(【般】オキシコドン錠10mg (乱用防止製剤)へ切替)
- 麻劇オキシコドン錠20mg N X「第一三共」 【後】  
(【般】オキシコドン錠20mg (乱用防止製剤)へ切替)
- 麻劇【般】オキシコドン錠2.5mg (乱用防止製剤)
- 麻劇【般】オキシコドン錠5mg (乱用防止製剤)
- 麻劇【般】オキシコドン錠10mg (乱用防止製剤)
- 麻劇【般】オキシコドン錠20mg (乱用防止製剤)
- 麻劇オキシコドン徐放錠5mg N X「第一三共」【後】 (【般】なし)  
(オキシコンチンTR錠5mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン徐放錠10mg N X「第一三共」【後】 (【般】なし)  
(オキシコンチンTR錠10mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン徐放錠20mg N X「第一三共」【後】 (【般】なし)  
(オキシコンチンTR錠20mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン徐放錠40mg N X「第一三共」【後】 (【般】なし)  
(オキシコンチンTR錠40mgへ切替)
- 麻劇【般】オキシコドン経口液2.5mg (オキシコドン内服液)
- 麻劇【般】オキシコドン経口液5mg (オキシコドン内服液)
- 麻劇【般】オキシコドン経口液10mg (オキシコドン内服液)
- 麻劇【般】オキシコドン経口液20mg (オキシコドン内服液)
- 麻劇オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」 2.5mL/包 【後】  
(【般】オキシコドン経口液2.5mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン内服液5mg「日本臓器」 2.5mL/包 【後】  
(【般】オキシコドン経口液5mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン内服液10mg「日本臓器」 5mL/包 【後】  
(【般】オキシコドン経口液10mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン内服液20mg「日本臓器」 5mL/包 【後】  
(【般】オキシコドン経口液20mgへ切替)
- 麻劇オキシコンチンTR錠5mg (【般】なし)
- 麻劇オキシコンチンTR錠10mg (【般】なし)
- 麻劇オキシコンチンTR錠20mg (【般】なし)
- 麻劇オキシコンチンTR錠40mg (【般】なし)
- 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg (ポラキス)
- 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg (ポラキス)
- 麻劇オキノーム散2.5mg (院内はオキノーム錠2.5mg N X「第一三共」)
- 麻劇オキノーム散5mg (院内はオキノーム錠5mg N X「第一三共」)
- 麻劇オキノーム散10mg (院内はオキノーム錠10mg N X「第一三共」)
- 麻劇オキノーム散20mg (院内はオキノーム錠20mg N X「第一三共」)
- オーグメンチン配合錠250RS
- オース 桂枝加苓朮附湯エキスG [3.0g]SG-18R
- オース 小半夏加茯苓湯エキスG [1.0g]SG-21
- オース 大黃甘草湯エキスT錠 [2錠/P]SG-84T
- オスポロット錠50mg
- オゼックス細粒小児用15%—150mg/g  
(【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%へ切替)
- オゼックス錠150 150mg
- オセルタミビルカプセル75mg「741」 【後】
- 【般】オセルタミビルカプセル75mg (タミフル)
- 【般】オセルタミビルシロップ用3% (タミフル)
- 劇オダイン錠125mg (【般】フルタミド錠125mgへ切替)
- 劇オテズラ錠10mg
- 劇オテズラ錠20mg
- 劇オテズラ錠30mg
- 劇オデフシ配合錠  
オノンドライシロップ10%  
(プララルカストドライシロップ10%「AFP」へ切替)  
(【般】プララルカストシロップ用10%へ切替)
- オノンカプセル112.5mg  
(院内はプララルカストカプセル112.5mg「741」)  
(【般】プララルカストカプセル112.5mgへ切替)
- オニアルモン錠5 $\mu$ g  
(【般】リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ gへ切替)
- 劇オフエブカプセル100mg
- 劇オフエブカプセル150mg
- 劇オブスミット錠10mg
- 麻劇オブソ内服液5mg [2.5mL/P]
- 麻劇オブソ内服液10mg [5mL/P]
- 劇オペブリム 1カプセル500mg
- 劇オムジャラ錠100mg
- 劇オムジャラ錠150mg
- オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ト」 【後】
- 【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g (ロトリガ)
- 【般】オメプラゾール錠10mg (オメプラール)
- オメプラゾール腸溶錠20mg「武田741」【後】
- 【般】オメプラゾール錠20mg (オメプラール)

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- オメプラザン錠10mg (【般】オメプラゾール錠10mgへ切替)
- オメプラザン錠20mg (【般】オメプラゾール錠20mgへ切替)
- オラベナム小児用細粒10% 100mg/g
- 【般】オランザピン細粒1% (ジプレキサ)
- 劇オランザピン錠2.5mg「アム」 【後】
- 【般】オランザピン錠2.5mg
- 劇オランザピンO D錠5mg「ト7」 【後】
- 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg
- 【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mg (ジプレキサ)
- 劇オルケディア錠1mg
- 劇オルケディア錠4mg
- 劇オルミエント錠2mg
- 劇オルミエント錠4mg
- オルメサルタンO D錠20mg「DSEP」 【後】
- ~~【般】~~オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg (オルメテック)
- 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg (オルメテック)
- 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg (オルメテック)
- 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg (オルメテック)
- オルメテックO D錠5mg
- オルメテックO D錠10mg
- オルメテックO D錠20mg
- (院内はオルメサルタンO D錠20mg「DSEP」)
- オルメテックO D錠40mg
- 【般】オロパジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g (包) (アレロック)
- オロパジン塩酸塩O D錠5mg「ト7」 【後】
- 【般】オロパジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg (アレロック)
- オンダリザ錠2.5mg (【般】サキサグリブチン錠2.5mgへ切替)
- オンダリザ錠5mg (【般】サキサグリブチン錠5mgへ切替)
- 劇オンジェンティス錠25mg
- 【カ】
- 劇カイトリル錠1mg
- ガスオン錠40mg (ジメチコン錠40mg「YD」へ切替)
- (【般】ジメチコン錠40mgへ切替)
- ガスコンドロップ内用液2%
- (【般】ジメチコンシロップ2%へ切替)
- ガスター散2%「10mg/0.5g」 (院内はファモチジン散2%「ト7」)
- (【般】ファモチジン散2% 0.5g/包へ切替)
- ガスターD錠10mg (院内はファモチジンO D錠10mg「ト7」)
- ガスターD錠20mg (院内はファモチジンO D錠20mg「ト7」)
- ガストログラフィン経口・注射用 [100mL]
- ガストロゼピン錠25mg
- (【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mgへ切替)
- ガストロム顆粒66.7%「1.5g/P」
- (【般】エカベトNa顆粒66.7%「1.5g/包へ切替」)
- ガスモチン錠5mg (院内はモサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」)
- ガスロンN・O D錠4mg
- 劇カンデックスO D錠80mg (ピカルタミドO D錠80mg「ト7」へ切替)
- (【般】ピカルタミド口腔内崩壊錠80mgへ切替)
- カタプレス錠75μg
- カチーフN散10mg/g
- 劇カデュエット配合錠2番
- (【般】アムロジピン2.5mg・アトルvastatin10mg配合錠：2へ切替)
- 劇カデュエット配合錠4番
- (【般】アムロジピン5mg・アトルvastatin10mg配合錠：4へ切替)
- カナダル錠100mg
- カナグルO D錠100mg
- ガナトシ錠50mg (院内はイトブリド塩酸塩錠50mg「ワイ」)
- (【般】イトブリド塩酸塩錠50mgへ切替)

- カナマイシンカプセル250mg「明治」
- カナリア配合錠 (カナリア配合O D錠へ切替予定)
- カナリア配合O D錠 (カナリア配合錠が無くなり次第切替)
- カーバグル分散錠200mg
- 劇カバサル錠0.25mg (【般】なし)
- 劇カバサル錠1.0mg (院内はカベルゴリン錠1.0mg「ワイ」)
- ガバベン錠200mg
- ガバベン錠300mg
- ガバベンシロップ5% [2~8°C]
- カプトリル錠12.5mg
- カプトリル-Rカプセル18.75mg
- 劇カズレルサ錠100mg
- 劇カベシタピン錠300mg「ワイ」 【後】
- 【般】カベシタピン錠300mg (ゼローダ)
- ~~【般】~~カベルゴリン錠0.25mg (カバサル)
- 劇カベルゴリン錠1.0mg「ワイ」 【後】 (【般】なし)
- ~~【般】~~カベルゴリン錠1mg (カバサル)
- 劇カボメティクス錠20mg
- 劇カボメティクス錠60mg
- 劇カムザイオスカプセル1mg
- 劇カムザイオスカプセル2.5mg
- 劇カムザイオスカプセル5mg
- カモスタットメシル酸塩錠100mg「ト7」 【後】
- 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg (フオイバン)
- ガランターゼ散50% [0.5g/P]
- 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg (レミニールO D)
- 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg (レミニールO D)
- 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg (レミニールO D)
- 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 (カルナクリン)
- カリメート散 [5g/P]
- カリメートドライシロップ92.59% [5.4g/P]
- カリメート経口液20% [25g/P] (【般】なし)
- カルダート錠10-10mg (【般】デノパミン錠10mgへ切替)
- (院内はデノパミン錠10mg「日医工」)
- 劇カルケンスカプセル100mg
- 劇カルケンス錠100mg
- 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg (ロカルトロール)
- 劇カルスロット錠10-10mg (【般】マニジピン塩酸塩錠10mgへ切替)
- 【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg (ミケラン)
- カルデナリンO D錠1mg (院内はドキサゾシン錠1mg「好へ」)
- カルデナリンO D錠4mg (院内はドキサゾシン錠4mg「好へ」)
- カルナタリン錠50-50単位
- (【般】カリジノゲナーゼ錠50単位へ切替)
- 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10% (アドナ)
- カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 【後】
- 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg (アドナ)
- カルバマゼピン細粒50%「アム」
- (テグレート細粒50% (供給停止)が無くなり次第使用開始)
- ~~【般】~~カルバマゼピン細粒50% (テグレート)
- ~~【般】~~カルバマゼピン錠100mg (テグレート)
- ~~【般】~~カルバマゼピン錠200mg (テグレート)
- カルデロット錠16mg (院内はアゼルニジピン錠16mg「ト7」)
- (【般】アゼルニジピン錠16mgへ切替)
- カルベジロール錠2.5mg「ト7」 【後】
- ~~【般】~~カルベジロール錠2.5mg (アーチスト)
- カルベジロール錠10mg「ト7」 【後】
- 【般】カルベジロール錠10mg (アーチスト)
- カルボシステインDS50%「ト7」 【後】



無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- グルベス配合錠  
 グルベス配合OD錠  
 タレステールOD錠2.5mg（販売中止）  
 （2026年3月31日経過措置終了）  
 （院内はロスバスタチンOD錠2.5mg「サリ」）  
 （【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mgへ切替）
- タレステール錠5mg（【般】ロスバスタチン錠5mgへ切替）  
 デレーズピット錠50mg（シタフロキサシン錠50mg「サリ」へ切替）
- 劇クレセンバカプセル40mg  
 劇クレセンバカプセル100mg
- 【般】クレマスチンシロップ用0.1%（テルギンG）
- 劇クレマスチンDS0.1%「効効」【後】  
 （テルギンGドライシロップ0.1%より名称変更）
- 劇クレミン錠25mg
- タレメジン細粒分包2g（院内は球形吸着炭細粒分包2g「日医工」）  
 （【般】球形吸着炭細粒 2g/包へ切替）
- クレメジン速崩錠500mg
- 【般】クレムンテロール塩酸塩錠10μg（スピロベント）  
 劇クロザリル錠25mg  
 劇クロザリル錠100mg
- 向クロチアゼパム錠5mg「サリ」【後】
- 【般】クロチアゼパム錠5mg（リーゼ）
- 【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠（コンプラビン配合錠）
- 【般】クロピドグレル錠25mg（プラビックス）
- クロピドグレル錠75mg「ト」【後】
- 【般】クロピドグレル錠75mg（プラビックス）
- クロフェクトン顆粒10%
- クロフェクトン錠10mg
- クロフェクトン錠25mg  
 クロミッド錠50mg
- d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」【後】
- 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg（ポララミン）
- クロルマジン酢酸エステル錠25mg「YD」【後】  
 （プロスタール錠25から切替）
- 【般】クロルマジン酢酸エステル錠25mg（プロスタール）
- 【ケ】
- 劇ケアラム錠25mg（【般】イグラチモド錠25mgへ切替）  
 劇ケアロードLA錠60μg  
 ケイキサレートドライシロップ76% [3.27g/P]
- ケイツーカプセル5mg  
 ケイツーシロップ0.2% [1mL/P]  
 ケタスカプセル10mg
- 【般】ケトチフェンカプセル1mg（ザジテン）
- ケトチフェンDS小児用0.1%「サリ」【後】
- 【般】ケトチフェンシロップ用0.1%（ザジテン）
- 劇ゲフィチニブ錠250mg「NK」【後】（販売中止）  
 （2026年3月31日経過措置終了）
- 【般】ゲフィチニブ錠250mg（イレッサ）  
 ケフラール細粒小児用100mg
- ケルボンダ錠10mg（【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mgへ切替）  
 ケレンディア錠10mg  
 ケレンディア錠20mg
- ケーワン錠5mg（【般】フィトナジオン錠5mgへ切替）  
 劇ゲンボイヤ配合錠
- 【コ】
- コスパノンカプセル40mg
- 劇コセルゴカプセル10mg
- 劇コセルゴカプセル25mg

- コロ-葛根湯加辛夷川芎エキス細粒 [3.0g]N2
- コロ-桔梗石膏エキス細粒 [2.0g]N324
- コロ-九味檳榔湯エキス細粒 [2.0g]N311
- コロ-柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 [2.5g]N12
- コロ-柴胡清肝湯エキス細粒 [3.0g]N80
- コロ-梔子柏皮湯エキス細粒 [2.0g]N314
- コロ-大柴胡湯去大黃エキス細粒 [3.0g]N319
- コロ-腸癰湯エキス細粒 [2.0g]N320
- コロ-半夏白朮天麻湯エキス細粒 [3.0g]N37
- ヨディオ配合錠E-X  
 （【般】バルサルタン・ヒドロクロチアジド 12.5mg配合錠へ切替）  
 劇コデインリン酸塩散1%「ホ」  
 麻劇コデインリン酸塩散10%「サ」  
 コートリル錠10mg
- コートン錠25mg
- 劇コニール錠4mg（院内はベニジピン塩酸塩錠4mg「ト」）  
 （【般】ベニジピン塩酸塩錠4mgへ切替）
- ※ コバシル錠4mg（販売中止）（2026年3月31日経過措置終了）  
 （【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mgへ切替）  
 ヨムタン錠100mg（エンタカポン錠100mg「JG」へ切替）
- コメリアンコーワ錠 50mg（ジラゼブ塩酸塩錠50mg「ト」へ切替）
- コメリアンコーワ錠100mg（ジラゼブ塩酸塩錠100mg「ト」へ切替）  
 （【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mgへ切替）
- 劇コララン錠2.5mg
- 劇コララン錠5mg
- 劇コララン錠7.5mg
- 劇コルヒチン錠0.5mg「効効」
- 劇コレアジン錠12.5mg
- コレチメント錠9mg
- コレバイン錠500mg
- コレバインミニ83% [1.81g/P]
- 向劇コンサータ錠18mg
- 向劇コンサータ錠27mg  
 コントミン糖衣錠12.5mg
- コンプラビン配合錠（【般】なし）  
 （【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠へ切替）
- 【サ】
- サアミオン錠5mg（院内はニセルゴリン錠5mg「ト」へ切替）  
 （【般】ニセルゴリン錠5mgへ切替）
- 劇ザイアジェン錠300mg  
 サイクロセリンカプセル250mg「明治」  
 ザイザル錠5mg（レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サト」へ切替）  
 （【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mgへ切替）  
 ザイザルシロップ0.05%  
 （レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ト」へ切替）
- 劇ザイティガ錠250mg
- 劇ザイティガ錠500mg  
 劇サイトテック錠100 100μg
- 劇サイバインコ錠50mg
- 劇サイバインコ錠100mg
- 劇サイバインコ錠200mg  
 ザイボックス錠600mg（【般】リネゾリド錠600mgへ切替）
- 向サイラーズ錠1mg（フルニトラゼパム錠1mg「アル」へ切替）  
 （【般】フルニトラゼパム錠1mgへ切替）
- 劇サインバルタカプセル20mg  
 （院内はデュロキセチンOD錠20mg「コ」へ切替）  
 （【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mgへ切替）



無印：採用薬  
※：削除予定薬  
●：院外処方専用薬  
☆：院外処方専用予定薬  
【後】：後発医薬品  
○：院内専用後発品である薬

- ジピリダモール錠25mg「ト7」 【後】
- 【般】ジピリダモール錠25mg（ペルサンチン）
- ジピリダモール錠100mg「ト7」 【後】
- ~~【般】ジピリダモール錠100mg（ペルサンチン）~~
- ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 【後】
- ~~ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ト7」~~ 【後】  
（ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」へ名称変更）
- ~~【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg（セファドール）~~
- ジナルカンカプセル100mg  
（【般】フルコナゾールカプセル100mgへ切替）
- 劇ジブレキサ細粒1%  
（【般】オランザピン細粒1%へ切替）
- 劇ジブレキサザイデイス錠5mg（院内はオランザピンOD錠5mg「ト7」）  
（【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mgへ切替）
- 劇ジブレキサザイデイス錠10mg  
（【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
- シベクトロ錠200mg
- 劇シベノール錠50mg（院内はシベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サ7」）
- 劇シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サ7」 【後】
- ~~劇シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「ト7」~~ 【後】（販売中止）  
（2026年3月31日経過措置終了）
- 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg（シベノール）
- 【般】ジメチコンシロップ2%（ガスコン）
- ジメチコン錠40mg「YD」 【後】
- 【般】ジメチコン錠40mg（ガスコン）
- 【般】ジメチジン錠200mg（タガメット）
- ~~【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25%（アストシロップ）~~
- 劇ジャカビ錠5mg
- 劇ジャカビ錠10mg
- 劇ジャカビ内用液小児用0.5% [2~8°C]  
ジャディアンス錠10mg
- ジャディアンス錠25mg
- 劇ジャドニュー顆粒分包90mg
- 劇ジャドニュー顆粒分包360mg（【般】デフェシカ顆粒360mgへ切替）
- ジャヌビア錠12.5mg（グラクティブ錠12.5mgへ切替）
- ジャヌビア錠25mg
- ジャヌビア錠50mg（グラクティブ錠50mgへ切替）
- 劇ジャルカ配合錠  
臭化カリウム「ヤマゼン」  
ジュリナ錠0.5mg（【般】エストラジオール錠0.5mgへ切替）
- ジュコウ四物湯FCEキス細粒医療用 [2.5g]FC71
- 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg（ニトロールR）
- 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg（フランドル錠）
- 小児用ムコソルバンシロップ0.3%  
（【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3%へ切替）
- 【般】シラザプリル錠0.5mg（インヒベース）
- ~~【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg（コメリアンコーワ）~~
- 【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mg（コメリアンコーワ）
- ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サ7」 【後】
- 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg（ヘルベッサーR）
- ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ト7」 【後】
- ~~【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg（ヘルベッサー）~~
- ジルテック錠10~10mg（販売中止）  
（【般】セチリジン塩酸塩錠10mgへ切替）
- 【般】シルデナフィル錠20mg：RE（レバチオ）
- シルニジピン錠10mg「FG」 【後】  
（【般】シルニジピン錠10mgへ切替）
- 【般】シルニジピン錠10mg（アテレック錠）
- 【般】シルニジピン錠20mg（アテレック錠）
- 劇ジウムロ配合錠HD「武田ハ」 【後】  
（ザクラス配合錠HDから切替）
- 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg（プレタール）
- シロスタゾールOD錠50mg「サ7」 【後】
- ~~シロスタゾールOD錠100mg「サ7」~~ 【後】  
（シロスタゾールOD錠50mg「サ7」へ切替）
- 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg（プレタール）
- 【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg（ユリーフOD）
- 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg（ユリーフOD）
- シンダレア細粒4mg~4mg/P  
（【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包へ切替）
- シンダレアチュアプル錠5mg  
（【般】モンテルカストチュアプル錠5mgへ切替）
- シンダレア錠10mg（【般】モンテルカスト錠10mgへ切替）
- 劇ジintas錠50mg
- ~~シンバスタチン錠5mg「アハ」~~ 【後】
- 【般】シンバスタチン錠5mg（リボバス）
- シンメトレル細粒10%（【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%へ切替）
- シンメトレル錠50mg（アマンタジン塩酸塩錠50mg「サ7」へ切替）  
（【般】アマンタジン塩酸塩錠50mgへ切替）
- 【ス】  
脾外分泌機能検査用PFD内服液500mg~5% [10mL/瓶]
- スイニー錠100mg
- スインプロイク錠0.2mg
- スオード錠100 100mg
- スーグラ錠50mg
- スクラルファート内用液10%「NIG」 [10mL/P] 【後】
- 【般】スクラルファート経口液10%  
スージャヌ配合錠
- スターシス錠30mg（【般】なし）（販売中止）  
（2026年3月31日経過措置終了）
- スターシス錠90mg（【般】ナテグリニド錠90mgへ切替）（販売中止）  
（2026年3月31日経過措置終了）
- 劇スタラシドカプセル50 50mg
- スタレボ配合錠L 50
- スタレボ配合錠L 100
- 劇スチバール錠40mg
- ~~ステララOD錠0.1mg~~  
（【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mgへ切替）
- 劇スーテントカプセル12.5mg（【般】スニチニブカプセル12.5mgへ切替）
- 劇ストクッタリン錠200mg  
ストミンA配合錠
- 劇ストラテラカプセル5mg（【般】アトモキセチンカプセル5mgへ切替）
- 劇ストラテラカプセル10mg（【般】アトモキセチンカプセル10mgへ切替）
- 劇ストラテラカプセル25mg（【般】アトモキセチンカプセル25mgへ切替）
- 劇ストラテラカプセル40mg（【般】アトモキセチンカプセル40mgへ切替）
- 劇ストラテラ内用液0.4%（【般】アトモキセチン経口液0.4%へ切替）
- ストロカイン錠5mg
- 劇ストロメクトール錠3mg
- 【般】スニチニブカプセル12.5mg（スーテント）
- スピラマイシン錠150万単位「サ7」
- スピロノラクトン錠25mg「ト7」 【後】
- 【般】スピロノラクトン錠25mg（アルダクトン）
- スピロペント錠10μg
- ズファジラン錠10mg
- ~~【般】ズプラタストトシル酸塩カプセル100mg（トP-D）~~

- 劇スズリセル錠20mg (ダサチニブ錠20mg「NK」へ切替予定)  
(【般】ダサチニブ錠20mgへ切替)
- 劇スズリセル錠50mg (ダサチニブ錠50mg「NK」へ切替予定)  
(【般】ダサチニブ錠50mgへ切替)
- 劇スマイラフ錠50mg
  - 劇スマイラフ錠100mg
  - 【般】スマートリプタン錠50mg (イミグラン)
  - スリンダ錠28
- 劇スルピラド細粒50mg「アム」【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了) (ドグマチール細粒50mgへ切替)
- 【般】スルピラド細粒50mg (ドグマチール)  
(2026年3月31日削除予定)
- スルピリド錠50mg「アム」【後】
- 【般】スルピリド錠50mg (ドグマチール)
  - 【般】スルピラド錠100mg (ドグマチール)
  - 【般】スルピラド錠200mg (ドグマチール)
- 【セ】
- セイザル錠50mg (院内はミグリトール錠50mg「ト-7」)  
(【般】ミグリトール錠50mgへ切替)
- セキノビット錠100mg
- 劇ゼジュール錠100mg
- ゼスラン小児用シロップ0.03%
  - セタプサル錠25mg (【般】アラセプリル錠25mgへ切替)
  - ゼチア錠10mg (エゼチミブ錠10mg「JG」へ切替)  
(【般】エゼチミブ錠10mgへ切替)
  - 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg (テシプール錠)
  - 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%
  - 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg (ジルテック)
  - 劇セディール錠10mg (院内はタドスピロクエン酸塩錠10mg「ト-7」)  
(【般】タドスピロクエン酸塩錠10mgへ切替)
  - 劇セディール錠20mg (【般】タドスピロクエン酸塩錠20mgへ切替)
  - 向セニラン錠2mg【後】 (プロマゼパム錠2mg「サド」へ名称変更)  
(【般】プロマゼパム錠2mgへ切替)
- 向セバゾン錠1 1mg
- 劇セパミット細粒1% [10mg/1g/P] 【後】  
(2023年3月現在,出荷停止)  
(【般】ニフェジピン細粒1% 10mg/1g (包) へ切替)
- セファドール錠25mg (院内はジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」)
  - セファランチン末1%
  - 劇ゼフィックス錠100 100mg
- セフカベン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」【後】 (【般】なし)
- 【般】セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg (フロモックス)
  - 【般】セフジニル細粒10% (セフゾン)
- セフゾン細粒小児用10%—100mg/g
- セフゾンカプセル100mg (【般】加算なし)
  - 【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5% (パナンD.S.)
- 劇ゼボジアカプセル0.92mg
  - 劇ゼボジアカプセルスターターパック
- 劇セムブリックス錠20mg [25°C以下]
- 劇セムブリックス錠40mg [25°C以下]
- セララ錠25mg (【般】エブレレノン錠25mgへ切替)
  - セララ錠50mg (エブレレノン錠50mg「杏林」へ切替)  
(【般】エブレレノン錠50mgへ切替)
  - 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg (セレクトール)
- 劇セリンクロ錠10mg
- 向セルシン散1%
- 向2mgセルシン錠 (院内はジアゼパム錠2mg「アム」)  
(【般】ジアゼパム錠2mgへ切替)
- 向5mgセルシン錠 (【般】ジアゼパム錠5mgへ切替)
- 劇セルセプトカプセル250 250mg
- セルテクトドライシロップ2%—20mg/g  
(【般】オキサトミドシロップ用2%へ切替)
  - セルテクト錠30—30mg (【般】オキサトミド錠30mgへ切替)
- 劇セルトラリン錠25mg「アム」【後】
- 【般】セルトラリン錠25mg (ジェイゾフト)
  - 【般】セルトラリン錠50mg (ジェイゾフト)
  - セルニルトン錠 63mg
  - セルベックス細粒10% [0.5g/P]
  - セルベックスカプセル50mg (院内はテブレノンカプセル50mg「ト-7」)
- 劇ゼルヤンツ錠5mg
- セレキノン錠100mg  
(【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mgへ切替)
  - 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg (エフピー)
- 劇セレクタール錠100mg  
(【般】セリプロロール塩酸塩錠100mgへ切替)
  - 【般】セレコキシブ錠100mg (セレコックス)
- 劇セレコキシブ錠100mg「JG」【後】
- 劇セロヨクタス錠100mg (セレコキシブ錠100mg「JG」へ切替)
- セレジストOD錠5mg (院内はタルチレリンOD錠5mg「サイ」)  
(【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- セレスタミン配合錠 (院内はベタセレミン配合錠)  
(【般】ベタメタゾン・d-α-コルフェニラミン配合錠へ切替)
- セレニカR顆粒40%
- セレニカR錠200mg
- 劇セレーヌ細粒1% (院内はハロペリドール細粒1%「ヨトミ」)  
(【般】ハロペリドール細粒1%へ切替)
  - 劇セレーヌ錠0.75mg (院内はハロペリドール錠0.75mg「ヨトミ」)  
(【般】ハロペリドール錠0.75mgへ切替)
  - 劇セレーヌ錠1mg (【般】ハロペリドール錠1mgへ切替)
  - 劇セレーヌ錠1.5mg (院内はハロペリドール錠1.5mg「ヨトミ」)  
(【般】ハロペリドール錠1.5mgへ切替)
  - 劇セレーヌ錠3mg (【般】ハロペリドール錠3mgへ切替)
- 劇セレーヌ内服液0.2%
  - 劇セロクエル細粒50% (【般】クエチアピン細粒50%へ切替)
  - 劇セロクエル25mg錠 (院内はクエチアピン錠25mg「アム」)  
(【般】クエチアピン錠25mgへ切替)
  - 劇セロクエル100mg錠 (院内はクエチアピン錠100mg「アム」)  
(【般】クエチアピン錠100mgへ切替)
  - 劇セロクエル200mg錠  
(【般】クエチアピン錠200mgへ切替)
- セロクラール錠20mg
- 劇ゼロダ錠300—300mg (カペシタピン錠300mg「サイ」へ切替)  
(【般】カペシタピン錠300mgへ切替)
- ゼンタコートカプセル3mg
- 【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包 (アローゼン)
- センノシド錠12mg「ト-7」【後】
- 【般】センノシド錠12mg (プルゼニド)
- 【ソ】
- 劇ゾコーバ錠125mg
- 劇ゾスバタ錠40mg
- 向劇ソセゴン錠25mg  
ソタロール錠40mg (【般】ソタロール塩酸塩錠40mgへ切替)  
(ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」へ切替)
- ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【後】
- 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg (ソタコール)
- 劇ソーティクツ錠6mg

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

※劇ゾテピン錠25mg「効効」 【後】（販売中止）

- （ロドピン錠25mgへ切替）
- 【般】ゾテピン錠25mg（ロドピン）
- 【般】ゾニサミド散20%（エクセグラン）
- 劇ゾニサミド錠100mg「アム」 【後】
- 劇【般】ゾニサミド錠100mg（エクセグラン）
- 劇【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg：T R E（トレリーフOD）
- 劇【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg：T R E（トレリーフOD）
- 【般】ゾピクロン錠7.5mg（アモバン）
- ゾピラックス顆粒40%（【般】アシクロピル顆粒40%へ切替）
- ゾピラックス錠200—200mg（【般】アシクロピル錠200mgへ切替）
- 【般】ソファールコン錠50mg（ソロン錠）
- （2026年3月31日削除予定）
- ゾフルーザ錠20mg
- 劇ゾーミッドRM錠2.5mg
- （【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mgへ切替）
- 向ソラナックス0.4mg錠（院内はアルプラゾラム錠0.4mg「トウ」）
- ソランタール錠100mg
- ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トウ」 【後】
- 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg（ベシケア）
- 劇ゾリンザカプセル100mg
- 向ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サウ」 【後】
- 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg（マイスリー）
- 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg（マイスリー）
- 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg（マイスリー）
- 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg（ゾーミッドRM）
- 【タ】
- ダイアート錠60mg（【般】アゾセミド錠60mgへ切替）
- ダイアモックス錠250mg
- ダイオウ末
- 劇タイケルブ錠250mg
- 太虎堂の芍帰調血飲エキス顆粒 [2.0g]EK-230
- 【般】耐性乳酸菌散0.6%（ビオフェルミンR）
- 劇ダイドロネル錠200 200mg
- ダイフェン配合顆粒
- タウリン散98%「大正」
- 劇ダイオニール錠1.25mg
- （【般】グリベンクラミド錠1.25mgへ切替）
- 劇ダイオニール錠2.5mg
- （【般】グリベンクラミド錠2.5mgへ切替）
- タガメット錠200mg
- （【般】シメチジン錠200mgへ切替）
- 劇ダクチル錠50mg
- （【般】ピペリドレート塩酸塩錠50mgへ切替）
- 劇タグリッソ錠40mg
- 劇タグリッソ錠80mg
- 【般】タクロリムスカプセル0.5mg（プログラフ）
- 【般】タクロリムスカプセル1mg（プログラフ）
- 劇タクロリムス錠0.5mg「トウ」 【後】
- 【般】タクロリムス錠0.5mg
- 劇タクロリムス錠1mg「トウ」 【後】
- 【般】タクロリムス錠1mg
- タケキャブOD錠10mg
- タケキャブOD錠20mg
- タケブロンOD錠15mg
- （院内はランソプラゾールOD錠15mg「サウ」）
- （【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mgへ切替）

- タケブロンOD錠30—30mg
- （【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mgへ切替）
- タケルダ配合錠
- 劇ダサチニブ錠20mg「NK」 【後】
- 【般】ダサチニブ錠20mg（スプリセル）
- 劇ダサチニブ錠50mg「NK」 【後】
- 【般】ダサチニブ錠50mg（スプリセル）
- 劇タシグナカプセル150mg（【般】ニロチニブカプセル150mgへ切替）
- 劇タシグナカプセル200mg（【般】ニロチニブカプセル200mgへ切替）
- 劇ターゼナカプセル0.25mg
- 劇ターゼナカプセル1mg
- 【般】タダラフィル錠2.5mg：Z A（ザルティア）
- 【般】タダラフィル錠5mg：Z A（ザルティア）
- タダラフィル錠20mg A D「TE」 【後】
- 【般】タダラフィル錠20mg：A D（アドシルカ）
- タチオン錠100mg（【般】グルタチオン錠100mgへ切替）
- 劇タナドーパ顆粒75% [750mg/1g/P]
- タナトサル錠5mg（院内はイミダプリル塩酸塩錠5mg「オハ」）
- （【般】イミダプリル塩酸塩錠5mgへ切替）
- 【般】ダバグリフロジン錠5mg（フォシーガ）
- 【般】ダバグリフロジン錠10mg（フォシーガ）
- 劇タバリス錠100mg
- 劇タフィンラーカプセル50mg
- 劇タフィンラーカプセル75mg
- ダフクリア錠200mg
- タブネオスカプセル10mg
- 劇タブレクタ錠150mg
- 劇タブレクタ錠200mg
- 劇ダーブロック錠2mg
- 劇ダーブロック錠4mg
- ※ タベジール錠1mg
- タミフルドライシロップ3%
- （【般】オセルタミビルシロップ用3%へ切替）
- タミナルカプセル75—75mg（オセルタミビルセル75mg「サウ」へ切替）
- （【般】オセルタミビルカプセル75mgへ切替）
- タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 【後】
- 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg（ハルナール）
- 【般】タモキシフェン錠10mg（ノルバデックス）
- 【般】タモキシフェン錠20mg（ノルバデックス）
- タモキシフェン錠20mg「サウ」 【後】
- ダラシカプセル150mg
- タリオン錠10mg（【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mgへ切替）
- タリオンOD錠5mg
- （【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替）
- タリオンOD錠10mg
- （ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トウ」へ切替）
- （【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替）
- タリージェ錠2.5mg
- タリージェ錠15mg
- タリージェOD錠2.5mg
- タリージェOD錠5mg
- タリージェOD錠10mg
- タリージェOD錠15mg
- 劇タルグレンカプセル75mg
- 劇タルセバ錠25mg（【般】エルロチニブ錠25mgへ切替）
- ※劇タルセバ錠100mg（【般】エルロチニブ錠100mgへ切替）
- 劇タルセバ錠150mg（【般】エルロチニブ錠150mgへ切替）

- タルチレリンOD錠5mg「カウ」 【後】
- 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg（セレジスト）  
炭酸水素ナトリウム末
- 【般】炭酸ランタン顆粒250mg（ホスレノール）  
劇炭酸リチウム錠100mg「大正」 100mg 【後】
- ~~【般】炭酸リチウム錠100mg（リーマス）~~
- 劇炭酸リチウム錠200mg「大正」 200mg 【後】
- ~~【般】炭酸リチウム錠200mg（リーマス）~~  
単シロップ（丸石）
- 劇タンドスピロクエン酸塩錠10mg「アメル」 【後】
- 【般】タンドスピロクエン酸塩錠10mg（セディール）
- 【般】タンドスピロクエン酸塩錠20mg（セディール）  
ダントリウムカプセル25mg  
タンニン酸アルブミン末  
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末（タンニン酸アルブミンより切替）
- 劇タンポコール細粒10%  
劇タンポコール錠50mg（フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」へ切替）  
（【般】フレカイニド酢酸塩錠50mgへ切替）
- 【チ】
- 【般】チアプリド塩酸塩細粒10%（グラマリール）
- チアプリド錠25mg「カウ」 【後】
- 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg（グラマリール）
- チアプリド錠50mg「カウ」【後】
- 【般】チアプリド塩酸塩錠50mg（グラマリール）
- 劇チオデロンカプセル5mg [冷]  
劇チガンソカプセル10 10mg
- チクロピジン塩酸塩錠100mg「トワ」 【後】（パナルジン）
- 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg（パナルジン）
- チザニジン錠1mg「トワ」 【後】
- 【般】チザニジン錠1mg（テルネリン）
- ~~【般】チミペロン細粒1%（トロペロン細粒1%へ切替）~~  
（2026年3月31日削除予定）
- 劇チャンピックス錠0.5mg
- 劇チャンピックス錠1mg  
（0.5mg×11錠,1mg×14錠を「服用のしかた」が記載された  
台紙にセットした「チャンピックス スタート用パック」もある。  
処方時に「スタート用パック」とコメントを記載する）  
調剤用パンピタン末
- チョコラA末1万単位/g
- 劇チラーゼンS錠12.5μg  
劇チラーゼンS錠25μg  
劇チラーゼンS錠50μg  
チロナミン錠5μg  
沈降炭酸カルシウム末  
沈降炭酸カルシウム「ケンエ」粉末
- 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 【後】
- 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)
- 【ツ】
- ツイミーグ錠500mg
- ツインラインNF配合経腸用液 [A液200mL, B液200mL]  
つくしA・M配合散 [1.3g/P]
- 劇ツートラム錠25mg
- 劇ツートラム錠50mg
- 劇ツートラム錠100mg
- 劇ツートラム錠150mg  
ツベルミン錠100mg  
ツム安中散エキス顆粒 [2.5g]5  
ツム茵陳蒿湯エキス顆粒 [2.5g]135
- ツム茵陳五苓散エキス顆粒 [2.5g]117
- ツム温経湯エキス顆粒 [2.5g]106
- ツム温清飲エキス顆粒 [2.5g]57
- ツム越婢加朮湯エキス顆粒 [2.5g]28
- ツム黄耆建中湯エキス顆粒 [3.0g]98
- ツム黄連解毒湯エキス顆粒 [2.5g]15
- ツム黄連湯エキス顆粒 [2.5g]120
- ツム乙字湯エキス顆粒 [2.5g]3
- ツム葛根湯エキス顆粒 [2.5g]1
- ツム加味帰脾湯エキス顆粒 [2.5g]137
- ツム加味逍遙散エキス顆粒 [2.5g]24
- ツム甘麦大棗湯エキス顆粒 [2.5g]72
- ツム桔梗湯エキス顆粒 [2.5g]138
- ツム芎帰膠艾湯エキス顆粒 [3.0g]77
- ツム荊芥連翹湯エキス顆粒 [2.5g]50
- ツム桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒 [2.5g]134
- ツム桂枝加芍薬湯エキス顆粒 [2.5g]60
- ツム桂枝加朮附湯エキス顆粒 [2.5g]18
- ツム桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 [2.5g]26
- ツム桂枝湯エキス顆粒 [2.5g]45
- ツム桂枝人参湯エキス顆粒 [2.5g]82
- ツム桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒 [2.5g]125
- ツム啓脾湯エキス顆粒 [2.5g]128
- ツム香蘇散エキス顆粒 [2.5g]70
- ツム五虎湯エキス顆粒 [2.5g]95
- ツム五積散エキス顆粒 [2.5g]63
- ツム牛車腎気丸エキス顆粒 [2.5g]107
- ツム呉茱萸湯エキス顆粒 [2.5g]31
- ツム五苓散エキス顆粒 [2.5g]17
- ツム柴陷湯エキス顆粒 [2.5g]73
- ツム柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 [2.5g]12
- ツム柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 [2.5g]11
- ツム柴胡桂枝湯エキス顆粒 [2.5g]10
- ツム柴朴湯エキス顆粒 [2.5g]96
- ツム柴苓湯エキス顆粒 [3.0g]114
- ツム三黄瀉心湯エキス顆粒 [2.5g]113
- ツム酸棗仁湯エキス顆粒 [2.5g]103
- ツム三物黄芩湯エキス顆粒 [2.5g]121
- ツム滋陰降火湯エキス顆粒 [2.5g]93
- ツム滋陰至宝湯エキス顆粒 [3.0g]92
- ツム四逆散エキス顆粒 [2.5g]35
- ツム七物降下湯エキス顆粒 [2.5g]46
- ツム四物湯エキス顆粒 [2.5g]71
- ツム炙甘草湯エキス顆粒 [3.0g]64
- ツム芍薬甘草湯エキス顆粒 [2.5g]68
- ツム十全大補湯エキス顆粒 [2.5g]48
- ツム十味敗毒湯エキス顆粒 [2.5g]6
- ツム潤腸湯エキス顆粒 [2.5g]51
- ツム小建中湯エキス顆粒 [2.5g]99
- ツム小柴胡湯エキス顆粒 [2.5g]9
- ツム小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 [2.5g]109
- ツム小青竜湯エキス顆粒 [3.0g]19
- ツム消風散エキス顆粒 [2.5g]22
- ツム辛夷清肺湯エキス顆粒 [2.5g]104
- ツム真武湯エキス顆粒 [2.5g]30
- ツム清上防風湯エキス顆粒 [2.5g]58
- ツム清暑益気湯エキス顆粒 [2.5g]136
- ツム清心蓮子飲エキス顆粒 [2.5g]111

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- ツム 清肺湯エキス顆粒 [3.0g]90
- ツム 川芎茶調散エキス顆粒 [2.5g]124
- ツム 疎経活血湯エキス顆粒 [2.5g]53
- ツム 大黃甘草湯エキス顆粒 [2.5g]84
- ツム 大黃牡丹皮湯エキス顆粒 [2.5g]33
- ツム 大建中湯エキス顆粒 [2.5g]100
- ツム 大柴胡湯エキス顆粒 [2.5g]8
- ツム 大承気湯エキス顆粒 [2.5g]133
- ツム 竹筴温胆湯エキス顆粒 [2.5g]91
- ツム 治打撲一方エキス顆粒 [2.5g]89
- ツム 調胃承気湯エキス顆粒 [2.5g]74
- ツム 釣藤散エキス顆粒 [2.5g]47
- ツム 猪苓湯エキス顆粒 [2.5g]40
- ツム 通導散エキス顆粒 [2.5g]105
- ツム 桃核承気湯エキス顆粒 [2.5g]61
- ツム 当帰飲子エキス顆粒 [2.5g]86
- ツム 当帰建中湯エキス顆粒 [2.5g]123
- ツム 当帰逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 [2.5g]38
- ツム 当帰芍薬散エキス顆粒 [2.5g]23
- ツム 当帰湯エキス顆粒 [2.5g]102
- ツム 二朮湯エキス顆粒 [2.5g]88
- ツム 女神散エキス顆粒 [2.5g]67
- ツム 人參湯エキス顆粒 [2.5g]32
- ツム 人參養栄湯エキス顆粒 [3.0g]108
- ツム 排膿散及湯エキス顆粒 [2.5g]122
- ツム 麦門冬湯エキス顆粒 [3.0g]29
- ツム 八味地黄丸エキス顆粒 [2.5g]7
- ツム 半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]16
- ツム 半夏瀉心湯エキス顆粒 [2.5g]14
- ツム 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 [2.5g]37
- ツム 白虎加人參湯エキス顆粒 [3.0g]34
- ツム 茯苓飲エキス顆粒 [2.5g]69
- ツム 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]116
- ツム 平胃散エキス顆粒 [2.5g]79
- ツム 防己黃耆湯エキス顆粒 [2.5g]20
- ツム 防風通聖散エキス顆粒 [2.5g]62
- ツム 補中益気湯エキス顆粒 [2.5g]41
- ツム 麻黄湯エキス顆粒 [2.5g]27
- ツム 麻黄附子細辛湯エキス顆粒 [2.5g]127
- ツム 麻杏甘石湯エキス顆粒 [2.5g]55
- ツム 麻杏薤甘湯エキス顆粒 [2.5g]78
- ツム 麻子仁丸エキス顆粒 [2.5g]126
- ツム 木防己湯エキス顆粒 [2.5g]36
- ツム 薤苳仁湯エキス顆粒 [2.5g]52
- ツム 抑肝散エキス顆粒 [2.5g] 54
- ツム 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 [2.5g]83
- ツム 六君子湯エキス顆粒 [2.5g]43
- ツム 立効散エキス顆粒 [2.5g]110
- ツム 竜胆瀉肝湯エキス顆粒 [2.5g]76
- ツム 茶甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 [2.5g]119
- ツム 茶姜朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]118
- ツム 茶桂朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]39
- ツム 六味丸エキス顆粒 [2.5g]87
- 劇ツルバダ配合錠
- 【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1% (ホクナリン)
- 【テ】
- 劇ディアコミットドライシロップ分包250mg

- 劇ティーエスワン配合顆粒 T 20 [20mg/P]
- 劇ティーエスワン配合顆粒 T 25 [25mg/P]
- 劇ティーエスワン配合O-D錠T20 (20mgテガフル相当量) (院内はエスワンタイホウ配合O-D錠T20) (【般】テガフル20mg・ギメラシ・オラシカル配合口腔内崩壊錠へ切替)
- 劇ティーエスワン配合O-D錠T25 (25mgテガフル相当量) (院内はエスワンタイホウ配合O-D錠T25) (【般】テガフル25mg・ギメラシ・オラシカル配合口腔内崩壊錠へ切替)
- デオパン錠40mg (院内はバルサルタン錠40mg「ツリ」) (【般】バルサルタン錠40mgへ切替)
- デオパン錠80mg (【般】バルサルタン錠80mgへ切替)
- デオパン錠160mg (【般】バルサルタン錠160mgへ切替)
- デオパンO-D錠40mg (【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mgへ切替)
- デオパンO-D錠80mg (【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mgへ切替)
- デオパンO-D錠160mg (【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mgへ切替)
- デオナゲスト錠0.5mg (ジエノゲスト錠0.5mg「ツダ」へ切替) (【般】ジエノゲスト錠0.5mgへ切替)
- デオナゲスト錠1mg (【般】ジエノゲスト錠1mgへ切替)
- 劇ティブゾ錠250mg
- ディオゲラ配合錠 (【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠へ切替)
- デエビゴ錠2.5mg
- デエビゴ錠5mg
- デエビゴ錠10mg
- テオドル錠100mg (院内はテオフィリン徐放錠100mg「ツリ」) →○劇テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「ツリ」【後】
- ※○劇テオフィリンドライシロップ20%「ツリ」【後】(販売中止) (テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「ツリ」へ切替)
- 劇テオフィリン錠200mg「ツリ」 (【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続)へ切替)
- テオフィリン徐放錠100mg「ツリ」【後】
- 【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) (テオドル)
- 劇【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) (テオドル)
- 劇テオフィリン徐放U錠200mg「ツリ」【後】
- 【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) (ユニフィルL A)
- 【般】テオフィリンシロップ用20% (テオドルドライシロップ)
- デカドロン錠0.5mg
- デカドロン錠4mg
- 【般】テガフル20mg・ギメラシ・オラシカル配合顆粒 (ティーエスワン)
- 【般】テガフル25mg・ギメラシ・オラシカル配合顆粒 (ティーエスワン)
- 【般】テガフル20mg・ギメラシ・オラシカル配合口腔内崩壊錠(ティーエスワン)
- 【般】テガフル25mg・ギメラシ・オラシカル配合口腔内崩壊錠(ティーエスワン)
- 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% (メジコン)
- テクフィデラカプセル120mg
- テクフィデラカプセル240mg
- テグレートール細粒50% (【般】なし) (カルバマゼピン細粒50%「アム」へ切替)
- テグレートール錠100mg
- テグレートール錠200mg
- デザレックス錠5mg
- 劇デシコビ配合錠L T
- 劇デシコビ配合錠H T
- 劇テンペール錠1mg (【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mgへ切替)

- 劇デジレル錠25—25mg (【般】トラゾドン塩酸塩錠25mgへ切替)  
デソパン錠60mg
- デタントール錠1mg
- デタントールR錠3mg  
テトラミド錠10mg
- テトラミド錠30mg
- テネリア錠40mg  
テネリアOD錠20mg
- テネリアOD錠40mg  
劇テネゼット錠300mg  
デノタスチュアブル配合錠
- デノバミン錠10mg「日医工」【後】
- 【般】デノバミン錠10mg(カルグート)  
テノーミン錠50 50mg(【般】アテノロール錠50mgへ切替)
- デパケン細粒40%(【般】なし)
- デパケン錠200mg(【般】なし)  
デパケンR錠100mg  
(バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「ト7」へ切替)  
デパケンR錠200mg  
(バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト7」へ切替)
- デパケンシロップ5%(院内はバルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」)  
向デバス細粒1%  
(【般】エチゾラム細粒1%へ切替)
- 向デバス錠0.5mg(院内はエチゾラム錠0.5mg「EMEC」)  
劇テビケイ錠50mg
- 【般】デフェラシロクス顆粒90mg(ジャドニュ)
- 【般】デフェラシロクス顆粒360mg(ジャドニュ)
- 劇テプミトコ錠250mg
- 【般】テプレノン細粒10%—0.5g/包(セルベックス)
- テプレノンカプセル50mg「ト7」【後】
- 【般】テプレノンカプセル50mg(セルベックス)
- デプロメール錠25—25mg  
(院内はフルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」)  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替)
- デプロメール錠50—50mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替)
- デプロメール錠75—75mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替)  
デベルザ錠20mg  
劇デムサーカプセル250mg
- テモカプリル塩酸塩錠2mg「サ7」【後】
- 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg(エースコール)
- 毒テモゾロミド錠20mg「NK」【後】
- 毒【般】テモゾロミド錠20mg(テモダール)
- 毒テモゾロミド錠100mg「NK」【後】
- 毒【般】テモゾロミド錠100mg(テモダール)  
毒テモダールカプセル20mg(テモゾロミド錠20mg「NK」へ切替)  
毒テモダールカプセル100mg(テモゾロミド錠100mg「NK」へ切替)  
デュオドーバ配合経腸用液 [100mL/キット] [2~8°C]
- 【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV(アボルプカプセル)
- デュファストン錠5mg
- 劇【般】デュロキセチンカプセル20mg(サインバルタ)
- 劇デュロキセチンOD錠20mg「コ7」【後】  
(サインバルタカプセル20mgから切替)  
(【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mgへ切替)
- 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg(サインバルタ)
- 一○劇テラムロ配合錠AP「EE」【後】  
(テラムロ配合錠AP「コ7」が無くなり次第切替)
- ※劇テラムロ配合錠AP「コ7」【後】(販売中止)  
(テラムロ配合錠AP「EE」へ切替予定)  
(【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠へ切替)
- 劇テルギンGドラインシロップ0.1%—【後】—  
(クレマスチンDS0.1%「効効」へ名称変更)  
(【般】クレマスチンシロップ用0.1%へ切替)
- ※○テルチア配合錠AP「ト7」【後】(販売中止)  
(テルチア配合錠AP「日医工」へ切替予定)
- 一○テルチア配合錠AP「日医工」【後】  
(テルチア配合錠AP「ト7」が無くなり次第切替)
- 劇デルティバ錠50mg  
テルネサン錠1mg(チザニジン錠1mg「ト7」へ切替)  
(【般】チザニジン錠1mgへ切替)
- 劇テルバンスD-S20%—【後】—  
(【般】テオフィリンシロップ用20%へ切替)
- テルピナフィン錠125mg「VTRS」【後】
- 【般】テルピナフィン錠125mg(ラミシール)
- テルミサルタン錠40mg「コ7」【後】(販売中止)
- テルミサルタン錠40mg「日医工」【後】
- 【般】テルミサルタン錠40mg(ミカルディス)
- 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠(ミカムロAP)
- 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロコルチゾン配合錠(ミコンビAP)
- 【般】テルミサルタン錠80mg(ミカルディス)
- 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠(ミカムロBP)
- 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロコルチゾン配合錠(ミコンビBP)
- 【ト】
- 劇トアラセット配合錠「日新」【後】  
(【般】トラマドール・アセトアミノフェンへ切替)  
劇ドゥベイト配合錠  
トウモロコシデンブン末  
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒 [2.0g]TY-026
- [東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒 [2.0g]TY-027
- [東洋]四君子湯エキス細粒 [2.0g]TY-054
- ドキサゾシン錠1mg「コ7」【後】—  
(院内はドキサゾシン錠1mg「コ7」へ切替)
- ドキサゾシン錠1mg「コ7」【後】
- 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg(カルデナリン)
- 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg(カルデナリン)
- ドキサゾシン錠4mg「コ7」【後】
- 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠4mg(カルデナリン)
- 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg(カルデナリン)  
劇ドグマチール細粒50%
- ドグマチール錠50mg(【般】スルピリド錠50mgへ切替)
- 劇ドグマチール錠100mg
- 劇ドグマチール錠200mg
- トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「コ7」【後】
- 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒20%(ユベラ)
- トコフェロール酢酸エステル錠50mg「ト7」【後】
- 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg(ユベラ)
- 【般】トコフェロール酢酸エステル錠100mg(ユベラN)
- 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%(オゼックス)
- 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg(オゼックス)  
トチモトのコウジン末AM  
トチモトのダイオウ末

- 劇ドネベジル塩酸塩O D錠5mg「明治」 【後】
  - 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg (アリセプト)
  - 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg (アリセプト)
  - 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg (アリセプト)
  - 【般】ドネベジル塩酸塩錠3mg (アリセプト)
  - 【般】ドネベジル塩酸塩錠5mg (アリセプト)
- ドパコール配合錠L 100 【後】
  - ドバトン散98.5%
  - トピエース錠4mg
  - トピエース錠8mg
  - トピナ細粒10%
  - トピナ錠50mg (【般】トピラマート錠50mgへ切替)
  - トピナ錠100mg
  - 【般】トピラマート錠50mg (トピナ)
  - 【般】トピラマート錠100mg (トピナ)
  - 【般】トフィソパム錠50mg (グランダキシン)
  - ドプスO D錠100mg (【般】なし)
  - ドプテレット錠20mg
  - トフラニール錠10mg
  - トフラニール錠25mg
  - トライコア錠80mg (【般】フェノフィブラート錠80mgへ切替)
  - 劇トラクリア錠62.5mg (【般】ポセンタン錠62.5mgへ切替)
- トラセミドO D錠8mg「TE」 【後】
  - 【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg (ルブラック)
  - トラゼンタ錠5mg
  - 劇トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」 【後】
    - ~~【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg (デジレル, レスリン)~~
    - ~~劇トラゾドン塩酸塩錠50mg「アム」【後】~~
    - 【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg (デジレル, レスリン)
    - トラディアンス配合錠A P
    - トラディアンス配合錠B P
- トラニラストカプセル100mg「ト7」 【後】
  - ~~【般】トラニラストカプセル100mg (リザベン)~~
- トラネキサム酸カプセル250mg「ト7」 【後】
  - 【般】トラネキサム酸カプセル250mg (トランサミン)
  - 【般】トラネキサム酸シロップ5% (トランサミン)
  - 【般】トラビジル錠100mg (ロコルナル)
  - トラベルミン配合錠
    - 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 (トラムセット)
    - 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg (トラマール)
    - 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg (トラマール)
- 劇トラマドール塩酸塩O D錠25mg「KO」 【後】
  - 劇トラマールO D錠25mg
    - (トラマドール塩酸塩O D錠25mg「KO」へ切替)
    - (【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mgへ切替)
  - 劇トラマールO D錠50mg
    - (【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mgへ切替)
  - 劇トラムセット配合錠 (院内はトアラセット配合錠「日新」)
  - 向ドラー錠15-15mg (【般】クアゼパム錠15mgへ切替)
  - トランサミンカプセル250mg
    - (院内はトラネキサム酸カプセル250mg「ト7」)
    - (【般】トラネキサム酸カプセル250mgへ切替)
    - トランサミンシロップ5%
    - (【般】トラネキサム酸シロップ5%へ切替)
  - 劇ランデート錠50mg
    - 【般】トリアゾラム錠0.25mg (ハルシオン)
  - 劇トリクロリールシロップ10% [冷]

- トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 【後】
  - 【般】トリクロルメチアジド錠2mg (フルイトラン)
  - トリテレン・カプセル50mg (2026年3月31日経過措置終了)
  - トリブタノール錠10 10mg
  - トリブタノール錠25 25mg
  - 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1% (アーテン)
  - 劇トリメク配合錠
    - トサメブチンマレイン酸塩錠100mg「サリ」【後】
    - 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg (セレキノン)
  - 劇トリンテリックス錠10mg
    - 劇トルカブ錠160mg
    - 劇トルカブ錠200mg
- 劇トルバプタンO D錠3.75mg「TE」 【後】
  - 劇トルバプタンO D錠7.5mg「ホツカ」 【後】
    - (サムスカO D錠7.5mgと適応が揃うまで切替を保留)
    - 【般】トルバプタン顆粒1% (サムスカ)
    - 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠3.75mg (サムスカ)
    - 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg (サムスカ)
    - 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg (サムスカ)
    - 劇トレドミン錠15mg (【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mgへ切替)
    - 劇トレドミン錠25mg (【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mgへ切替)
    - 劇トレドミン錠50mg (【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50mgへ切替)
    - 【般】トレミフェン錠40mg (フェアストン)
    - トレランG液50g [150mL/瓶] (産婦人科外来専用払出し)
    - トレランG液75g [225mL/瓶]
  - 劇トレリーフO D錠25mg
    - (【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg：TREへ切替)
  - 劇トセラフO D錠50mg
    - (【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg：TREへ切替)
  - ~~【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg (ドプス)~~
  - ~~【般】ドロキシピド錠100mg (アブレース)~~
    - (2026年3月31日経過措置終了)
  - 【般】ドロシビリン・エチルストラゾール配合錠・ラセボ錠 (ヤーズ配合錠)
  - 劇トロペロイン細粒1%(2026年3月31日経過措置終了)
  - 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg (ナウゼリン)
  - ~~【般】ドンペリドン錠5mg (ナウゼリン)~~
  - 【般】ドンペリドンシロップ用1% (ナウゼリン)
- ドンペリドン錠10mg「サリ」 【後】
  - 【般】ドンペリドン錠10mg (ナウゼリン)
- 【ナ】
  - ナイキサン錠100mg
  - ナウゼリンドライシロップ1%
  - (【般】ドンペリドンシロップ用1%へ切替)
  - ナウゼリン錠5 5mg
  - ~~ナウゼリンO D錠10mg (院内はドンペリドン錠10mg「サリ」)~~
    - (【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
  - 劇ナゼアO D錠0.1mg
  - ナディック錠30mg
  - ~~【般】ナテグリン錠30mg (スターシス)~~
  - 【般】ナテグリン錠90mg (スターシス)
  - ナトリックス錠1 1mg
  - ~~劇ナフトジール錠2-2mg【後】~~ (【般】ニルバジピン錠2mgへ切替)
- ナフトビジルO D錠25mg「効効」 【後】
  - 【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg (フリバス)
  - 【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg (フリバス)
  - 劇ナポールS-Rカプセル37.5-37.5mg
    - (【般】ジクロフェナクN a徐放カプセル37.5mgへ切替)
  - 【般】ナラトリブタン錠2.5mg (アマージ)

- 麻劇ナルサス錠2mg
- 麻劇ナルサス錠6mg
- 麻劇ナルサス錠12mg
- 麻劇ナルサス錠24mg
- ナルティーク O D錠75mg
- 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg (レミッチ)
- 【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg (レミッチ)
- 麻劇ナルラビド錠1mg
- 麻劇ナルラビド錠2mg
- 麻劇ナルラビド錠4mg
- 【ニ】
- ~~【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg (ベルジピンL A)~~
- ~~【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg (ベルジピンL A)~~
- ニコランジル錠5mg「サリ」 【後】
- ~~【般】ニコランジル錠5mg (シグマート)~~
- ~~ニザチジンカプセル75mg「サリ」【後】~~
- ~~【般】ニザチジンカプセル75mg (アシンオン)~~
- ~~ニザチジンカプセル150mg「サリ」【後】~~
- 【般】ニザチジンカプセル150mg (アシンオン)
- ~~【般】ニザチジン錠75mg (アシンオン)~~
- ニセルゴリン錠5mg「ト7」 【後】 (サアミオン錠5mgから切替)
- 【般】ニセルゴリン錠5mg (サアミオン)
- ニッパスカルシウム顆粒100%
- ~~【般】ニトラゼパム細粒1% (ベンザリン)~~
- 【般】ニトラゼパム錠5mg (ベンザリン)
- ~~【般】ニトレンジピン錠10mg (パイロテンシン)~~
- 劇ニトロペン舌下錠0.3mg 【後】
- 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg
- ニトロールRカプセル20mg  
(【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mgへ切替)
- 劇ニバジール錠4mg (【般】ニルバジピン錠4mgへ切替)
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続) (アダラートL)~~  
劇ニフェジピンL錠20mg「サリ」 【後】
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続) (アダラートL)~~
- 劇ニフェジピンC R錠10mg「サリ」 【後】
- 劇ニフェジピンC R錠20mg「サリ」【後】  
(ニフェジピンC R錠10mg「サリ」へ切替)
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続) (アダラートC R)~~
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) (アダラートC R)~~
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) (アダラートC R)~~
- 【般】ニフェジピン細粒1% 10mg/1g (包) (セバミット)
- ニフレック配合内用剤 [137.155g/プラスチックバッグ]
- 乳酸カルシウム「ケエ」 [1g/P]
- (乳酸カルシウム水和物「ケエ」) 原末へ名称変更)
- 乳酸カルシウム水和物「ケエ」 原末
- (乳酸カルシウム「ケエ」より名称変更)
- 乳糖水和物「シエ」
- 乳糖水和物(粉末) (院内製剤原料)
- 劇ニューベクオ錠300mg
- 劇ニューレプチル細粒10%
- ニューロタン錠25mg (院内はロサルタンK錠25mg「ト7」)  
(【般】ロサルタンK錠25mgへ切替)
- ニューロタン錠50mg (【般】ロサルタンK錠50mgへ切替)
- ~~【般】ニルバジピン錠2mg (ニバジール)~~
- 【般】ニルバジピン錠4mg (ニバジール)
- 【般】ニロチニブカプセル150mg (タシグナ)
- 【般】ニロチニブカプセル200mg (タシグナ)

- 毒ニンラーロカプセル2.3mg
- 毒ニンラーロカプセル3mg
- 毒ニンラーロカプセル4mg
- 【ネ】
- ネイリンカプセル100mg
- ネオドパストン配合錠7100 (院内はドパコール配合錠L100)  
(【般】レポドバ100mg・カルビドバ配合錠へ切替)
- ネオマレルミンTR錠6mg ~~【後】~~  
(d-カルフェニミン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」へ名称変更)  
(【般】d-カルフェニミン酸塩徐放錠6mgへ切替)
- 劇ネオオラル10mgカプセル(院内はシクロスポリンカ7セル10mg「ト7」)  
(【般】シクロスポリンカセル10mg : NEへ切替)
- 劇ネオオラル25mgカプセル(院内はシクロスポリンカ7セル25mg「ト7」)  
(【般】シクロスポリンカセル25mg : NEへ切替)
- 劇ネオオラル50mgカプセル(院内はシクロスポリンカ7セル50mg「ト7」)  
(【般】シクロスポリンカセル50mg : NEへ切替)
- 劇ネオオラル内用液10% [50mL]  
ネキソウムカプセル10mg  
(エソメプラゾールカプセル10mg「ト7」へ切替)  
(【般】エソメプラゾールカプセル10mgへ切替)
- ネキソウムカプセル20mg  
(【般】エソメプラゾールカプセル20mgへ切替)
- ネキソウム懸濁用顆粒分包10mg
- ネキソウム懸濁用顆粒分包20mg
- 劇ネクサバル錠200mg
- ネクセトール錠180mg
- ネシーナ錠6.25mg
- ネシーナ錠12.5mg
- ネシーナ錠25mg
- 【ノ】
- ナイキノン錠10mg (院内はユビデカレノン錠10mg「ト7」)  
(【般】ユビデカレノン錠10mgへ切替)
- ノイロトロピン錠4単位
- ノイロピタン配合錠
- ノウリアスト錠20mg
- 劇ノクサフィル錠100mg
- ノバミン錠5mg
- 劇ノーピア錠100mg
- 劇ノベルジン錠25mg (酢酸亜鉛錠25mg「サリ」へ切替)  
(【般】酢酸亜鉛錠25mgへ切替)
- 劇ノベルジン錠50mg (【般】酢酸亜鉛錠50mgへ切替)
- 【般】ノルバステロン・エチルエストラジオール0.02配合錠 (ルナベルULD)
- 【般】ノルバステロン・エチルエストラジオール0.035配合錠 (ルナベルLD)
- 劇ノルバスク錠2.5mg
- 劇ノルバスク錠5mg
- 劇ノルバスタO-D錠2.5mg
- 劇ノルバスタO-D錠5mg
- ノルバデックタス錠10mg (【般】タモキシフェン錠10mgへ切替)
- ノルバデックタス錠20mg (タモキシフェン錠20mg「サリ」へ切替)  
(【般】タモキシフェン錠20mgへ切替)
- ノルレボ錠1.5mg
- 【ハ】
- バイアグラ錠50mg  
[男性不妊の治療目的で処方された場合のみ保険適用]
- バイアスピリン錠100mg 【後】  
(【般】アスピリン腸溶錠100mgへ切替)
- ハイシー顆粒25% [250mg/1g/P]
- 劇ハイドレアカプセル500mg

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- 劇ハイペン錠200mg (院内はエトドラク錠200mg「SW」)
- ハイボン錠20mg (【般】リポフラビン酪酸エステル錠20mgへ切替)  
劇ハイヤスタ錠10mg
- バイロテンシン錠10mg
- 劇パキシル錠5mg (【般】パロキセチン錠5mgへ切替)
- 劇パキシル錠10mg (【般】パロキセチン錠10mgへ切替)
- 劇パキシル錠20mg (【般】パロキセチン錠20mgへ切替)  
劇パキシルC R錠12.5mg
- 劇パキシルC R錠25mg  
劇バキロピッドパック300 1シート  
劇バキロピッドパック600 1シート  
小児用バクシダール錠50mg
- バクタ配合錠 (院内はダイフェン配合錠)
- 麻劇バシーフカプセル30mg (2026年3月31日経過措置終了)
- 麻劇バシーフカプセル60mg (2026年3月31日経過措置終了)
- 麻劇バシーフカプセル120mg (2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】バゼドキシフェン錠20mg (ピピアント)  
バセトシン細粒10%—100mg/g (ワイドシリン細粒20%へ切替)
- 日本薬局方ハチミツ  
ハッカ水「ケエ」  
ハッカ油「ニコ」(製剤原料)  
バップフォー錠10—10mg  
(【般】プロピベリン塩酸塩錠10mgへ切替)
- パナルジン錠100mg (院内はチクロピジン塩酸塩錠100mg「ト-7」)  
(【般】チクロピジン塩酸塩錠100mgへ切替)
- パナンドライシロップ5%—50mg/g  
(【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5%へ切替)  
劇ハーフジゴキシンK Y錠0.125 0.125mg
- 劇バフェオ錠150mg
- 劇バフェオ錠300mg
- ハーボニー配合錠  
劇バラタールド錠0.5mg (エンテカビルOD錠0.5mg「カイ」へ切替)  
(【般】エンテカビル錠0.5mgへ切替)
- 【般】バラシクロピル錠50% (パルトレックス)
- バラシクロピル錠500mg「ト-7」 【後】
- 【般】バラシクロピル錠500mg (パルトレックス)
- 劇パラミチンカプセル300mg  
パサエット錠5mg (ラベプラゾールN a錠5mg「YD」へ切替)  
(【般】ラベプラゾールN a錠5mgへ切替)
- パサエット錠10mg (院内はラベプラゾールN a錠10mg「ト-7」)  
(【般】ラベプラゾールN a錠10mgへ切替)
- パサエット錠20mg (【般】ラベプラゾールN a錠20mgへ切替)
- 毒バリキサドライシロップ5000mg  
毒バリキサ錠450mg
- 劇ハリゾンシロップ100mg/mL [24mL] 【後】  
バリトッHD [400g/本]
- 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠(イクスフォージ)
- 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠(イクスフォージ)
- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg (ディオバン)
- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg (ディオバン)
- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mg (ディオバン)
- バルサルタン錠40mg「カイ」 【後】
- バルサルタン錠40mg「日新」—【後】—  
(バルサルタン錠40mg「カイ」へ切替)
- 【般】バルサルタン錠40mg (ディオバン)
- バルサルタン錠80mg「日新」—【後】—
- 【般】バルサルタン錠80mg (ディオバン)
- 【般】バルサルタン錠160mg (ディオバン)
- 【般】バルサルタン・ヒドクロキサジド 12.5mg配合錠 (コディオE X)
- 向ハルシオン0.125mg錠
- 向ハルシオン0.25mg錠 (【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替)  
パルトレックス顆粒50%
- パルトレックス錠500mg(院内はバラシクロピル錠500mg「ト-7」)  
(【般】バラシクロピル錠500mgへ切替)
- ハルナールD錠0.2mg  
(院内はタムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」)  
(【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mgへ切替)
- バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 500mL瓶 【後】
- 【般】バルプロ酸Na細粒40% (デパケン)
- 【般】バルプロ酸Na錠200mg (デパケン)
- 【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40% (デパケンR, セレニカR)  
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg「ト-7」 【後】
- 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg (デパケンR, セレニカR)  
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「ト-7」 【後】
- 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg (デパケンR, セレニカR)
- 【般】バルプロ酸Naシロップ5% (デパケン)
- パルモディア錠0.1mg  
パルモディアXR錠0.2mg
- パルモディアXR錠0.4mg
- 向ハルラック錠0.25mg—【後】— (【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替)
- パレリシロップ5%—【後】—  
(【般】バルプロ酸Naシロップ5%へ切替)  
(バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」へ名称変更)
- 【般】パロキセチン錠5mg (パキシル)
- 【般】パロキセチン錠10mg (パキシル)
- 【般】パロキセチン錠20mg (パキシル)  
劇パーデル錠2.5mg  
(【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mgへ切替)
- 劇ハロペリドール細粒1%「ヨトミ」 【後】
- 【般】ハロペリドール細粒1% (セレネース)
- 劇ハロペリドール錠0.75mg「ヨトミ」 【後】
- 【般】ハロペリドール錠0.75mg (セレネース)
- 【般】ハロペリドール錠1mg (セレネース)
- 劇ハロペリドール錠1.5mg「ヨトミ」 【後】
- 【般】ハロペリドール錠1.5mg (セレネース)
- 【般】ハロペリドール錠3mg (セレネース)  
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
- 【般】パンテチン散20% (パントシン)
- パントシン散20%—(パ-)
- 【ヒ】
- ピオグリスロップ65%—500mL—【後】—  
(ラクツロースシロップ65%「効効」へ名称変更)  
(【般】ラクツロースシロップ65%へ切替)  
膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg—5%—[10mL/瓶]  
PL配合顆粒 [1g/P]  
(【般】プロメジン1.35%等配合非βリ系感冒剤 1g/包へ切替)  
幼児用P7配合顆粒—[1g/P]
- ピオグリタゾンOD錠15mg「ト-7」 【後】
- 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg (アクトス)
- 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg (アクトス)  
ピオスリー配合OD錠  
ピオチン散0.2%「カイ」
- ピオフェルミン散剤 【後】
- ピオフェルミンR散 (【般】耐性乳酸菌散0.6%へ切替)
- ピオフェルミン錠剤 【後】 (【般】ピフィズ菌錠12mgへ切替)

- ビカルタミドOD錠80mg「ワイ」【後】  
(ビカルタミドOD錠80mg「ト7」無くなり次第切替)
- ※○劇ビカルタミドOD錠80mg「ト7」【後】(販売中止)  
(ビカルタミドOD錠80mg「ワイ」へ切替予定)
- 【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg(カソデックス)  
劇ビクトルピ配合錠
  - ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」[10mL/瓶]【後】
  - 【般】ピコスルファートNa経口液0.75%10mL(ラクソベロン)
  - ~~【般】ピコスルファートNa錠2.5mg(ラクソベロン)~~  
劇ピ・シフロール錠0.125mg  
(【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mgへ切替)
  - 劇ピ・シフロール錠0.5mg  
(【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mgへ切替)
  - ピジクリア配合錠[50錠/瓶]
  - セスロンH錠200mg  
(【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mgへ切替)  
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「ワイ」【後】(【般】なし)
  - ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ト7」【後】
  - 【般】ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg(メインテート)
  - 【般】ピソプロロールフマル酸塩錠5mg(メインテート)
  - ピタバスタチンCa・OD錠2mg「ト7」【後】
  - 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg(リバロ)
  - 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg(リバロ)
  - 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg(リバロ)
  - ピタメジン配合カプセルB25-25mg(B1と七セ)  
(【般】ベンゾジアゼピン25mg(B1)・B6・B12配合カプセルへ切替)
  - ヒダントール錠25mg  
ピドキシサル錠10mg(ピリドキシサル錠10mg「ワハラ」へ切替)  
(【般】ピリドキシサルリン酸エステル錠10mgへ切替)
  - ビートル顆粒分包250mg
  - ビートルチュアブル錠250mg
  - 毒ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「ワイ」【後】  
(【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg(院外は)へ切替)
  - 毒【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg(プラケニル)  
覚劇ピバンセカプセル20mg  
覚劇ピバンセカプセル30mg
  - ゼピアノト錠20mg(【般】バゼドキシフェン錠20mgへ切替)
  - 【般】ピフィズス菌錠12mg(ピオフェルミン)  
ピフェルトロ錠100mg
  - ピプラマイシン錠100mg  
劇ピプレッソ徐放錠50mg
  - 劇ピプレッソ徐放錠150mg
  - ~~ゼペリデン塩酸塩細粒1%「ワル」【後】~~
  - 【般】ペペリデン塩酸塩細粒1%(アキネトン)
  - ペペリデン塩酸塩錠1mg「ワル」【後】
  - 【般】ペペリデン塩酸塩錠1mg(アキネトン)
  - 【般】ペペリドレート塩酸塩錠50mg(ダクテル)
  - 劇ヒボカ5mgカプセル
  - 劇ヒボカ15mgカプセル  
劇ビムパット錠50mg
  - 劇ビムパット錠100mg  
劇ビムパットドライシロップ10%
  - ピモベンダン錠1.25mg「TE」【後】
  - 【般】ピモベンダン錠1.25mg(アカルディ)
  - ピヨントラ錠400mg  
ピラノアOD錠20mg  
劇ピラフトピカプセル50mg  
ピラマイド原末
- 劇ピリアード錠300mg  
ピリドキシサル錠10mg「ワイ」【後】
- ~~ピリドキシサル錠10mg「ワハラ」【後】~~(供給停止)  
(ピリドキシサル錠10mg「ワイ」へ切替)
  - 【般】ピリドキシサルリン酸エステル錠10mg(ピドキシサル)
  - 劇ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「ト7」【後】
  - 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg(サンリズム)
  - ビルダグリプチン錠50mg「ト7」
  - 【般】ビルダグリプチン錠50mg(エクア)
  - 【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠(エクメット配合錠LD)
  - 【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠(エクメット配合錠HD)
  - ピルタサ懸濁用散分包8.4g[2~8°C]  
ピルトリシド錠600mg
  - 劇ヒルナミン細粒10%  
ヒルナミン錠(5mg)  
ヒルナミン錠(25mg)  
(【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mgへ切替)
  - ピルフェニドン錠200mg「日医工」【後】
  - 【般】ピルフェニドン錠200mg(ピレスパ)  
劇ピレスパ錠200mg(ピルフェニドン錠200mg「日医工」へ切替)  
(【般】ピルフェニドン錠200mgに切替)
  - 劇ピレチア細粒10%  
ピレチア錠(25mg)
  - 【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg(ガストロゼピン)  
劇ピンダケルカプセル20mg
  - 劇ピンマックカプセル61mg
- 【フ】  
劇ファダプス錠10mg  
劇ファビハルタカプセル200mg
- 【般】ファミシクロビル錠250mg(ファミビル)
  - ~~ファミビル錠250mg(【般】ファミシクロビル錠250mgへ切替)~~
  - ファミモチジン散2%「ト7」[0.5g/P]【後】
  - 【般】ファミモチジン散2%0.5g/包(ガスター)
  - ファミモチジンOD錠10mg「ト7」【後】
  - ~~ファミモチジンOD錠20mg「ト7」【後】~~
  - ~~ファミモチジン口腔内崩壊錠10mg(ガスター)~~
  - ~~ファミモチジン口腔内崩壊錠20mg(ガスター)~~
  - ファロムドライシロップ小児用10%100mg/g  
ファロム錠200mg
  - フィコンバ細粒1%  
フィコンバ錠2mg  
フィコンバ錠4mg
  - 【般】フィトナジオン錠5mg(ケーワン)  
劇プイフェンドドライシロップ2800mg[2~8°C]  
劇プイフェンド錠50mg(ポリコナゾール錠50mg「ト7」へ切替)  
劇プイフェンド錠200mg(ポリコナゾール錠200mg「ト7」へ切替)  
劇フィンテプラ内用液2.2mg/mL
  - ~~フェアストーン錠40-40mg(【般】トレミフェン錠40mgへ切替)~~
  - 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg(アレグラ)
  - フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ト7」【後】
  - 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg(アレグラ)
  - 【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠(デルゲラ)  
向劇フェノバル散10%  
向劇フェノバルエリキシル0.4%
  - フェノフィブラート錠80mg「武田ワ」【後】  
(リビディル錠80mgから切替)

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- フェブキソスタット錠10mg「JG」 【後】
- 【般】 フェブキソスタット錠10mg (フェブリク)
- 【般】 フェノフィブラート錠80mg (リビディル)
- ~~フェブキソスタット錠20mg「JG」~~ 【後】  
 フェブリク錠20mg (フェブキソスタット錠20mg「JG」へ切替)  
 (【般】 フェブキソスタット錠20mgへ切替)
- 【般】 フェブキソスタット錠20mg (フェブリク)
- 劇フェマール錠2.5mg (【般】 レトロゾール錠2.5mgへ切替)  
 フェロミア顆粒8.3%  
 フェロミア錠50mg
- ナオイパン錠100mg  
 (院内はカモスタットメシル酸塩錠100mg「ト7」)  
 (【般】 カモスタットメシル酸塩錠100mgへ切替)
- 劇フォサマック錠35mg (【般】 アレンドロン酸錠35mgへ切替)  
 フォシーガ錠5mg  
 フォシーガ錠10mg  
 フォスブロック錠250mg  
 フォゼベル錠5mg  
 フォゼベル錠10mg  
 フォリアミン錠 5mg  
 向プロラム口腔用液2.5mg 0.5mL  
 向プロラム口腔用液5mg 1mL  
 向プロラム口腔用液7.5mg 1.5mL
- 向プロラム口腔用液10mg 2mL  
 劇ブシ末 (調剤用)「ツム7」 3023  
 ブスコパン錠10mg
- 【般】 プチルスコポラミン臭化物錠10mg (ブスコパン)  
 プフェニール顆粒94%
- ~~デライアン錠500mg~~ 【後】  
~~(【般】 エデト酸カルシウム三ナトリウム錠500mgへ切替)~~  
~~毒デラケニル錠200mg~~  
 (ヒドロキシクロキソ硫酸塩錠200mg「74」へ切替)  
 (【般】 ヒドロキシクロキソ硫酸塩錠200mgへ切替)  
 プラザキサカプセル75mg  
 プラザキサカプセル110mg  
 フラジール内服錠250mg
- 【般】 プラスグレル口腔内崩壊錠20mg (エフィエント)
- 【般】 プラスグレル錠2.5mg (エフィエント)
- 【般】 プラスグレル錠3.75mg (エフィエント)
- プラダロン錠200mg (院内はフラボキサート塩酸塩錠200mg「74」)  
 プラノバル配合錠
- ~~デラバスタチンNa錠5mg「74」~~ 【後】
- ~~【般】 デラバスタチンNa錠5mg (メバロチン)~~
- プラバスタチンNa錠10mg「ト7」 【後】
- 【般】 プラバスタチンNa錠10mg (メバロチン)
- ナラピタニンシロップ0.3% (【般】 FADシロップ0.3%へ切替)
- デラピタックス錠25mg (【般】 クロピドグレル錠25mgへ切替)
- デラピタックス錠75mg (院内はクロピドグレル錠75mg「74」)  
 (【般】 クロピドグレル錠75mgへ切替)
- フラボキサート塩酸塩錠200mg「74」 【後】
- ~~【般】 フラボキサート塩酸塩錠200mg (プラダロン)~~
- 【般】 プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg (ピ・シフロール)
- 【般】 プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg (ピ・シフロール)
- 【般】 プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg (ミラベックスL A)
- 【般】 プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg (ミラベックスL A)
- ナラピタル錠20mg (【般】 硝酸イソソルピド徐放錠20mgへ切替)
- プランルカストドライシロップ10%「AFP」 【後】
- 【般】 プランルカストシロップ用10% (オノン)
- プランルカストカプセル112.5mg「74」 【後】
- 【般】 プランルカストカプセル112.5mg (オノン)
- 【般】 プランルカスト錠112.5mg (オノン)
- 【般】 プランルカスト錠225mg (オノン)  
 プリイピアクト錠25mg
- プリイピアクト錠50mg
- フリウェル配合錠L D「モダ」 【後】  
 (【般】 ルエチステロン・エチルエストラジオール0.035配合錠へ切替)  
 劇プリジスタ錠600mg
- ナサバスD錠25mg (院内はナフトビジルOD錠25mg「あすか」)  
 (【般】 ナフトビジル口腔内崩壊錠25mgへ切替)
- ナサバスD錠75mg  
 (【般】 ナフトビジル口腔内崩壊錠75mgへ切替)
- プリミドン細粒99.5%「日医工」
- プリモボラン錠5mg  
 劇フリユザクラカプセル1mg  
 劇フリユザクラカプセル5mg
- プリリント錠60mg  
 プリリント錠90mg
- デサンペラン錠5—5mg (院内はメトクロプラミド錠5mg「NIG」)  
 (【般】 メトクロプラミド錠5mgへ切替)  
 プリンペランシロップ0.1%  
~~(【般】 メトクロプラミドシロップ0.1%へ切替)~~
- ナルイトラン錠2mg (院内はトリクロロメチアジド錠2mg「NP」)  
 (【般】 トリクロロメチアジド錠2mgへ切替)  
 劇ブルキンザカプセル80mg  
 フルコナゾールカプセル100mg「74」 【後】 (【般】 なし)
- ~~【般】 ナルコナゾールカプセル100mg (ジナルカン)~~
- フルスルチアミン錠25mg「ト7」 【後】
- 【般】 フルスルチアミン錠25mg (アリナミンF)
- 【般】 フルタミド錠125mg (オダイン錠)
- 劇フルダラ錠10mg
- 劇フルツロンカプセル200 200mg
- 向フルニトラゼパム錠1mg「74」 【後】
- 【般】 フルニトラゼパム錠1mg (サイレース)
- 【般】 フルバスタチン錠30mg (ローコール)
- デルチアミン錠100mg (院内はイブプロフェン錠100mg「74」)  
 (【般】 イブプロフェン錠100mgへ切替)
- ~~ナルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」~~ 【後】  
 (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了 (予定))
- フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「74」 【後】
- 【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg (デプロメール)
- 【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg (デプロメール)
- 【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg (デプロメール)
- 劇フルメジン散0.2%
- フルメジン糖衣錠(0.25) 0.25mg
- 劇フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 【後】
- 【般】 フレカイニド酢酸塩錠50mg (タンポコール)
- プレガバリンOD錠25mg「明治」 【後】
- プレガバリンOD錠75mg「明治」 【後】
- 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠25mg (リリカ)
- 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠75mg (リリカ)
- 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠150mg (リリカ)  
 劇プレジコピックス配合錠
- ~~デラターナルD錠50mg~~  
 (【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠50mgへ切替)
- ~~デラターナルD錠100mg (院内はシロスタゾールOD錠100mg「74」)~~  
 (【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠100mgへ切替)

- ブレディニン錠25 25mg
- ~~ブレディニン錠50—50mg~~  
ブレディニン O D錠50 50mg  
ブレドニゾロン散「タダ」1%  
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)  
ブレドニン錠5mg  
劇ブレバイミス顆粒分包20mg  
劇ブレバイミス顆粒分包120mg  
劇ブレバイミス錠240mg
- ブレマリン錠0.625mg  
デレミネント配合錠7D  
(【般】ロキソニン50mg・ヒドロコルチゾン配合錠へ切替)
- ~~デレミネント配合錠H D~~  
(【般】ロキソニン100mg・ヒドロコルチゾン配合錠へ切替)
- ~~【般】プロカテロール塩酸塩錠0.025mg (メプチン)~~
- ~~【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg (メプチン)~~
- プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」【後】
- ~~【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% 5μg/mL (メプチン)~~
- 劇プログラフ顆粒0.2mg [0.2mg/包]
- 劇プロダララカプセル0.5mg (タクロリムス錠0.5mg「ト」へ切替)  
(【般】タクロリムスカプセル0.5mgへ切替)
- 劇プロダララカプセル1mg (タクロリムス錠0.5mg「ト」へ切替)  
(【般】タクロリムスカプセル1mgへ切替)
- ~~プロゲステロン錠2.5mg—【後】~~  
(メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」へ名称変更)  
(【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mgへ切替)
- 劇プロサイラン錠20μg (院内はベラプロスト N a錠20μg「サ」)  
(【般】ベラプロスト N a錠20μgへ切替)
- 劇プロスタグランジン E<sub>2</sub>錠0.5mg「科研」  
デロスターール錠25—25mg  
(院内はクロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」へ切替)  
(【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mgへ切替)
- プロセキソール錠0.5mg  
フロセミド細粒4%「EMEC」【後】(【般】なし)
- ~~【般】フロセミド細粒4%~~
- フロセミド錠20mg「NIG」【後】
- ~~【般】フロセミド錠20mg (ラシックス)~~
- ~~【般】フロセミド錠40mg (ラシックス)~~
- プロチアデン錠25 25mg (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)
- 向プロチゾラム O D錠0.25mg「パ」【後】
- ~~【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg (レンドルミン)~~  
~~プロチカジン O D錠10—10mg (ラフチジン錠10mg「ト」へ切替)~~  
(【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- プロナーゼMS 20000単位 [0.5g/P]
- ~~【般】プロナセリン錠4mg (ロナセン)~~
- ~~【般】プロナセリン錠8mg (ロナセン)~~
- 劇プロナセン錠150mg (【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mgへ切替)  
プロバジール錠50mg
- 劇プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オハラ」【後】
- ~~【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg (プロノン)~~
- プロ・バンサイン錠15mg [2~8°C]
- ~~【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg (バップフォー)~~
- ~~【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg (インデラル)~~
- デロプレス錠2mg (【般】カンデサルタン錠2mgへ切替)
- デロプレス錠4mg (院内はカンデサルタン錠4mg「あすか」)  
(【般】カンデサルタン錠4mgへ切替)
- ~~デロプレス錠8mg (【般】カンデサルタン錠8mgへ切替)~~
- ~~デロプレス錠12mg (【般】カンデサルタン錠12mgへ切替)~~
- 劇プロベシア錠0.2mg (保険適用外)
- 劇プロベシア錠1mg (保険適用外)  
デロベラ錠2.5mg (プロゲステロン錠2.5mgへ切替)
- 向プロマゼパム錠2mg「サド」【後】(セニラン錠2mgより名称変更)
- ~~【般】プロマゼパム錠2mg (レキソタン)~~
- プロマック顆粒15% [75mg/0.5g/P]
- プロマック D錠75mg (院内はボラプレジック O D錠75mg「サ」)
- ~~【般】プロムベリドール細粒1% (インプロメン)~~
- ~~【般】プロムベリドール錠1mg (インプロメン)~~
- ~~【般】プロムベリドール錠3mg (インプロメン)~~
- ~~【般】プロメタゾン1.35%等配合非βリソ系感冒剤1g/包 (PL)~~
- ~~【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg (パロデル)~~
- フロモックス小児用細粒100mg (【般】なし)
- ~~【般】セフェキシム塩酸塩細粒10%へ切替~~
- ラロモックス錠100mg  
(院内はセフェキシムピキシル塩酸塩錠100mg「SW」)  
フロリードゲル経口用2% 5g  
劇フロリネフ錠0.1mg
- ~~プロレナール錠5μg~~  
(院内はリマプロストアルファデクス錠5μg「サ」)  
(【般】リマプロストアルファデクス錠5μgへ切替)
- 【へ】
- ~~ペイスン O D錠0.2mg~~  
(【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mgへ切替)
- ~~ペイスン O D錠0.3mg (院内はボグリボース O D錠0.3mg「ト」)~~  
(【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mgへ切替)
- ペオーバ錠50mg
- 劇ペオオン錠80—80mg (【般】ザルトプロフェン錠80mgへ切替)
- ベザツール S R錠200mg(院内はベザフィブラート徐放錠200mg「ト」)  
劇ベサノイドカプセル10mg
- ベザフィブラート徐放錠200mg「ト」【後】
- ~~【般】ベザフィブラート徐放錠200mg (ベザツール)~~  
ペンケア O D錠5mg  
(ソリフェナシンコハク酸塩 O D錠5mg「ト」へ切替)
- 劇ベージニオ錠50mg  
劇ベージニオ錠150mg
- ~~【般】β-ガラクトシダーゼ (アスペルギルス) 散50% (ガラクターゼ)~~
- ~~【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mg (ケルロング)~~
- ベタセレミン配合錠【後】  
(【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠へ切替)
- 向ベタナミン錠50mg—【後】(【般】ペモリン錠50mgへ切替)  
劇ベタニス錠50mg
- ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「ト」【後】
- ~~【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg (メリスロン)~~
- ~~【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 (セレストアミン)~~
- ~~【般】ベタメタゾン錠0.5mg (リンデロン)~~
- 劇ベニジピン塩酸塩錠4mg「ト」【後】
- ~~【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg (コニール)~~  
劇ベネクレクスタ錠10mg  
劇ベネクレクスタ錠50mg  
劇ベネクレクスタ錠100mg
- 劇ベネネット錠2.5mg  
(【般】リセドロン酸 N a錠2.5mgへ切替)
- 劇ベネネット錠17.5mg  
(【般】リセドロン酸 N a錠17.5mgへ切替)
- ヘバン E D配合内用剤 [80g/P]

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- 劇ヘプセラ錠10-10mg
- 劇ヘプシコール錠50mg (ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」へ切替)  
 (【般】ペプリジル塩酸塩錠50mgへ切替)
- 劇ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」【後】
- 劇【般】ペプリジル塩酸塩錠50mg (ペプリコール)
- ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「ト-7」【後】
- 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg (タリオン)
- 【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg (タリオン)
- 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg (タリオン)
- 劇ベマジール錠4.5mg
- 劇ヘマンジオールシロップ小児用0.375%
- 【般】ペミロラストK錠10mg (アレギサル)
- 【般】ペミロラストKシロップ用0.5% (アレギサル)
- 劇ベムリディ錠25mg
- 【般】ペモリン錠50mg (ベタナミン錠)
- 劇ベラサス七A錠60μg (ケアロードL A錠60μgへ切替)
- 【般】ベラバミル塩酸塩錠40mg (ワソラン)
- 劇ベラプロストN a錠20μg「ワイ」【後】
- 【般】ベラプロストN a錠20μg (プロサイリン)
- ベリアクチン錠4mg
- ベリアクチンシロップ0.04%
- ベリキューボ錠2.5mg
- ベリキューボ錠5mg
- ベリキューボ錠10mg
- ベリチーム配合顆粒 [1g/P]
- ペリンドプリルエルブミン錠4mg「ワイ」
- 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg (コバシル)
- 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μg (ペルマックス)
- 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg (ペルマックス)
- ペルサンチン錠25mg (院内はジピリダモール錠25mg「ト-7」)  
 (【般】ジピリダモール錠25mgへ切替)
- ペルサンチン錠100mg (院内はジピリダモール錠100mg「ト-7」)
- ペルジピン七Aカプセル20mg  
 (【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mgへ切替)
- ペルジピン七Aカプセル40mg  
 (【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mgへ切替)
- ベルソムラ錠15mg
- ベルソムラ錠20mg
- ヘルベッサ錠30 30mg  
 (ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ト-7」へ切替)
- ヘルベッサRカプセル100mg  
 (ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「ワイ」へ切替)  
 (【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mgへ切替)
- 劇ベルマックス錠50μg (【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μgへ切替)
- 劇ベルマックス錠250μg (【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μgへ切替)
- 劇ベレキンプル錠80mg
- 劇ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アム」【後】
- 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg (ルーラン)
- ベングッド錠250mg
- 向ベンザリン細粒1%
- 向ベンザリン錠5-5mg (【般】ニトラゼパム錠5mgへ切替)
- 劇ベンズプロマロン錠50mg「NIG」【後】
- 【般】ベンズプロマロン錠50mg (ユリノーム)
- ペンタサ顆粒94% [250mg/P]
- ペンタサ顆粒94% [1000mg/P]
- ペンタサ顆粒94% [2000mg/P]
- ペンタサ錠500mg (【般】メサラジン錠500mgへ切替)
- 【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル(ビタジン)

- 【ホ】
- 劇ボイデヤ錠50mg
- ボカブリア錠30mg
- ホクナンドライシロップ0.1%小児用
- ボグリボースOD錠0.3mg「ト-7」【後】
- ボダサボースODフィルム0.2「QQ」-0.2mg【後】
- ボダサボースODフィルム0.3「QQ」-0.3mg【後】
- 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg (ベイスン)
- 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg (ベイスン)
- 劇ボシュリフ錠100mg
- ボースデル内用液10 [250mL/袋]
- ホスミシンドライシロップ400 400mg/g
- ホスミン錠500 500mg
- ホスリボン配合顆粒
- ホスレノール顆粒分包250mg(【般】炭酸ランタン顆粒250mgへ切替)
- ホスレノールチュアブル錠250mg
- ホスレノールチュアブル錠500mg
- 【般】ボセンタン錠62.5mg (トラクリア)
- 劇ボナロン錠5mg (【般】アレンドロン酸錠5mgへ切替)
- 劇ボナロン錠35mg (院内はアレンドロン酸錠35mg「ト-7」)  
 (【般】アレンドロン酸錠35mgへ切替)
- 劇ボナロン経口ゼリー35mg
- ボノサップパック400 1シート
- ボノピオンパック 1シート
- 毒ポマリストカプセル1mg
- 毒ポマリストカプセル2mg
- 毒ポマリストカプセル3mg
- 毒ポマリストカプセル4mg
- ポラキス錠2-2mg (【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mgへ切替)
- ポラキス錠3-3mg (【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mgへ切替)
- ポラブレジンクOD錠75mg「ワイ」【後】
- 【般】ポラブレジンク顆粒15% 75mg/0.5g(包) (プロマック)
- 【般】ポラブレジンク口腔内崩壊錠75mg (プロマック)
- 【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg (EPLカプセル)  
 (2026年3月31日削除予定)
- ポリカルボフィルC a細粒83.3%「日医工」 [1.2g/P] 【後】
- 劇ポリコナゾール錠50mg「ト-7」【後】
- 劇ポリコナゾール錠200mg「ト-7」【後】
- 【般】ポリコナゾール錠50mg (ブイフェンド)
- 【般】ポリコナゾール錠200mg (ブイフェンド)
- ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」【後】  
 (アーガメイト20%ゼリー25gより名称変更)
- 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%-25g/包 (カリメート)
- 【般】ホリナート錠25mg (ロイコポリン)
- ボルズイ錠2.5mg
- ボルズイ錠5mg
- ボルズイ錠10mg
- 劇ボルタレン錠25mg (【般】ジクロフェナクNa錠25mgへ切替)  
 (院内はジクロフェナクNa錠25mg「ト-7」)
- ポルトラック原末 [6g/P]
- ボンゾール錠100mg
- ボンターランロップ3.25%
- 劇ボンビバ錠100mg
- 【マ】
- 向マイスタン錠5mg
- 向マイスタン錠10mg
- 向マイスナー錠5mg (院内はゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「ワイ」)  
 (【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mgへ切替)

- 向マイスリー錠10mg (【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mgへ切替)
- マヴィレット配合錠  
マグコロール散68%分包50g  
劇マタサルトルP-D錠10mg  
(リザトリプタンOD錠10mg[VTRS]へ切替)  
(【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- マダニット錠500mg—【後】— (【般】酸化マグネシウム錠500mgへ切替)
- 劇マスーレッド錠5mg
- 劇マスーレッド錠12.5mg
- 劇マスーレッド錠25mg
- マーズレンS配合顆粒 [0.67g/P]  
(【般】アズレスリン酸Na・L-グルタミン配合顆粒0.67g/包へ切替)
- マーズレン配合錠1.0ES  
マドパー配合錠 (マドパー配合錠L100へ名称変更)
- マドパー配合錠L50  
マドパー配合錠L100
- 劇マニジピン塩酸塩錠10mg「サリ」—【後】—
- 【般】マニジピン塩酸塩錠10mg (カルスロット)
- 劇マニジピン塩酸塩錠20mg「サリ」—【後】—
- 【般】マニジピン塩酸塩錠20mg (カルスロット)
- 【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg (ルジオミール)
- 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg (ルジオミール)
- マーベロン21 (保険適用外)
- マリゼブ錠12.5mg
- マリゼブ錠25mg
- 【ミ】
- ミオカーム内服液33.3% [125mL/瓶]
- ミオナール錠50mg (院内はエペリゾン塩酸塩錠50mg「ト-7」)  
(【般】エペリゾン塩酸塩錠50mgへ切替)
- 劇ミカトリオ配合錠  
劇ミカカムロ配合錠A-P (テラムロ配合錠A-P「ニアロ」へ切替)
- 劇ミカカムロ配合錠B-P  
(【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠へ切替)  
ミカルヂェス錠40mg (院内はテルミサルタン錠40mg「ニアロ」)  
(【般】テルミサルタン錠40mgへ切替)
- ミカルヂェス錠80mg (【般】テルミサルタン錠80mgへ切替)  
ミグシス錠5mg
- ミグリトール錠50mg「ト-7」 【後】
- 【般】ミグリトール錠50mg (セイブル)  
小児用ミケラン細粒0.2%
- ミケラン錠5mg (【般】カルテオロール塩酸塩錠5mgへ切替)
- ミケランLカプセル15mg
- ミコプティンカプセル150mg  
ミヨソビ配合錠A-P (院内はテルチア配合錠A-P「ト-7」)  
(【般】テルチア40mg・ヒドロコルチゾン配合錠へ切替)
- ミヨソビ配合錠B-P  
(【般】テルチア80mg・ヒドロコルチゾン配合錠へ切替)
- 【般】ミチグリニドCa錠10mg (グルファスト)
- ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
- ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
- ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 【後】
- 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg (メトリジン)  
劇ミニリンメルトOD錠25μg  
劇ミニリンメルトOD錠60μg
- 劇ミニリンメルトOD錠120μg  
ミネプロOD錠1.25mg  
ミネプロOD錠2.5mg  
ミネプロOD錠5mg
- —【般】—ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg (ミノマイシン)  
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「ト-7」 【後】
- —【般】—ミノサイクリン塩酸塩錠100mg (ミノマイシン)
- 【般】ミノドロロン酸錠1mg (ポノテオ)
- 【般】ミノドロロン酸錠50mg (ポノテオ)  
ミノマイシン顆粒2% 20mg/g
- ミノマイシン錠50mg
- ミノマイシнкаプセル100mg  
(院内はミノサイクリン塩酸塩錠100mg「ト-7」)  
ミヤBM細粒 [1g/P]  
劇ミラベックスL A錠0.375mg  
(【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mgへ切替)
- 劇ミラベックスL A錠1.5mg  
(【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mgへ切替)
- 劇ミルタザピン錠15mg「ト-7」 【後】
- 【般】ミルタザピン錠15mg (リフレックス)
- 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg (トレドミン)
- 劇ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アム」 【後】
- 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg (トレドミン)
- 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50mg (トレドミン)  
ミンクリア内用散布液0.8%
- 【ム】
- ムコサールドライシロップ1.5% (【般】なし)
- 【般】—アンプロキシソール塩酸塩シロップ用1.5%へ切替—
- ムコスタ錠100mg (院内はレバミピド錠100mg「ト-7」)  
(【般】レバミピド錠100mgへ切替)
- ムコソルバンD-S3%—[0.5g/P]  
(【般】アンプロキシソール塩酸塩シロップ用3%へ切替)
- ムコソルバン錠15mg  
(【般】アンプロキシソール塩酸塩錠15mgへ切替)
- ムコソルバンL錠45mg  
(【般】アンプロキシソール塩酸塩徐放錠45mgへ切替)
- 小児用ムコソルバンシロップ0.3%  
(【般】アンプロキシソール塩酸塩シロップ0.3%へ切替)
- ムコダインD-S50% (院内はカルボシステインD-S50%「ト-7」)
- ムコダイン錠250mg (院内はカルボシステイン錠250mg「ト-7」)
- ムコダインシロップ5%  
(院内はカルボシステインシロップ小児用5%「ト-7」)  
(【般】カルボシステインシロップ5%へ切替)
- ムコダイン錠15mg—【後】—  
(院内はアンプロキシソール塩酸塩錠15mg「ト-7」へ切替)  
(【般】アンプロキシソール塩酸塩錠15mgへ切替)
- ムルプレタ錠3mg
- ※ 劇ムンデシンカプセル100mg
- 【メ】
- メイアクトMS小児用細粒10% 100mg/g
- メイアクトMS錠100mg
- 向メイラックス錠1mg (院内はロフラゼブ酸エチル錠1mg「サリ」)
- メインテート錠2.5mg  
(院内はピソプロロール fumarate 錠2.5mg「ト-7」)  
(【般】ピソプロロール fumarate 錠2.5mgへ切替)
- メインテート錠5mg  
(【般】ピソプロロール fumarate 錠5mgへ切替)
- 劇メキシチールカプセル50mg
- 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg (メキシチール)  
劇メキシチールカプセル100mg  
(【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mgへ切替)
- 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg (メキシチール)

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- 劇メキニスト錠0.5mg [冷]
- 劇メキニスト錠2mg [冷]
- 劇メクトビ錠15mg
- 【般】メコパミン細粒0.1%500mg 500μg/0.5g包 (メチコパール)
- 【般】メコパミン錠0.5mg (メチコパール)
- 麻劇メサペイン錠5mg
- 麻劇メサペイン錠10mg
- 【般】メサラジン錠500mg (ペンタサ)
- メサラジン腸溶錠400mg「サリ」 【後】
- 【般】メサラジン腸溶錠400mg (アサコール)
- 劇メジコン散10%
- 劇メスチノン錠60mg
- 劇メゼント錠0.25mg [冷]
- 劇メゼント錠2mg [冷]
- 劇メソトレキセート錠2.5mg
- 劇メタクト配合錠L D
- 劇メタクト配合錠H D
- 劇メタライト250カプセル 250mg [冷]
- メタルカプターゼカプセル50mg
- メチコパール細粒0.1% 500μg/0.5g包 【後】
- (【般】メコパミン細粒0.1%500mg 500μg/0.5g包へ切替)
- メチコパール錠500μg 【後】
- (【般】メコパミン錠0.5mgへ切替)
- 劇メチルエルゴメリン錠0.125mg「あすか」
- 劇メトアナ配合錠L D
- 劇メトアナ配合錠H D
- 劇メトグルコ錠250mg
- 劇メトグルコ錠500mg (【般】なし)
- メトクロプラミド錠5mg「NIG」 【後】
- 【般】メトクロプラミド錠5mg (プリンペラン)
- 劇【般】メトトレキサートカプセル2mg (リウマトレックス)
- (【般】メトトレキサート錠2mgへ切替)
- 劇メトトレキサート錠2mg「JG」 【後】
- 劇【般】メトトレキサート錠2mg
- メトピロンカプセル250mg
- 【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg (ロプレソール)
- 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mgMT (メトゲルコ)
- メトサジン錠2mg (【般】ミドドリン塩酸塩錠2mgへ切替)
- メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 【後】
- (プロゲストン錠2.5mgより名称変更)
- 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg (プロハラ)
- 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg (ヒソルH)
- メドロール錠2mg
- メドロール錠4mg
- 【般】メナテレンオンカプセル15mg (グラケウ)
- メニレット70%ゼリー20g/個
- (イソソルビド内服ゼリー70%分包装20g「日医工」へ名称変更)
- メニレット70%ゼリー30g/個
- (イソソルビド内服ゼリー70%分包装30g「日医工」へ名称変更)
- メネシット配合錠250—250mg
- (【般】レボドパ250mg—カルピドパ配合錠へ切替)—
- メパロチン錠5 5mg
- メパロチン錠10—10mg (院内はプラバスタチンN a錠10mg「ト-7」)
- (【般】プラバスタチンN a錠10mgへ切替)
- 劇メフィーゴパック
- メブチンドライシロップ0.005%
- メブチンミニ錠25μg
- (【般】プロカテロール塩酸塩錠0.025mgへ切替)—

- メブチン錠50μg
- (【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mgへ切替)—
- メブチンシロップ5μg/ml
- (院内はプロカテロール塩酸塩シロップ5μg/ml「日医工」)
- (【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% 5μg/mlへ切替)
- 【般】メベンゾラート臭化物錠7.5mg (トランコロン)
- 劇メマリー錠5mg (【般】メマンチン塩酸塩錠5mgへ切替)
- 劇メマリー錠10mg (【般】メマンチン塩酸塩錠10mgへ切替)
- 劇メマリー錠20mg (【般】メマンチン塩酸塩錠20mgへ切替)
- 劇メマリーOD錠5mg (メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」へ切替)
- (【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 劇メマリーOD錠10mg
- (【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- 劇メマリーOD錠20mg
- (【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mgへ切替)
- 劇メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 【後】
- 【般】メマンチン塩酸塩錠5mg (メマリー)
- 【般】メマンチン塩酸塩錠10mg (メマリー)
- 【般】メマンチン塩酸塩錠20mg (メマリー)
- 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg (メマリーOD)
- 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg (メマリーOD)
- 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg (メマリーOD)
- メラトベル顆粒小児用0.2% g
- メリスロン錠6mg (院内はベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「ト-7」)
- メルカゾール錠2.5mg
- メルカゾール錠5mg
- メレックス錠0.5mg (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了)
- メロキシカム錠10mg「ト-7」 【後】
- 【般】メロキシカム錠10mg (モービック)
- 【モ】
- モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 【後】
- 【般】モサプリドクエン酸塩散1% (ガスモチン)
- モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 【後】
- —【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg (ガスモチン)
- 向劇モディオダール錠100mg
- モニラックシロップ65% [600mL]
- (院内はラクツロースシロップ65%「効効」)
- モニラックシロップ65% [10mL/包]
- モーバー錠100mg (販売中止)
- (【般】アクタリット錠100mgへ切替 2026年3月31日削除予定)
- モビコール配合内用剤H D
- モビコール配合内用剤L D (モビコール配合内用剤より名称変更)
- 劇モービック錠10mg (院内はメロキシカム錠10mg「ト-7」)
- (【般】メロキシカム錠10mgへ切替)
- モビプレップ配合内用剤
- 麻毒モルヒネ塩酸塩水和物「効効」原末 g
- 麻劇モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包装10mg「フジト」 0.5g/包 【後】
- (モルベス細粒2%から名称変更)
- 麻劇【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg (12時間持続) (モルベス)
- 麻劇モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
- 麻劇モルベス細粒2%—[0.5g/包]—【後】—
- (モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包装10mg「フジト」へ名称変更)
- モンテルカストOD錠10mg「効効」 【後】
- 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg (キプレス, シングレア)
- 【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包 (キプレス, シングレア)
- 【般】モンテルカスト錠5mg (キプレス, シングレア)
- 【般】モンテルカスト錠10mg (キプレス, シングレア)

- モンテルカストチュアブル錠5mg「ト-7」 【後】  
(キプレスチュアブル錠5mgから切替)
- 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg (キプレス, シングレア)  
【ヤ】  
薬用炭「日医工」(50g)
- ヤーズ配合錠 1シート  
(【般】ドロスピノン・エチルエストラジオール配合錠・ブプレザ錠へ切替)
- ヤーズフレックス配合錠 1シート  
【ユ】  
● 劇ユーエフティE配合顆粒T100 [100mg/0.5g/P]  
● 劇ユーエフティE配合顆粒T150 [150mg/0.75g/P]  
● 劇ユーエフティE配合顆粒T200 [200mg/1g/P]  
● 劇ユーエフティ配合カプセルT100  
● ユーゼル錠25mg (【般】ホリナート錠25mgへ切替)  
ユナシン細粒小児用10% 100mg/g
- ユナシン錠375mg
- 劇ユニシア配合錠H-D  
(【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠へ切替)
- 劇ユニシア配合錠H-D  
(【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替)  
劇ユニファイル7-A錠200mg  
(院内はテオフィリン徐放U錠200mg「ト-7」)  
(【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)へ切替)
- 劇ユバンシ配合錠  
ユービット錠100mg
- ユビデカレノン錠10mg「ト-7」 【後】
- 【般】ユビデカレノン錠10mg (ノイキノン)  
ユベラ顆粒20% (販売中止)  
(トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハ」へ切替)  
ユベラ錠50mg (トコフェロール酢酸エステル錠50mg「ト-7」へ切替)  
(【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mgへ切替)
- ユベラNカプセル100mg  
(【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mgへ切替)  
ユリス錠1mg
- ユリス錠2mg
- 劇ユサノム錠50mg (院内はベンズプロマロン錠50mg「NIG」)  
(【般】ベンズプロマロン錠50mgへ切替)
- 劇ユサーマD錠2mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mgへ切替)
- 劇ユサーマD錠4mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mgへ切替)
- 向ユーロジン2mg錠 (【般】エスタゾラム錠2mgへ切替)  
【ヨ】  
劇ヨウ化カリウム「コザカイ・M」(院内製剤原料)  
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」  
ヨウ化カリウム未  
ヨウ化カリウム内服ゼリー16.3mg「日医工」(備蓄用) [1g/P]  
幼児用P-7配合顆粒[1g/P]
- 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% (インクレミン)
- ヨクイニンエキス錠「コ知」T72  
【ラ】  
● ラキソベロン錠2.5mg (【般】なし)  
(【般】ピコスルファートNa錠2.5mgへ切替)
- ラキソベロン内用液0.75% [75mg/10mL/瓶]  
(【般】ピコスルファートNa経口液0.75% [10mL]へ切替)
- ラクツロースシロップ65%「効効」 【後】  
(ピアレシロップ65%より名称変更)
- 【般】ラクツロースシロップ65% (モニラック)
- 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g/包 (ラグノスNFゼリー)
- ラグノスNF経口ゼリー分包12g 【後】  
(【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g/包へ切替)  
劇ラゲブリオ錠400mg
- 【般】ラコサミドシロップ用10% (ビムパット)
- 【般】ラコサミド錠50mg (ビムパット)
- 【般】ラコサミド錠100mg (ビムパット)  
ラコールNF配合経腸用半固形剤[300g/袋]  
(イノソリッド配合経腸用半固形剤へ切替)  
ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー)[200mL/袋]
- ラコールNF配合経腸用液(コーンフレーバー) [200mL/袋]  
ラコールNF配合経腸用液 [400mL/袋]  
ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL/瓶 [2~8°C]  
ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL/瓶 [2~8°C]  
ラシックス細粒4% (院内はフロセミド細粒4%「EMEC」)  
(【般】フロセミド細粒4%へ切替)  
ラシックス錠20mg (フロセミド錠20mg「NIG」へ切替)  
(【般】フロセミド錠20mgへ切替)
- ラシックス錠40mg (【般】フロセミド錠40mgへ切替)  
ラジレス錠150mg  
劇ラズクルーズ錠80mg  
劇ラステットSカプセル25mg  
ラスピック錠75mg  
ラックビー微粒N 1% [1g/P]  
劇ラツダ錠20mg
- 劇ラツダ錠40mg
- 劇ラツダ錠80mg  
ラディオガルダーゼカプセル500mg  
劇ラニラピッド錠0.05mg (【般】なし)  
劇ラニラピッド錠0.1mg (【般】メチルジゴキシン錠0.1mgへ切替)
- 劇ラバリムス顆粒0.2%  
劇ラバリムス錠1mg  
ラフチジン錠10mg「ト-7」 【後】
- 【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg (プロテカジン)
- ラベキアバック400 1シート  
(販売終了) (2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】ラベタロール塩酸塩錠50mg (トランデート錠へ切替)  
(2026年3月31日削除予定)
- ラベファインバック 1シート
- ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 【後】
- ラベプラゾールNa錠10mg「ト-7」 【後】
- 【般】ラベプラゾールNa錠5mg (パリエット)
- 【般】ラベプラゾールNa錠10mg (パリエット)
- 【般】ラベプラゾールNa錠20mg (パリエット)  
向劇ラボナ錠50mg
- 【般】ラマトロバン錠75mg (バイナス)
- ラミタン錠5mg 【後】 (【般】シンバスタチン錠5mgへ切替)
- 劇ラミクタル錠小児用2mg
- 劇ラミクタル錠小児用5mg  
劇ラミクタル錠25mg (院内はラモトリギン錠25mg「アム」)  
(【般】ラモトリギン錠25mgへ切替)
- 劇ラミクタル錠100mg (【般】ラモトリギン錠100mgへ切替)  
ラミネール錠125mg (テルピナフィン錠125mg「VTRS」へ切替)
- ラメルテオン錠8mg「JG」 【後】
- 【般】ラメルテオン錠8mg (ロゼレム)
- 【般】ラモトリギン錠2mg (ラミクタル)
- 【般】ラモトリギン錠5mg (ラミクタル)
- 劇ラモトリギン錠25mg「アム」 【後】
- 【般】ラモトリギン錠25mg (ラミクタル)

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- 劇ラモトリギン錠100mg「アム」 【後】
- 【般】ラモトリギン錠100mg (ラミクタール)
- 劇ラモトリギン錠小児用5mg「ト7」 【後】
- 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg (エビスタ)
- ランソプラゾールO D錠15mg「サウ」 【後】
- 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg (タケブロン)
- 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg (タケブロン)
- 劇ランデル錠20 20mg  
 ランプレンカプセル50mg [35°C以上禁]
- 【リ】
- リアルダ錠1200mg [冷]
- 劇サウマトレックスカプセル2mg  
 (メトトレキサート錠2mg「JG」へ切替)  
 (【般】メトトレキサート錠2mgへ切替)
- リオナ錠250mg
- リオベル配合錠L D
- リオベル配合錠H D
- 劇サカルボン錠1mg (【般】ミノドロン酸錠1mgへ切替)
- 劇サカルボン錠50mg (【般】ミノドロン酸錠50mgへ切替)
- リクシアナO D錠15mg
- リクシアナO D錠30mg
- リクシアナO D錠60mg
- 劇リザトリプタンO D錠10mg「VTRS」 【後】
- 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg (マクサルトR P D)
- リザベンカプセル100mg
- 劇リスパダール細粒1%
- 劇リスパダールO D錠1mg
- 劇リスパダール内用液1mg/mL [30mL/瓶]
- 劇リスパダール内用液1mg/mL [0.5mL/包]
- 劇リスパダール内用液1mg/mL [1mL/包]
- 劇リスパダール内用液1mg/mL [2mL/包]
- 劇リスベリドン細粒1%「ト7」 【後】
- 【般】リスベリドン細粒1% (リスパダール)
- サスペリドン錠0.5mg「ヨホ」【後】 (【般】なし)  
 (2026年3月31日経過措置終了)
- ~~【般】リスベリドン錠0.5mg (リスパダール)~~
- ~~【般】リスベリドン錠1mg (リスパダール)~~
- 劇リスベリドンO D錠1mg「アム」 【後】
- ~~【般】リスベリドン口腔内崩壊錠1mg (リスパダール)~~
- 劇リスベリドン内用液1mg/mL「効効」 【後】
- 劇リスベリドン内用液分包0.5mg「アム」 [0.1%0.5mL/包] 【後】
- 【般】リスベリドン経口液0.1% 0.5mL (リスパダール)
- 【般】リスベリドン経口液0.1% 1mL (リスパダール)
- 【般】リスベリドン経口液0.1% 2mL (リスパダール)
- 【般】リスベリドン経口液0.1% 3mL (リスパダール)
- リスミー錠1mg (【後】なし)
- リスミー錠2mg (【般】なし)
- サズミツタ錠10mg  
 (院内はアメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「ト7」)  
 (【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mgへ切替)
- 劇リスマダンカプセル50mg  
 (院内はジソピラミドカプセル50mg「アザ」)  
 (【般】ジソピラミドカプセル50mgへ切替)
- 劇リスマダンR錠150mg  
 (【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mgへ切替)
- 向リーゼ錠5mg (院内はクロチアゼラム錠5mg「サウ」)
- 【般】リセドロン酸N a錠2.5mg (アクトネル)
- 【般】リセドロン酸N a錠17.5mg (アクトネル)
- 【般】リセドロン酸N a錠75mg (アクトネル)
- 劇リセドロン酸N a錠75mg「ト7」 【後】
- 向劇リタリン錠10mg
- サツタル配合顆粒 [4.74g/P]【後】 (販売中止)  
 (リーバクト配合顆粒へ切替)  
 (【般】イロイシ・ロイシ・ハ'リ配合顆粒 4.74g/包へ切替)
- 劇リットフォーロカプセル50mg
- 劇リトゴビ錠4mg
- リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」 【後】
- 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg (ウテメリン)  
 リーバクト配合顆粒 [4.15g/P]
- リーバクト配合経口ゼリー [20g/個]
- リバクレオン顆粒300mg分包  
 リバクレオンカプセル150mg
- リバゼブ配合錠L D
- リバゼブ配合錠H D
- サバロO D錠1mg  
 (【般】ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠1mgへ切替)
- サバロO D錠2mg (院内はピタバスタチンC a・O D錠2mg「ト7」)  
 (【般】ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠2mgへ切替)
- サバロO D錠4mg  
 (【般】ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠4mgへ切替)
- リバーロキサバンO D錠10mg「ハ'イル」 【後】
- 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg (イゲザレルト)
- リバーロキサバンO D錠15mg「ハ'イル」 【後】
- 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg (イゲザレルト)  
 サビディール錠80mg  
 (院内はフェノフィブラート錠80mg「武田テバ」へ切替)  
 (【般】フェノフィブラート錠80mgへ切替)
- サビトール錠10mg (【般】アトルバスタチン錠10mgへ切替)
- サファジンカプセル150mg  
 (院内はリファンピシンカプセル150mg「サド」)  
 リファンピシンカプセル150mg「サド」 【後】 (【般】なし)
- ~~【般】サファジンカプセル150mg (サファジン)~~  
 リフキシマ錠200mg  
 劇リプテンシティ錠200mg
- リフヌア錠45mg  
 劇サラレックス錠15mg (ミルタザピン錠15mg「ト7」へ切替)  
 (【般】ミルタザピン錠15mgへ切替)
- 劇リベルサス錠3mg
- 劇リベルサス錠7mg
- 劇リベルサス錠14mg  
 向リポトリール細粒0.5%
- 向リポトリール錠0.5mg
- サボバズ錠5—5mg (【般】シンバスタチン錠5mgへ切替)
- 【般】リポフラビン酪酸エステル錠20mg (ハイボン)  
 劇サーマス錠100—100mg (炭酸リチウム錠100「大正」へ切替)
- 劇サーマス錠200 200mg (院内は炭酸リチウム錠200「大正」)
- 劇リマチル錠100mg
- リマプロストアルファデクス錠5μg「サウ」 【後】
- 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg (オハルモン, プ'ロネール)  
 劇リムパーザ錠100mg  
 劇リムパーザ錠150mg  
 毒硫酸アトロピン「社付」  
 (アトロピン硫酸塩水和物「社付」原末へ名称変更)  
 硫酸マダネンウム「東海」 (院内製剤原料) (販売中止)  
 ササカO D錠25mg (プレガバリンO D錠25mg「明治」へ切替)  
 (【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mgへ切替)

- サリカチン錠75mg (プレガバリンOD錠75mg「明治」へ切替)  
(【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mgへ切替)
- サリカチン錠150mg  
(【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mgへ切替)
- リルゾール錠50mg「エプソ」 【後】
- 【般】リルゾール錠50mg (リルテック)  
サルテック錠50-50mg (サルゾール錠50mg「エプソ」へ切替)  
(【般】リルゾール錠50mgへ切替)
- 劇リンヴォック錠7.5mg
- 劇リンヴォック錠15mg
- 劇リンヴォック錠30mg
- 劇リンヴォック錠45mg
- 劇リン酸コデイン散1%「ハイ」
- リン酸水素カルシウム水和物「エビス」  
(リン酸水素カルシウム水和物「ミダ」から切替)  
リンゼス錠0.25mg  
リンデロン錠0.5mg  
リンデロンシロップ0.01%
- 【ル】
- ルジオミール錠10mg
- ルジオミール錠25mg (【般】マプロチリン塩酸塩錠25mgへ切替)  
ルセフィ錠2.5mg
- ルセフィODフィルム2.5mg
- ルトラール錠2mg
- ルナベル配合錠H7D  
(【般】ルエチステロン・エチルエストラジオール0.02mg配合錠)
- ルナベル配合錠H7D  
(【般】ルエチステロン・エチルエストラジオール0.035mg配合錠へ切替)  
ルネスタ錠1mg (エスゾピクロン錠1mg「日新」へ切替)
- ルネスタ錠2mg  
ルパフィン錠10mg
- 劇ルブキネスカプセル7.9mg  
ルプラック錠8mg (トラセミドOD錠8mg「TE」へ切替)
- ルボクサス錠25-25mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替)
- ルボクサス錠50-50mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替)
- ルボクサス錠75-75mg  
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替)
- 劇ルマケラス錠120mg
- 劇ルーラン錠4mg (院内はペロスピロン塩酸塩錠4mg「アム」)  
(【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mgへ切替)
- 【レ】
- 劇レイボー錠50mg
- 劇レイボー錠100mg  
劇レキサルティOD錠0.5mg  
劇レキサルティOD錠1mg
- 劇レキサルティOD錠2mg
- 劇レキサルティOD錠2mg (採用薬はプロマゼパム錠2mg「サド」へ切替)
- 劇レキップ錠0.25mg (【般】ロピニロール錠0.25mgへ切替)  
劇レキップ錠1mg (院内はロピニロールOD錠1mg「アム」)  
(【般】ロピニロール口腔内崩壊錠1mgへ切替)
- 劇レキップ錠2mg (【般】ロピニロール錠2mgへ切替)  
劇レキップC-R錠2mg (院内はロピニロール徐放錠2mg「ト」)  
(【般】ロピニロール徐放錠2mgへ切替)
- 劇レキップC-R錠8mg (【般】ロピニロール徐放錠8mgへ切替)  
劇レキサプロ錠10mg (【般】エスシタロプラム錠10mgへ切替)  
レクチゾール錠25mg
- レグテクト錠333mg
- レグナイト錠300mg
- レグバラ錠12.5mg  
レグバラ錠25mg
- レザルタス配合錠LD  
レザルタス配合錠HD  
レスタミンコーワ錠10mg  
レスピア静注・経口液60mg 3mL瓶  
レスプレ錠20mg
- 劇レスサン錠50-50mg (【般】トラゾドン塩酸塩錠50mgへ切替)  
劇レズロック錠200mg
- 劇レットヴィモカプセル40mg
- 劇レットヴィモカプセル80mg
- 劇レトロゾール錠2.5mg「ケル」 【後】
- 【般】レトロゾール錠2.5mg (フェマール)  
劇レトロピルカプセル100mg  
レナデックス錠4mg
- 毒レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」 【後】
- 毒【般】レナリドミドカプセル2.5mg (レプラミド)
- 毒レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 【後】
- 毒【般】レナリドミドカプセル5mg (レプラミド)
- セニペーン錠2.5-2.5mg  
(【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mgへ切替)
- セニペーン錠5mg (院内はエナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ト」)  
(【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mgへ切替)
- 劇レバグリニド錠0.25mg「サウ」 【後】
- 【般】レバグリニド錠0.25mg (シュアポスト)
- 劇レバグリニド錠0.5mg「サウ」 【後】
- 【般】レバグリニド錠0.5mg (シュアポスト)  
セバチオ懸濁用ドライシロップ900mg  
レバチオ錠20mg (【般】シルデナフィル錠20mg:REへ切替)
- レバミビド錠100mg「ト」 (【般】加算なし)
- 【般】レバミビド錠100mg (ムコスタ)  
毒レプラミドカプセル2.5mg  
(【般】レナリドミドカプセル2.5mgへ切替)
- 毒レプラミドカプセル5mg  
(【般】レナリドミドカプセル5mgへ切替)
- レベチラセタムDS50%「ト」 【後】
- レベチラセタム錠500mg「サウ」 【後】
- 【般】レベチラセタム錠500mg (イーケプラ)
- 【般】レベチラセタムシロップ用50% (イーケプラドライシロップ)
- レボカルニチンFF錠250mg「ト」 【後】
- 【般】レボカルニチンFF錠250mg (エルカルチン)
- レボカルニチンFF内用液10%「ト」 【後】
- 【般】レボカルニチンFF経口液10% (エルカルチン)
- レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サド」 【後】  
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ト」 【後】
- 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg (ザイザル)
- 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% (ザイザルシロップ)
- 劇レボチロキシンNa錠25μg「サド」
- 劇レボチロキシンNa錠50μg「サド」
- 【般】レボドバ100mg・カルビドバ配合錠 (ネオドバストンL)
- 【般】レボドバ250mg・カルビドバ配合錠 (メネシット)
- 【般】レボフロキサシン錠250mg  
レボフロキサシン錠500mg「サウ」 【後】
- 【般】レボフロキサシン錠500mg (クラビット)
- 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg (ヒルナミン)  
劇レボレード錠12.5mg

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- 劇レミッチカプセル2.5 $\mu$ g（販売中止）  
 （【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 $\mu$ gへ切替）  
 劇レミッチOD錠2.5 $\mu$ g  
 （【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 $\mu$ gへ切替）  
 劇レミニールOD錠4mg  
 （【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mgへ切替）  
 劇レミニールOD錠8mg  
 （【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mgへ切替）
- 劇レミニールOD錠12mg  
 （【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mgへ切替）
- レリフェン錠400mg  
 劇レリミナ錠40mg
- 向レンドルミンD錠0.25mg  
 劇レニピマカプセル4mg  
 劇レニピマカプセル10mg  
 【口】  
 劇ロイケリン散10%  
 ロイコボリン錠5mg  
 ロイコン錠10mg
- 劇ロカルトロールカプセル0.25—0.25 $\mu$ g  
 （【般】カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ gへ切替）
- ローガン錠10mg
- ~~【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg（アルタト）~~
- ロキソニン錠60mg（院内はロキソプロフェンN a錠60mg「ト7」）  
 （【般】ロキソプロフェンN a錠60mgへ切替）
- 【般】ロキソプロフェンN a錠60mg（ロキソニン）
- ロキソプロフェンN a錠60mg「ト7」 【後】  
 ロケルマ懸濁用散分包装5g 1包
- ロケルマ懸濁用散分包装10g 1包
- ロヨール錠30mg（【般】フルバスタチン錠30mgへ切替）
- ロヨルナール錠100mg（【般】トラビジル錠100mgへ切替）
- ロサルタンK錠25mg「ト7」 【後】
- 【般】ロサルタンK錠25mg（ニューロタン）
- 【般】ロサルタンK錠50mg（ニューロタン）
- 【般】ロサルタン100mg・ヒドロクロアジド配合錠（プレミネントHD）
- 【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロアジド配合錠（プレミネントLD）  
 ロスゼット配合錠HD  
 （【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠へ切替）
- ロスバスタチンOD錠2.5mg「サ7」 【後】
- 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg（クレストール）
- 【般】ロスバスタチン錠5mg（クレストール）  
 劇ロズリートレカカプセル100mg  
 劇ロズリートレカカプセル200mg  
 ロゼレム錠8mg（ラメルテオン錠8mg「JG」へ切替）  
 （【般】ラメルテオン錠8mgへ切替）  
 劇ロタリックス内用液 1.5mL/本 [冷]
- 劇ロートエキス散 10%
- 劇ロドピン錠25mg（ゾテピン錠25mg「効効」2026年3月31日経過措置  
 終了が無くなり次第切替）  
 ロトサガ粒状カプセル2g—[2g/包]  
 （オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ト7」へ切替）  
 （【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2gへ切替）  
 劇ロナセン錠4mg（【般】プロナンセリン錠4mgへ切替）
- 劇ロナセン錠8mg（【般】プロナンセリン錠8mgへ切替）
- 劇ロピニロールOD錠1mg「アル」 【後】
- 【般】ロピニロール口腔内崩壊錠1mg（レキップ）
- 【般】ロピニロール錠0.25mg（レキップ）
- 【般】ロピニロール錠1mg（レキップ）

- 【般】ロピニロール錠2mg（レキップ）
- 劇ロピニロール徐放錠2mg「ト7」 【後】
- 【般】ロピニロール徐放錠2mg（レキップCR）
- 【般】ロピニロール徐放錠8mg（レキップCR）
- 向ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サ7」 【後】
- ~~【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg（メイラックス）~~  
 劇ロプレソール錠20mg  
 劇ローブレナ錠25mg  
 劇ローブレナ錠100mg  
 ロペミン細粒0.1%（【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.1%へ切替）
- ロペミンカプセル1mg（院内はロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サ7」）
- ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サ7」 【後】
- 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg（ロペミン）
- 向ロラゼパム錠0.5mg「サ7」 【後】
- ~~【般】ロラゼパム錠0.5mg（ワイパックス）~~
- 【般】ロラタジン錠10mg（クラリチン）
- 【般】ロラタジンシロップ用1% 0.5g（包）（クラリチン）  
 劇ロルカム錠4mg（ロルノキシカム錠4mg「KO」へ切替）
- 劇ロルノキシカム錠4mg「KO」 【後】
- ~~【般】ロルノキシカム錠4mg（ロルカム）~~  
 劇ロンサーフ配合錠T15  
 劇ロンサーフ配合錠T20
- 【ワ】
- 劇ワイテンス錠2mg  
 ワイドシリン細粒20% 【後】
- 向ワイパックス錠0.5 0.5mg  
 劇ワゴスチグミン散(0.5%)  
 ワソラン錠40mg（【般】ペラパミル塩酸塩錠40mgへ切替）
- ワーファリン顆粒0.2%  
 ワーファリン錠0.5mg  
 ワーファリン錠1mg  
 ワルファリンK細粒0.2%「NS」 【後】
- ~~【般】ワルファリンK細粒0.2%（ワーファリン）~~
- 劇ワシアルファ錠0.5 $\mu$ g  
 （【般】アルファカルシドール錠0.5 $\mu$ gへ切替）  
 劇ワントラム錠100mg

## 外用薬リスト

- 【ア】
- 劇アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL1個
  - ※ アイドロイチン1%点眼液 5mL 【後】 (販売中止)  
(コンドロイチン点眼液1%「日点」へ切替)  
(【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mLへ切替)
  - 劇アイノフロー吸入用800ppm (NICUの限定使用)  
アイノフロー点眼液0.1% 5mL  
(プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」へ切替)  
(【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%へ切替)
  - アイベータ配合点眼液 5mL/瓶  
アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/瓶
  - 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ 【後】
  - 【般】亜鉛華単軟膏10% (サトウザルベ)  
テタアチムクリーム1% 10g (院内はナジフロキサシンクリーム1%「トワ」)  
(【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g/本へ切替)  
テタアチムローション1% 20mL  
(ナジフロキサシンローション1%「トワ」へ切替)  
(【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本へ切替)  
アクトシン軟膏3% 30g [冷]  
アクトシン軟膏3% 200g [冷]  
アジマイシン点眼液1% 2.5mL/瓶 [冷]
  - 劇亜硝酸アミル「AFP」 0.25mL1管 [冷]
  - アスタット軟膏1% 10g (【般】なし)  
(【般】ラノヨナゾール軟膏1% 10mg/本へ切替)  
アズノール軟膏0.033% 20g  
アズノール軟膏0.033% 500g (供給停止)  
(アズノール軟膏0.033% 20gへ切替)  
アズノールS T錠口腔用5mg  
アズノール液(0.5%) 50mL/瓶
  - アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 6mg1キット  
(販売中止) (2026年3月31日経過措置終了(予定))
  - アズレンうがい液4%「ケンエ」 5mL 【後】
  - 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% 5mL/瓶
  - 【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 2g/包 (ハチアズレ)
  - 劇アセサイド6%消毒液(第一剤, 第二剤とも800mLセット) [1~25°C]  
[内視鏡洗浄消毒装置OER-4専用]
  - 劇アセサイド6%消毒液(第一剤, 第二剤とも875mLセット) [1~25°C]  
[内視鏡洗浄消毒装置OER-3専用]
  - アセチロールクリーム20% 25g 【後】  
(尿素クリーム20%「SUN」へ名称変更)  
(【般】尿素クリーム20% 25g/本へ切替)
  - 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg (アンヒバ)
  - アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL
  - 【般】アダバレンゲル0.1% 15g/本 (ディフェリンゲル)
  - アテキュラ吸入用カプセル低用量  
アテキュラ吸入用カプセル中用量  
アテキュラ吸入用カプセル高用量  
アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g1瓶  
アドエア100ディスクス60吸入用 60リットル1キット
  - アドエア250ディスクス60吸入用 60リットル1キット
  - アドエア500ディスクス60吸入用 60リットル1キット
  - アドフィードパップ40mg 10cm×14cm(7枚入)  
劇日点アトロピン点眼液1% 5mL
  - アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 1キット
  - アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 1キット
  - アノーロエリプタ7吸入用 1キット  
アノーロエリプタ30吸入用 1キット
  - ~~アフラタシール25μg 1枚(10枚入) 【後】~~  
(トリウムシロロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」へ名称変更)  
~~アボコート軟膏0.1% 5g 【後】~~
  - アボハイドローション20% 4.32g/本  
アラセナ-A軟膏3% 5g (【般】ピダラビン軟膏3% 5g/本へ切替)  
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g1キット  
(【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用へ切替)
  - アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 5mg10g1キット  
(【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用へ切替)  
アリケイス吸入液590mg 8.4mL瓶 [2~8°C]
  - 劇アリドネパッチ27.5mg 1枚
  - 劇アリドネパッチ55mg 1枚
  - ~~【般】アルカメゲン「ロビ」お酸エステル軟膏0.1% 5g/本 (アルメタ軟膏)~~  
アルト原末 500mg1管
  - アルメタ軟膏 0.1%5g (【般】なし)  
(【般】アルカメゲン「ロビ」お酸エステル軟膏0.1% 5g/本へ切替)
  - アレサガテープ4mg 1枚
  - アレサガテープ8mg 1枚
  - ※ アレジオンL X点眼液0.1% 5mL/瓶  
(エピナスチン塩酸塩L X点眼液0.1%「SEC」へ切替)  
(【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%へ切替)  
アレジオン眼瞼クリーム0.5% 2g/本  
アロンアルファA「三共」0.5g1管 [冷] (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了(予定))
  - 劇アンテベート軟膏0.05% 5g  
(院内は「タメゾン酪酸エステル」お酸エステル軟膏0.05%「MYK」)
  - 劇アンテベートクリーム0.05% 5g  
(院内は「タメゾン酪酸エステル」お酸エステルクリーム0.05%「MYK」)
  - 劇アンテベートローション0.05% 10g  
(院内は「タメゾン酪酸エステル」お酸エステルローション0.05%「JG」)  
アンヒバ坐剤小児用100mg [冷]  
アンヒバ坐剤小児用200mg [冷]  
(【般】アセトアミノフェン坐剤200mgへ切替)
  - 麻劇アンベック坐剤10mg
  - 【イ】  
イオウ・カンフルローション「東豊」 500mL [冷]  
劇イクセロンパッチ4.5mg 1枚  
(【般】リバスチグミンテープ4.5mgへ切替)
  - 劇イクセロンパッチ9mg 1枚  
(【般】リバスチグミンテープ9mgへ切替)
  - 劇イクセロンパッチ13.5mg 1枚  
(【般】リバスチグミンテープ13.5mgへ切替)
  - 劇イクセロンパッチ18mg 1枚  
(【般】リバスチグミンテープ18mgへ切替)  
産婦人科用イソジンクリーム5% 250g  
イソジンガーゲル液7% 30mL  
(ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」30mLへ切替)  
(【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本へ切替)  
イソジンゲル10% 90g
  - イソジンシュガーパスタ軟膏100g 【後】 (販売中止)  
(【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100g/瓶へ切替)
  - イソジンシュガーパスタ軟膏500g 【後】
  - 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL/瓶 (イシキエ)  
イナビル吸入粉末剤20mg 1キット
  - 劇イミグラン点鼻液20 20mg0.1mL1個  
劇イムノブラダー膀胱注用80mg 1瓶 (溶解液付) [冷]

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- インターール吸入液1%—2mL1管 (ケレグ<sup>®</sup> リ酸Na a 吸入液1%「サウ」)
- インテバンクリーム1% 50g
- インテバン外用液1%—50mL  
 (【般】インドメタシン外用液1% 50mL/本へ切替)
- 【般】インドメタシン外用液1% 50mL/本 (インテバン)

【ウ】

- ※ ウエルアップハンドローション0.5% 1L  
 (ヒビスコール液A 1% 1Lへ切替)
- ウトロゲスタン腔用カプセル200mg
- ウルティプロ吸入用カプセル  
 ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3% 3L

【エ】

- ゼイゾプト懸濁性点眼液1%—5mL  
 (【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶へ切替)
- 劇エイベリス点眼液0.002% 2.5mL [2~8°C]  
 エキザルベ軟膏 5g  
 エキザルベ軟膏 500g  
 エクラープラスター20 $\mu$ g/cm<sup>2</sup> (1.5mg)7.5cm×10cm
- エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用
- エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用
- エクロックゲル5%
- エコリシン眼軟膏 3.5g  
 ACD-A液 500mL1袋  
 エスクレ坐剤「250」 250mg [冷]
- エストラナテープ0.09mg 1.125cm<sup>2</sup>1枚
- エストラナテープ0.18mg 2.25cm<sup>2</sup>1枚
- エストラナテープ0.36mg 4.5cm<sup>2</sup>1枚
- エストラナテープ0.72mg 9cm<sup>2</sup>1枚  
 エストリアル腔錠0.5mg
- 【般】エストリアル腔錠0.5mg
- SPTローチ0.25mg「明治」【後】  
 (【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mgへ切替)
- エタノール[局] 500mL
- 【般】エタノール外用液  
 エタノール[無水] 500mL  
 エナジア吸入用カプセル中用量  
 エナジア吸入用カプセル高用量
- 劇エビデュオゲル 15g  
 エピナスチン塩酸塩L X点眼液0.1%「SEC」 5mL瓶 【後】
- 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1% (アレジオンL X)
- 【般】エフィナコナゾール外用液10% (クレナフィン爪外用液)  
 劇エムラクリーム 5g [凍結を避け30°C以下]  
 劇エムラパッチ 1枚 [禁凍結]
- エリザスカプセル外用用400 $\mu$ g
- エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用 5.6mg1瓶  
 ゼルエイジ—10液—10%500mL—【後】— (販売中止)  
 (サテニジン液10へ切替) (2026年3月31日経過措置終了)  
 塩化アルミニウム(6水和物) 500g  
 塩化ナトリウム 500g  
 塩化ベンザルコニウム液 (=逆性石ケン液0.025「ヨダ」) 0.025%5L
- エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用  
 ゼンペンド外用液1%—10mL  
 (クロトリマゾール外用液1%「日医工」へ切替)
- ゼンペンドタナーム1%—10g  
 (【般】クロトリマゾールクリーム1% 10g/本へ切替)

【オ】

- オイラックスクリーム10% 500g
- オイラックスHクリーム 5g

- オオサキCHG消毒綿0.2% [2枚/包] (物品供給センターで取扱い)
- 劇オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g 10g  
 (【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10g/本へ切替)

- 劇オキサロールローション25 $\mu$ g/g 10g
- オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」【後】
- 【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg (オキナゾール)  
 オキシシ9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入 252 $\mu$ g1キット  
 オキシドール「ケエ」 500mL  
 オキナゾール錠600mg (オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」)  
 オクソラレン軟膏0.3%—10g  
 オクソラレンローション0.3%—60mL  
 オスバン消毒液10% 500mL  
 (【般】ベンザルコニウム塩化物外用液10% 500mL/本へ切替)
- オフミック点眼液 5mL/瓶 【後】
- オフロキサシンゲル化点眼液0.3%「わかもと」 5mL [冷] 【後】  
 オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニト」 3.5g  
 (オフロキシ眼軟膏0.3%より名称変更)  
 オフロキシ眼軟膏0.3%—3.5g  
 (オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニト」へ名称変更)
- オベガードMA眼灌流液 20mL  
 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%—0.85mL筒—[冷]—【後】—  
 (ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」へ名称変更)
- オラネジン液1.5%OR消毒用7リケ<sup>®</sup>10mL  
 オラネジン液1.5%OR消毒用7リケ<sup>®</sup>25mL  
 オラビ錠口腔用50mg  
 オリブ油(丸石) 500mL  
 オリブ油「ヨダ」(滅菌済) 100mL
- オルテクサー口腔用軟膏0.1% 5g 【後】  
 (【般】トリアシノアセト<sup>®</sup> 口腔用軟膏0.1% 5gへ切替)
- オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g1キット  
 オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g1キット
- 【般】オロパタジン点眼液0.1% (パタノール)
- オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g

【カ】

- カタリンK点眼用0.005% 15mL
  - ガチフロ点眼液0.3% 5mL  
 カデックス軟膏0.9% 40g
  - カトレップテープ35mg 7cm×10cm(7枚入)  
 (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了)
  - カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 2.5mL 【後】
  - 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL/瓶 (ミケランLA)
  - 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本 (フロジン外用液)
- 【キ】
- キサラタン点眼液0.005%—2.5mL—[冷]  
 (院内はラタノプロスト点眼液0.005%「サウ」)  
 (【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/瓶へ切替)
  - キシロカイン液「4%」 100mL  
 キシロカイン点眼液4% 20mL/瓶 [冷]
  - 劇キシロカインポンプスプレー8% 80g 【後】  
 キシロカインゼリー2% 30mL  
 逆性石ケン液0.025「ヨダ」 (=塩化ベンザルコニウム液0.025%)—5L  
 (販売中止) (500mL/瓶へ切替)  
 逆性石ケン液0.025「ヨダ」  
 (=塩化ベンザルコニウム液0.025%) 500mL/瓶
  - キュパール50エアゾール 7mg8.7g
  - キュパール100エアゾール 15mg8.7g  
 劇ギリアデル脳内留置用剤7.7mg 1箱(8枚入) [-15°C以下]

- キンダベート軟膏0.05%—5g (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
(クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イキ」へ切替)  
(【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 5g/本へ切替)
- 【ク】
  - クエン酸ナトリウム 500g
  - グラアルファ配合点眼液 5mL/瓶
  - グラナテック点眼液0.4% 5mL
- タラピット点眼液1.5%—5mL  
(レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」へ切替)  
(【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/瓶へ切替)
- 劇グリジールスカルプローション0.05% 10g/本  
(デルモベートスカルプローション0.05%が無くなり次第切替)
  - グリセリン 500mL
  - グリセリン「ケエ」(滅菌済) 25mL
  - ダリセサン「ヨダ」(滅菌済)—100mL (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)
  - グリセリンB C液「ヨダ」 100mL (ポリ)
  - グリセリン洗腸「オタ」小児用30 50%30mL 【後】
  - グリセリン洗腸液50%「ケエ」 60mL
  - グリセリン洗腸液50%「ケエ」 120mL
- 【般】 クリダマイシン酪酸エステルゲル1% 10g/本 (ダラシンTゲル)
- グルコン酸クオールヘキシジン液 (=ステリカW液0.05) 0.05%500mL
- タレナフィン爪外用液10%—3.56g  
(院外は【般】エフィナコナゾール外用液10%へ切替)
- 【般】 クロトリマゾール外用液1% 15mL/本 (エンベシド外用液)
- 劇クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イキ」 5g/本 【後】
- 【般】 クロベタゾン酪酸エステル外用液0.05% 10g/本 (デルモベート)
- 【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 5g/本
- クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イキ」 5g/本  
(キンダベート軟膏0.05%が無くなり次第切替)
- 【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 5g/本 (キンダベート軟膏)
- 【般】 クロトリマゾールクリーム1% 10g/本 (エンベシドクリーム)
- クロマイ錠錠100mg
- クロモグリク酸Na吸入液1%「サウ」 2mL1管 【後】
- クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 250mL
- 【般】 クオールヘキシジングルコン酸塩外用液0.05% 500mL/本 (ヒピテン)
- 【ケ】
  - ケトコナゾールクリーム2%「イキ」 10g/本 【後】  
(ニゾラールクリーム2%から切替)
  - 【般】 ケトコナゾールクリーム2% 10g/本 (ニゾラールクリーム)
  - ケトプロフェンテープ20mg「BMD」 7cm×10cm (7枚入) 【後】
  - 【般】 ケトプロフェンテープ 20mg(7×10cm非温感) 7枚/袋 (モラステープ)
  - 【般】 ケトプロフェンテープ 40mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (モラステープ)
  - ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm (7枚入) 【後】
  - 【般】 ケトプロフェンパップ 30mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (モラステープ)
  - 【般】 ケトプロフェンパップ 120mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (モラステープXR)
  - ケナロゲン点眼軟膏0.1%—5g (院内はオルテクサー点眼軟膏0.1%)  
(【般】 トリアメシノロン点眼軟膏0.1% 5g/本へ切替)
  - ゲーベンクリーム1% 500g
  - ケラチナミンヨーワタクリーム20%—25g (院内は尿素クリーム20%「SUN」)  
(【般】 尿素クリーム20% 25g/本へ切替)
  - ケンエーハイポアルコール (=ハイポアルコール) 8% 500mL
  - ゲンタシン軟膏0.1% 10g
  - ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イキ」 10g/本
- 【コ】
  - 麻劇ヨカイン塩酸塩「オダ」原末 (販売中止)
  - ヨソプト配合点眼液—5mL  
(【般】 ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL/瓶へ切替)
  - 劇コムクロシャンプー—0.05% [125g/本]
  - コムレクス耳科用液1.5% 5mL/瓶
  - コレクチム軟膏0.25% 5g/本
  - コレクチム軟膏0.5% 5g/本
  - コンドロイチン点眼液1%「日点」 5mL/瓶 【後】  
(アイドロイチン1%点眼液が無くなり次第切替)
  - 【般】 コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mL (コンドロン)
- 【サ】
  - サイプレジン1%点眼液 10mL
  - ~~サジセルアブソルバブルヘキサトガーゼ型—5.1cm×7.6cm—【後】~~
  - ~~サジセルアブソルバブルヘキサトユニット—15.2cm×22.9cm—【後】~~
  - ~~サジセルアブソルバブルヘキサト綿型II(シート)—5.1cm×2.5cm—【後】~~
  - [上記3種(サジセル)は医療機器扱いとなり、薬剤部での取り扱いは終了]
  - サテニジン液10 500mL 【後】
  - ザーネ軟膏0.5%—500g
  - サーフアクテン気管注入用120mg 1瓶 [冷]
  - 劇サハライド液歯科用38% 5g
  - ザラカム配合点眼液—2.5mL—[冷]
  - (【般】 タブロスト・チモール配合点眼液 2.5mL/瓶へ切替)
  - サラゾピリン坐剤500mg
  - サリチル酸ワセリン軟膏5% (東豊) 500g 【後】
  - 【般】 サリチル酸軟膏5%
  - サリベートエアゾール 50g
  - サルゲマリン吸入用250μg 1瓶 [2~8°C]
  - サンコバ点眼液0.02%—5mL  
(【般】 シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL/瓶へ切替)
  - 劇サンピロ点眼液2% 5mL瓶 (サンピロ点眼液3%が無くなり次第切替)
  - 劇サンピロ点眼液3% 5mL (販売中止)
- 【シ】
  - 【般】 シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL/瓶 (サンコバ点眼液)
  - シェルガン0.5眼粘弾剤 [1~30°C] 【後】
  - ジオチルジウムスルサクネート耳科用液5%「CEO」 10mL/瓶 【後】
  - 【般】 ジオチルジウムスルサクネート点耳液5% 10mL/瓶
  - ジクアス点眼液3% 5mL/瓶  
(【般】 ジクアホソルN a点眼液3%5mLへ切替)
  - ジクアスL X点眼液3% 5mL/瓶
  - 【般】 ジクアホソルN a点眼液3%5mL (ジクアス)
  - ジクトルテープ75mg 7cm×10cm 1枚/袋
  - ジクロード点眼液0.1% 5mL [冷]
  - (院内はジクロフェナック点眼液0.1%)  
(【般】 ジクロフェナクN a点眼液0.1% 5mL/瓶へ切替)
  - 劇ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 [冷] 【後】
  - 劇ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 [冷] 【後】
  - 劇ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 [冷] 【後】
  - 【般】 ジクロフェナクN a坐剤12.5mg (ポルタレン)
  - 【般】 ジクロフェナクN a坐剤25mg (ポルタレン)
  - 【般】 ジクロフェナクN a坐剤50mg (ポルタレン)
  - 【般】 ジクロフェナクN a外用液1% 50g/本 (ポルタレン)
  - 【般】 ジクロフェナクN aテープ15mg(7×10cm非温感) 7枚/袋 (ポルタレントープ)
  - 【般】 ジクロフェナクN aテープ30mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (ポルタレントープ)
  - ジクロフェナクN a点眼液0.1%「ニト」 5mL [冷] 【後】
  - 【般】 ジクロフェナクN a点眼液0.1% 5mL/瓶
  - 【般】 ジフォルトン吉草酸エステルクリーム0.1% 5g/本 (ネリゾナ)
  - 【般】 ジフォルトン・リドカイン配合坐剤 (ネリプロクト)

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- ~~【般】ジフルプレドナート軟膏2g/本 (ネリプロクト)~~  
(2026年3月31日削除予定)
- **【般】**ジフルプレドナートクリーム0.05% 5g/本 (マイザー)  
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イキ」10g/本 **【後】** ( **【般】** なし)
- ~~【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%—10g/本 (マイザー)—~~  
ジムソ膀胱内注入液50% 50mL/瓶  
シムピコートタービュヘイラー60吸入 1キット  
( **【般】** プテソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入へ切替)  
笑気ガス
- 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 1枚 **【後】**
- **【般】** 硝酸イソソルビドテープ40mg (フランドルテープ)  
劇硝酸銀「VTRS」原末 (院内製剤原料)  
消毒用エタノール「ケエ」 500mL/瓶  
消毒用エタプロコール 500mL **【後】**  
親水ワセリン—500g  
新レシカルボン坐剤 [冷]
- 【ス】**  
スクラベインS4%液 500mL  
スタデルム軟膏5% 10g  
ステリクロンW液0.05 (=グルコン酸クロルヘキジン液 0.05%)  
0.05%500mL **【後】**  
( **【般】** クロヘキジングルコン酸塩外用液0.05% 500mLへ切替)  
劇ステリハイド20w/v%—500mL  
スピオルトレスピマット28吸入 1キット
- スピオルトレスピマット60吸入 1キット  
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 150μg1キット
- スピリーバ吸入用カプセル18μg [冷]  
スピール膏M 25cm<sup>2</sup>1枚
- ~~スプレキュア点鼻液0.15%—10mL~~  
( **【般】** プセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 15.75mg10mL/瓶へ切替)  
劇スープレイン吸入麻酔液 240mL/瓶  
スポンゼル—5cm×2.5cm (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)
- ~~スミルスチッタ3%—40g—【後】 (販売中止)~~  
( **【般】** フェルピナク軟膏3%—40g/本へ切替)
- ~~スミルテープ35mg—7cm×10cm—【後】~~  
( **【般】** フェルピナクテープ 35mg(7×10cm非温感) 14枚/袋へ切替)
- 【セ】**  
● 精製水 オード 単位mL [院外処方専用]
- **【般】** 精製白糖・ポピドノド配合軟膏 100g/瓶 (イソジシカノバスタ)  
生理食塩液 (洗浄用：細口開栓) 500mL  
生理食塩液 (洗浄用：広口開栓) 1L  
生理食塩液「ヒカリ」 (広口開栓型) 500mL/瓶  
セクターローション3% 50mL
- セタネオ点眼液0.002% 2.5mL/本
- ゼビアックスローション2% 10g
- ゼフナート外用液2% 10mL
- ゼフナートクリーム2% 10g
- ゼベリン点眼液0.1% 5mL  
劇セポフルラン吸入麻酔液「ニコ」 250mL **【後】**  
劇セポフルラン吸入麻酔液—250mL  
(セポフルラン吸入麻酔液「ニコ」に切替)
- ゼボラステープ40mg 10cm×14cm (7枚/袋)
- ゼボラスパップ40mg 10cm×14cm (7枚/袋)
- セルタッチテープ70 10cm×14cm (7枚/袋)
- セルタッチパップ70 10cm×14cm (7枚入)  
(院内はフェルピナクパップ70mg「NP」)
- セルタッチパップ140 20cm×14cm (7枚入)

- セレベント50ディスクス 50μg607リスター1キット
- 【ソ】**  
● ゾビラックス眼軟膏3% 5g  
ソフラチュール貼付剤10cm (10.8mg)10cm×10cm1枚
- 【タ】**  
● 向ダイアップ坐剤4 4mg  
● 向ダイアップ坐剤6 6mg  
● 向ダイアップ坐剤10 10mg
- **【般】** 大腸菌死菌・ヒドコロチン配合軟膏 2g/本 (強力ポステリソ)
- ~~タオン外用液1%—15mL—【後】~~  
(クロトリマゾール外用液1%「日医王」へ名称変更)  
( **【般】** クロトリマゾール外用液1% 15mL/本へ切替)
- **【般】** タクロリムス軟膏0.1% 5g/本 (プロトピック軟膏)  
タコシール組織接着用シート (ハフサイズ) 4.8cm×4.8cm [1~30°C]  
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ) 9.5cm×4.8cm [1~30°C]
- 劇タブコム配合点眼液 2.5mL  
( **【般】** タフルプロスト・チモロール配合点眼液へ切替)
- **【般】** タフルプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL (タブコム)
- **【般】** タフルプロスト点眼液0.005%1mL 2.5mL (タブロス)  
※劇タブロス点眼液0.0015% 2.5mL  
( **【般】** タフルプロスト点眼液0.005%1mLへ切替)
- ~~ダランゲンゲル1%—10g~~  
( **【般】** クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% 10g/本へ切替)
- タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g (院内はオフロキシム眼軟膏0.3%)  
タリビッド耳科用液0.3% 5mL
- 劇タリムス点眼液0.1% 5mL
- 【チ】**  
● ~~チモプトルXE点眼液0.5%—2.5mL~~  
※ チモロールXE点眼液0.5%「センジュ」 2.5mL **【後】** (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)
- チモロールXE点眼液0.5%「ニット」 2.5mL **【後】**
- **【般】** チモロール点眼液0.5%(持続性) 2.5mL/瓶 (チモプトルXE)  
注射用水 (洗浄用) 500mL  
注射用水 (洗浄用) 1L
- 【ツ】**  
● ツム 紫雲膏 [500g]501
- **【般】** ツロプテロールテープ0.5mg
- ツロプテロールテープ1mg「QQ」 **【後】**
- **【般】** ツロプテロールテープ1mg
- ツロプテロールテープ2mg「QQ」 **【後】**
- **【般】** ツロプテロールテープ2mg
- 【テ】**  
● 劇デイスオーパ消毒液0.55%—3.8L  
(フタラール消毒液0.55%「ソエ」3.8Lへ切替)
- ディビゲル1mg 1包
- 劇ディオフェランゲル0.1%—15g  
( **【般】** アダパレンゲル0.1% 15g/本へ切替)
- **【般】** デカリニウム塩化物トローチ0.25mg (SPTトローチ)  
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 (2g/本) **【後】** (販売中止)
- デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 (5g/本) **【後】**
- **【般】** デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 5g/本  
テゴ—51消毒液10%—3L (サテニジン液10へ切替)  
デスパコーワ口腔用クリーム 5g  
劇デスマプレシン点鼻スプレー—2.5μg「フエリグ」  
125μg5mL/瓶 [10°C以下]
- ~~【般】デスマプレシン点鼻スプレー—0.01%—500μg5mL/瓶~~  
(2026年3月31日削除予定)
- デタントール0.01%点眼液 5mL

- デュオトラバ配合点眼液 2.5mL  
（【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液2.5mLへ切替）  
麻劇デュロテップMTパッチ2.1mg 1枚  
（【般】フェンタニルテープ2.1mg（3日用）へ切替）  
麻劇デュロテップMTパッチ4.2mg 1枚  
（【般】フェンタニルテープ4.2mg（3日用）へ切替）
- 麻劇デュロテップMTパッチ8.4mg 1枚（【般】なし）  
（【般】フェンタニルテープ8.4mg（3日用）へ切替）  
テラ・コートリル軟膏 5g  
テリルジ-100エリプタ30吸入用 1キット  
テリルジ-200エリプタ30吸入用 1キット
- テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「ワイ」 10g 【後】
- 【般】テルピナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本（ラミシール）
- 劇デルモベート軟膏0.05%—5g（2026年3月31日経過措置終了）  
（院内はカハ`タ`ル`ロ`ビ`オ`酸エステル軟膏0.05%「イキ」）  
（【般】カハ`タ`ル`ロ`ビ`オ`酸エステル軟膏0.05% 5g/本へ切替）
- ※劇デルモベートスカルプローション0.05%—10g（販売中止）  
（2026年3月31日経過措置終了）  
（グリジールスカルプローション0.05%へ切替）  
（【般】カハ`タ`ル`ロ`ビ`オ`酸エステル外用液0.05% 10g/本へ切替）  
テレミンソフト坐薬2mg [2~8°C]  
テレミンソフト坐薬10mg  
デンターグル含嗽用散20mg 1包
- 【ト】  
劇トービイ吸入液300mg 5mL管 [2~8°C]  
劇トプシム軟膏0.05% 5g  
（【般】フルオシノニド軟膏0.05% 5g/本へ切替）
- 劇トプシムローション0.05% 10g  
劇トブラシン点眼液0.3% 5mL  
劇ドボネックス軟膏50μg/g—0.005%—10g
- 劇ドボベットのゲル 15g  
劇ドボベットの軟膏 15g
- 劇ドボベットのフォーム 60g/本
- 【般】トラニラスト点眼液0.5% 5mL/瓶（リザベン点眼液）
- トラバタンズ点眼液0.004%—2.5mL [1~25°C]
- 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液  
2.5mL/瓶（デュオトラバ配合点眼液）
- 【般】トラボプロスト点眼液0.004% 2.5mL/瓶（トラバタンズ）  
劇トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 10mL [←100mL]
- トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」  
（アファシール25μgより名称変更）
- 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% 5g/本（ケナログ）  
トルソプト点眼液1% 5mL
- 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL/瓶（コプト配合点眼液）  
劇トレプロスト吸入液1.74mg 2.9mL/管  
トロンピン液モチダソフトポトル1万 1万単位10mL1キット [冷]
- ドンペリドン坐剤10mg「日新」 【後】
- 【般】ドンペリドン坐剤10mg（ナウゼリン）
- 【ナ】  
● ナイスピー点鼻液50μg—8.5mg8.5g—【後】  
（【般】ハ`クロ`メ`タ`ン`ソ`ロ`ビ`オ`酸エステル点鼻液50μg 8.5g/瓶へ切替）
- ナウゼリン坐剤10mg（院内はドンペリドン坐剤10mg「日新」）  
（【般】ドンペリドン坐剤10mgへ切替）  
ナウゼリン坐剤60 60mg
- 【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本（アクアチム）
- ナジフロキサシンクリーム1%「ト-7」 10g 【後】
- 【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g（アクアチム）
- ナジフロキサシンローション1%「ト-7」 【後】
- ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用—5mg10g1瓶  
（【般】モメタゾン点鼻液50μg 10gへ切替）  
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 9mg18g1瓶  
（【般】モメタゾン点鼻液50μg 18gへ切替）
- ナナドラーAQネーザル50μg—8.5mg8.5g1瓶—【後】  
（【般】ハ`クロ`メ`タ`ン`ソ`ロ`ビ`オ`酸エステル点鼻液50μg 8.5g/瓶へ切替）
- 【ニ】  
● ニコチネルTTS10 17.5mg10cm<sup>2</sup>1枚  
● ニコチネルTTS20 35.0mg20cm<sup>2</sup>1枚  
● ニコチネルTTS30 52.5mg30cm<sup>2</sup>1枚  
[上記3種については、ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方時のみ保険適用]  
ニゾラーレタリム2%—10g  
（院内はケトコナゾールクリーム2%「イキ」へ切替）  
（【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g/本へ切替）
- 劇ニトロダームTTS25mg 10cm<sup>2</sup>1枚
- ニトロルスプレー1.25mg 10g瓶
- 【般】ニブラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶（ハイバジールコーワ）
- ニブラジロールPF点眼液0.25%「日点」—5mL/瓶—【後】
- 劇ニュープロパッチ2.25mg 2.25mg1枚  
劇ニュープロパッチ4.5mg 4.5mg1枚  
劇ニュープロパッチ9mg 9mg1枚
- 劇ニュープロパッチ13.5mg 13.5mg1枚
- 劇ニュープロパッチ18mg 18mg1枚
- 尿素クリーム20%「SUN」 25g/本 【後】  
（アセチロールクリーム20%より名称変更）
- 【般】尿素クリーム20% 25g/本（ケラチナミンコーワ）
- 【ネ】  
● ネオキシテープ73.5mg 1枚  
ネオクリーナー「セキ」 10%30mL（歯科専用薬）  
ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL  
ネオメドロールE E軟膏 3g  
ネキソブリッド外用ゲル5g [2~8°C]  
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL  
劇ネリザ軟膏—2g—【後】（販売中止）  
（2026年3月31日経過措置終了）  
（【般】ジ`フル`コ`ルト`ロ`ン`・`リ`ド`カ`イ`配合軟膏 2g/本へ切替）
- 劇ネリザナタリム0.1%—5g  
（【般】ジ`フル`コ`ルト`ロ`ン`吉`草`酸`エ`ス`テ`ル`リ`ム`0.1% 5g/本へ切替）
- 劇ネリザプロタ坐剤  
（【般】ジ`フル`コ`ルト`ロ`ン`・`リ`ド`カ`イ`配合坐剤へ切替）
- 【ノ】  
向劇ノルスバンテープ5mg 1枚
- 向劇ノルスバンテープ10mg 1枚
- 向劇ノルスバンテープ20mg 1枚
- 【ハ】  
ハイバジールコーワ点眼液0.25%—5mL  
（院内はニブラジロールPF点眼液0.25%「日点」）  
（【般】ニブラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶へ切替）  
ハイポエタノール 8%（=ケンエハイポアルコール（健栄）） 500mL
- ハイポライト消毒液10% 有効塩素として10% 500g  
[なるべく10°C以下] 【後】  
白色ワセリン 500g
- 劇バクスマー点鼻粉末剤3mg V  
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g
- パタメー点眼液0.1%—5mL  
（【般】オロパタジン点眼液0.1%へ切替）

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

- 含嗽用ハチアズレ顆粒—0.1%2g1包  
 (【般】アズレスリン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 2g/包へ切替)  
 パッチテストパネル (S) 2枚1組 [2~8°C]
- 劇パピロックミニ点眼液0.1% 0.4mL1個  
 パラオキシ安息香酸エチル (院内製剤原料)  
 パラマイシン軟膏—10g  
 パラマイシン軟膏—250g  
 バルミコート吸入液0.25mg 2mL1管  
 (【般】ブデソニド吸入液0.25mgへ切替)
- バルミコート吸入液0.5mg—2mL1管  
 (【般】ブデソニド吸入液0.5mgへ切替)
- バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg1瓶  
 劇ハルロピテープ8mg 枚  
 ● 劇ハルロピテープ16mg 枚  
 ● 劇ハルロピテープ24mg 枚  
 ● 劇ハルロピテープ32mg 枚  
 ● 劇ハルロピテープ40mg 枚  
 バンコマイシン眼軟膏1% 5g [2~8°C]
- バンデル軟膏0.1% 5g
- バンデルローション0.1% 10mL
- 【ヒ】  
 ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 0.85mL  
 (オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%より名称変更)
- 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL (ヒアレイン)
- 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL (ヒアレイン)  
 ヒアレイン点眼液0.1% 5mL  
 (【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mLへ切替)
- セアレイン点眼液0.3%—5mL  
 (【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mLへ切替)  
 ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL1個
- ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL1個  
 PA・ヨード点眼・洗眼液 0.2%20mL1瓶 [冷]  
 ビーエヌアラス500眼灌流液0.0184%—0.46%20mL1瓶 (希釈液 (瓶) 付)  
 ビーエヌアラス500眼灌流液0.0184% 0.46%20mL1瓶 (希釈液 (袋) 付)  
 ビンノテープ2mg 1枚  
 ビンノテープ4mg 1枚
- 【般】ビダラビン軟膏3% 5g/本 (アラセナA)
- 【般】ビドコロゲンナーラジコリン等配合軟膏—2g/本 (ブロトセイル)  
 ヒビスコール液A1% 1L  
 5%ヒピテン液 500mL  
 (【般】カルヘキジゲンルン酸塩外用液5% 500mL/本へ切替)
- 【般】ピマトプロスト点眼液0.03% (ルミガン)  
 ピマリシン点眼液5%「センジュ」 5mL  
 ビュアラピング 250mL
- セルドイドタリ—ム0.3%  
 (【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%へ切替)  
 セルドイドソナト軟膏0.3%—25g  
 (ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「コ1」へ切替)  
 (【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本へ切替)
- セルドイドフォ—ム0.3%—92g  
 (【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%へ切替)
- セルドイドローション0.3%—25g  
 (【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 25g/本へ切替)  
 ビレーズトリエアロスフィア120吸入 キット  
 ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL 筒 [冷]
- 【フ】  
 ● ブイタマ—クリーム1%  
 フィラストスプレー—500 500μg1瓶 (溶解液付) [冷]

- 劇液状フェノール「ケン」 500mL
- フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」
- 【般】フェルピナク軟膏3%—40g/本
- 【般】フェルピナテープ 35mg(7×10cm非温感) 14枚/袋
- 【般】フェルピナテープ 70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋
- フェルピナクパップ70mg「東光」10cm×14cm(7枚入) 【後】  
 (販売中止)
- 【般】フェルピナテープ 70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋
- 【般】フェルピナテープ 140mg(20×14cm非温感) 7枚/袋  
 (セルタッチパップ140へ切替) (2026年3月31日削除予定)
- 麻劇【般】フェンタニル塩酸塩テープ 0.5mg—(1日用) 1枚 (フェントテープ)
- 麻劇【般】フェンタニル塩酸塩テープ 1mg—(1日用) 1枚 (フェントテープ)
- 麻劇【般】フェンタニル塩酸塩テープ 2mg—(1日用) 1枚 (フェントテープ)
- 麻劇【般】フェンタニル塩酸塩テープ 4mg—(1日用) 1枚 (フェントテープ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ0.84mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ1.7mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ3.4mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ5mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ6.7mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ2.1mg (3日用) (フェンタニル M Tパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ4.2mg (3日用) (フェンタニル M Tパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ8.4mg (3日用) (フェンタニル M Tパッチ)
- 麻劇フェントテープ0.5mg 1枚  
 麻劇フェントテープ1mg 1枚  
 麻劇フェントテープ2mg 1枚  
 麻劇フェントテープ4mg 1枚  
 複方ヨード・グリセリン「コガイ・M」 500mL  
 フシジンレオ軟膏2% 10g
- 【般】プセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 15.75mg10mL/瓶  
 劇フタラール消毒液0.55%「ソエ」 3.8L (ディスオーバ)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本 (メンタックス)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本 (ポレー)
- 【般】ブデソニド吸入液0.25mg (バルミコート)
- 【般】ブデソニド吸入液0.5mg (バルミコート)
- 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 (シムコート)  
 フラジール錠250mg
- ラランドルテープ40mg—1枚  
 (院内は硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」)  
 (【般】硝酸イソソルビドテープ40mgへ切替)
- プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 mL/瓶 【後】
- 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% (アイファガン)
- 【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶 (エイゾプト)
- 【般】フルオシノニド軟膏0.05% 5g/本 (トプシム)
- フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 5mL 【後】
- フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」—5mL—【後】  
 (フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」へ名称変更)
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% 5mL/瓶
- フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 5mL 【後】
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% 5mL/瓶  
 フルタイド50μgエアゾール120吸入用 8.83mg10.6g1瓶
- フルタイド100μgエアゾール60吸入用 11.67mg7.0g1瓶
- フルタイド200デイスカス 200μg60ブリスター1個
- 【般】フルチカソフランカドニド点鼻液27.5μg56噴霧用 (アラミスト)
- 【般】フルチカソフランカドニド点鼻液27.5μg120噴霧用 (アラミスト)
- 【般】フルチカソフロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 8mL (フルナーゼ)
- フルティフォーム50エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム50エアゾール120吸入用 1瓶

- フルティフォーム125エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム125エアゾール120吸入用 1瓶
- フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用—4.08mg8mL1瓶  
（【般】フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用 8mLへ切替）
- 小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用 2.04mg4mL1瓶  
（2026年3月31日経過措置終了）  
劇フルメタ軟膏 0.1%5g
- ~~【般】フルルピプロフェンテープ40mg（10 $\times$ 14cm非温感）  
（ゼボラステープ）  
劇ブレオS軟膏5mg/g 0.5%5g  
劇ブレグランディン腔坐剤1mg [冷]~~
- ~~【般】フレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%—15g/本  
（リドメックスヨーワ）~~
- ~~【般】フレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%—5g/本  
（リドメックスコーワ）~~
- ~~【般】フレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%—5g/本  
（リドメックスコーワ）~~
- ~~フレドネマ注腸20mg—【後】—（2026年3月31日経過措置終了）~~
- ~~【般】フレドニゾロンリン酸エステルNa注腸剤20mg（フレドネマ）  
（2026年3月31日削除予定）  
劇プロウベス腔用剤10mg 個 [-20 $^{\circ}$ C以下]~~
- ~~デロタトセディール軟膏—2g  
フロジン外用液5% 30mL 【後】  
（【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本へ切替）  
劇プロスタンディン軟膏0.003% 10g  
局方プロテイン銀末 25g  
劇プロトピック軟膏0.1% 5g  
（【般】タクロリムス軟膏0.1% 5g/本へ切替）~~
- 劇プロトピック軟膏0.03%小児用 5g
- ~~デロナック点眼液0.1%—5mL  
（院内はプロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」）  
（【般】プロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶へ切替）  
プロベト 500g~~
- ~~プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」—5mL—【後】—  
（プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」へ切替）~~
- ~~プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」 5mL/瓶 【後】~~
- ~~【般】プロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶（プロナック）~~
- ~~プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」 45mL 【後】~~
- ~~【般】プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL/瓶（ピソルボン）  
プロメライン軟膏5万単位/g 20g~~
- ~~フロリード腔坐剤100mg [冷]  
フロリードDクリーム1% 10g（【般】なし）~~
- 【へ】  
● ~~ベガモックス点眼液0.5%—5mL  
（モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」へ切替）  
（【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%へ切替）  
ヘキザックAL1%OR液16mm綿棒セット（物品供給センター取扱い）~~
- ~~ベキノククリーム0.5% 10g~~
- ~~【般】ベタメタゾン酢酸エステル点鼻液50 $\mu$ g 8.5g/瓶（リノコート）~~
- ~~【般】ベタメタゾン酢酸エステル点鼻粉25 $\mu$ g 1.50mg/瓶  
（リノコートパウダースプレー）~~
- ~~ベシカムクリーム5% 10g  
ベストロン耳鼻科用1% 5mL  
ベストロン点眼用0.5% 5mL  
ベセルナクリーム5% 250mg1包~~
- ~~【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶（ベトプティック）~~
- ~~【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5g/本（リンデロンV）~~
- ~~【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% 10mL/本（リンデロンV）~~
- ~~劇ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイク」 5g 【後】~~
- ~~【般】ベタメタゾン酢酸エステル軟膏0.064% 5g/本  
（リンデロンD P軟膏）~~
- ~~ベタメタゾンリン酸エステルNa・P F 眼耳鼻科用液0.1%「日点」5mL 【後】~~
- ~~【般】ベタメタゾン酪酸エステル酢酸エステル外用液0.05%—10g/本（アテベート）—  
劇ベタメタゾン酪酸エステル酢酸エステルクリーム0.05%「MYK」 5g 【後】  
（【般】なし）~~
- ~~【般】ベタメタゾン酪酸エステル酢酸エステルクリーム0.05%—5g/本（アテベート）—  
劇ベタメタゾン酪酸エステル酢酸エステル軟膏0.05%「MYK」 5g 【後】  
（【般】なし）~~
- ~~【般】ベタメタゾン酪酸エステル酢酸エステル軟膏0.05%—5g/本（アテベート）—  
劇ベタメタゾン酪酸エステル酢酸エステルローション0.05%「JG」 10g 【後】  
（【般】なし）~~
- ~~【般】ベタメタゾン酪酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mL（リンデロン）~~
- ~~ベトプティック点眼液0.5%—5mL  
（【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替）  
ベネトリン吸入液0.5% 30mL  
ベノキシル点眼液0.4% 5mL/瓶~~
- ~~【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%（乳剤性） 25g/本（ヒルドイド）~~
- ~~【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%（ヒルドイドクリーム）~~
- ~~【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%（ヒルドイド）~~
- ~~【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本（ヒルドイド）~~
- ~~ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「エプソ」 25g/本 【後】~~
- ~~ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクル」 50g/本 【後】~~
- ~~ベビオウォッシュジェル5% 20g/本~~
- ~~ベビオゲル2.5% 15g/本 [25 $^{\circ}$ C以下][禁凍結]~~
- ~~ベビオローション2.5% 15g/本 [25 $^{\circ}$ C以下][禁凍結]~~
- ~~ヘモポリゾン軟膏 2g/本 【後】  
ペリオフェール歯科用軟膏2%—10mg0.5g—[冷]—【後】—  
（ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」へ名称変更）  
ペリプラストPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組 [冷]  
ペリプラストPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組 [冷]  
ペリプラストPコンビセット組織接着用 5mL2キット1組 [冷]  
ペルベゾロンF点眼点鼻液—5mL—[冷]—【後】—~~
- ~~【般】ペンタシクロン塩化物外用液10% 500mL/本（オスバン）  
ペンタサ坐剤1g  
ペンタサ注腸1g  
劇ペンテステープ18mg—30.5mm $\times$ 50.0mm1枚  
（院内はリドカインテープ18mg「YP」）~~
- 【ホ】  
● ~~ポアラ軟膏0.12% 5g~~
- ~~ホタチナシテープ1mg—1枚（【般】ツロプテロールテープ1mgへ切替）~~
- ~~ホタチナシテープ2mg—1枚（【般】ツロプテロールテープ2mgへ切替）  
強力ポステリザン（軟膏）—2g—（ヘモポリゾン軟膏へ切替）  
（【般】大腸菌死菌・ヒドコロゲン配合軟膏 2g/本へ切替）~~
- ~~ホスミンS耳科用3% 10mL  
ポスミン外用液0.1% 500mL~~
- ~~ポビドンヨード外用液10%「明治」 250mL 【後】~~
- ~~【般】ポビドンヨード外用液10%（イソノール非含有）~~
- ~~ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 30mL 【後】~~
- ~~【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本~~
- ~~【般】ポビドンヨードゲル10% 20g/本（イソジンゲル）  
ポビヨンスクラブ7.5% 500mL 【後】~~
- ~~ポラザG軟膏 2.4g  
劇ポルタレンサボ12.5mg—[冷]  
（院内はジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」）  
劇ポルタレンサボ25mg—[冷]  
（院内はジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」）~~

無印：採用薬  
※：削除予定薬  
●：院外処方専用薬  
☆：院外処方専用予定薬  
【後】：後発医薬品  
○：院内専用後発品である薬

劇ボルタレンサボ50mg〔冷〕

(院内はジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」)

- ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm (7枚入)
- ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm (7枚入)
- ボルタレンローション1%—50g  
(【般】ジクロフェナクNa外用液1% 50g/本へ切替)
- 特生ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組 [冷]
- 特生ボルヒール組織接着用 3mL4瓶1組 [冷]
- 特生ボルヒール組織接着用 5mL4瓶1組 [冷]
- 劇ホルマリンゲアヤコールF G15mL [歯科専用薬]
- ボレー外用液1%—10mL  
(【般】プテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本へ切替)
- 劇ボンアルファ軟膏2μg/g 10g
- 劇ボンアルファハイ軟膏20μg/g 10g
- 劇ボンアルファハイローション20μg/g 10g

【マ】

- マイザー軟膏0.05%—5g  
(院内はジフルプレドナート軟膏0.05%「イワ」)  
(【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% 10g/本へ切替)
- マイザークリーム0.05%—5g  
(【般】ジフルプレドナートクリーム0.05% 5g/本へ切替)
- 劇マイトマイシン眼科外用液用2mg
- 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10g/本 (オキサロール)
- 劇マーデュオックス軟膏 10g

【ミ】

- 劇ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g1缶
- ミオピン点眼液 5mL
- ミケランヒ点眼液2%—2.5mL  
(院内はカルテオロール塩酸塩A点眼液2%「わかもと」へ切替)  
(【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL/瓶へ切替)
- ミケルナ配合点眼液 2.5mL
- ミドリンM点眼液0.4% 5mL
- ミドリンP点眼液—10mL (オフミック点眼液へ切替)
- ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 10mg0.5g [冷] 【後】  
(ペリオフィール歯科用軟膏2%から名称変更)
- ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm (6枚入)  
(2026年3月31日経過措置終了)
- ミレーナ52mg 1個
- ミロル点眼液0.5%—5mL  
(【般】レボプロノール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)

【ム】

- ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL
- ムコフィン吸入液20% 17.62%2mL1包

【メ】

- ~~【般】メサラジン注腸剤1g (ペンタサ注腸へ切替)~~  
(2026年3月31日削除予定)
- 滅菌精製水 オダ 単位mL [院外処方専用]  
メディクスワブポビドンヨード4.5ml (物品供給センター取扱い)
- メトロニダゾールゲル0.75%「マルシ」 100g(チューブ)本 【後】
- 【般】メトロニダゾールゲル0.75% (ロゼックスゲル)
- メノエイドコンビパッチ 1枚 [冷]
- メブチンエア—10μg吸入100回 0.0143%5mL1キット
- メブチン吸入液0.01% 30mL
- メブチンスイングヘラー—10μg吸入100回 1mg1キット
- メンタツタスタサ—1—10g  
(【般】プテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本へ切替)

【モ】

- モイゼルト軟膏0.3% 10g/本
- モイゼルト軟膏1% 10g/本
- モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 5mL/瓶 【後】
- 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (ペガモックス)
- ~~【般】モメタゾン点鼻液0.1%—5g/本 (フルメタ)~~
- 【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用
- 【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用
- モーラステープ20mg—7cm×10cm (7枚入)  
(ケトプロフェンテープ20mg「BMD」へ切替)  
(【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)7枚/袋へ切替)
- モーラステープL40mg—10cm×14cm (7枚入)  
(【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)7枚/袋へ切替)
- モーラスパップ30mg 10cm×14cm (7枚入)
- モーラスパップ60mg 20cm×14cm (7枚入)
- モーラスパップXR120mg—10cm×14cm (7枚入)  
(【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感)7枚/袋へ切替)
- モーラスパップXR240mg 20cm×14cm (7枚入)

【ヤ】

- ヤクバンテープ60mg 15cm×14cm (7枚入)

【ユ】

- ユベラ軟膏 56g/本 [15°C以下]
- ユベラ軟膏—500g—[15°C以下] (ユベラ軟膏 56g/本へ切替)

【ラ】

- ラクティオンパップ70mg 10cm×14cm (7枚入)
- ラクリミン点眼液0.05% 5mL瓶
- 【般】ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテ」 2.5mL/瓶 (ザラカム配合)
- ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテ」 2.5mL/瓶 【後】
- 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/瓶 (キサラタン)
- ~~【般】ラノコナゾール軟膏1%—10mg/本 (アスタット)~~
- 劇ラバリムスゲル0.2% 10g [2~8°C]
- ラビジェル 60mL
- ラビジェル 250mL
- ラビショット 500mL
- ラミシールクリーム1%—10g  
(院内はテルピナフィン塩酸塩クリーム1%「ワ」)  
(【般】テルピナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本へ切替)

【リ】

- リザベン点眼液0.5%—5mL  
(【般】トラニラスト点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)
- リティンパ耳科用250μgセット 1セット (溶解液付) [冷]
- 劇リドカインテープ18mg「YP」 1枚 【後】
- リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g
- リドメックスコーワクリーム0.3% 5g
- リドメックスコーワローション0.3% 15g (【般】なし)
- ~~(【般】デリンゴジ草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%—15g/本へ切替)~~
- サノコートパウダースプレー鼻用25μg—1.50mg—0.9087g1瓶  
(【般】ベタメタゾール点鼻粉末25μg1.50mg/瓶へ切替)
- 【般】リバスチグミンテープ4.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)
- 【般】リバスチグミンテープ9mg (1日用) (イクセロンパッチ)
- 【般】リバスチグミンテープ13.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)
- 【般】リバスチグミンテープ18mg (1日用) (イクセロンパッチ)
- 硫酸ポリミキシンB散50万単位「マイザー」—1瓶
- リレンザ 5mg17リスター (1枚：47リスター)
- リンデロン坐剤0.5mg
- リンデロン点眼液0.01% 5mL
- サンデロン点眼液—点耳—点鼻液0.1%—5mL  
(【般】ベタメタゾール点眼点耳点鼻液0.1% 5mLへ切替)

- 点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL [冷]
- 眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g
- 劇リンデロン-DP軟膏0.064%5g  
(院内は~~ベタメタゾロンD~~ 0.064%「テイク」)  
(【般】~~ベタメタゾロンD~~ 0.064% 5g/本へ切替)  
リンデロン-V軟膏0.12% 5g  
(【般】~~ベタメタゾロン~~ 吉草酸エステル軟膏0.12% 5g/本へ切替)  
リンデロン-Vローション0.12% 10mL  
(【般】~~ベタメタゾロン~~ 吉草酸エステル外用液0.12% 10mL/本へ切替)
- リンデロン-V G軟膏0.12% 5g (院内はルリクールV G軟膏0.12%)  
リンデロン-V Gクリーム0.12% 5g  
リンデロン-V Gローション 0.12%10mL
- 【ル】
  - ル・エストロジェル0.06% 80g
  - ルコナック爪外用液5% 3.5g
  - ルティナス錠100mg [1~30°C]
  - ルテウム腔用坐剤400mg [25°C以下]
  - ルミガン点眼液0.03% 2.5mL  
(【般】ピマトプロスト点眼液0.03%へ切替)  
ルリクールV G軟膏0.12% 5g 【後】
- ルリコナゾールクリーム1%「イキ」 【後】
- 【般】ルリコナゾールクリーム1% (ルリコン)  
~~ルリコナゾール~~ 1% 10g (ルリコナゾールクリーム1%「イキ」へ切替)  
ルリコン液1% 10mL
- 【レ】
  - レクタブル2mg注腸フォーム14回 48mg30.8g1瓶
  - ~~レスキューラ~~点眼液0.12% 5mL [冷]  
(【般】イソプロピルウプロストン点眼液0.12% 5mL/瓶へ切替)  
レスタミンコーチゾン軟膏[強力] 10g  
レスタミンコーワクリーム1% 1kg
- レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 5mL 【後】  
(【般】レバミピド点眼液2%5mLへ切替)
- 【般】レバミピド点眼液2%5mL (ムコスタ)
- 向劇レベタン坐剤0.2mg
- 向劇レベタン坐剤0.4mg
- 【般】レボプロノール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶 (ミロル)
- レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 5mL/瓶 【後】
- 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/瓶 (クラビット)
- レルベア100エリプタ14吸入用 1キット
- レルベア100エリプタ30吸入用 1キット
- レルベア200エリプタ14吸入用 1キット
- レルベア200エリプタ30吸入用 1キット
- 【ロ】
  - ~~ロキソニン~~ゲル1% 50g  
(【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 50g/本へ切替)
  - ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm (7枚入)
  - ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm (7枚入)
  - ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm (7枚入)  
(院内はロキソプロフェンNaパップ100mg「JG」)
  - ~~【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 50g/本~~  
(ロキソニンゲルへ切替) (2026年3月31日削除予定)
  - ~~【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感)~~  
7枚/袋 (ロキソニンテープ)
  - ~~【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温感)~~  
7枚/袋 (ロキソニンテープ)
- ~~ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」~~  
10cm×14cm (7枚入) 【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了予定)
- ロキソプロフェンNaパップ100mg「JG」  
10cm×14cm 7枚/袋 【後】  
ロコイドクリーム0.1% 5g  
ロコイド軟膏0.1% 5g  
ロゼックスゲル0.75% 15g/本 (皮膚科限定)  
(院内はメトロナゾールゲル0.75%「マイル」へ切替)  
(【般】メトロナゾールゲル0.75%へ切替)  
~~ロゼックスゲル0.75% 50g/本~~ (15g/本へ切替)
- 劇ロナセンテープ20mg 枚  
劇ロナセンテープ40mg 枚
- 【ワ】
  - 向劇ワコピタル坐剤15 15mg [冷]
  - 向劇ワコピタル坐剤50 50mg [冷]
  - ワンクリノン腔用ゲル90mg
  - 麻劇ワンデュロパッチ0.84mg 1枚  
(【般】フェタニルテープ0.84mg (1日用)へ切替)
  - 麻劇ワンデュロパッチ1.7mg 1枚  
(【般】フェタニルテープ1.7mg (1日用)へ切替)
  - 麻劇ワンデュロパッチ3.4mg 1枚  
(【般】フェタニルテープ3.4mg (1日用)へ切替)
  - 麻劇ワンデュロパッチ5mg 1枚  
(【般】フェタニルテープ5mg (1日用)へ切替)
  - 麻劇ワンデュロパッチ6.7mg 1枚  
(【般】フェタニルテープ6.7mg (1日用)へ切替)

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

## 注射薬リスト

### 【ア】

劇アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL 2mg1mLV [2~8°C]  
 アイモビーグ皮下注70mgペン 1mLキット  
 劇アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL  
 2mg0.05mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
 劇アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL—0.07mLV—[2~8°C]  
 劇アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL  
 0.07mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
 劇アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 1キット [2~8°C] [禁凍結]  
 ●劇アウィクリ注 フレックスタッチ 総量700単位 1キット [2~8°C] [禁凍結]  
 劇アーウィナーゼ筋注用10000 10,000単位V [2~8°C]  
 アエントリベンタート静注1055mg V  
 劇アガルシダーゼ ベータB S点滴静注5mg「JCR」 1mLV [2~8°C] 【後】  
 劇アガルシダーゼ ベータB S点滴静注35mg「JCR」 7mLV [2~8°C] 【後】  
 劇アキネトン注射液5mg—1mLA (乳酸ペリデン注5mg「ヨトミ」へ切替)  
 劇アキラルックス点滴静注250mg 50mLV [2~8°C]  
 劇アクテムラ点滴静注用200mg 10mLV [2~8°C]  
 ●劇アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mLキット [2~8°C]  
 劇アクテムラ皮下注162mgシリンジ 0.9mL筒 [2~8°C]  
 劇アクトヒブ 10μgV [冷]  
 毒アクプラ静注用50mg V  
 劇アクラシノン注射用20mg V  
 アコアラシ静注用600 600国際単位V (溶解液付) [冷]  
 アコアラシ静注用1800 1800国際単位V (溶解液付) [冷]  
 アザクタム注射用1g V  
 ○劇アザチジン注射用100mg「サリ」 V 【後】  
 アシクロビル点滴静注液250mg「ト」 A 【後】  
 アジョビ皮下注225mgオートインジェクター 1.5mLキット [2~8°C]  
 アスコルビン酸注500mgP B「日新」 A 【後】  
 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 17.12%10mLキット 【後】  
 アセテート維持液3G「HK」 500mLP  
 アセトキープ3G注 (ソラトバッグ) —500mLP—【後】 (販売中止)  
 (アセテート維持液3G「HK」へ切替)  
 劇アセリオ静注液1000mgバッグ 100mLP  
 劇アセレンド注100μg 2mLV  
 アタラックス-P注射液 (25mg/mL) A  
 アタラックス-P注射液 (50mg/mL) A  
 ●劇アダリムマブB S皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」筒 [2~8°C] 【後】  
 ●劇アダリムマブB S皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」キット [2~8°C] 【後】  
 ●劇アダリムマブB S皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」キット [2~8°C] 【後】  
 ●劇アダリムマブB S皮下注40mgペン0.8mL「FKB」キット [2~8°C] 【後】  
 アディノベイト静注用キット1000  
 1000国際単位キット (溶解液付) [冷]  
 アディノベイト静注用キット2000  
 2000国際単位キット (溶解液付) [冷]  
 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 20mL筒 【後】  
 アデノスキャン注60mg—20mLV  
 アデホス-L コーワ注10mg A [冷]  
 アデラペリン9号注2mL—A (販売中止) (2025年9月31日経過措置終了)  
 劇アトガム点滴静注液250mg 5mLA [2~8°C]  
 劇アドセトリス点滴静注用50mg V [2~8°C]  
 アートセラレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL  
 劇アドトラザ皮下注150mgシリンジ—1mL筒—[2~8°C]—[禁凍結]  
 劇アドトラザ皮下注300mgペン 2mLキット [2~8°C]

アドナ注 (静脈用) 50mg—10mLA  
 (カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」へ切替)  
 アトニン-O注5単位 A [冷]  
 劇アドレナリン注0.1%シリンジ「フレ」 1mL筒 【後】  
 (エピネフリン注0.1%シリンジ「フレ」から名称変更)  
 劇アトロピン注0.05%シリンジ「フレ」 1mL筒 【後】  
 劇アトロピン硫酸塩注0.5mg「フレ」 0.05%1mLA  
 劇アナフラニール点滴静注液25mg A  
 ※劇アナベイン注2mg/mL 100mLP  
 (ロビパカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「フレ」へ切替)  
 劇アナベイン注7.5mg/mL—10mLA  
 (ロビパカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「フレ」へ切替)  
 アネメトロ点滴静注液500mg 100mLV  
 向アネレム静注用20mg V  
 向アネレム静注用50mg V  
 劇アバステチ点滴静注用400mg/16mL V [冷]  
 劇アービタックス注射液100mg 20mL V [冷]  
 劇アビドラ注ソロスター 300単位キット [冷]  
 アブニシオン静注15mg 3mLA  
 毒アブラキサ点滴静注用100mg V  
 劇アブリスゴ筋注用 V (溶解液付) [2~8°C]  
 劇アフリベルセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」  
 2mg0.05mL筒 【後】 [2~8°C] [禁凍結]  
 アブレゾリン注射用20mg A  
 劇アボカイン皮下注30mg 3mL筒  
 ●劇アボネックス筋注用シリンジ30μg 0.5mL筒 [冷]  
 ●劇アボネックス筋注30μgペン 0.5mLキット [2~8°C]  
 劇アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 3mLA 【後】  
 アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 2mLA  
 アミキサリ注100mg—10%1mLA  
 アミノレバン点滴静注 500mLP  
 アミパレン輸液200mL 1袋  
 アムヴトラ皮下注25mgシリンジ 0.5mL筒 [禁凍結]  
 毒アムビゾーム点滴静注用50mg V [冷]  
 アラセナ-A点滴静注用300mg V  
 劇アラノンジー静注用250mg 50mLV  
 アリクストラ皮下注2.5mg—0.5mL筒  
 アリクストラ皮下注7.5mg—0.6mL筒  
 アリナミンF50注—50mg20mLA  
 (フルスルチアミン注50mg「日新」へ切替)  
 アリナミン注射液10mg—2mLA (販売中止)  
 劇アリマタ注射用100mg—V  
 (ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」へ切替)  
 劇アリマタ注射用500mg—V  
 (ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」へ切替)  
 ○ アルガトロバンH I注10mg/2mL「ア」 A 【後】 (アノソHI注)  
 アルギニン点滴静注30g「AY」 10%300mLP  
 毒アルケラン静注用50mg V (溶解液付)  
 アルスロマチック関節手術用灌流液 3L1P  
 麻劇アルチバ静注用5mg—V  
 (レミフェentanil静注用5mg「第一三共」に切替)  
 アルツディスポ関節注25mg 2.5mL筒  
 劇アルプロスタジール注5μg「サリ」 1mLA [冷] 【後】  
 劇アルプロスタジールアルファデクス注射用20μg「効効」 V  
 劇アルプロスタジールアルファデクス点滴静注用500μg「効効」 V  
 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V  
 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V  
 献血アルブミン20%静注4g/20mL「効効」 V

献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」—20%50mLV  
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV  
献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV  
劇アレックスビー筋注用 120μgV (溶解液付) [2~8°C]  
※劇アレピアチン注250mg 5mLA  
アレルゲンエキス診断用対照液 1.8mLV  
アレルゲンエキス治療用希釈液 1.8mLV  
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリ」  
ヒスタミン二塩酸塩 2mLV [冷]  
診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリ」 1mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ダマ1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」大麦1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」カメグ花花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」カキ花花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ク1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」米1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」サ花花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」スチ花花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」トモコシ1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ヒメマ花花粉1:1,000 2mLV [冷]  
診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」アタ花花粉1:1,000 2mLV [冷]  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ」アタ花花粉1:100 2mLV [冷]  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ」  
アタ花花粉1:1,000 2mLV [冷]  
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ」  
オシ草花粉1:100 2mLV [冷]  
劇アロカリス点滴静注235mg 10mLV [2~8°C]  
劇アロキシン静注0.75mg—5mLV  
アロフィセル注 4瓶1組 [専用輸送用容器で15~22°C]  
(発注管理は診療科で実施)  
劇アンカロン注150—150mg3mLA  
(アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」へ切替)  
アンサー皮下注20μg 1mLA  
安息香酸Naカフェイン注200mg「ア」 20%1mLA 【後】  
(アンナカ注「ア」—20%より名称変更)  
劇アンチレクス静注10mg 1%1mLA  
アンナカ注「ア」—20%—1mLA—【後】—  
(安息香酸Naカフェイン注200mg「ア」へ名称変更)  
【イ】  
~~イオパーク300注100mL—64.71%—V—【後】—~~  
(イオヘキソール300注100mL「F」へ名称変更)  
~~イオパーク300注シリンジ80mL—64.71%—筒—【後】—~~  
(イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」へ名称変更)  
~~イオパーク350注50mL—75.49%—V—【後】—~~  
(イオヘキソール350注50mL「F」へ名称変更)  
~~イオパーク350注100mL—75.49%—V—【後】—~~  
(イオヘキソール350注100mL「F」へ名称変更)  
~~イオパーク350注シリンジ100mL—75.49%—筒—【後】—~~  
(イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」へ名称変更)  
イオパミドール300注20mL「F」 61.24%20mL 【後】  
(イオパロミン300注20mLより名称変更)  
イオパミドール300注50mL「F」 61.24%50mL 【後】  
(イオパロミン300注50mLより名称変更)  
イオパミドール300注100mL「F」 61.24%100mL 【後】  
(イオパロミン300注100mLより名称変更)  
イオパミドール370注20mL「F」 75.52%20mL 【後】  
(イオパロミン370注20mLより名称変更)

イオパミドール370注50mL「F」 75.52%50mL 【後】  
(イオパロミン370注50mLより名称変更)  
イオパミドール370注100mL「F」 75.52%100mL 【後】  
(イオパロミン370注100mLより名称変更)  
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 61.24%100mL筒 【後】  
(イオパロミン300注シリンジ100mLより名称変更)  
イオパミドール300注シリンジ150mL「F」 61.24%150mL筒 【後】  
(イオパロミン300注シリンジ150mLより名称変更)  
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 75.52%100mL筒 【後】  
(イオパロミン370注シリンジ100mLより名称変更)  
※ イオパミロン注300 61.24%20mLV (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
イオパミロン注300シリンジ 61.24%100mL筒  
※ イオパミロン注370 75.52%20mLV (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
イオパミロン注370 75.52%100mLV  
イオパミロン注370シリンジ 75.52%80mL筒  
イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL筒  
E O B・プリモピスト注シリンジ 18.143%10mL筒  
イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」 62.34%50mL筒 【後】  
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 62.34%100mL筒 【後】  
イオヘキソール300注100mL「F」 64.71%100mLV 【後】  
(イオパーク300注100mLより名称変更)  
イオヘキソール350注50mL「F」 75.49%50mLV 【後】  
(イオパーク350注50mLより名称変更)  
イオヘキソール350注100mL「F」 75.49%100mLV 【後】  
(イオパーク350注100mLより名称変更)  
イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」 64.71%80mL筒 【後】  
(イオパーク300注シリンジ80mLより名称変更)  
イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」 75.49%100mL筒 【後】  
(イオパーク350注シリンジ100mLより名称変更)  
イオメロン300注100mL 61.24%V  
イオメロン300注シリンジ100mL 61.24%筒  
イオメロン350注100mL 71.44%V  
イオメロン350注シリンジ100mL 71.44%筒  
イオメロン350注シリンジ135mL (CT・尿路用) 71.44%筒  
イーケプラ点滴静注500mg—5mLV  
(レベチラセタム点滴静注500mg「ア」へ切替)  
劇イジュド点滴静注25mg 1.25mLV [2~8°C]  
劇イジュド点滴静注300mg 15mLV [2~8°C]  
劇イズカーゴ点滴静注用10mg V [2~8°C][禁凍結]  
イスコチン注100mg A  
劇イストダックス点滴静注用10mg—10mg—V (溶解液付)—  
インピスト注240 51.26%10mLV  
インピスト注300 64.08%10mLV  
毒イダマイシン静注用5mg 5mgV  
イデルピオン静注用1000—1000国際単位V (溶解液付) [2~25°C]  
イデルピオン静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [2~25°C]  
● イデルピオン静注用3500 3500国際単位V (溶解液付) [2~25°C]  
劇イノバン注0.3%シリンジ 50mL筒  
劇イノバン注100mg 5mLA  
劇イブグリース皮下注250mgオートインジェクター 2mLキット [2~8°C]  
イベニティ皮下注105mgシリンジ 1.17mL筒 [2~8°C]  
劇注射用イホマイド1g V  
● 劇イミグランキット皮下注3mg 0.5mL筒  
劇イミフィンジ点滴静注120mg 2.4mLV [2~8°C]  
劇イミフィンジ点滴静注500mg 10mLV [2~8°C]

無印：採用薬  
※：削除予定薬  
●：院外処方専用薬  
☆：院外処方専用予定薬  
【後】：後発医薬品  
○：院内専用後発品である薬

劇イムデトラ点滴静注用1mg V (輸液安定化液付) [2~8°C]  
劇イムデトラ点滴静注用10mg V (輸液安定化液付) [2~8°C]  
劇イムネース注35 35万国内標準単位V (溶解液付) [冷]  
劇イムノマックス-γ注100 100万国内標準単位 V (溶解液付)  
[凍結を避け10°C以下]  
劇イモバックスポリオ皮下注0.5mL筒 [2~8°C]  
劇イラリス皮下注射液150mg 1mLV [2~8°C]  
劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト-7」 2mLV 【後】  
劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト-7」 5mLV 【後】  
劇イルミア皮下注100mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]  
● イロクテイト静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
● イロクテイト静注用1500 1500国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
● イロクテイト静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
● イロクテイト静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
● イロクテイト静注用4000 4000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
インジゴカルミン注20mg「AFP」 0.4%5mLA  
劇インスリンアスパルトB S注ソロスターNR「サフィ」  
300単位キット [2~8°C] 【後】  
● 劇インスリンゲラルギンB S注カート「リ-」 300単位キット [2~8°C] 【後】  
● 劇インスリンゲラルギンB S注キット「FFP」 300単位キット [2~8°C] 【後】  
劇インスリンゲラルギンB S注ミリオペン「リ-」  
300単位キット [2~8°C] 【後】  
劇インスリン リスプロB S注ソロスター H U「サフィ」  
300単位キット [2~8°C] 【後】  
劇インダシン静注用1mg V  
劇インデラル注射液2mg 2mLA  
イントラリボス輸液20% 100mLP 【後】  
劇インフリキシマブB S点滴静注用100mg「NK」 V [2~8°C] 【後】  
劇インフルエンザHA A77チ 1mLV [冷]  
【ウ】  
劇ウィフガート点滴静注400mg 20mLV [2~8°C]  
ヴィーンD輸液 500mLP (袋)  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注0.5g/5mL V [冷]  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注2.5g/25mL V [冷]  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注5g/50mL V [冷]  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注10g/100mL V [冷]  
献血ヴェノグロブリンI H10%静注20g/200mL V [冷]  
劇ウゴービ皮下注0.25mg SD 0.5mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ウゴービ皮下注0.5mg SD 0.5mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ウゴービ皮下注1.0mg SD 0.5mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ウゴービ皮下注1.7mg SD 0.75mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ウゴービ皮下注2.4mg SD 0.75mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD 1mg1.5mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD 2mg1.5mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD 4mg3mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD 6.8mg3mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD 9.6mg3mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
ウログラフィン注60% 20mLA  
ウロナーゼ静注用6万単位 V  
ウロミテキサン注100mg 1mLA  
ウロミテキサン注400mg 4mLA  
【エ】  
劇エアウィン皮下注用45mg V [2~8°C]  
劇エアウィン皮下注用60mg V [2~8°C]  
HMG注用150単位「あすか」 V (溶解液付) [冷] 【後】  
HMG注射用75IU「フェリグ」 75単位V (溶解液付) 【後】  
(2023年3月現在 供給停止)  
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニヤク」 1mLV (溶解液付) [冷]

劇エクザール注射用10mg V [冷]  
エクストラニール腹膜透析液 (ツインバッグ) 1.5LP  
エクストラニール腹膜透析液 (UVツインバッグ) 1.5LP  
エクストラニール腹膜透析液 (シングルバッグ) 2LP  
エクストラニール腹膜透析液 (シングルバッグ・機器専用) 2LP  
● エクストラニール腹膜透析液 (ツインバッグ) 2LP  
劇エジヤイモ点滴静注1.1g 22mLV [2~8°C] [禁凍結]  
劇エスポー注射液750—750国際単位A—[冷]  
(エポエチンアルファB S注750「JCR」へ切替)  
● 劇エタネルセプトB S皮下注25mgペン0.5mL「MA」  
25mg0.5mLキット [2~8°C] 【後】  
● 劇エタネルセプトB S皮下注50mgペン1.0mL「TY」  
50mg1.0mLキット [2~8°C] 【後】  
劇エトキシスクレロール1%注射液 30mLV  
劇エトポシド点滴静注液100mg「サド」 5mLV 【後】  
● エメジェンラ皮下注60mgペン 1.2mL/キット [2~8°C]  
エネフリード輸液 550mLキット  
劇エビペン注射液0.15mg 1mg/2mL筒 (注射量は0.3mL)  
劇エビペン注射液0.3mg 2mg/2mL筒 (注射量は0.3mL)  
劇エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ 300mgキット  
劇エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ 400mgキット  
劇エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 V [2~8°C] 【後】  
劇エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 V [2~8°C] 【後】  
劇エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 V 【後】  
劇エフェドリン「カキ」注射液40mg 1mLA  
劇エブキンリ皮下注4mg 0.8mLV [2~8°C]  
劇エブキンリ皮下注48mg 0.8mLV [2~8°C]  
劇エポエチンアルファB S注750「JCR」  
750国際単位0.5mLV [2~8°C] 【後】  
劇エポジン皮下注シリンジ24000—24000国際単位0.5mL筒—[冷]  
劇エホチール注10mg 1%1mLA  
劇エポプロステノール静注用0.5mg「ヤセン」 V 【後】  
劇エポプロステノール静注用1.5mg「ヤセン」 V 【後】  
エポプロステノール静注用「ヤセン」専用溶解液 50mLV  
劇エポルトラ点滴静注20mg 20mLV  
エムガルティ皮下注120mgオトインジェクター 1mLキット [2~8°C]  
劇エムブリシティ点滴静注用300mg V [2~8°C]  
劇エムズリンチ点滴静注用400mg—V—[2~8°C]  
注射用エラスポール100 100mg V  
劇エラプレース点滴静注液6mg 3mLV [2~8°C]  
劇エリル点滴静注液30mg 2mLA  
LH-RH注0.1mg「プロ」 0.1mgA  
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ—5mL筒  
(レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ト-7」へ切替)  
劇エルシトニン注40単位 1mLA  
エルネオパNF1号輸液 1000mLキット  
エルネオパNF2号輸液 1000mLキット  
毒エルプラテット点滴静注液100mg—20mLV  
(オキサリプラチン点滴静注100mg「ト-7」へ切替)  
劇エルレフィオ皮下注44mg 1.1mLV [2~8°C]  
劇エルレフィオ皮下注76mg 1.9mLV [2~8°C]  
塩化ナトリウム10% 20mLA  
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「効効」—0.5%2mLA 【後】  
(プリンペラン注射液10mgへ切替)  
劇エンズプリング皮下注120mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]  
劇エンタイピオ点滴静注用300mg V [2~8°C]  
劇エンタイピオ皮下注108mgペン 0.68mLキット [2~8°C]  
劇注射用エンドキサン500mg V [冷]

劇エンハーツ点滴静注用100mg V [2~8°C]  
●劇エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL 1カセット [2~8°C]  
●劇エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL 1カセット [2~8°C]  
劇エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 1筒 [2~8°C]  
●劇エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL 筒 [2~8°C]  
●劇エンブレル皮下注50mgペン1.0mL キット [2~8°C]  
【オ】  
オイパロミン300注20mL 61.24% V 【後】  
(イオパミドール300注20mL「F」へ名称変更)  
オイパロミン300注50mL 61.24% V 【後】  
(イオパミドール300注50mL「F」へ名称変更)  
オイパロミン300注100mL 61.24% V 【後】  
(イオパミドール300注100mL「F」へ名称変更)  
オイパロミン300注シリンジ100mL 61.24% 筒 【後】  
(イオパミドール300注シリンジ100mL「F」へ名称変更)  
オイパロミン300注シリンジ150mL 61.24% 筒 【後】  
(イオパミドール300注シリンジ150mL「F」へ名称変更)  
オイパロミン370注20mL 75.52% V 【後】  
(イオパミドール370注20mL「F」へ名称変更)  
オイパロミン370注50mL 75.52% V 【後】  
(イオパミドール370注50mL「F」へ名称変更)  
オイパロミン370注100mL 75.52% V 【後】  
(イオパミドール370注100mL「F」へ名称変更)  
オイパロミン370注シリンジ100mL 75.52% 筒 【後】  
(イオパミドール370注シリンジ100mL「F」へ名称変更)  
大塚生食注2ポート100mL キット 【後】  
毒オキサリプラチン点滴静注100mg「ト」 20mLV 【後】  
劇オキサロール注5μg 1mLA [冷]  
麻劇オキファスト注50mg 1%5mLA  
劇オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サト」 1mLA [冷] 【後】  
オザグレルN a点滴静注80mg「効」 4mLV 【後】  
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg 0.75mL筒 [2~8°C]  
劇オゼンピック皮下注2mg 1.5mLキット [2~8°C]  
劇乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「効」 1人用V [冷]  
オツカMV注  
劇オニバイド点滴静注43mg 10mLV [2~8°C]  
劇オノアクト点滴静注用150mg V  
オパホルモンデポー筋注5mg-A  
オビザー静注用500 500単位V (溶解液付) [2~8°C]  
劇オピソート注射用0.1g A (溶解液付)  
劇オピドレル皮下注シリンジ250μg 0.5mL筒 [2~8°C]  
オフサグリン静注用25mg V (溶解液付)  
劇オブジーボ点滴静注20mg 2mLV [2~8°C]  
劇オブジーボ点滴静注120mg 12mLV [2~8°C]  
劇オブジーボ点滴静注240mg 24mLV [2~8°C]  
オブチレイ320注シリンジ100mL 67.8%筒  
オブチレイ350注シリンジ100mL 74.1%筒  
オムニパーク240注10mL 51.77%V  
オムニパーク300注シリンジ80mL 64.71%筒  
オムニパーク300注シリンジ150mL 64.71%筒  
オムニパーク350注シリンジ45mL 75.49%筒  
オムニパーク350注シリンジ100mL 75.49%筒  
オメプラゾール注射用20mg「日医工」 V 【後】  
劇オキサベス点滴用1% 200mLP 【後】  
(リドカイン点滴静注液1%「効」へ名称変更)  
劇オルダミン注射用1g 10%10gV  
劇オルドレブ点滴静注用150mg V  
オルプロリタス静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]

劇オレンシア点滴静注用250mg V [2~8°C]  
●劇オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL キット [2~8°C]  
●劇オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL 筒 [2~8°C]  
劇オンキアス点滴静注用3750 3,750国際単位V [2~8°C]  
劇オンコピン注射用1mg V [冷]  
劇オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイ」 2mL筒 【後】  
オンドキサ静注用200mg V [2~8°C]  
劇オンパットロ点滴静注2mg/mL 8.8mg4.4mLV [2~8°C]  
(アムヴトラ皮下注25mgシリンジへ切替)  
劇オンポー点滴静注300mg 15mLV [2~8°C]  
劇オンポー皮下注100mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]  
劇オンポー皮下注200mgオートインジェクター 2mLキット [2~8°C]  
【カ】  
劇カイトリル注3mg 3mLA  
(採用薬はグラニセトロン静注液3mg「効」へ切替)  
毒カイプロリス点滴静注用10mg V [2~8°C]  
毒カイプロリス点滴静注用40mg V [2~8°C]  
劇カコジン注100mg 5mLA 【後】  
劇ガザイバ点滴静注1000mg 40mLV [2~8°C]  
ガスター注射液20mg 2mLA  
(ファモチジン静注20mg「日新」へ切替)  
注射用カタクロット40mg V  
(オザグレルN a点滴静注80mg「効」へ切替)  
劇カタボンH注600mg ÷ 0.3% 200mLP  
(ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」へ切替)  
劇カドサイラ点滴静注用100mg V  
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」 筒 【後】  
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL 60.47%5mL筒  
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL 60.47%10mL筒  
カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 A  
●劇ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ 0.5mL筒  
カブリビ注射用10mg V (溶解液付) [2~8°C]  
劇ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「効」 V 【後】  
劇ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「効」 V 【後】  
カーポスター透析剤・L 6L瓶  
カーミCA液 [KBS-200CA8L(C)] 200mL採血用  
カーミCA液 [KBS-400CA8L(C)] 400mL採血用  
カーミCA液 [KBT-400CA8L(C)] 400mL採血用  
劇カルセド注射用20mg V  
カルチコール注射液8.5%5mL A  
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」  
0.5%10mLA 【後】  
カルベニシ点滴用0.5g V  
毒カルボプラチン注射液50mg「NK」 5mLV  
毒カルボプラチン注射液150mg「NK」 15mLV 【後】  
毒カルボプラチン注射液450mg「NK」 45mLV 【後】  
劇カンサイダス点滴静注用50mg V [2~8°C]  
毒ガンシクロピル点滴静注用500mg「VTRS」 V 【後】 (デノシン)  
乾燥H B グロブリン筋注用200単位「ニヤク」 1mLV (溶解液付) [冷]  
劇乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「効」 1人用V [冷]  
劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 V (溶解液付) [冷]  
劇乾燥弱毒生麻しんワクチン「効」 1人分V (溶解液付) [冷]  
劇乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V (溶解液付) [冷]  
【キ】  
劇キイトルーダ点滴静注100mg 4mLV [2~8°C]  
劇キシロカイン注射液1% 100mLV  
劇歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mLA [冷]

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

劇キシロカイン注ポリアンブ1%—10mLA  
 (リドカイン塩酸塩注1%「日新」へ切替)  
 劇キシロカイン注ポリアンブ2%—10mLA  
 (リドカイン塩酸塩注2%「日新」へ切替)  
 劇キシロカイン注射液「1%」エトキシ (1:100,000) 含有 20mLV [冷]  
 キドパレン輸液  
 キドミン輸液 200mLP  
 劇ギャバロン髄注0.005% 1mLA  
 劇ギャバロン髄注0.05% 20mLA  
 劇ギャバロン髄注0.2% 5mLA  
 劇キャップボックス筋注シリンジ 0.5mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
 キュピシン静注用350mg—V—[2~8°C]  
 (ダプトマイシン静注用350mg「プロ」へ切替)  
 キュービトル20%皮下注4g/20mL V [冷]  
 劇キロサイド注20mg A  
 劇キロサイド注100mg A  
 劇キロサイドN注1g—V  
 (採用薬はシタラピン点滴静注液1g「NIG」へ切替)  
 キンダリー透析剤 A F5号 6LV (炭酸水素ナトリウム液付)

【ク】

劇グラニセトロン静注液3mg「アム」—3mLA—【後】—  
 劇グラニセトロン静注液3mg「カ」 3mLA 【後】  
 タラピット点滴静注バッグ500mg/100mL—キット  
 (レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」へ切替)  
 グランシリンジ75 75μg0.3mL筒 [冷]  
 グランシリンジ150 150μg0.6mL筒 [冷]  
 ※ グランシリンジM300 300μg0.7mL筒 [冷]  
 クリアクター静注用80万 80万国際単位V  
 グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mLP 【後】  
 劇クリースピータ皮下注10mg 1mLV [2~8°C]  
 劇タリースピータ皮下注20mg—1mLV—[2~8°C]  
 劇クリースピータ皮下注30mg 1mLV [2~8°C]  
 ● 劇クリースピータ皮下注20mgシリンジ 0.67mL筒 [2~8°C]  
 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 4mLA  
 グルアセト35注 (ソフトバッグ) 500mLP 【後】  
 劇グルカゴンGノボ注射用1mg V (溶解液付) [冷]  
 グルトバ注1200万 1200万国際単位 V (溶解液付)  
 劇クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL筒  
 劇クレセンバ点滴静注用200mg V [2~8°C]  
 ● グロウジェクト皮下注12mg 筒 [冷]  
 ● クロスエイトMC静注用250単位 V (溶解液付)  
 ● クロスエイトMC静注用1000単位 V (溶解液付)  
 献血グロベニン—I静注用2500mg 50mLV (溶解液付)  
 献血グロベニン—I静注用5000mg 100mLV (溶解液付)

【ケ】

KCL注20mEqキット「テル」 1E/L20mLキット 【後】  
 ケイセントラ静注用500 500国際単位V (溶解液付) [25°C以下]  
 ケイセントラ静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [25°C以下]  
 ケイツーN静注10mg A  
 劇ケサンラ点滴静注液350mg 20mLV [2~8°C]  
 劇ケシンプタ皮下注20mgペン 0.4mLキット [2~8°C]  
 麻劇ケタラール静注用50mg 5mLA  
 ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL V  
 劇ケブザラ皮下注200mgシリンジ 1.14mL筒 [2~8°C]  
 ● 劇ケブザラ皮下注150mgオトインジェクター 1.14mLキット [2~8°C]  
 ● 劇ケブザラ皮下注200mgオトインジェクター 1.14mLキット [2~8°C]  
 劇ゲムスタピン点滴静注液1g/25mL「サド」 V [2~8°C] 【後】

献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V  
 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V  
 献血アルブミン20%静注4g/20mL「タダ」 V  
 献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」—20%50mLV  
 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV  
 献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV  
 献血ヴェノグロブリンI H10%静注0.5g/5mL V [冷]  
 献血ヴェノグロブリンI H10%静注2.5g/25mL V [冷]  
 献血ヴェノグロブリンI H10%静注5g/50mL V [冷]  
 献血ヴェノグロブリンI H10%静注10g/100mL V [冷]  
 献血ヴェノグロブリンI H10%静注20g/200mL V [冷]  
 献血グロベニン—I静注用2500mg 50mLV (溶解液付)  
 献血グロベニン—I静注用5000mg 100mLV (溶解液付)  
 献血ノンスロン500注射用 500単位V (溶解液付)  
 献血ノンスロン1500注射用 1500単位V (溶解液付)  
 献血ベニロン—I静注用2500mg 50mLV (溶解液付)  
 献血ベニロン—I静注用5000mg 100mLV (溶解液付)

劇ゲンタシン注40 40mgA

【コ】

コアテック注5mg 5mLA  
 劇コアベータ静注用12.5mg V  
 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」  
 (=ローブリン) V (溶解液付) [冷]  
 劇コスメゲン静注用0.5mg V [冷]  
 劇コセンティクス皮下注150mgペン 1mLキット [2~8°C]  
 ● 劇コセンティクス皮下注300mgペン 2mLキット [2~8°C]  
 コートロシン注射用0.25mg V (溶解液付) [冷]  
 コートロシンZ筋注0.5mg V [冷]  
 劇ゴナックス皮下注用80mg V (溶解液付)  
 劇ゴナックス皮下注用120mg V (溶解液付)  
 ゴナトロピン注用5000単位 V [冷] (アンプルからバイアルへ切替)  
 ● ゴナールエフ皮下注ペン300 300国際単位0.5mL筒 [冷]  
 ゴナールエフ皮下注ペン450 450国際単位0.75mL筒 [冷]  
 ● ゴナールエフ皮下注ペン900 900国際単位1.5mL筒 [冷]  
 コバキソン皮下注20mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]  
 コバルトリー静注用250 250国際単位V (溶解液付) [冷]  
 ● コバルトリー静注用500 500国際単位V (溶解液付) [冷]  
 ● コバルトリー静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [冷]  
 ● コバルトリー静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [冷]  
 ● コバルトリー静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [冷]  
 劇ゴービック水性懸濁注シリンジ 0.5mL筒 [10°C以下]  
 劇コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 0.03mg0.3mL1筒 [2~8°C]  
 劇コントミン筋注25mg 5mLA  
 コンファクトF静注用500単位 500単位V (溶解液付) [10°C以下]

【サ】

ザイボックス注射液600mg 300mLP  
 劇注射用サイメリン50mg V [冷]  
 劇サイモグロブリン点滴静注用25mg V [冷]  
 劇サイラムザ点滴静注液100mg 10mLV [冷]  
 劇サイラムザ点滴静注液500mg 50mLV [冷]  
 向サイレース静注2mg A  
 劇サークリサ点滴静注100mg 5mLV [2~8°C]  
 劇サークリサ点滴静注500mg 25mLV [2~8°C]  
 劇ザノサー点滴静注用1g V [2~8°C]  
 ザバクサ配合点滴静注用 V [2~8°C]  
 劇サーバサックス—0.5mL筒—[冷]  
 (シルガード9水性懸濁筋注シリンジへ切替)  
 劇サビーン点滴静注用500mg V

- 劇サフネロー点滴静注300mg 2mLV [2~8°C]  
サブパック血液ろ過用補充液-B i 2020mLキット 【後】  
サブブラッド血液ろ過用補充液B-S-G—2020mLキット
- 劇サムタス点滴静注用8mg V  
劇ザルトラップ点滴静注100mg 4mLV [2~8°C]  
劇サンディミュン点滴静注用250mg 5%5mLA  
劇サンドスタチン皮下注用50 $\mu$ g—1mLA—[冷]  
(採用薬はオクトレオチド酢酸塩皮下注50 $\mu$ g「サド」へ切替)  
劇サンドスタチンLAR筋注用キット20mg 筒 (溶解液付) [2~8°C]  
劇サンラピン点滴静注用250mg—V—[冷]  
劇サンリズム注射液50 50mg5mLA
- 【シ】**  
ジアグノグリーン注射用25mg V (溶解液付)  
向ジアゼパム注射液10mg「NIG」 A 【後】  
シアノキット注射用5gセット 5gV (溶解液付)  
注射用GHRP 科研100 100 $\mu$ gV [10°C以下] [禁凍結]  
(注射用GHRP 科研100 (溶解液付) より切替)  
注射用GHRP 科研100—100 $\mu$ gV (溶解液付)—[冷]
- ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg キット [冷]  
ジェノトロピンゴークイック注用12mg キット [冷]
  - ジェノトロピンTC注用5.3mg 5.33mg筒 (溶解液付) [冷]
  - ジェノトロピンTC注用12mg 筒 (溶解液付) [冷]
- 劇ジェビックV (=乾燥細胞培養日本脳炎77c) V (溶解液付) [冷]  
毒ジェブタナ点滴静注60mg 1.5mLV (溶解液付) [15~30°C]  
劇ジェムザール注射用1g—V—  
(ゲムスタピン点滴静注液1g/25mL「サド」へ切替)  
劇シオゾール注10mg—1mLA— (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了 (予定))  
劇ジオン注無痛化剤付 10mLV (希釈液付)  
劇ジギラノゲン注0.4mg 2mLA  
劇シグニフォルLAR筋注用キット40mg 1キット (溶解液付) [2~8°C]  
シグマート注2mg V [冷]  
シグマート注48mg—V—[冷]  
(ニコランジル点滴静注用48mg「77」へ切替)  
シザナリン配合点滴静注液 2mLA 【後】  
毒シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mLV 【後】  
毒シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mLV 【後】  
ジスロマック点滴静注用500mg V  
劇歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 3%1.8mLA [冷]
- 劇シタラピン点滴静注液1g「NIG」 50mLV 【後】  
シチヨサン注500mg/10mL「日医王」A—【後】— (販売中止)  
(2025年9月30日経過措置終了)  
ジトリペンタートカル静注1000mg V  
シナジス筋注液50mg 0.5mLV [2~8°C]  
シナジス筋注液100mg 1mLV [2~8°C]
- ジビイ静注用3000 3,000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
劇ジフォルタ注射液20mg 1mLV [2~8°C]  
劇洗降ジラテリヤ破傷風混合トキソイド「タダ」—1mLV—[冷]  
劇ジプレキサ筋注用10mg V  
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「コ」 200mLP 【後】  
シベクトロ点滴静注用200mg V  
劇シベノール静注70mg 5mLV筒  
劇シムジア皮下注200mgシランジ—1mL筒—[2~8°C]  
劇シムジア皮下注200mgオートクリックス 1mLキット [2~8°C]  
劇シムレクト静注用20mg V—(溶解液付)— [冷]  
シメチジン注200mg「NP」 2mLA 【後】  
ジョイタル関節注30mg—3mL筒—[2~8°C]
- ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL筒 [2~8°C]  
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド 0.36mLキット [2~8°C]  
劇シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]  
劇ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ 0.574mL筒 [2~8°C]  
劇シングリックス筋注用 一人分V (溶解液付) [2~8°C]  
劇シンビット静注用50mg V  
劇シンボニー皮下注50mgシランジ—0.5mL筒—[2~8°C]  
劇シンボニー皮下注50mgオートインジェクター 0.5mLキット [2~8°C]
- 【ス】**  
劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 V (溶解液付) [冷]  
水溶性プレドニン20mg A  
スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルシ」 2mL筒 【後】  
劇スカンドネストカートリッジ3% 1.8mLA  
劇スキリージ皮下注75mgシランジ0.83mL—筒—[2~8°C]  
劇スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL 筒 [2~8°C]  
劇スキリージ皮下注360mgオートドーズー 2.4mLキット [2~8°C]  
劇スキリージ点滴静注600mg 10mLV [2~8°C]  
ステミラック注 1回分 [-80°C以下]  
(輸血免疫移植部でのみ取扱い)  
劇ステララ点滴静注130mg 26mLV [2~8°C]  
劇ステララ皮下注45mgシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]  
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ 筒 [2~8°C]  
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 V  
スピランザ髓注12mg 5mLV [2~8°C]  
劇ズファジラン筋注5mg 0.5%1mLA  
劇スミフェロン注D-S300万IU—筒—(注射針同梱)—[冷]  
劇スミフェロン注D-S600万IU 筒 (注射針同梱) [冷]  
スルバシリン静注用1.5g—V—  
スルバシリン静注用3g V  
スロニメシH+注10mg/2mL—A  
(アルガトロバンH+注10mg/2mL「77」へ切替)
- 【セ】**  
劇一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25 $\mu$ gV (溶解液付) [冷]  
生食注シリンジ「NP」10mL 筒 【後】
- 生食注シリンジ「オカ」10mL 筒 【後】  
生食注シリンジ50mL「コ」 筒 【後】  
生理食塩液 20mLA  
生理食塩液 50mLV  
生理食塩液 100mLV  
生理食塩液 250mLP  
生理食塩液 500mLP (プラボトルからバッグへ切替)  
生理食塩液「フル」 1000mLP  
生理食塩液PL「77」 2LP
- ※毒ゼオメイン筋注用100単位 V [25°C以下]  
(ゼオメイン注用100単位へ名称変更)  
→毒ゼオメイン注用100単位 V
- 劇ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
● 劇ゼップバウンド皮下注5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
● 劇ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
● 劇ゼップバウンド皮下注10mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
● 劇ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
● 劇ゼップバウンド皮下注15mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
- 劇セトロタイド注射用0.25mg V (溶解液付) [2~8°C]  
セバセルインテグラCA 400mL採血用 [ABD-400CA8FL]  
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医王」 V 【後】  
劇セファランチン注10mg 2mLA  
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 V 【後】  
セフォタックス注射用1g V

無印：採用薬  
 ※：削除予定薬  
 ●：院外処方専用薬  
 ☆：院外処方専用予定薬  
 【後】：後発医薬品  
 ○：院内専用後発品である薬

セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 V 【後】  
 セフタジジム静注用1g「VTRS」 V  
 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 V  
 セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 V 【後】  
 ※劇ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ 25mg1キット  
 劇ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ 50mg1キット  
 劇ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ 75mg1キット  
 劇ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ 100mg1キット  
 劇ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ 150mg1キット  
 劇ゼプリオンTRI水懸筋注525mgシリンジ 525mg1キット  
 向セルシン注射液10mg—A（販売中止）（2026年3月31日経過措置終了）  
 （ジアゼパム注射液10mg「NIG」へ切替）  
 劇セレネース注5mg 1mLA

【ソ】  
 ● ソグルーヤ皮下注5mg 1.5mLキット [2~8°C]  
 ● ソグルーヤ皮下注10mg 1.5mLキット [2~8°C]  
 ● ソグルーヤ皮下注15mg 1.5mLキット [2~8°C]  
 ズシン静注用4.5—4.5gV（タゾピベ配合静注用4.5「コ」へ切替）  
 向劇ソセゴン注射液15mg A  
 ズピラタックス点滴静注用—250mgV  
 （アシクロビル点滴静注液250mg「ト」へ切替）  
 ソナゾイド注射液16μL V（溶解液付）  
 劇ソマチユリン皮下注90mg 筒 [冷]  
 劇ソマチユリン皮下注120mg 筒 [冷]  
 ● ソマトロピンB S皮下注5mg「サド」シユアパル  
 5mg筒 [2~8°C] 【後】  
 ● ソマトロピンB S皮下注10mg「サド」シユアパル  
 10mg筒 [2~8°C] 【後】  
 劇ゾメタ点滴静注4mg/100mL—V  
 （ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ト」へ切替）  
 劇ゾラデックス3.6mgデポ 筒 [冷]  
 劇ゾラデックスL A 10.8mgデポ 筒 [冷]  
 劇ソリクア配合注ソロスター キット [2~8°C]  
 劇ソリリス点滴静注300mg 30mLV [冷]  
 ソルアセトF輸液 500mLP 【後】  
 ソル・コーテフ注射液100mg V（溶解液付）  
 ソル・コーテフ静注用500mg V（溶解液付）  
 劇ソルダクトン静注用100mg A  
 ソルデム1輸液 200mLP 【後】  
 ソルデム1輸液 500mLP 【後】  
 ソルデム3A輸液 200mLP 【後】  
 ソルデム3A輸液 500mLP 【後】  
 劇ゾルトファイ配合注フレックスタッチ キット [2~8°C]  
 ソル・メドロール静注用40mg 40mgV（溶解液付）  
 ソル・メドロール静注用125mg 125mgV（溶解液付）  
 ソル・メドロール静注用500mg 500mgV（溶解液付）  
 ソルラクト輸液 500mLP 【後】  
 劇ゾレア皮下注150mgペン 1mL1キット [2~8°C]  
 劇ゾレア皮下注300mgペン 2mL1キット [2~8°C]  
 劇ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ト」 P 【後】

【タ】  
 ダイアニール—N PD—2 1.5腹膜透析液(シグ ルバ ッグ) 2LP（販売中止）  
 ダイアニール—N PD—2 2.5腹膜透析液(シグ ルバ ッグ) 2LP（販売中止）  
 ● ダイアニール—N PD—4 1.5腹膜透析液(シグ ルバ ッグ) 1LP  
 ダイアニール—N PD—4 1.5腹膜透析液(シグ ルバ ッグ) 2LP（販売中止）  
 ● ダイアニール—N PD—4 1.5腹膜透析液(シグ ルバ ッグ) 5LP  
 ● ダイアニール—N PD—4 2.5腹膜透析液(シグ ルバ ッグ) 1LP  
 ダイアニール—N PD—4 2.5腹膜透析液(シグ ルバ ッグ) 2LP（販売中止）

● ダイアニール—N PD—4 2.5腹膜透析液(シグ ルバ ッグ) 5LP  
 ダイアニールPD—2 4.25腹膜透析液(シグ ルバ ッグ) 2LP  
 ダイアモックス注射用500mg V  
 劇タイガシル点滴静注用50mg V  
 劇タイサブリア点滴静注300mg 15mLV [2~8°C]  
~~ダイホルモン—デポー注—1mLA—【後】—（販売中止）~~  
 （2026年3月31日経過措置終了）  
 タイロゲン筋注用0.9mg V [冷]  
 劇ダウノマイシン静注用20mg V  
 タガメット注射液200mg—2mLA—（シメチジン注200mg「NP」へ切替）  
 劇ダカルバジン注用100 100mgV [冷]  
 タケブロン静注用30mg V  
 劇注射用タゴシッド200mg—V  
 （テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」へ切替）  
 タゾピベ配合静注用4.5「コ」 4.5gV  
 タチオン注射用100mg A  
 劇ダトロウエイ点滴静注用100mg V [2~8°C]  
 ダブトマイシン静注用350mg「コ」 V 【後】（キュピシン）  
 劇ダラキューロ配合皮下注 15mLV [2~8°C]  
 劇ダラザレタックス点滴静注100mg—5mLV—[2~8°C]  
 劇ダラザレタックス点滴静注400mg—20mLV—[2~8°C]  
 ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」  
 5,000低分子ヘパリン国際単位A 【後】（フラグミン）  
 劇ダルピアス点滴静注用135mg V [2~8°C]  
 ○劇ダルバポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」  
 0.5mL筒 【後】 [2~8°C]（ネスブ）  
 ○劇ダルバポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」  
 0.5mL筒 【後】 [2~8°C]（ネスブ）  
 ダントリウム静注用20mg V  
 劇タンボコール静注50mg 5mLA

【チ】  
 チエナム点滴静注用0.5g V  
 注射用水 20mLA  
 注射用水（＝大塚蒸留水） 100mLV  
 注射用水（＝大塚蒸留水） 500mLV（PET専用・物流のみ）  
 注射用水（洗浄用） 500mLV  
 注射用水（洗浄用） 1000mLV  
 注射用水バッグ「フ」 1LP  
 劇チラーゼンS静注液200μg 1mLA  
 劇沈降破傷風トキシイド「生研」 0.5mLV [冷]  
 劇沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド「タダ」—1mLA—[冷]  
 （DTピックへ切替）

【ツ】  
 劇一般診断用精製ツベルクリン（PPD）  
 1人用 0.25μgV（溶解液付） [冷]

【テ】  
 T R H注0.5mg「コ」 A [冷]  
 ○劇テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」 V 【後】  
 劇DTピック（＝沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド） 0.1mLV [冷]  
 劇1%ディプリバン注—キット 500mg50mL筒  
 低分子デキストラン糖注 500mLP 【後】  
 デカドロン注射液1.65mg—0.5mL—[冷]  
 （院内はデキサート注射液1.65mg）  
 デカドロン注射液6.6mg—2mL—[冷]  
 （院内はデキサート注射液6.6mg）  
 ○ デキサート注射液1.65mg 0.5mLA 【後】  
 ○ デキサート注射液6.6mg 2mLV 【後】  
 劇デクスメドミジン静注液200μg「コ」 2mLV 【後】

- 劇テクベイリ皮下注30mg 3mLV [2~8°C]  
劇テクベイリ皮下注153mg 1.7mLV [2~8°C]  
テストノンデポー筋注用125mg 1mLA  
劇テゼスパイア皮下注210mgペン 1.91mLキット [2~8°C]  
劇テセントリク点滴静注840mg 14mLV [2~8°C]  
劇テセントリク点滴静注1200mg 20mLV [2~8°C]  
テナノブリンIH静注250単位 V [冷]  
テナノブリンIH静注1500単位V [冷]  
劇テッペーザ点滴静注用500mg V [2~8°C]  
デトキソール静注液2g 20mLV  
劇テトラピック皮下注シリンジ0.5mL筒 [冷]  
毒デノシン点滴静注用500mg—V  
(ガンシクロピル点滴静注用500mg[VTRS]へ切替)  
劇テビムブラ点滴静注100mg 10mLV [2~8°C] [禁凍結]  
デファイテリオ静注200mg 2.5mLV  
劇テブダック点滴静注用40mg V [2~8°C]  
テムセルHS注 10.8mLIP [液体室素(気相中)]  
(輸血移植免疫部でのみ取扱い)  
毒テモダール点滴静注用100mg V [2~8°C]  
※劇デュビクセント皮下注200mgシリンジ 1.14mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
(デュビクセント皮下注200mgペンへ切替)  
劇デュビクセント皮下注200mgペン 1.14mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
劇デュビクセント皮下注300mgペン 2mLキット [2~8°C] [禁凍結]  
劇テラルピシン注射用10mg V [冷]  
劇テラルピシン注射用20mg V [冷]  
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モダ」キット [2~8°C] 【後】  
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター キット [2~8°C]  
テルモ血液バッグCPDA 200mL採血用セット [BB-SCD200J8A]  
【ト】  
劇ドキシル注20mg 10mLV [冷]  
劇ドキシルピシン塩酸塩注射液10mg「サド」5mLV [冷]—【後】—  
(販売中止)  
劇ドキシルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」 V 【後】  
劇ドキシルピシン塩酸塩注射液50mg「サド」25mLV [冷]—【後】—  
(販売中止) (ドキシルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」へ切替)  
毒ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「エロ」 V 【後】  
毒ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「エロ」 V 【後】  
ドバストン静注50mg 0.25%20mLA  
→劇ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」0.3%200mL袋 【後】  
(ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」が無くなり次第切替)  
※劇ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」0.3%200mL袋 【後】  
(ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」へ切替予定)  
劇ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サド」 5mLA 【後】  
劇ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」50mL筒—【後】—  
(ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テル」へ名称変更)  
劇ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テル」0.3%50mL筒 【後】  
(ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」より名称変更)  
劇ドブトレックス注射液100mg—A  
(ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サド」へ切替)  
劇ドブポン注0.3%シリンジ—50mL—【後】—  
(ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」へ名称変更)  
(ドブトレックスK注600mgより切替)  
劇ドブラン注60mg—A  
劇ドブラム注射液400mg 20mLV  
劇トポテン点滴静注40mg—2mLV  
(院内はイリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト」)  
劇トポテン点滴静注100mg—5mLV  
(院内はイリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト」)  
トラスツズマブB-S点滴静注用60mg「NK」—V [2~8°C]—【後】—  
トラスツズマブB-S点滴静注用150mg「NK」 V [2~8°C] 【後】  
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」10%10mLA 【後】  
劇トラマル注100 100mgA  
トランサミン注10% 10mLA  
毒トリセノックス点滴静注12mg 6mLV  
劇トリピック(=沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン)  
0.5mLV [10°C以下] [禁凍結]  
劇トルツ皮下注80mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]  
向ドルミカム注射液10mg 2mLA (ミダゾラム注10mg「サド」へ切替)  
劇トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL1キット [2~8°C]  
●劇トルリシティ皮下注1.5mgアテオス 0.5mL1キット [2~8°C]  
劇トリアキシン点滴静注液100mg/4mL V [2~8°C]  
劇トリーバ注フレックスタッチ 300単位キット [2~8°C]  
劇トレプロスト注射液200mg 20mLV  
劇トレムフィア点滴静注200mg 20mLV [2~8°C]  
劇トレムフィア皮下注100mgシリンジ 100mg1mL筒 [2~8°C]  
劇トレムフィア皮下注200mgペン 2mLキット [2~8°C]  
劇トロデルピ点滴静注用200mg V [2~8°C]  
劇ドロレプタン注射液25mg 10mLV  
【ナ】  
●劇ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター 0.375mLキット [2~8°C]  
劇ナノゾラ皮下注30mgシリンジ 0.375mL筒 [2~8°C]  
劇ナファモスタット注射用10mg「SW」 V 【後】  
毒ナーブロック筋注2500単位—0.5mLV—[2~8°C]  
毒ナルベリン注40 4mLV [冷] (ロゼウス静注液40mgへ切替)  
麻劇ナルベイン注2mg 1mLA  
劇ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mLA  
【ニ】  
劇ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 2mLA 【後】  
(サリベックス注0.1% 2mg2mLより名称変更)  
劇ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 10mLA 【後】  
(サリベックス注0.1% 10mg10mLより名称変更)  
●ニコペリック腹膜透析液1.5L 袋(排液用バッグ付) 【後】  
ニコランジル点滴静注用48mg「サド」 V [冷] 【後】  
ニコサン注射液500mg—10mLA  
毒ニトロプロ持続静注液6mg 2mLA [冷]  
劇ニドラン注射用50mg—V  
劇ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 A 【後】  
劇ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テル」筒 【後】  
ニトロール注5mgシリンジ 10mL筒  
ニトロール持続静注25mgシリンジ 50mL筒  
劇乳酸ビペリデン注5mg「ヨシミ」0.5%1mLA 【後】  
劇ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]  
【ヌ】  
劇ヌーカラ皮下注100mgペン 1mLキット [2~8°C]  
劇小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL筒 [2~8°C]  
【ネ】  
ネオアデミュー輸液—200mLP  
劇ネオシネジンコーワ注1mg 1mLA  
劇ネオピタカイン注シリンジ5mL 筒  
ネオファーゲン静注20mL A  
ネオフィリン注250mg 10mLA  
劇ネスズ注射液30μgブラスリンジ—0.5mL筒—[2~8°C]  
(ダルベオエチナルファ注30μgシリンジへ切替)  
劇ネスズ注射液60μgブラスリンジ—0.5mL筒—[2~8°C]  
(ダルベオエチナルファ注60μgシリンジへ切替)  
劇ネスズ注射液120μgブラスリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]

無印：採用薬  
※：削除予定薬  
●：院外処方専用薬  
☆：院外処方専用予定薬  
【後】：後発医薬品  
○：院内専用後発品である薬

【ノ】

劇マイアート静注用1500単位V (溶解液付)  
(献血ノンスロン1500注射用へ切替)  
ノイトロジン注50 $\mu$ g V (溶解液なし)  
ノイトロジン注100 $\mu$ g V (溶解液なし)  
ノイトロジン注250 $\mu$ g V (溶解液なし)  
ノイトロピン注射液3.6単位 3mLA  
劇ノクスフィル点滴静注300mg 16.7mLV [2~8°C]  
メバミン筋注5mg—1mLA (販売中止)  
毒ノバントロン注10mg 5mLV  
向劇ノーベルパール静注用250mg V  
● ノボエイト静注用1500 1500国際単位V (溶解液付) [2~8°C]  
ノボセブンH I 静注用5mgシリンジ 5mLV (溶解液付) [冷]  
劇ノボラピッド注100単位/mL 10mLV [冷]  
● 劇ノボラピッド注フレックスタッチ 300単位キット [冷]  
(院内はインスリンアスパルトB S注用スターNR「サフィ」へ切替予定)  
● 劇ノボラピッド注フレックスペン 300単位キット [冷]  
● 劇ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]  
● 劇ノボラピッド50ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]  
● 劇ノボリンR注フレックスペン 300単位キット [冷]  
● 劇ノボリンN注フレックスペン 300単位キット [2~8°C]  
劇ノルアドリナリン注1mg 0.1% 1mLA  
● ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg キット [冷]  
● ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg キット [冷]  
献血ノンスロン500注射用 500単位V (溶解液付)  
献血ノンスロン1500注射用 1500単位V (溶解液付)

【ハ】

劇ハイカムチン注射用1.1mg V  
ハイカリックRF輸液 500mLP  
バイクロット配合静注用V (溶解液付) [10°C以下]  
(バイクロット配合静注用2.5mLへ名称変更)  
特生バイクロット配合静注用2.5mL V (2.5mL溶解液付)  
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL V [2~25°C]  
水溶性ハイドロコートン注射液100mg 2mLV  
バクトラミン注 5mLA  
毒バクリタキセル注100mg/16.7 mL「NK」 V 【後】  
毒バタリタキセル注射液100mg「NP」—16.7mLV—【後】 (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
劇パーサビブ静注透析用シリンジ5mg 2mL筒 [2~8°C]  
劇パージェタ点滴静注420mg/14mL V [2~8°C]  
劇沈降破傷風トキシイド「生研」 0.5mLV [冷]  
ハーセプチン注射用150 150mgV (溶解液なし) [2~8°C]  
劇バドセブ点滴静注用30mg V [2~8°C]  
ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」 1mLA  
劇バビースモ硝子体内注射液120mg/mL—0.05mLV— [2~8°C]  
劇バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg.0.05mL筒 [2~8°C]  
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100mLV [冷]  
劇ハベカシン注射液200mg 4mLA  
劇バベンチオ点滴静注200mg 10mLV [2~8°C]  
バム静注500mg 20mLA  
毒ハラヴェン静注1mg 2mLV  
毒バラデラチン注射液50mg—5mLV  
(カルボプラチン点滴静注50mg「NK」へ切替)  
毒バラデラチン注射液150mg—15mLV  
(カルボプラチン点滴静注150mg「NK」へ切替)  
毒バラデラチン注射液450mg—45mLV  
(カルボプラチン点滴静注450mg「NK」へ切替)  
バル筋注100mg「AFP」 10%1mLA [冷]

劇パルクス注5 $\mu$ g—1mLA [冷]  
(採用薬はアルプロスタジル注5 $\mu$ g「サイ」へ切替)  
劇パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ付」 P 【後】  
劇ハロマンズ注100mg 1mLA  
バンコマイシン点滴静注用0.5g「ト7」 V 【後】  
パンテノール注500mg「KCC」—A—【後】 (供給停止)  
パントール注射液500mg—A  
劇ハンブ注射用1000 1000 $\mu$ gV

【ヒ】

劇ピアスカイ注340mg 2mLV [2~8°C]  
劇ピヴラツ点滴静注液150mg 6mLV  
ピカネイト輸液 500mLP (ピカーボン輸液から切替)  
ピカネイト輸液 1000mLP  
ピカーボン輸液—500mLP (ピカネイト輸液 500mLへ切替)  
劇ピキセオス配合静注用 (144mg) V [2~8°C]  
ピクシリン注射用2g V  
注射用ピクシリンS500 500mgV 【後】  
劇ピクトーザ皮下注18mg 3mLキット [冷]  
劇BCG7クフ「デイス」乾燥 12mg 1人用V [冷]  
劇ピシバニール注射用1KE V (溶解液なし) [10°C以下]  
劇ピシバニール注射用5KE V (溶解液なし) [10°C以下]  
劇ビスダイン静注用15mg V  
セスタグロピン皮下注用V (溶解液付) [冷]  
ゼンルボン注4mg—0.2%2mLA  
(プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨ」へ切替)  
劇ビダーザ注射用100mg—V  
(アザシチジン注射用100mg「サイ」へ切替)  
ゼタミン注射用500mg—A— [冷]  
(アスコルビン酸注500mgP B「日新」へ切替)  
ピタメジン静注用 V  
※ ピドキサル注10mg A (ピリドキサル注10mg「イイ」へ切替)  
→ ピリドキサル注10mg「イイ」 A  
(ピドキサル注10mgが無くなり次第切替)  
ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「エロ」 V (溶解液付)  
ピトレシン注射液20 20単位1mLA [冷]  
劇ヒフデューラ配合皮下注—5.6mLV— [2~8°C]  
(ヒフデューラ配合皮下注シリンジへ切替)  
劇ヒフデューラ配合皮下注シリンジ 5mL筒 [2~8°C]  
ビーフリード輸液 500mLキット  
ピペラシリンNa注射用1g「NIG」 V 【後】  
(ペントシリン注射用1gVから切替)  
ヒベルナ注25mg 2.5%1mLA  
劇ビームゲン注「HB7クチ」 5 $\mu$ g0.25mLV [冷]  
劇ビームゲン注「HB7クチ」—10 $\mu$ g0.5mLV— [冷]  
(ヘプタバックス-IIへ切替)  
劇ビムパット点滴静注100mg 10mLV  
劇ビムパット点滴静注200mg—20mLV  
● ヒューマトローブ注射用6mg 筒 (溶解液付) [冷]  
(販売終了) (2026年3月31日経過措置終了)  
● ヒューマトローブ注射用12mg 筒 (溶解液付) [冷]  
(販売終了) (2026年3月31日経過措置終了)  
劇ヒューマリンR注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]  
● 劇ヒューマリンR注カート 300単位筒 [冷]  
劇ヒューマリンR注ミリオペン 300単位キット [冷]  
劇ヒューマリンN注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]  
劇ヒューマリンN注ミリオペン—300単位キット— [冷]  
● 劇ヒューマリン3/7注ミリオペン [冷]  
● 劇ヒューマログ注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]

- 劇ヒューマログ注カート 300単位筒 [冷]
- 劇ヒューマログ注ミリオベン 300単位キット [冷]
- 劇ヒューマログ注ミリオベンHD 300単位キット [冷]
- 劇ヒューマログミックス25注ミリオベン 300単位キット [冷]
- 劇ヒューマログミックス50注ミリオベン 300単位キット [冷]
- 劇ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL 筒 [冷]
- 劇ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL 筒 [冷]
- 劇ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL キット [冷]
- 劇ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL 筒 [冷]
- 劇ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL キット [冷]
- ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL V [2~25°C] [禁凍結]
- ピリヴィジェン10%静注5g/50mL V [2~25°C] [禁凍結]
- ピリヴィジェン10%静注10g/100mL V [2~25°C] [禁凍結]
- ピリスコピン点滴静注50 10.55% 100mLV
- 劇ピーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g V [2~8°C]
- ビルテプソ点滴静注250mg 5mL V [冷]
- ヒルトニン0.5mg注射液 A
- 劇ピロイ点滴静注用100mg V [2~8°C]
- 劇ピロイ点滴静注用300mg V [2~8°C]
- 劇ペンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]
- 劇ペンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター 2mLキット [2~8°C]
- 【フ】
- ファイバ静注用1000 20mLV [2~8°C]
- 劇5-FU注250mg-V [2~8°C]
- (フルオロウラシル注250mg「ト7」へ切替)
- ファーストシン静注用1g V
- 劇ファセンラ皮下注30mgシリンジ1mL筒 [2~8°C]
- 劇ファセンラ皮下注30mgペン 1mLキット [2~8°C]
- 劇ファブラザイム点滴静注用5mg V [冷]
- 劇ファブラザイム点滴静注用35mg V [冷]
- 劇ファルモルピシン注射用10mg-V
- (エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」へ切替)
- ファモチジン静注20mg「日新」 20mLA 【後】
- 劇ファンガード点滴用50mg-V
- (ミカファンギンNa点滴静注用50mg「プロ」へ切替)
- フィコンパ点滴静注用2mg V
- ライジオ35輸液-500mLP (グルアセト35注 500mLへ切替)
- フィジオ140輸液 500mLP
- フィニバック点滴静注用0.5g V
- 劇ブイフェンド200mg静注用 V
- フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 V (溶解液付) [冷]
- フィプロガミンP静注用 V [冷]
- フィラジル皮下注30mgシリンジ 3mL筒 [冷]
- フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「NK」
- 0.3mL/筒 [2~8°C] 【後】
- フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「NK」
- 0.6mL/筒 [2~8°C] 【後】
- フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」
- 0.7mL/筒 [10°C以下 禁凍結] 【後】
- 劇注射用フィルデシン1mg V [冷]
- フェインジェクト静注500mg 10mLV
- フェジン静注40mg 2mLA
- 劇フェスゴ配合皮下注MA 10mLV [2~8°C]
- 劇フェスゴ配合皮下注IN 15mLV [2~8°C]
- 劇フェソロデックス筋注250mg 5mL筒 [冷]
- フェトロージャ点滴静注用1g V [2~8°C]
- 向劇フェノバル注射液100mg-1mLA
- 麻劇フェンタニル注射液0.1mg「テル」 0.005%2mLA 【後】
- 麻劇フェンタニル注射液0.5mg「テル」 0.005%10mLA 【後】
- フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g 0.005%10mLA
- 劇注射用アサン10-10mgV
- (ナファモスタット注射用10mg「SW」へ切替)
- 劇注射用アサン50 50mgV
- 劇ブスコパン注20mg 2%1mLA
- 劇ブスルフェクス点滴静注用60mg V [冷]
- ブドウ糖 5% 20mLA
- ブドウ糖 5% 50mLV
- ブドウ糖 5% 100mLV
- ブドウ糖 5% 250mLP (アポトルからバックへ切替)
- ブドウ糖 5% 500mLP (アポトルからバックへ切替)
- ブドウ糖 10% 20mLA
- ブドウ糖 20% 20mLA
- ブドウ糖-50%-20mLA (50%ブドウ糖注射液「ニッソ」へ切替)
- ブドウ糖 70% 350mLP
- 50%ブドウ糖注射液「ニッソ」 20mLA
- ララゲミン静注5000単位/5mL-0.005%10mLA-【後】(販売中止)
- (2026年3月31日経過措置終了)
- (ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」へ切替)
- 劇プラリア皮下注60mgシリンジ1mL筒 [2~8°C]
- 劇プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL 筒 [2~8°C] [禁凍結]
- プリズバインド静注液2.5g 50mLV [2~8°C]
- ズリデオオン静注200mg-2mLV
- (スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルシ」へ切替)
- プリンペラン注射液10mg 0.5%2mLA
- (塩酸メトクロプラミド注射液10mg「効効」が無くなり次第切替)
- フルオレサイト静注500mg 5mLV 【後】
- 劇フルオロウラシル注250mg「ト7」 V [2~8°C] 【後】
- 劇フルオロウラシル注1000mg「ト7」 V [2~8°C] 【後】
- フルカリック1号輸液 903mLキット
- フルカリック2号輸液 1003mLキット
- フルカリック3号輸液 1103mLキット
- フルコナゾール静注液50mg「ワ」 0.1%50mLV 【後】
- フルスルチアミン注50mg「日新」 20mLA 【後】
- 劇フルダラ静注用50mg V
- 劇フルデカシン筋注25mg 1mLV
- 劇フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テル」 5mL筒 【後】
- フルマリン静注用1g V
- プレアミン-P注射液 200mLP
- 劇プレオ注射用15mg V
- 劇プレセデックス静注液200 $\mu$ g「ワ」-2mLV
- (デクスメドミジン静注液200 $\mu$ g「プロ」へ切替)
- 劇プレセデックス静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイ」 筒
- 水溶性プレドニン20mg A
- 劇プレバミス点滴静注240mg 12mLV
- 劇プレビブロック注100mg 10mLV
- 劇プレベナー-20水性懸濁注 0.5mLキット [2~8°C]
- プロイメンド点滴静注用150mg-V [2~8°C]
- (ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」へ切替)
- プロギノン・デポー筋注10mg 1mLA
- 劇プログラフ注射液2mg 0.4mLA
- プロゲデポー筋注125mg-1mLA (販売中止)
- プロゲホルモン筋注用25mg-1mLA (販売中止)
- プロジフ静注液200 8%2.5mLV [冷]
- 劇プロスタルモン・F注射液1000 1mg1mLA

無印：採用薬  
※：削除予定薬  
●：院外処方専用薬  
☆：院外処方専用予定薬  
【後】：後発医薬品  
○：院内専用後発品である薬

劇プロスタグランディン注射用20 $\mu$ g-V  
(アルプロスタジルアルファデクス注射用20 $\mu$ g「効効」へ切替)  
劇プロスタグランディン500 $\mu$ g-V  
(アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「効効」へ切替)  
○ フロセミド注20mg「NIG」 A 【後】  
フロセミド注20mg「トワ」A 【後】  
(フロセミド注20mg「NIG」へ切替)  
劇プロタノールL注0.2mg 0.02%1mLA  
プロタミン硫酸塩静注100mg「モタ」 1%10mLV  
(ノボ・硫酸プロタミン静注用100mgから名称変更)  
プロハンス静注シリンジ13mL 筒  
劇プロポフォール静注1%20mL「マルシ」 200mg20mLA 【後】  
劇プロポフォール静注1%100mL「マルシ」 1g100mLV 【後】  
プロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイ」 0.2%2mLA 【後】  
劇静注用フローラン0.5mg V (溶解液無)  
劇静注用フローラン1.5mg V (溶解液無)  
静注用フローラン専用溶解液 50mLV  
【へ】  
バイフォータス筋注50mgシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]  
バイフォータス筋注100mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]  
劇ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg0.05mL筒 [2~8°C]  
劇ベガシス皮下注180 $\mu$ g 1mLV [冷]  
劇ベクティブックス点滴静注100mg 5mLV [冷]  
ベクルリー点滴静注用100mg V  
毒ベスボンサ点滴静注用1mg V [2~8°C]  
劇ベスレミ皮下注250 $\mu$ gシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
● 劇ベタフェロン皮下注用960万国際単位 V (溶解液付)  
麻ベチロルファン注射液1mLA  
麻ベチロルファン配合注HD 1mLA  
劇ベナンボックス注用300mg V  
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 V  
献血ベニロン-I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)  
献血ベニロン-I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)  
ベネフィクス静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [1~30°C]  
● ベネフィクス静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [1~30°C]  
劇ベバズマブB-S点滴静注100mg「CTNK」 4mLV [2~8°C] 【後】  
劇ベバズマブB-S点滴静注100mg「第一三共」  
4mLV [2~8°C] 【後】 (販売中止)  
劇ベバズマブB-S点滴静注400mg「CTNK」 16mLV [2~8°C] 【後】  
劇ベバズマブB-S点滴静注400mg「第一三共」  
16mLV [2~8°C] 【後】 (販売中止)  
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モタ」 筒 【後】  
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ  
「オツカ」10mL (ルアスリップタイプ) 筒 【後】  
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ  
「オツカ」5mL (ルアスリップタイプ) 筒 【後】  
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ  
「オツカ」10mL (ルアスリップタイプ) 筒 【後】  
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「FAY」A  
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」 V  
劇ベズシド注100mg 5mLV  
(エトシド点滴静注液100mg「サド」へ切替)  
ヘブスプリンI H 静注1000単位 5mLV [冷]  
劇ヘブタボックス-II水溶性懸濁注シリンジ0.5mL 筒 [2~8°C]  
ヘムライブラ皮下注60mg 0.4mLV [2~8°C]  
ヘムライブラ皮下注90mg 0.6mLV [2~8°C]  
ヘムライブラ皮下注105mg 0.7mLV [2~8°C]  
ヘムライブラ皮下注150mg 1mLV [2~8°C]

劇ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 4mLV 【後】  
劇ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 20mLV 【後】  
ペラニンデポー筋注5mg 1mLA (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
(プロギノン・デポー筋注10mgへ切替)  
● ペリセート360N 腹膜透析液 1.5LP (排液用バッグ付)  
● ペリセート400N 腹膜透析液 1.5LP  
(排液用バッグ付) [セフキャップシステム用]  
ペリナートP 静注用500  
(正常人血漿1mL中含有量の500倍(溶解液付)) V [冷]  
毒ベルケイド注射用3mg V  
ヘルニコア椎間板注用1.25単位 V [冷]  
劇ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トワ」 V [2~8°C] 【後】  
ペントシラン注射用1g-V  
(ピペラシリンNa注射用1g「NIG」V 【後】へ切替)  
劇ペンリスダ点滴静注用120mg V [2~8°C]  
劇ペンリスダ点滴静注用400mg V [2~8°C]  
劇ペンリスダ皮下注200mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]  
【ホ】  
ポカブリア水懸筋注600mg 3mLV  
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 V [2~8°C] 【後】  
毒点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 6g250mLV  
劇ホストイン静注750mg 10mLV [冷]  
ホスホマイシンナトリウム静注2g「日医工」 V 【後】  
劇ポスミン注1mg 0.1%1mLA  
● ボックスゾゴ皮下注用0.4mg V (溶解液付) [2~8°C]  
● ボックスゾゴ皮下注用0.56mg V (溶解液付) [2~8°C]  
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg V (溶解液付) [2~8°C]  
劇ポテリジオ点滴静注20mg 5mLV [2~8°C]  
毒ポトックス注用50単位 V [冷]  
劇ポートルーザ点滴静注液800mg 50mLV [2~8°C]  
劇ポナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g 100mLP  
劇ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL P  
劇ポブスカイン0.5%注50mg/10mL A  
劇ポブスカイン0.75%注75mg/10mL A  
ホメビゾール点滴静注1.5g「効効」 V  
劇ポライビー点滴静注用30mg V [2~8°C]  
劇ポライビー点滴静注用140mg-V [2~8°C]  
ポララミン注5mg 1mLA  
劇ポラリドカステレロール0.5%注2mLA  
劇ポラリドカステレロール1%注2mLA  
劇ポラリドカステレロール3%注2mL A  
毒ボルテゾミブ注射用3mg「トワ」 V 【後】  
ボルベン輸液6% 500mLP  
劇ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL筒  
ボンベンディ 静注用1300 1300国際単位V (溶解液付)  
【マ】  
劇マイトマイシン注用2mg V  
毒マイロターグ点滴静注用5mg V [2~8°C]  
劇マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mLA  
劇マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mLA  
注射用マキンピーム1g-V  
(セフェビム塩酸塩静注用1g「CMX」へ切替)  
マキューイド眼注用40mg V  
マグセント注100mL V  
マグネスコープ静注38%シリンジ13mL 筒  
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 筒

劇乾燥弱毒生麻しんワクチン「効効」 1人分V (溶解液付) [冷]  
劇乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン (=ミールピックII皮下注用)  
1人分V (溶解液付) [8°C以下]  
劇乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V (溶解液付) [冷]  
劇マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
劇マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇マンジャロ皮下注10mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇マンジャロ皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
●劇マンジャロ皮下注15mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]  
20%マンニトール注射液「YD」(袋) 300mL袋

【ミ】

劇ミオコール静注5mg—10mLA—【後】  
(ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」へ名称変更)  
ミオテクター冠血管注 A液 495mLV  
ミオテクター冠血管注 B液 5mLA  
劇ミカファンギンNa点滴静注用50mg「コブ」 V 【後】  
(ファンガード点滴用50mgから切替)  
向ミダゾラム注射液10mg「NIG」 2mLA 【後】  
向ミダゾラム注10mg「サド」—2mLA—【後】 (出荷停止)  
(ミダゾラム注射液10mg「NIG」へ切替)  
向ミダフレッサ静注0.1% 10mg10mLV  
劇ミチーガ皮下注用30mgバイアル V [2~8°C]  
劇ミチーガ皮下注用60mgシリンジ 筒  
ミッドペリック135腹膜透析液 1.5LP (排液用バッグ付)  
●ミッドペリック135腹膜透析液 2LP (排液用バッグ付)  
●ミッドペリック135腹膜透析液—2LP (排液用バッグ無し)—  
●ミッドペリック250腹膜透析液 1.5LP (排液用バッグ付)  
●ミッドペリック250腹膜透析液—2LP (排液用バッグ無し)—  
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」 V 【後】  
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サド」—V—【後】  
(ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」へ名称変更)  
ミノマイシン点滴静注用100mg—V  
(ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」へ切替)  
ミラクリッド注射液5万単位 1mLA  
ミラクリッド注射液10万単位 2mLA  
劇ミリプラ動注用70mg V [冷]  
ミリプラ用懸濁液4mL A  
劇ミルセラ注シリンジ25μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミルセラ注シリンジ50μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミルセラ注シリンジ75μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミルセラ注シリンジ100μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミルセラ注シリンジ150μg 0.3mL筒 [冷]  
劇ミールピックII皮下注用 (=乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン)  
1人分V (溶解液付) [8°C以下]  
劇ミルリノン注10mg「効効」 10mLA 【後】  
劇ミルサーラ注射液10mg—10mLA (ミルリノン注10mg「効効」へ切替)

【ム】

無水エタノール注「フ」 5mLA

【メ】

メイロン静注7% 20mLA  
メイロン静注7% 250mLV  
メイロン静注8.4% 20mLA  
劇メグルダーゼ静注用1000 1000単位V [2~8°C]  
○メコバラミン注500μg「NP」 0.5mgA 【後】  
劇注射用メソトレキセート50mg V  
劇メソトレキセート点滴静注液200mg 8mLV  
劇メソトレキセート点滴静注液1000mg 40mLV

メチコパール注射液500μg—A

(院内はメコバラミン注500μg「NP」)  
劇メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 0.02%1mLA [冷] 【後】  
劇メチレンブルー静注50mg「第一三共」 10mLA  
●劇メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(院内はメトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL切替)  
●劇メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(院内はメトジェクト皮下注10mgペン0.20mL切替)  
●劇メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(院内はメトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL切替)  
●劇メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(院内はメトジェクト皮下注15mgペン0.30mL切替)  
劇メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL 筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mLが無くなり次第切替)  
劇メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL 筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mLが無くなり次第切替)  
劇メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL 筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mLが無くなり次第切替)  
劇メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL 筒 [25°C以下] [禁凍結]  
(メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mLが無くなり次第切替)  
劇メナクトラ筋注—0.5mLV—[2~8°C]  
(メクアッドファイ筋注へ切替)  
メルカゾール注10mg A  
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 V 【後】  
メロベネム点滴用バイアル0.5g—V  
(メロベネム点滴静注用0.5g「明治」へ切替)  
劇メクアッドファイ筋注 0.5mLV [2~8°C]  
(メナクトラ筋注から切替)

【モ】

劇モゾビル皮下注24mg 1.2mLV  
モノヴァー静注1000mg 10mLV  
モサヘパミン点滴静注—500mLV  
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1%1mLA  
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液50mg「効効」 1%5mLA

【ヤ】

劇ヤーボイ点滴静注液50mg 10mLV [2~8°C]

【ユ】

ユナシン—S 静注用1.5g—V (スルバシリン静注用1.5gへ切替)  
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g V  
劇ユニツキシ点点滴静注17.5mg/5mL V [2~8°C]  
劇ユプリズナ点滴静注100mg 10mLV [2~8°C]  
劇ユルトミリスH点滴静注300mg/3mL V [2~8°C]

【ヨ】

毒ヨンデリス点滴静注用0.25mg V [2~8°C]  
毒ヨンデリス点滴静注用1mg V [2~8°C]

【ラ】

ライザケア輸液 1L袋 (ルタテラ静注専用)  
劇ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位キット [2~8°C]  
劇ライブリバント点滴静注350mg 7mLV [2~8°C]  
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mLキット  
ラシクタク注20mg—A (フロセミド注20mg「ト」へ切替)  
劇ラスピック点滴静注キット150mg 筒 (希釈液付)  
劇ラスリテック点滴静注用1.5mg V (溶解液付) [冷]  
劇ラニビズマブB S 硝子体内注射用キット10mg/mL「セツ」  
0.5mg0.05mL筒 [2~8°C] 【後】  
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg 60mLV  
劇ラボナール注射用0.5g A

無印：採用薬  
※：削除予定薬  
●：院外処方専用薬  
☆：院外処方専用予定薬  
【後】：後発医薬品  
○：院内専用後発品である薬

毒ランダ注—10mg20mLV  
(シスプラチン注「マル」10mg20mLへ切替)  
毒ランダ注—50mg100mLV  
(シスプラチン注「マル」50mg100mLへ切替)  
●劇ランタス注ソロスター 300単位キット [冷]  
劇ランタスXR注ソロスター 450単位キット [冷]  
劇ランマータ皮下注120mg 1.7mLV [2~8°C]  
劇ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL1mL筒 [2~8°C] [禁凍結]  
【リ】  
劇リカムビス水懸筋注900mg 3mLV [2~8°C]  
劇リクラスト点滴静注液5mg(バッグ) 100mLV  
リコモジュリン点滴静注用12800 12800単位V  
劇リサイオ点滴静注液100mg 2.5mLV [2~8°C]  
劇リストイーゴ皮下注280mg 2mLV [2~8°C]  
劇リサパダールコンスタ筋注用25mg—キット(懸濁用液付)—[冷]  
劇リサモダンP静注50mg—5mLA (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
リツキサン点滴静注100mg 10mLV [2~8°C]  
リツキサン点滴静注500mg 50mLV [2~8°C]  
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 10mLV [2~8°C] 【後】  
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 50mLV [2~8°C] 【後】  
劇リドカイン点滴静注液1%「効効」 200mLV 【後】  
劇リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mLA 【後】  
劇リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mLA 【後】  
劇リドカイン静注用2%シリンジ「テル」 5mLV筒 【後】  
劇リドラン塩酸塩点滴静注液50mg「F」—1%5mLA  
[2~8°C]—【後】(販売中止)(2027年3月31日経過措置終了(予定))  
劇リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 1%5mLA  
[5°C以下] 【後】  
リピオドール480注10mLA A  
劇リプタヨ点滴静注350mg 7mLV [2~8°C]  
劇リプレガル点滴静注用3.5mg V [冷]  
劇リメタズン静注2.5mg 1mLA  
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5%20mLA  
劇リユーブリン注射用キット1.88mg—筒  
(リユーブロリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」へ切替)  
劇リユーブリン注射用キット3.75mg—筒  
(リユーブロリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」へ切替)  
劇リユーブリンPRO注射用キット22.5mg 筒  
劇リユーブリンSR注射用キット11.25mg 筒  
劇リユーブロリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」筒 【後】  
劇リユーブロリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」筒 【後】  
○劇リユーブロリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」筒 【後】  
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 0.5%20mLA  
リンデロン注2mg(0.4%) A [冷]  
【ル】  
劇ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL 0.5mg0.05mLV [2~8°C]  
劇ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL  
0.5mg0.05mLV筒—[2~8°C]  
※劇ルミセフ皮下注210mgシリンジ 1.5mLV筒 [2~8°C]  
(ルミセフ皮下注210mgペンへ切替予定)  
→劇ルミセフ皮下注210mgペン 1.5mLV筒 [2~8°C]  
(ルミセフ皮下注210mgシリンジが無くなり次第切替)  
劇ルムジェブ注ミリオペン 300単位キット [冷]  
【レ】  
レギチーン注射液5mg 0.5%1mLV [冷]  
レギュニールHC a 1.5腹膜透析液(ツイパッ) 1.5LP  
レギュニールHC a 1.5腹膜透析液(UVツイパッ) 1.5LP

レギュニールHC a 1.5腹膜透析液(ツイパッ) 2LP  
レギュニールHC a 1.5腹膜透析液(UVツイパッ) 2LP  
レギュニールHC a 1.5腹膜透析液(シングルパッ・機器専用) 2.5LP  
レギュニールHC a 1.5腹膜透析液(シングルパッ・機器専用) 5LP  
レギュニールHC a 2.5腹膜透析液(ツイパッ) 1.5LP  
レギュニールHC a 2.5腹膜透析液(UVツイパッ) 1.5LP  
レギュニールHC a 2.5腹膜透析液(ツイパッ) 2LP  
レギュニールHC a 2.5腹膜透析液(シングルパッ・機器専用) 2.5LP  
レギュニールHC a 2.5腹膜透析液(シングルパッ・機器専用) 5LP  
レギュニールHC a 4.25腹膜透析液(シングルパッ) 2LP  
レギュニールLC a 4.25腹膜透析液(ツイパッ・排液用パッ付) 2LP  
レギュニールLC a 4.25腹膜透析液(UVツイパッ・排液用パッ付) 2LP  
レクピオ皮下注300mgシリンジ 1.5mLV筒  
劇レケンピ点滴静注200mg 2mLV [2~8°C]  
劇レケンピ点滴静注500mg 5mLV [2~8°C]  
●レコベル皮下注12μgペン 0.36mLV筒 [2~8°C]  
●レコベル皮下注36μgペン 1.08mLV筒 [2~8°C]  
●レコベル皮下注72μgペン 2.16mLV筒 [2~8°C]  
劇注射用レザフィリン100mg V [冷]  
レスピア静注・経口液60mg 3mLV  
レバーサ皮下注420mgオートミニド—ザ—  
3.5mLV筒—[2~8°C] (販売中止)  
(2026年3月31日経過措置終了)  
レバーサ皮下注140mgペン 1mLV筒 [2~8°C]  
劇レプロジル皮下注用25mg V [2~8°C]  
劇レプロジル皮下注用75mg V [2~8°C]  
劇レバスティブ皮下注用0.95mg V (溶解液付) [2~8°C] [禁凍結]  
向劇レベタン注0.2mg A  
○レベチラセタム点滴静注500mg「メル」 5mLA 【後】(イーケブラ)  
劇レベミル注フレックスペン 300単位キット [冷]  
●劇レベミル注ペンフィル 300単位筒 [冷]  
○レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ト」 5mLV筒(ルア—ロック) 【後】  
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mLV「DSEP」キット 【後】  
(クラブビット点滴静注バッグ500mg/100mLVから切替)  
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤルト」 V 【後】  
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤルト」 V 【後】  
劇レミケード点滴静注用100 100mgV [冷]  
劇レミトロ点滴静注用300μg V [2~8°C]  
麻劇レミフェタニル静注用2mg「第一三共」 V 【後】  
麻劇レミフェタニル静注用5mg「第一三共」 V 【後】  
【ロ】  
ロイコボリン注3mg 1mLA  
劇ロイナーゼ注用10000 10000K単位V [冷]  
劇ロカイン注1% 5mLA  
毒ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mLV「マルシ」 V 【後】  
毒ロゼウス静注液40mg 4mLV 【後】(ナベルピン注より切替)  
ロゼバラミン筋注用25mg V  
ロセフオン静注用1g—V  
(セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」へ切替)  
劇ロピオン静注50mg 5mLA  
劇ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mLV「テル」 1袋 【後】  
劇ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mLV「テル」 A 【後】  
ローブリン (=抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」)  
250μg V [冷]  
ロミプレート皮下注250μg調製用 V [2~8°C]  
向ロラピタ静注2mg 1mLV [2~8°C]

【ワ】

ワイスタール配合静注用1g V 【後】  
劇ワソラン静注5mg 2mLA  
毒ワソラン点注20mg/1mL「V」へ切替  
(ドセタキセル点注20mg/1mL「V」へ切替)  
毒ワソラン点注80mg/4mL「V」へ切替  
(ドセタキセル点注80mg/4mL「V」へ切替)

## 生薬

- ウチダのウイキョウM (茴香)
- 劇ウチダの烏頭 (ウズ)
- ウチダのエンゴサクM (延胡索)  
ウチダのオウギ末M (黄耆)
- ウチダのオウヒM (桜皮)
- ウチダのオンジM (遠志)
- ウチダのガイヨウM (艾葉)
- ウチダのキンギンカM (金銀花)
- ウチダのクコシM (枸杞子)
- ウチダのコウイM (膠飴)
- ウチダのコウカM (紅花)
- ウチダのゴシュユM (呉茱萸)
- ウチダのゴマM (胡麻)
- ウチダのゴミシM (五味子)
- ウチダのシコンM (紫根)
- ウチダのシソシM (紫蘇子)
- ウチダのゼンコM (前胡)
- ウチダのゼンコツM (川骨)
- ウチダのソウハクヒM (桑白皮)
- ウチダのテンナンショウM (天南星)
- ウチダのテンマM (天麻)
- ウチダのテンモンドウM (天門冬)
- ウチダのトウドクカツM (唐独活)
- ウチダのニンドウM (忍冬)
- ウチダのビャクゴウM (百合)
- ウチダのピワヨウM (枇杷葉)
- 劇ウチダの附子 (ブシ)
- ウチダのポウコンM (茅根)
- 劇ウチダの炮附子 (ホウブシ)
- ウチダのマンケイシM (蔓荊子)
- ウチダのモッカM (木瓜)
- ウチダのヤクモソウM (益母草)
- ウチダのリュウガンニクM (竜眼肉)
- ウチダのリュウタンM (竜胆)
- ウチダのレンニクM (蓮肉)
- トチモトのアキョウ (阿膠)
- トチモトのイレイセン (威靈仙)
- トチモトのインチンコウ (茵陳蒿)
- トチモトのウバイ (烏梅)
- トチモトのウヤク (烏藥)
- トチモトのオウギ (黄耆)
- トチモトのオウゴン (黄芩)
- トチモトのオウバク (黄柏)
- トチモトのオウレン (黄連)
- トチモトのカシュウ (何首烏)
- トチモトのガジュツ (莪朮)
- トチモトのカッコウ (藜蘆)
- トチモトのカッココン (葛根)
- トチモトのカッセキ (滑石)
- トチモトのカロコン (栝楼根)
- トチモトのカロニン (栝楼仁)
- トチモトのカンキョウ (乾姜)
- トチモトのカンゾウ (甘草)
- トチモトのキキョウ (桔梗)
- トチモトのキクカ (菊花)
- トチモトのキジツ (枳殼・キコク)
- トチモトのキジツ (枳実)
- トチモトのキッピ (橘皮)
- トチモトのキョウカツ (羌活)
- トチモトのキョウニン (杏仁)
- トチモトのクジン (苦参)
- トチモトのケイガイ (荊芥)
- トチモトのケイヒ (桂皮)
- トチモトのケイヒ末 (桂皮)
- トチモトのケツメイシ (決明子)
- トチモトのゲンジン (玄参)
- トチモトのコウジン (紅参)  
トチモトのコウジン末AM (紅参)
- トチモトのコウブシ (香附子)
- トチモトのコウベイ (粳米)
- トチモトのコウボク (厚朴)
- トチモトのゴシツ (牛膝)
- トチモトのゴボウシ (牛蒡子)
- トチモトのサイコ (柴胡)
- トチモトのサイシン (細辛)
- トチモトのサイチャ (細茶)
- トチモトのサフラン
- トチモトのサンザシ (山査子)
- トチモトのサンシシ (山梔子)
- トチモトのサンシュユ (山茱萸)
- トチモトのサンショウ (山椒)
- トチモトのサンソウニン (酸棗仁)
- トチモトのサンヤク (山藥)
- トチモトのジオウ (乾地黄)
- トチモトのジオウ (熟地黄)
- トチモトのジオウ (生地黄)
- トチモトのシオン (紫苑)
- トチモトのジコッピ (地骨皮)
- トチモトのシツリシ (蒺藜子)
- トチモトのシテイ (柿蒂)

- トチモトのシャクヤク (芍薬)
- トチモトのシャクヤク末 (芍薬)
- トチモトのジャシヨウシ (蛇床子)
- トチモトのシャゼンシ (車前子)
- トチモトのジュウヤク (十薬)
- トチモトのシュクシャ (縮砂)
- トチモトのショウキョウ (生姜)
- トチモトのショウバク (小麦)
- トチモトのショウマ (升麻)
- トチモトのシンイ (辛夷)
- トチモトのセッコウ (石膏)
- トチモトのセンキュウ (川芎)
- トチモトのセンキュウ末 (川芎)
- トチモトのセンタイ (蟬退)
- トチモトのソウジュツ (蒼朮)
- トチモトのソボク (蘇木)
- トチモトのソヨウ (蘇葉)
- トチモトのダイオウ (大黄)
- トチモトのダイオウ末 (大黄)
- トチモトのタイソウ (大棗)
- トチモトのタクシャ (沢瀉)
- トチモトのタクシャ末 (沢瀉)
- トチモトのチクジョ (竹茹)
- トチモトのチクセツニンジン (竹節人参)
- トチモトのチモ (知母)
- トチモトのチョウジ (丁字)
- トチモトのチョウトウコウ (釣藤鉤)
- トチモトのチョレイ (猪苓)
- トチモトのチンピ (陳皮)
- トチモトのトウガシ (冬瓜子)
- トチモトのトウキ (当帰)
- トチモトのトウキ末 (当帰)
- トチモトのトウニン (桃仁・原形)
- トチモトのトウニン (桃仁・刻み)
- トチモトのトチュウ (杜仲)
- トチモトのニンジン (人参)
- トチモトのバイモ (貝母)
- トチモトのバクガ (麦芽)
- トチモトのバクモンドウ (麦門冬)
- トチモトのハッカ (薄荷)
- トチモトのハンゲ (半夏)
- トチモトのビャクシ (白芷)
- トチモトのビャクジュツ (白朮)
- トチモトのビャクジュツ末 (白朮)
- トチモトのビンロウジ (檳榔子)
- トチモトのブクリョウ (茯苓)
- トチモトのブクリョウ末 (茯苓)
- トチモトのベッコウ (土別甲)
- トチモトのポウイ (防已)
- トチモトのポウフウ (防風)
- トチモトのボクソク (樸椒)
- トチモトのボタンピ (牡丹皮)
- トチモトのボタンピ末 (牡丹皮)
- トチモトのボレイ (牡蠣)
- トチモトのマオウ (麻黄)
- トチモトのマシニン (麻子仁)
- トチモトのモクツウ (木通)
- トチモトのモッコウ (木香)
- トチモトのヨクイニン (薏苡仁)
- トチモトのリュウコツ (竜骨)
- トチモトのリョウキョウ (良姜)
- トチモトのレンギョウ (連翹)