

当 院 採 用 薬 等 一 覧 2026. 7

〈採用薬・院外処方専用薬〉

(2026(令和8)年7月1日より適用開始)

目 次

内用薬リスト	1
外用薬リスト	30
注射薬リスト	39
生 薬	53
人工鼻・再生医療等製品（輸血部）	55

一覧中の記号注釈

本資料	オーダーシグ
マーク	表示マーク
↓	↓
記号無：採用薬	：◎
（院内・院外処方可）	
※：削除予定薬	：◎
●：院外処方専用薬	：●
☆：院外処方専用予定薬	：◎
○：院内専用後発品である薬	：○
→：使用開始日に特に注意を要する採用薬	

注意点

1. 「削除予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、院内・院外とも全面削除になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
2. 「院外処方専用予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、「院外処方専用薬」になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
3. 2019(平成31)年2月1日より院外処方で一般名処方を開始しました。

2026. 6. 26
福島県立医科大学

薬剤部

作成
附属病院

D I 室

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

内用薬リスト

- 【ア】
- 劇アイクルシ錠15mg
- 劇アイセントレス錠400mg
- アイトロール錠20mg（院内は一硝酸イソソルビド錠20mg「サリ」）
 - アイピーディカプセル100 100mg
 - アイピーディロシロップ5%
 - 劇アイミクス配合錠7㊦
 - （【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替）
 - 劇アイミクス配合錠H D
 - （【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠へ切替）
 - テーガメイト20%ゼリー25g—【後】—
 - （ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25 g「三和」へ名称変更）
 - （【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25gへ切替）
 - 【般】アカルボース錠50mg（グルコバイ）
 - 【般】アカルボース錠100mg（グルコバイ）
 - テキネトン細粒1%（【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%へ切替）
 - テクネトン錠1mg（院内はビペリデン塩酸塩錠1mg「アル」）
 - （【般】ビペリデン塩酸塩錠1mgへ切替）
 - テクトス㊦錠15mg（院内はピオグリタゾンO D錠15mg「VTRS」）
 - （【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mgへ切替）
 - テクトス㊦錠30mg（【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mgへ切替）
 - 劇テクトネル錠2.5mg（【般】リセドロン酸N a錠2.5mgへ切替）
 - 劇テクトネル錠17.5mg（【般】リセドロン酸N a錠17.5mgへ切替）
 - 劇テクトネル錠75mg（リセドロン酸N a錠75mg「トリ」へ切替）
 - 劇アダリランカプセル0.5mg（【般】アナグレリドカプセル0.5mgへ切替）
 - アコニンサン錠 166.67mg ST-01
 - アコファイド錠100mg
 - テサヨール錠400mg（院内はメサラジン腸溶錠400mg「サリ」）
 - （【般】メサラジン腸溶錠400mgへ切替）
 - アザルフィジンE N錠500mg
 - （【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mgへ切替）
 - 【般】アシクロビル顆粒40%（ゾビラックス）
 - アシクロビル錠200mg「サリ」 【後】（【般】なし）
 - —【般】アシクロビル錠200mg（ゾビラックス）—
 - アジスロマイシン錠250mg「トリ」 【後】
 - アシテアダニ舌下錠100単位（TR）
 - アシテアダニ舌下錠300単位（IR）
 - アシノン錠75mg
 - 【般】アジスロマイシン細粒10%（ジスロマック）
 - 【般】アジスロマイシン錠250mg（ジスロマック）
 - —【般】アジルサルタン錠10mg（アジルバ）—
 - 【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠10mg（アジルバ）
 - —【般】アジルサルタン錠20mg（アジルバ）—
 - —【般】アジルサルタン錠40mg（アジルバ）—
 - 劇【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠（ザクラス配合錠H D）
 - アジルサルタンO D錠10mg「DSEP」 【後】
 - アジルバ顆粒1%
 - アジルバ錠10mg（【般】アジルサルタン錠10mgへ切替）
 - アジルバ錠20mg（【般】アジルサルタン錠20mgへ切替）
 - アジルバ錠40mg（【般】アジルサルタン錠40mgへ切替）
 - 劇アジレクト錠0.5mg
 - 劇アジレクト錠1mg
 - 【般】アスコルビン酸・パントテン酸C a配合顆粒 1g/包（シナール）
 - アストミン錠10mg

- アストミンシロップ0.25%
- アスバラカリウム錠300mg
- アスバラ配合錠
 - アスピリン原末「マルシ」
 - 【般】アスピリン腸溶錠100mg（バイアスピリン）
 - 劇アスベノンカプセル10mg（院内はアプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」）
 - （【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mgへ切替）
 - アスベリン散10%
 - アスベリンシロップ0.5%
 - 【般】アズレシムル酸N a・L-グルタミン配合顆粒0.67g（マーズレンS）
 - アズロキサ錠15mg
 - —【般】アセトアミノフェン細粒50%（カロナール）—
 - 【般】アセトアミノフェン錠200mg（カロナール）
 - 【般】アセトアミノフェン錠300mg（カロナール）
 - アセトアミノフェン錠300mg「マルシ」 【後】
 - 劇アセトアミノフェン錠500mg「マルシ」—【後】—
 - （アセトアミノフェン錠300mg「マルシ」へ切替）
 - 【般】アセトアミノフェン錠500mg（カロナール）
 - 【般】アセトアミノフェンシロップ2%（カロナール）
 - 【般】アセトアミノフェンシロップ用40%（カロナール）
 - アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL/瓶
 - アセノベル徐放錠500mg
 - アゼプチン錠1mg
 - 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg（アゼプチン）
 - アゼルニジピン錠16mg「トリ」 【後】
 - 【般】アゼルニジピン錠16mg（カルブロック）
 - アゾセミド錠30mg「JG」 【後】
 - —【般】アゾセミド錠30mg（ダイアート）—
 - アゾセミド錠60mg「JG」—【後】—
 - 【般】アゾセミド錠60mg（ダイアート）
 - アダブチノール錠5mg
 - アタラックス錠10mg
 - 劇アダラート7錠10mg
 - 劇アダラート7錠20mg（院内はニフェジピンL錠20mg「サリ」）
 - 劇アダラートC R錠20mg
 - 劇アダラートC R錠40mg
 - アーチスト錠2.5mg（院内はカルベジローラ錠2.5mg「トリ」）
 - テーチスト錠10mg（院内はカルベジローラ錠10mg「トリ」）
 - （【般】カルベジローラ錠10mgへ切替）
 - アデカット15mg錠
 - アデカット30mg錠
 - アテディオ配合錠
 - テネノール錠50mg「NikP」—【後】—
 - 【般】アテノロール錠50mg（テノーミン）
 - アデホスコワ顆粒10% [1g/P]
 - アデホスコワ腸溶錠20 20mg（【般】なし）
 - 劇アデムバス錠0.5mg
 - 劇アデムバス錠1.0mg
 - テレラック錠10—10mg（【般】シルニジピン錠10mgへ切替）
 - テレラック錠20—20mg（【般】シルニジピン錠20mgへ切替）
 - テーテン散1%（【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%へ切替）
 - アーテン錠(2mg)（【般】加算なし）
 - アドニルカ錠20mg（タダラフィル錠20mg A D「TE」へ切替）
 - （【般】タダラフィル錠20mg：A Dへ切替）
 - テーゼット配合錠7㊦
 - （【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠へ切替）
 - テドナ散10%（【般】カルバゾクロムスルホン酸N a散10%へ切替）

デドナ錠30mg（カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」へ切替）
（【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mgへ切替）
● 【般】アトモセチンカプセル5mg（ストラテラ）
● 【般】アトモセチンカプセル10mg（ストラテラ）
● 【般】アトモセチンカプセル25mg（ストラテラ）
● 【般】アトモセチンカプセル40mg（ストラテラ）
○劇アトモセチン錠5mg「ト7」 【後】
（院外は【般】アトモセチン錠5mgへ切替）
○劇アトモセチン錠25mg「ト7」 【後】
（院外は【般】アトモセチン錠25mgへ切替）
● 【般】アトモセチン錠5mg
● 【般】アトモセチン錠25mg
● 【般】アトモセチン経口液0.4%（ストラテラ）
● アトルバスタチン錠10mg「日医工」 【後】
● 【般】アトルバスタチン錠10mg（リピトール）
○ アトルバスタチンOD錠5mg「ト7」 【後】
● 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg（リピトールOD）
毒アトロピン硫酸塩水和物「虹」原末
● 【般】アナグレリドカプセル0.5mg（アグリリン）
○劇アナストロゾール錠1mg「ト7」 【後】
● 【般】アナストロゾール錠1mg（アリミデックス）
●劇アナストロゾール錠1mg「明治」 【後】
アナフラニール錠10mg
● アナフラニール錠25mg
● アババ錠50mg（【般】イルベサルタン錠50mgへ切替）
アババ錠100mg（イルベサルタン錠100mg「DSPB」へ切替）
（【般】イルベサルタン錠100mgへ切替）
● アババ錠200mg（【般】イルベサルタン錠200mgへ切替）
● 【般】アビラテロン酢酸エステル錠250mg（ザイティガ）
●劇アフィニトール錠2.5mg
劇アフィニトール錠5mg
麻劇アブストラル舌下錠100μg
麻劇アブストラル舌下錠200μg
麻劇アブストラル舌下錠400μg
○劇アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 【後】
● 【般】アブリンジン塩酸塩カプセル10mg（アスペノン）
アプレゾリン錠10mg
○ アプレピタントカプセル80mg「NK」 【後】
● 【般】アプレピタントカプセル80mg（イメンド）
○ アプレピタントカプセル125mg「NK」 【後】
● 【般】アプレピタントカプセル125mg（イメンド）
●劇アベロックス錠400mg
●劇アボルブカプセル0.5mg
（【般】デュタステリドカプセル0.5mg：AVへ切替）
●劇アマージ錠2.5mg（【般】ナラトリブタン錠2.5mgへ切替）
●劇アマリール0.5mg錠（【般】グリメピリド錠0.5mgへ切替）
●劇アマリール1mg錠（院内はグリメピリド錠1mg「ト7」）
●劇アマリール3mg錠（【般】グリメピリド錠3mgへ切替）
○ アマンタジン塩酸塩錠50mg「サ7」 【後】
● アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 【後】
● 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%（シンメトレル）
● 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg（シンメトレル）
○毒アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 【後】
● 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg（アンカロン）
アミティーザカプセル12μg
● アミティーザカプセル24μg
アミノレバンE N配合散（フルーツ味） [50g/P]
● アミノレバンE N配合散（コーヒー味） [50g/P]

● アミュー配合顆粒 [2.5g/P]
劇アムノレイク錠2mg
○劇アムバロ配合OD錠「ト7」 【後】（販売中止）
（2027年3月31日経過措置終了）
○劇アムバロ配合OD錠「日医工」 【後】
● 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠（カデュエット2番）
● 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠（カデュエット4番）
●劇アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 【後】
○劇アムロジピンOD錠2.5mg「サ7」 【後】
●劇アムロジピンOD錠5mg「サ7」 【後】
●劇アムロジピンODフィルム5mg「QQ」 【後】
● 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg（アムロジン、ノルバスク）
● 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg（アムロジン、ノルバスク）
● 【般】アムロジピン錠2.5mg（アムロジン、ノルバスク）
● 【般】アムロジピン錠5mg（アムロジン、ノルバスク）
●劇アムロジン錠2.5mg
●劇アムロジンOD錠2.5mg
●劇アムロジンOD錠5mg
○ アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「ト7」 【後】
● 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg（リズミック）
アメナリーフ錠200mg
○ アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 【後】（【般】なし）
● 【般】アモキシシリンカプセル250mg（サワシリン）
● 【般】アモキシシリン細粒20%（ワイドシリン細粒）
●向アモバン錠7.5—7.5mg（2027年3月31日経過措置終了）
（【般】ゾピクロン錠7.5mgへ切替）
● 【般】アラセプリル錠25mg（セタブリル）
アラベル内用剤1.5g [1.5g/瓶]
● アリッサ配合錠
劇アリセプトドライシロップ1%
●劇アサセプト錠3mg（【般】ドネペジル塩酸塩錠3mgへ切替）
●劇アサセプト錠5mg（【般】ドネペジル塩酸塩錠5mgへ切替）
●劇アサセプト錠3mg
（【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mgへ切替）
劇アサセプト錠5mg（院内はドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」）
（【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替）
●劇アサセプト錠10mg
（【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替）
劇アーリーダ錠60mg
25mgアサナミンF糖衣錠（院内はフルスルチアミン錠25mg「ト7」）
（【般】フルスルチアミン錠25mgへ切替）
○劇アリピプラゾール錠1mg「サ7」 【後】
（エビリファイ錠1mgから切替）
● 【般】アリピプラゾール散1%（エビリファイ）
● 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg（エビリファイ）
● 【般】アリピプラゾール錠1mg（エビリファイ）
● 【般】アリピプラゾール錠3mg（エビリファイ）
● 【般】アリピプラゾール錠6mg（エビリファイ）
● 【般】アリピプラゾール錠12mg（エビリファイ）
● 【般】アリピプラゾール経口液0.1%1mL（エビリファイ）
● 【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mL（エビリファイ）
● 【般】アリピプラゾール経口液0.1%6mL（エビリファイ）
● 【般】アリピプラゾール経口液0.1%12mL（エビリファイ）
劇アサミデックス錠1mg（アナストロゾール錠1mg「ト7」へ切替）
（【般】アナストロゾール錠1mgへ切替）
● アリメジンシロップ0.05%
アルギU配合顆粒
毒アルケラン錠2mg [冷]

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- アルサルミン内用液10%—[10mL/P]
(院内はスクラルファート内用液10%「NIG」)
(【般】スクラルファート経口液10%へ切替)
- 劇アルシオドールカプセル1 μ g—【後】—
(【般】アルファカルシドールカプセル1 μ gへ切替)
アルダクトンA細粒10%
アルダクトンA錠25mg—(スピロノラクトン錠25mg「ト-7」へ切替)
(【般】スピロノラクトン錠25mgへ切替)
- アルタットカプセル75mg
アルドメット錠250 250mg
- 劇アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「ト-7」—【後】—
- 【般】アルファカルシドールカプセル0.25 μ g (アルファロール)
- 劇アルファカルシドールカプセル1 μ g「ト-7」—【後】—
- 【般】アルファカルシドールカプセル1 μ g (アルファロール)
- 劇アルファカルシドール錠0.25 μ g「アム」 【後】
- 劇アルファカルシドール錠0.5 μ g「アム」—【後】—
(アルファカルシドール錠0.25 μ g「アム」へ切替)
- 【般】アルファカルシドール錠0.25 μ g (ワンアルファ)
- 【般】アルファカルシドール錠0.5 μ g (ワンアルファ)
- 劇アルファロールカプセル0.25 μ g
(【般】アルファカルシドールカプセル0.25 μ gへ切替)
劇アルファロールカプセル1 μ g
(【般】アルファカルシドールカプセル1 μ gへ切替)
劇アルファロール内用液0.5 μ g/mL [10mL/瓶]
- 向アルプラゾラム錠0.4mg「ト-7」 【後】
- —【般】—アルプラゾラム錠0.4mg (ソラナックス)
アルロイドG内用液5% [600mL/瓶]
- 劇アルンブリグ錠30mg
- 劇アルンブリグ錠90mg
- アレギサル錠10mg
- アレギサルドドライシロップ0.5%
(【般】ペミロラストKシロップ用0.5%へ切替)
- アレグドラ錠30mg (【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mgへ切替)
- アレグドラ錠60mg (院内はフェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ト-7」)
(【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mgへ切替)
アレジオンドライシロップ1%
(院内はエピナスチン塩酸塩DS小児用1%「ト-7」)
(【般】エピナスチン塩酸塩シロップ用1%へ切替)
アレジオン錠20—20mg (【般】エピナスチン塩酸塩錠20mgへ切替)
(エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケフィア」へ切替)
劇アレセンサカプセル150mg
劇アレビアチン散10%
アレビアチン錠100mg
- アレロックタ顆粒0.5%—[0.5g/P]
(【般】オパ[®]ジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g (包) へ切替)
- アレロックタOD錠5mg
(院内はオロバタジン塩酸塩OD錠5mg「ト-7」)
(【般】オロバタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 【般】アレンドロン酸錠5mg (ボナロン)
- 劇アレンドロン酸錠35mg「ト-7」 【後】
- 【般】アレンドロン酸錠35mg (ボナロン)
アローゼン顆粒 [0.5g/P]
(【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包へ切替)
- アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」
(アルマール錠10より名称変更)
- 【般】アロチノール塩酸塩錠10mg (アルマール)

- アロプリノール錠100mg「オパ[®]」—【後】—
(アロシトル錠100mgから名称変更)
(アロプリノール錠100mg「ニブ[®]」へ名称変更)
- アロプリノール錠100mg「ニブ[®]」 【後】
- 【般】アロプリノール錠100 (アロシトル)
- アロマシン錠25mg (【般】エキセメスタン錠25mgへ切替)
- 毒アंकカロン錠100mg (アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」へ切替)
劇アंकカロン錠500mg
- アンジュ28錠 (保険適用外)
- 劇安息香酸ナトリウムカフェイン末
劇安息香酸ナトリウム「コザ[®]ガイ・M」(院内製剤)
- アンブラーダ錠50mg
(院内はサルボグレラート塩酸塩錠50mg「ト-7」)
(【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mgへ切替)
- アンブラーダ錠100mg
(【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mgへ切替)
- 【般】アンブリセタン錠2.5mg (ヴォリプリス)
- アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ト-7」 【後】
- 【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg (ムコソルバン)
- 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放錠45mg (ムコソルバン)
- 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3% (ムコソルバン)
- —【般】—アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5% (ムコソルバン)—
- 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用3% (ムコソルバン)
- 【イ】
- イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg
- ※ イグザレルト錠2.5mg
イグザレルトOD錠10mg
(リバーロキサバンOD錠10mg「ハ[®]イェ」へ切替)
(【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
イグザレルトOD錠15mg
(リバーロキサバンOD錠15mg「ハ[®]イェ」へ切替)
(【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mgへ切替)
劇イクスタンジ錠40mg
- 劇イクスタンジ錠80mg
劇イグラチモド錠25mg「あゆみ」
- 【般】イグラチモド錠25mg (ケアラム)
イーケブラドドライシロップ50% (レベチラセタムDS50%「ト-7」へ切替)
(【般】レベチラセタムシロップ用50%へ切替)
- イーケブラ錠500mg (レベチラセタム錠500mg「サ[®]イ」へ切替)
(【般】レベチラセタム錠500mgへ切替)
- 【般】イコサベント酸エチルカプセル300mg (エパデール)
- イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 【後】
- 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg (エパデール)
イスコチン原末
イスコチン錠100mg
- 劇イスツリサ錠1mg [25°C以下]
- イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」—【後】—
- イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」
(メニレット70%ゼリー20gから名称変更)
- イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」
(メニレット70%ゼリー30gから名称変更)
- 【般】イソソルビド経口液70%40mL (イソバイト)
(2027年3月31日削除予定)
- イソバイドシロップ70%分包20mL
イソバイドシロップ70%分包30mL
- イソプリノシン錠400mg
- —【般】—イソプリノシン配合顆粒4.74g/包 (リツケル)—

- 一硝酸イソソルビド錠20mg「サリ」 【後】
(アイトロール錠20mgより切替)
- ~~【般】一硝酸イソソルビド錠20mg~~ (アイトロール)
- イトブリド塩酸塩錠50mg「サリ」 【後】
- 【般】イトブリド塩酸塩錠50mg (ガナトン)
- イトラコナゾール錠50mg「科研」 【後】
- 【般】イトラコナゾールカプセル50mg (イトリゾール)
- イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 【後】
(【般】イトラコナゾール経口液1%)
- イトサゾールカプセル50mg
(【般】イトラコナゾールカプセル50mg)
イトサゾール内用液1%
(イトラコナゾール内用液1%「VTRS」へ切替)
- 【般】イトラコナゾール経口液1% (イトリゾール)
- 劇イニシク配合錠
イノソリッド配合経腸用半固形剤
- イノベロン錠200mg
イノラス配合経腸用液(紅茶フレーバー) [125mL/袋]
イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) [125mL/袋]
イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー) [187.5mL/袋]
イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー) [187.5mL/袋]
イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー) [187.5mL/袋]
- ~~モPヒカプセル250mg~~ ~~【後】~~ (2026年3月31日経過措置終了)
(【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mgへ切替)
- 劇イフェクサーSRカプセル37.5mg
劇イフェクサーSRカプセル75mg
麻劇イーフェンバカル錠50μg (販売中止)
- 麻劇イーフェンバカル錠400μg (販売中止)
- 麻劇イーフェンバカル錠600μg (販売中止)
- 麻劇イーフェンバカル錠800μg (販売中止)
- ~~イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg「日医王」~~ ~~【後】~~
- ~~【般】イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg~~ (セロクラール)
イブプロフェン錠100mg「NIG」 【後】 (【般】なし)
- 劇イブランス錠25mg
劇イブランス錠125mg
- 劇イマチニブ錠100mg「サリ」 【後】
- 【般】イマチニブ錠100mg (グリベック)
- ~~劇イマチニブ錠200mg「明治」~~ ~~【後】~~
- 【般】イマチニブ錠200mg (グリベック)
- ~~劇イミダラン錠50—50mg~~ (【般】スマトリプタン錠50mgへ切替)
- 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg (ステープラOD)
- イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハ」 【後】
- 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg (タナトリル)
- 劇イムセラカプセル0.5mg
(院外は【般】フィンゴリモドカプセル0.5mgへ切替)
- 劇イムブルピカカプセル140mg
イムラン錠50mg
イメンドカプセル80mg
(アブレピタントカプセル80mg「NK」へ切替)
(【般】アブレピタントカプセル80mgへ切替)
イメンドカプセル125mg
(アブレピタントカプセル125mg「NK」へ切替)
(【般】アブレピタントカプセル125mgへ切替)
- 劇イリボーOD錠2.5μg
- 劇イリボーOD錠5μg
- ~~【般】イルソゲラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠4mg~~ (ガスロンN)
- イルトラ配合錠LD
- イルトラ配合錠HD

- 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 (アイミクスLD)
- 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 (アイミクスHD)
- イルベサルタン錠100mg「DSPB」 【後】
- 【般】イルベサルタン錠50mg (アバプロ)
- 【般】イルベサルタン錠100mg (アバプロ)
- 【般】イルベサルタン錠200mg (アバプロ)
- 劇イレッサ錠250—250mg (ゲフィチニブ錠250mg「NK」へ切替)
(【般】ゲフィチニブ錠250mgへ切替)
- 劇インヴェガ錠3mg
- インクレミンシロップ5% 【後】
(【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%へ切替)
- 劇インチュニブ錠1mg
- 劇インチュニブ錠3mg
劇インデラル錠10mg (【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mgへ切替)
- ~~インセパース錠0.5—0.5mg~~ (【般】シラザプリル錠0.5mgへ切替)
- 劇インフリーSカプセル200mg
- 劇インブロメニ細粒1% (【般】プロムペリドール細粒1%へ切替)
- 劇インブロメニ錠1mg (【般】プロムペリドール錠1mgへ切替)
- 劇インブロメニ錠3mg (【般】プロムペリドール錠3mgへ切替)
- 劇インライタ錠1mg
劇インライタ錠5mg
- 【ウ】
- 劇ヴァイトラックピカプセル25mg
- 劇ヴァイトラックピカプセル100mg
劇ヴァンフリタ錠17.7mg
劇ヴァンフリタ錠26.5mg
- 劇ウインタミン細粒(10%)
劇ウェリレグ錠40mg
劇ヴォトリエント錠200mg
ヴォリプリス錠2.5mg (【般】アンプリセンタン錠2.5mgへ切替)
- ウチダのオウギ末M
ウチダの八味丸M [20丸/P]
ウテメサン錠5mg (【般】リトドリン塩酸塩錠5mgへ切替)
(院内はリトドリン塩酸塩錠5mg「日新」)
- ウブトラ錠0.2mg
ウブトラ錠0.4mg
- 毒ウブレチド錠5mg
- ウラリット-U配合散 [1g/P]
- ウラリット配合錠
- ウリアデック錠40mg
- ウルグートカプセル200mg
ウルソ顆粒5%
ウルソ錠100mg (ウルソデオキシコール酸錠100mg「ト7」へ切替)
- ~~【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg~~
ウルソデオキシコール酸錠50mg「ト7」 【後】
- ~~【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg~~
ウルソデオキシコール酸錠100mg「ト7」 【後】
- ウロカルン錠225mg
- 【エ】
- エカード配合錠HD
(【般】カンデサルタン4mg・ヒドクロチアジド配合錠へ切替)
- エカード配合錠HD
(【般】カンデサルタン8mg・ヒドクロチアジド配合錠へ切替)
- ~~【般】エカベトNa顆粒66.7%—1.5g/包~~ (ガストローム)
- 【般】エキセメスタン錠25mg (アロマシン)
エタア錠50mg (【般】ビルダグリブチン錠50mgへ切替)
(ビルダグリブチン錠50mg「ト7」へ切替)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

●劇エタセゲラン散20%（【般】ゾニサミド散20%へ切替）
●劇エタセゲラン錠100mg（【般】ゾニサミド錠100mgへ切替）
劇エクフィナ錠50mg
劇エクメット配合錠L D
（院外は【般】ビルダグリブリン・メチルシムン塩酸塩250mg配合錠へ切替）
●劇エタメット配合錠H D
（院外は【般】ビルダグリブリン・メチルシムン塩酸塩500mg配合錠へ切替）
劇エサンブトール錠250mg
劇エジュラント錠25mg
●エーヌコール錠2mg（院内はテモカプリル塩酸塩錠2mg「サリ」）
（【般】テモカプリル塩酸塩錠2mgへ切替）
●【般】エスシタロプラム錠10mg（レクサプロ）
●S G配合顆粒 [1g/P]
○エスゾピクロン錠1mg「日新」【後】
●【般】エスゾピクロン錠1mg（ルネスタ）
●【般】エスゾピクロン錠2mg（ルネスタ）
●向エスタゾラム錠2mg「アム」【後】
●【般】エスタゾラム錠2mg（ユーロジン）
●劇エストラサイトカプセル156.7mg 140mg [冷]
（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）
●【般】エストラジオール錠0.5mg（ジュリナ）
●エストリール錠1mg
○劇エスワンタイホウ配合O D錠T 20 【後】（20mgテガフル相当量）
（【般】テガフル20mg・ギメナル・オキシ配合口腔内崩壊錠へ切替）
○劇エスワンタイホウ配合O D錠T 25 【後】（25mgテガフル相当量）
（【般】テガフル25mg・ギメナル・オキシ配合口腔内崩壊錠へ切替）
○エゼチミブ錠10mg「JG」【後】
●【般】エゼチミブ錠10mg（ゼチア）
●【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠（アトベットL D）
●【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠（ロセベットH D）
○エソメプラゾールカプセル10mg「ト」【後】
●【般】エソメプラゾールカプセル10mg（ネキシウム）
●エソメプラゾールカプセル20mg「ト」【後】
●【般】エソメプラゾールカプセル20mg（ネキシウム）
●【般】エチゾラム細粒1%（デパス）
○向エチゾラム錠0.5mg「EMEC」【後】
●【般】エチゾラム錠0.5mg（デパス）
●劇エタスファージ配合錠
（【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠へ切替）
劇エタスファージ配合O D錠
（院内はアムバロ配合O D錠「ト」へ切替）
（【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠へ切替）
劇エディロールカプセル0.75μg
（【般】エルデカルシトールカプセル0.75μgへ切替）
（エルデカルシトールカプセル0.75μg「ト」へ切替）
○劇エトドラク錠200mg「SW」【後】
●【般】エトドラク錠200mg（ハイベン）
劇エドルミズ錠50mg
●エナブリルマレイン酸塩錠2.5mg「ト」【後】
●【般】エナブリルマレイン酸塩錠2.5mg（レニベース）
エナブリルマレイン酸塩錠5mg「ト」【後】
●【般】エナブリルマレイン酸塩錠5mg（レニベース）
●劇エナロイ錠2mg
●劇エナロイ錠4mg
エネーゴ配合経腸用液 [250mL/缶]
●【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg（エバステル）
●【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg（エバステル）
●【般】エバスチン錠10mg（エバステル）

●エバステル錠10mg（【般】エバスチン錠10mgへ切替）
●エバステルO D錠5mg（【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mgへ切替）
●エバステルO D錠10mg
（【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
●エバデールE Mカプセル2g
●エバデールカプセル300mg
（【般】イコサベント酸エチルカプセル300mgへ切替）
●エバデールS 900—900mg
（【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mgへ切替）
●向エバミール錠1.0 1mg
●エバルレスタット錠50「EK」—50mg—【後】
○エバルレスタット錠50mg「VTRS」【後】
●【般】エバルレスタット錠50mg（キネダック）
●エビスタ錠60mg
（【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mgへ切替）
○エピナスチン塩酸塩錠20mg「ギマ」【後】
●【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
劇エビビル錠150 150mg
●エビプロスタット配合錠S G
（【般】オキサギン1.0mg・オキサギン等配合錠へ切替）
●劇エビスファイ散1%（【般】アリピプラゾール散1%へ切替）
劇エビスファイ錠1mg（院内はアリピプラゾール錠1mg「サリ」へ切替）
（【般】アリピプラゾール錠1mgへ切替）
●劇エビスファイ錠3mg（【般】アリピプラゾール錠3mgへ切替）
劇エビリファイ錠6mg（【般】アリピプラゾール錠6mgへ切替）
●劇エビスファイ錠12mg（【般】アリピプラゾール錠12mgへ切替）
●劇エビスファイO D錠24mg
（【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mgへ切替）
劇エビリファイ内用液0.1% [1mL/包]
（【般】アリピプラゾール経口液0.1%1mLへ切替）
●劇エビスファイ内用液0.1%—[3mL/包]
（【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mLへ切替）
劇エビリファイ内用液0.1% [6mL/包]
（【般】アリピプラゾール経口液0.1%6mLへ切替）
●劇エビスファイ内用液0.1%—[12mL/包]
（【般】アリピプラゾール経口液0.1%12mLへ切替）
エフィエント錠2.5mg
（院外は【般】プラスグレル錠2.5mgへ切替）
エフィエント錠3.75mg
（院外は【般】プラスグレル錠3.75mgへ切替）
エフィエントO D錠20mg
（院外は【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mgへ切替）
●エブクルーサ配合錠
覚劇エフビーO D錠2.5 2.5mg
（【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mgへ切替）
●エフメノカプセル100mg
エブランチルカプセル15mg
劇エブリスディドライシロップ60mg [25℃以下]
●【般】エブレネン錠25mg（セララ）
○エブレネン錠50mg「杏林」【後】
●【般】エブレネン錠50mg（セララ）
○エベリゾン塩酸塩錠50mg「ト」【後】
●【般】エベリゾン塩酸塩錠50mg（ミオナール）
劇エベレンゾ錠20mg
劇エベレンゾ錠50mg
●エボザックカプセル30mg
●劇エミレース錠3mg

- 麻劇MSコンチン錠10mg
- 麻劇MSコンチン錠60mg
- エリキウス錠2.5mg
- エリキウス錠5mg
- エリスロシンドライシロップW20%
- エリスロシン錠100mg
- モルカルチンF錠250mg
- (レボカルニチンF錠250mg「ト」へ切替)
- (【般】レボカルニチンF錠250mgへ切替)
- モルカルチンF内用液10%
- (レボカルニチンF内用液10%「ト」へ切替)
- (【般】レボカルニチンF経口液10%へ切替)
- Ｌ-ケフレックス顆粒 [1g/包]
- エルデカルシトールカプセル0.75μg「ト」 【後】
- 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg (エディロールカプセル)
- 【般】エルトロンバグ錠12.5mg (レボレード)
- 【般】エルロチニブ錠25mg (タルセバ)
- 【般】エルロチニブ錠100mg (タルセバ)
- 【般】エルロチニブ錠150mg (タルセバ)
- エレンタール配合内用剤 [80g/P]
- エレンタール配合内用剤—[80g/ガラスシリンジ容器] (販売中止)
- エレンタールP乳幼児用配合内用剤 [80g/P]
- 劇塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」
- エンシュア・H (パニラ) [250mL/缶]
- エンシュア・H (パナナ) [250mL/缶]
- エンシュア・H (コーヒー) [250mL/缶]
- エンシュア・H (黒糖) [250mL/缶]
- エンシュア・H (メロン) [250mL/缶]
- エンシュア・リキッド [250mL/缶]
- エンタカポン錠100mg「JG」 【後】
- 【般】エンタカポン錠100mg (コムタン)
- 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg (パラクルード)
- 劇エンテカビルOD錠0.5mg「サ」 【後】
- 劇エンドキサン錠50mg
- エンレスト錠50mg
- エンレスト錠100mg
- エンレスト錠200mg
- 【オ】
- 【般】オウメガ「サ」錠1.0mg・ハヤギ「キ」等配合錠 (エビプロスタット)
- 【般】オキサトミド錠30mg—(セルテクト)—
- 【般】オキサトミドシロップ用2%—(セルテクト)—
- 麻劇オキシコドン錠2.5mgN X「第一三共」 【後】
- (【般】オキシコドン錠2.5mg (乱用防止製剤) へ切替)
- 麻劇オキシコドン錠5mgN X「第一三共」 【後】
- (【般】オキシコドン錠5mg (乱用防止製剤) へ切替)
- 麻劇オキシコドン錠10mgN X「第一三共」 【後】
- (【般】オキシコドン錠10mg (乱用防止製剤) へ切替)
- 麻劇オキシコドン錠20mgN X「第一三共」 【後】
- (【般】オキシコドン錠20mg (乱用防止製剤) へ切替)
- 麻劇【般】オキシコドン錠2.5mg (乱用防止製剤)
- 麻劇【般】オキシコドン錠5mg (乱用防止製剤)
- 麻劇【般】オキシコドン錠10mg (乱用防止製剤)
- 麻劇【般】オキシコドン錠20mg (乱用防止製剤)
- 麻劇オキシコドン徐放錠5mgN X「第一三共」—【後】— (【般】なし)
- (オキシコンチンTR錠5mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン徐放錠10mgN X「第一三共」—【後】— (【般】なし)
- (オキシコンチンTR錠10mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン徐放錠20mgN X「第一三共」—【後】— (【般】なし)
- (オキシコンチンTR錠20mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン徐放錠40mgN X「第一三共」—【後】— (【般】なし)
- (オキシコンチンTR錠40mgへ切替)
- 麻劇【般】オキシコドン経口液2.5mg (オキシコドン内服液)
- 麻劇【般】オキシコドン経口液5mg (オキシコドン内服液)
- 麻劇【般】オキシコドン経口液10mg (オキシコドン内服液)
- 麻劇【般】オキシコドン経口液20mg (オキシコドン内服液)
- 麻劇オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」 2.5mL/包 【後】
- (【般】オキシコドン経口液2.5mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン内服液5mg「日本臓器」—2.5mL/包—【後】—
- (【般】オキシコドン経口液5mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン内服液10mg「日本臓器」—5mL/包—【後】—
- (【般】オキシコドン経口液10mgへ切替)
- 麻劇オキシコドン内服液20mg「日本臓器」—5mL/包—【後】—
- (【般】オキシコドン経口液20mgへ切替)
- 麻劇オキシコンチンTR錠5mg (【般】なし)
- 麻劇オキシコンチンTR錠10mg (【般】なし)
- 麻劇オキシコンチンTR錠20mg (【般】なし)
- 麻劇オキシコンチンTR錠40mg (【般】なし)
- 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg (ボラキス)
- 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg (ボラキス)
- 麻劇オキノーム散2.5mg (院内はオキノーム錠2.5mgN X「第一三共」)
- 麻劇オキノーム散5mg (院内はオキノーム錠5mgN X「第一三共」)
- 麻劇オキノーム散10mg (院内はオキノーム錠10mgN X「第一三共」)
- 麻劇オキノーム散20mg (院内はオキノーム錠20mgN X「第一三共」)
- オーグメンチン配合錠250RS
- オース「桂枝加苓朮附湯エキスG [3.0g]SG-18R
- オース「小半夏加茯苓湯エキスG [1.0g]SG-21
- オース「大黃甘草湯エキスT錠 [2錠/P]SG-84T
- オスポロット錠50mg
- オゼックス細粒小児用15%—150mg/g
- (【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%へ切替)
- オゼックス錠150 150mg
- オセルタミビルカプセル75mg「サ」 【後】
- 【般】オセルタミビルカプセル75mg (タミフル)
- 【般】オセルタミビルシロップ用3% (タミフル)
- 劇オダイン錠125mg (【般】フルタミド錠125mgへ切替)
- 劇オテズラ錠10mg
- 劇オテズラ錠20mg
- 劇オテズラ錠30mg
- 劇オデフシ配合錠
- オノンドライシロップ10%
- (プラナルカストドライシロップ10%「AFP」へ切替)
- (【般】プラナルカストシロップ用10%へ切替)
- オノンカプセル112.5mg
- (院内はプラナルカストカプセル112.5mg「サ」)
- (【般】プラナルカストカプセル112.5mgへ切替)
- オパルモン錠5μg
- (【般】リマプロストアルファデクス錠5μgへ切替)
- 劇オフエブカプセル100mg
- 劇オフエブカプセル150mg
- 劇オブスミット錠10mg
- 麻劇オブソ内服液5mg [2.5mL/P]
- 麻劇オブソ内服液10mg [5mL/P]
- 劇オベプリム 1カプセル500mg
- 劇オムジャラ錠100mg
- 劇オムジャラ錠150mg

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ト-7」 【後】
- 【般】 オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル2g（ロトリガ）
- 【般】 オメプラゾール錠10mg（オメプラール）
- ~~オメプラゾール腸溶錠20mg「武田ファナール」~~【後】
- 【般】 オメプラゾール錠20mg（オメプラール）
- ~~オメプラゼン錠10mg~~（【般】 オメプラゾール錠10mgへ切替）
- ~~オメプラゼン錠20mg~~（【般】 オメプラゾール錠 20mgへ切替）
- オラペネム小児用細粒10% 100mg/g
- 【般】 オランザピン細粒1%（ジプレキサ）
- 劇オランザピン錠2.5mg「アメル」 【後】
- 【般】 オランザピン錠2.5mg
- 劇オランザピン O D 錠5mg「ト-7」 【後】
- 【般】 オランザピン口腔内崩壊錠5mg
- 【般】 オランザピン口腔内崩壊錠10mg（ジプレキサ）
- 劇オルケディア錠1mg
- 劇オルケディア錠4mg
- 劇オルミエント錠2mg
- 劇オルミエント錠4mg
- オルメサルタン O D 錠20mg「DSEP」 【後】
- ~~【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg（オルメテック）~~
- 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg（オルメテック）
- 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg（オルメテック）
- 【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg（オルメテック）
- オルメテック O D 錠5mg
- オルメテック O D 錠10mg
- オルメテック O D 錠20mg
- （院内はオルメサルタン O D 錠20mg「DSEP」）
- オルメテック O D 錠40mg
- 【般】 ~~オロパテン~~塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g（包）（アレロック）
- オロパタジン塩酸塩 O D 錠5mg「ト-7」 【後】
- 【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg（アレロック）
- ~~オンダリザ錠2.5mg~~（【般】 サキサグリブチン錠2.5mgへ切替）
- ~~オンダリザ錠5mg~~（【般】 サキサグリブチン錠5mgへ切替）
- 劇オンジェンティス錠25mg
- 【力】
- 劇カイトリル錠1mg
- ~~ガスコン錠40mg~~（ジメチコン錠40mg「YD」へ切替）
- （【般】 ジメチコン錠40mgへ切替）
- ガスコンドロップ内用液2%
- （【般】 ジメチコンシロップ2%へ切替）
- ~~ガスターA散2%「10mg/0.5g」~~（院内はファモチジン散2%「ト-7」）
- （【般】 ファモチジン散2% 0.5g/包へ切替）
- ガスター D 錠10mg（院内はファモチジン O D 錠10mg「ト-7」）
- ガスター D 錠20mg（院内はファモチジン O D 錠20mg「ト-7」）
- ガストログラフィン経口・注腸用 [100mL]
- ~~ガストロゼピン錠25mg~~
- （【般】 ピレンゼピン塩酸塩錠25mgへ切替）
- ~~ガストローム顆粒66.7%「1.5g/P」~~
- （【般】 ~~モカベト N a~~顆粒66.7%「1.5g/包へ切替」）
- ガスモチン錠5mg（院内はモサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」）
- ガスロン N・O D 錠4mg
- 劇カソデックス O D 錠80mg（ピカルタミド O D 錠80mg「ト-7」へ切替）
- （【般】 ピカルタミド口腔内崩壊錠80mgへ切替）
- カタプレス錠75μg
- カチーフ N 散10mg/g
- 劇カデュエット配合錠2番
- （【般】 ~~アムジピン~~2.5mg・~~アトルvastatin~~10mg配合錠：2へ切替）

- 劇カデュエット配合錠4番
- （【般】 ~~アムジピン~~5mg・~~アトルvastatin~~10mg配合錠：4へ切替）
- ~~カナダール錠100mg~~
- ~~カナグル O D 錠100mg~~
- ~~ガナトン錠50mg~~（院内はイトブリド塩酸塩錠50mg「サリ」）
- （【般】 イトブリド塩酸塩錠50mgへ切替）
- ~~カナマイシンカプセル250mg「明治」~~
- ~~カナリア配合錠（カナリア配合 O D 錠へ切替予定）~~
- ~~カナリア配合 O D 錠（カナリア配合錠が無くなり次第切替）~~
- ~~カーバゲル分散錠200mg~~
- 劇カバサル錠0.25mg （【般】 なし）
- ~~劇カバサル錠1.0mg~~（院内はカベルゴリン錠1.0mg「サリ」）
- ~~ガバベン錠200mg~~
- ~~ガバベン錠300mg~~
- ~~ガバベンシロップ5% [2~8℃]~~
- ~~カプトリル錠12.5mg~~
- ~~カプトリル-Rカプセル18.75mg~~
- ~~劇カプレルサ錠100mg~~
- 劇カベシタピン錠300mg「サリ」 【後】
- 【般】 カベシタピン錠300mg（ゼロダ）
- ~~【般】 カベルゴリン錠0.25mg（カバサル）~~
- 劇カベルゴリン錠1.0mg「サリ」 【後】 （【般】 なし）
- ~~【般】 カベルゴリン錠1mg（カバサル）~~
- 劇カボメティクス錠20mg
- 劇カボメティクス錠60mg
- 劇カムザイオスカプセル1mg
- 劇カムザイオスカプセル2.5mg
- 劇カムザイオスカプセル5mg
- カモスタットメシル酸塩錠100mg「ト-7」 【後】
- 【般】 カモスタットメシル酸塩錠100mg（フオイバン）
- ~~ガラタナーゼ散50% [0.5g/P]~~
- 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠4mg（レミニール O D）
- 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠8mg（レミニール O D）
- 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠12mg（レミニール O D）
- 【般】 カリジノゲナーゼ錠50単位（カルナクリン）
- カリメート散 [5g/P]
- カリメートドライシロップ92.59% [5.4g/P]
- カリメート経口液20% [25g/P] （【般】 なし）
- ~~カルダート錠10-10mg~~（【般】 デノパミン錠10mgへ切替）
- （院内はデノパミン錠10mg「日医工」）
- ~~劇カルケンスカプセル100mg~~
- 劇カルケンス錠100mg
- 【般】 カルシトリオールカプセル0.25μg（ロカルトロール）
- ~~劇カルスロケット錠10-10mg~~（【般】 マニジピン塩酸塩錠10mgへ切替）
- 【般】 カルテオロール塩酸塩錠5mg（ミケラン）
- ~~カルデナリン O D 錠1mg~~（院内はドキサゾシン錠1mg「けん」）
- ~~カルデナリン O D 錠4mg~~（院内はドキサゾシン錠4mg「けん」）
- ~~カルナタリン錠50-50単位~~
- （【般】 カリジノゲナーゼ錠50単位へ切替）
- 【般】 カルバゾクロムスルホン酸 N a 散10%（アドナ）
- カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠30mg「YD」 【後】
- 【般】 カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠30mg（アドナ）
- ~~カルバマゼピン細粒50%「アメル」~~
- ~~【般】 カルバマゼピン細粒50%（テグレートール）~~
- ~~【般】 カルバマゼピン錠100mg（テグレートール）~~
- ~~【般】 カルバマゼピン錠200mg（テグレートール）~~
- ~~カルデロックス錠16mg~~（院内はアゼルニジピン錠16mg「ト-7」）
- （【般】 アゼルニジピン錠16mgへ切替）

- カルベジロール錠2.5mg「ﾄｰﾌ」 【後】
- ~~【般】カルベジロール錠2.5mg（アーチスト）~~
- カルベジロール錠10mg「ﾄｰﾌ」 【後】
- 【般】カルベジロール錠10mg（アーチスト）
- カルボシステインD S50%「ﾄｰﾌ」 【後】
- ~~【般】カルボシステインシロップ用50%（ムコダイン）~~
- カルボシステイン錠250mg「ﾄｰﾌ」 【後】
- ~~【般】カルボシステイン錠250mg（ムコダイン）~~
- カルボシステインシロップ小児用5%「ﾄｰﾌ」 【後】
- 【般】カルボシステインシロップ5%
カルメロースナトリウム原末「ﾏﾘｼﾞ」 （院内製剤原料）
- 劇カレトラ配合錠
- 劇カログラ錠120mg
- 劇カロナール細粒50% 【後】 （【般】なし）
- ~~劇カロナール錠300—300mg—【後】—~~
（【般】アセトアミノフェン錠300mgへ切替）
- 劇カロナールシロップ2% 【後】
（【般】アセトアミノフェンシロップ2%へ切替）
- ~~カロリールゼリー40.496%—16.05g【ﾌｻｯﾎｰｽとして6.5g含有】—【後】—~~
- 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒
- 【般】カンデサルタン錠2mg（プロプレス）
- カンデサルタン錠4mg「あすか」 【後】
- 【般】カンデサルタン錠4mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン錠8mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン錠12mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠（ユニシアLD）
- 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠（ユニシアHD）
- 【般】カンデサルタン4mg・ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾃﾞｻﾞｼﾞﾝ 配合錠（エカードLD）
- 【般】カンデサルタン8mg・ﾋﾄﾞｸﾛｸﾃﾞｻﾞｼﾞﾝ 配合錠（エカードHD）
- 【キ】
キシロカインビスカス2% [100mL]
キックリン顆粒86.2%
- キックリンカプセル250mg
- キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」
キプレス細粒4mg [4mg/P]
（【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包へ切替）
キプレスチュアブル錠5mg
（院内はモンテルカストチュアブル錠5mg「ﾄｰﾌ」へ切替）
（【般】モンテルカストチュアブル錠5mgへ切替）
- キプレス錠5mg（【般】モンテルカスト錠5mgへ切替）
- キプレス錠10mg（【般】モンテルカスト錠10mgへ切替）
- キプレスOD錠10mg（院内はモンテルカストOD錠10mg「効効」
（【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mgへ切替）
- ギボンズ錠1mg—【後】—（【般】チザニジン錠1mgへ切替）
- 劇ギャバロン錠10mg
キャピリン配合錠
- ~~【般】球形吸着炭カプセル200mg（クレメジン）~~
- 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 [2g/P] 【後】
- 【般】球形吸着炭細粒 2g/包（クレメジン）
- 【ク】
● 【般】クアゼパム錠15mg（ドラーレ）
- 【般】クエチアピン細粒50%（セロクエル）
- 劇クエチアピン錠12.5mg「ｱﾏﾙ」 【後】
- 【般】クエチアピン錠12.5mg（セロクエル）
- 劇クエチアピン錠25mg「ｱﾏﾙ」 【後】
- 【般】クエチアピン錠25mg（セロクエル）
- 劇クエチアピン錠100mg「ｱﾏﾙ」 【後】
- 【般】クエチアピン錠100mg（セロクエル）
- 【般】クエチアピン錠200mg（セロクエル）
- ~~【般】ｸｴﾅ酸ｶﾙｼｳﾑ→ｸｴﾅ酸ﾅﾄﾘｳﾑ配合散—1g/包（ウラリットU）~~
- ~~【般】ｸｴﾅ酸ｶﾙｼｳﾑ→ｸｴﾅ酸ﾅﾄﾘｳﾑ配合錠（ウラリット）~~
- ｸｴﾅ酸第一鉄Na錠50mg「ﾏｲﾄﾞ」—【後】—（院内はフェロミア錠50mg）
- ~~【般】ｸｴﾅ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ錠50mg（鉄と七て）~~（フェロミア）
クエン酸ナトリウム末
クービピック錠25mg
- クービピック錠50mg
グーフィス錠5mg
グラクティブ錠12.5mg
- グラクティブ錠25mg
グラクティブ錠50mg
- グラクティブ錠100mg
グラケーカプセル15mg
（【般】メナテトレノンカプセル15mgへ切替）
- ｸﾗｼﾞ 加味帰脾湯エキス細粒 [2.5g] EK-49
ｸﾗｼﾞ 桂枝茯苓丸料エキス細粒 [2.0g] EK-25
ｸﾗｼﾞ 神祕湯エキス細粒 [2.0g] EK-85
- ｸﾗｼﾞ 大柴胡湯エキス細粒 [2.0g] EK-8
- ※ ｸﾗｼﾞ 人参養栄湯エキス細粒 [2.5g] EK-108
→ ｸﾗｼﾞ 人参養栄湯エキス細粒 [3.75g] KB-108
（ｸﾗｼﾞ 人参養栄湯エキス細粒 [2.5g] EK-108が無くなり次第切替）
- 劇グラセプターカプセル0.5mg
- 劇グラセプターカプセル1mg
- クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg/g
- タラビット錠250mg（【般】レボフロキサシン錠250mgへ切替）
- タラビット錠500mg（院内はレボフロキサシン錠500mg「ﾀﾊﾞ」）
（【般】レボフロキサシン錠500mgへ切替）
- デラマリール細粒10%（【般】チアプリド塩酸塩細粒10%へ切替）
- デラマリール錠25mg（【般】チアプリド塩酸塩錠25mgへ切替）
デラマリール錠50mg（チアプリド錠50mg「ﾏｲﾄﾞ」へ切替）
（【般】チアプリド塩酸塩錠50mgへ切替）
タラリシッド錠50mg小児用
（クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」へ切替）
- 【般】クラリスロマイシン錠50mg（クラリシッド，クラリス）
- タラリシッド錠200mg（院内はクラリスロマイシン錠200mg「ﾄｰﾌ」）
- タラリス錠200—200mg
クラリスロマイシンDS小児用10%「効効」 【後】（【般】なし）
- クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」 【後】
クラリスロマイシン錠200mg「ﾄｰﾌ」 【後】（【般】なし）
- タラリチンドライシロップ1%—【5mg/0.5g/P】
（【般】ロラタジンシロップ用1% 0.5g（包）へ切替）
- タラリチン錠10mg（【般】ロラタジン錠10mgへ切替）
- デランダキニン錠50—50mg（【般】トフィソパム錠50mgへ切替）
- 劇クリアミン配合錠S0.5
- クリアナール錠200mg
- 【般】グリクラジド錠40mg（グリミクロン）
（2027年3月31日削除予定）
グリチロン配合錠
- クリノリル錠100 100mg
劇ゲリベック錠100mg（イマチニブ錠100mg「ﾏｲﾄﾞ」へ切替）
（【般】イマチニブ錠100mgへ切替）
- ~~【般】ゲリベンタラミド錠1.25mg（ダオニール）~~
- 【般】グリベンクラミド錠2.5mg（ダオニール）
- 劇ゲリミタロンHA錠20mg（【般】グリクラジド錠20mgへ切替）
- 劇ゲリミタロン錠40mg（【般】グリクラジド錠40mgへ切替）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

○劇グリメピリド錠1mg「トワ」 【後】 （【般】なし）
● 【般】グリメピリド錠0.5mg（アマリール）
● 【般】グリメピリド錠3mg（アマリール）
● ゲルヨバイ錠50mg（【般】アカルボース錠50mgへ切替）
● ゲルヨバイ錠100mg（【般】アカルボース錠100mgへ切替）
グルコンサンK細粒4mEq/g
● 【般】グルタチオン錠100mg（タチオン）
● ゲルファスト錠10mg（【般】ミチグリニドC a錠10mgへ切替）
● グルベス配合錠
グルベス配合OD錠
● タレストール錠5mg（【般】ロスバスタチン錠5mgへ切替）
ダレーズピット錠50mg（シタフロキサシン錠50mg「ガワ」へ切替）
●劇クレセンバカプセル40mg
劇クレセンバカプセル100mg
● 【般】クレマスチンシロップ用0.1%（テルギンG）
○劇クレマスチンDS0.1%「効タ」 【後】
（テルギンGドライシロップ0.1%より名称変更）
●劇クレミン錠25mg
● クレメジン細粒分包2g（院内は球形吸着炭細粒分包2g「日医工」）
（【般】球形吸着炭細粒 2g/包へ切替）
● クレメジン速崩錠500mg
● 【般】クレメンテテロール塩酸塩錠10μg（スピロベント）
劇クロザリル錠25mg
劇クロザリル錠100mg
○向クロチアゼパム錠5mg「ガワ」 【後】
● 【般】クロチアゼパム錠5mg（リーゼ）
● 【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠（コンプラビン配合錠）
● 【般】クロピドグレル錠25mg（プラビックス）
○クロピドグレル錠75mg「トワ」 【後】
● 【般】クロピドグレル錠75mg（プラビックス）
●クロフェクトン顆粒10%
●クロフェクトン錠10mg
●クロフェクトン錠25mg
クロミッド錠50mg
○d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 【後】
● 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg（ポララミン）
○クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 【後】
（プロスタール錠25から切替）
● 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg（プロスタール）
【ケ】
●劇ケアラム錠25mg（【般】イグラチモド錠25mgへ切替）
劇ケアロードLA錠60μg
ケイキサレートドライシロップ76% [3.27g/P]
（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）
● ケイツーカプセル5mg
ケイツーシロップ0.2% [1mL/P]
ケタスカプセル10mg
● 【般】ケトチフェンカプセル1mg（ザジテン）
○ケトチフェンDS小児用0.1%「ガワ」 【後】
● 【般】ケトチフェンシロップ用0.1%（ザジテン）
● 【般】ゲフィチニブ錠250mg（イレッサ）
ケフラール細粒小児用100mg
● ケルボンダ錠10mg（【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mgへ切替）
ケレンディア錠10mg
ケレンディア錠20mg
● ケーワン錠5mg（【般】フィトナジオン錠5mgへ切替）
劇ゲンボイヤ配合錠

【コ】
● コスパノンカプセル40mg
●劇コセルゴカプセル10mg
●劇コセルゴカプセル25mg
コ如-葛根湯加辛夷川芎エキス細粒 [3.0g]N2
コ如-桔梗石膏エキス細粒 [2.0g]N324
コ如-九味檳榔湯エキス細粒 [2.0g]N311
コ如-柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 [2.5g]N12
コ如-柴胡清肝湯エキス細粒 [3.0g]N80
●コ如-梔子柏皮湯エキス細粒 [2.0g]N314
コ如-大柴胡湯去大黃エキス細粒 [3.0g]N319
コ如-腸癰湯エキス細粒 [2.0g]N320
コ如-半夏白朮天麻湯エキス細粒 [3.0g]N37
● ヨディオ配合錠E-X
（【般】バルサルタン・ヒドロクロチアジド 12.5mg配合錠へ切替）
劇コデインリン酸塩散1%「ガワ」
麻劇コデインリン酸塩散10%「効タ」
コートリル錠10mg
● コートン錠25mg
●劇ヨニール錠4mg（院内はベニジピン塩酸塩錠4mg「トワ」）
（【般】ベニジピン塩酸塩錠4mgへ切替）
ヨムタン錠100mg（エンタカポン錠100mg「JG」へ切替）
● コメリアンコーワ錠50（ジラゼブ塩酸塩錠50mg「トワ」へ切替）
● コメリアンコーワ錠100（ジラゼブ塩酸塩錠100mg「トワ」へ切替）
（【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mgへ切替）
劇コラン錠2.5mg
●劇コラン錠5mg
●劇コラン錠7.5mg
劇コルヒチン錠0.5mg「効タ」
●劇コレアジン錠12.5mg
● コレチメント錠9mg
● コレバイン錠500mg
● コレバインミニ83% [1.81g/P]
向劇コンサータ錠18mg
●向劇コンサータ錠27mg
コントミン糖衣錠12.5mg
● コンプラビン配合錠（【般】なし）
（【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠へ切替）
【サ】
サアミオン錠5mg（院内はニセルゴリン錠5mg「トワ」へ切替）
（【般】ニセルゴリン錠5mgへ切替）
劇ザイアジェン錠300mg
サイクロセリンカプセル250mg「明治」
ザイザル錠5mg（レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サド」へ切替）
（【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mgへ切替）
ザイザルシロップ0.05%
（レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トワ」へ切替）
劇ザイティガ錠250mg
（院外は【般】アピラテロン酢酸エステル錠250mgへ切替）
●劇ザイティガ錠500mg
劇サイトテック錠100 100μg
●劇サイバインコ錠50mg
●劇サイバインコ錠100mg
●劇サイバインコ錠200mg
ザイボックス錠600mg（【般】リネゾリド錠600mgへ切替）
●向サイレーズ錠1mg（フルニトラゼパム錠1mg「アル」へ切替）
（【般】フルニトラゼパム錠1mgへ切替）

劇サインバルタカプセル20mg
(院内はデュロキシチンOD錠20mg「ニプロ」へ切替)
(【般】デュロキシチン口腔内崩壊錠20mgへ切替)
●【般】サキサグリプチン錠2.5mg (オングリザ)
●【般】サキサグリプチン錠5mg (オングリザ)
○劇酢酸亜鉛顆粒5%「サリ」【後】
●劇【般】酢酸亜鉛顆粒5% (ノベルジン)
○劇酢酸亜鉛錠25mg「サリ」【後】
●劇【般】酢酸亜鉛錠25mg (ノベルジン)
●劇【般】酢酸亜鉛錠50mg (ノベルジン)
劇ザタラス配合錠70
劇ザタラス配合錠H70 (院内はジルムロ配合錠HD「武田70」へ切替)
●劇ザーコリカプセル200mg
劇ザーコリカプセル250mg
ザジテンドライシロップ0.1%
(ケトチフェンDS小児用0.1%「サリ」へ切替)
●ザジテンカプセル1mg (【般】ケトチフェンカプセル1mgへ切替)
劇サーティカン錠0.25mg
●劇サーティカン錠0.5mg
●劇サーティカン錠0.75mg
●向劇サノレックス錠0.5mg
ザファテック錠100mg
劇サブリル散分包500mg [500mg/P]
劇サムスカ顆粒1% (【般】トルバプタン顆粒1%へ切替)
※劇サムスカOD錠7.5mg
(トルバプタンOD錠7.5mg「オツカ」へ切替予定 (適応が揃い次第))
(【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mgへ切替)
●劇サムスカOD錠15mg
(【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mgへ切替)
劇サムスカOD錠30mg
サムチレール内用懸濁液15% [5mL/P]
●劇サラジェン顆粒0.5% [5mg/1g/P]
劇サラジェン錠5mg
●【般】サラゾスルファピリジン錠500mg (サラゾピリン)
●サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」【後】
●【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg (アザルフィジンEN)
●サラゾピリン錠500mg
●ザルティア錠2.5mg (【般】タダラフィル錠2.5mg:ZAへ切替)
ザルティア錠5mg (【般】タダラフィル錠5mg:ZAへ切替)
●【般】ザルトプロフェン錠80mg (ペオン錠80mg)
サルプレップ配合内用液 480mLV
○サルボグレラート塩酸塩錠50mg「ト7」【後】
●【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mg (アンブラーグ)
●【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg (アンブラーグ)
毒サレドカプセル25 25mg
毒サレドカプセル100 100mg
●ザロンチンシロップ5%
●サワシリンカプセル250—250mg
(院内はアモキシシリンカプセル250mg「日医工」)
(【般】アモキシシリンカプセル250mgへ切替)
酸化マグネシウム原末「マルイ」
●【般】酸化マグネシウム錠250mg
○酸化マグネシウム錠330mg「ケンエ」【後】
●【般】酸化マグネシウム錠330mg
●【般】酸化マグネシウム錠500mg
●サンバゼン錠50mg—【後】
(【般】エベリゾン塩酸塩錠50mgへ切替)

●劇サンリズムカプセル50mg
(院内はビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「ト7」)
(【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mgへ切替)
三和 黄芩湯エキス細粒 [2.5g]S-35
三和 葛根加朮附湯エキス細粒 [2.5g]S-07
劇三和 桂芍知母湯エキス細粒 [3.0g]S-10
劇三和 附子理中湯エキス細粒 [1.5g]S-09
【シ】
○向ジアゼパム錠2mg「アム」【後】
●【般】ジアゼパム錠2mg (セルシン)
●【般】ジアゼパム錠5mg (セルシン)
劇シアナマイド内用液1%「サベ」[100mL]—【冷】
●シアリス錠10mg
[男性不妊の治療目的で処方された場合のみ保険適用]
劇ジェイゾロフト錠25mg (院内はセルトラリン錠25mg「アム」)
(【般】セルトラリン錠25mgへ切替)
●劇ジェイゾロフト錠50mg (【般】セルトラリン錠50mgへ切替)
●劇ジェセリ錠40mg
ジェニナック錠200mg
○ジェノゲスト錠0.5mg「モダ」【後】
●【般】ジェノゲスト錠0.5mg (ディナゲスト)
●【般】ジェノゲスト錠1mg (ディナゲスト)
●ジェミーナ配合錠
●劇ジオトリフ錠20mg
劇ジオトリフ錠30mg
劇ジオトリフ錠40mg
劇ジカディア錠150mg
●シグマート錠5mg (院内はニコランジル錠5mg「サリ」)
劇シクレスト舌下錠5mg
劇シクレスト舌下錠10mg
●劇シクロスポリン細粒17%「VTRS」【後】
●【般】シクロスポリン細粒17%
○劇シクロスポリンカプセル10mg「ト7」【後】
●【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE (ネオーラル)
○劇シクロスポリンカプセル25mg「ト7」【後】
●【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE (ネオーラル)
○劇シクロスポリンカプセル50mg「ト7」【後】
●【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE (ネオーラル)
●【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg (ボルタレンSR)
○劇ジクロフェナクNa錠25mg「ト7」【後】
●【般】ジクロフェナクNa錠25mg (ボルタレン)
劇ジゴシン散0.1%
劇ジゴシン錠0.25mg
劇ジゴシンエリキシル0.05mg/mL
●劇ジスバルカプセル40mg
ジスロマック細粒小児用10%
(【般】アジスロマイシン細粒10%へ切替)
●ジスロマック錠250mg (【般】アジスロマイシン錠250mgへ切替)
●劇ジセレカ錠100mg
●劇ジセレカ錠200mg
●【般】ジソピラミドカプセル50mg (リスモダン)
●【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg (リスモダンR)
●シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
●シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
シタフロキサシン錠50mg「サリ」【後】 (【般】なし)
●【般】シタフロキサシン錠50mg (グレースビット)
シナール配合顆粒 [1g/P]
(【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 1g/包へ切替)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- ジピリダモール散12.5%【JG】 【後】
- 【般】ジピリダモール散12.5%（~~アングナール~~）
- ジピリダモール錠25mg【ト7】 【後】
- 【般】ジピリダモール錠25mg（ペルサンチン）
- ジピリダモール錠100mg【ト7】 【後】
- ~~【般】ジピリダモール錠100mg（ペルサンチン）~~
- ジフェニドール塩酸塩錠25mg【NIG】 【後】
- ~~ジフェニドール塩酸塩錠25mg【タコ】~~ 【後】
（ジフェニドール塩酸塩錠25mg【NIG】へ名称変更）
- ~~【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg（セファドール）~~
- ジナルカンカプセル100mg
（【般】フルコナゾールカプセル100mgへ切替）
- 劇ジブレキサ細粒1%
（【般】オランザピン細粒1%へ切替）
- 劇ジブレキサザイデイス錠5mg（院内はオランザピンOD錠5mg【ト7】）
（【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mgへ切替）
- 劇ジブレキサザイデイス錠10mg
（【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
- シベクトロ錠200mg
- 劇シベノー錠50mg（院内はシベンゾリンコハク酸塩錠50mg【サ4】）
- 劇シベンゾリンコハク酸塩錠50mg【サ4】 【後】
- 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg（シベノー錠）
- 【般】ジメチコンシロップ2%（ガスコン）
- ジメチコン錠40mg【YD】 【後】
- 【般】ジメチコン錠40mg（ガスコン）
- 【般】ジメチジン錠200mg（タガメット）
- ~~【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25%（アトシシロップ）~~
劇ジャイパーカ錠50mg
劇ジャイパーカ錠100mg
劇ジャカピ錠5mg
劇ジャカピ錠10mg
劇ジャカピ内用液小児用0.5% [2~8℃]
ジャディアン錠10mg
- ジャディアン錠25mg
劇ジャドニユ顆粒分包90mg
劇ジャドニユ顆粒分包360mg（【般】デフェシロックス顆粒360mgへ切替）
ジャヌビア錠12.5mg（グラクティブ錠12.5mgへ切替）
- ジャヌビア錠25mg
ジャヌビア錠50mg（グラクティブ錠50mgへ切替）
- 劇ジャルカ配合錠
臭化カリウム【ヤメン】
ジュリナ錠0.5mg（【般】エストラジオール錠0.5mgへ切替）
- ジュンコウ四物湯FCEキス細粒医療用 [2.5g]FC71
- 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg（ニトロールR）
- 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg（フランドル錠）
- 小児用ムコソールバンシシロップ0.3%
（【般】アンブロキシオール塩酸塩シロップ0.3%へ切替）
- 【般】シラザプリル錠0.5mg（インヒベース）
- ~~【般】ジラゼバ塩酸塩錠50mg（コメリアンコーワ）~~
- 【般】ジラゼバ塩酸塩錠100mg（コメリアンコーワ）
- ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg【サ4】 【後】
- 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg（ヘルベッサール）
- ジルチアゼム塩酸塩錠30mg【ト7】 【後】
- ~~【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg（ヘルベッサール）~~
- ジルテック錠10→10mg（販売中止）
（【般】セチリジン塩酸塩錠10mgへ切替）
- 【般】シルデナフィル錠20mg：RE（レバチオ）

- シルニジピン錠10mg【JG】 【後】
（【般】シルニジピン錠10mgへ切替）
- 【般】シルニジピン錠10mg（アテレック錠）
- 【般】シルニジピン錠20mg（アテレック錠）
- 劇ジルムロ配合錠HD「武田パ」 【後】
（ザクラス配合錠HDから切替）
- 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg（プレタール）
- シロスタゾールOD錠50mg【サ4】 【後】
- ~~シロスタゾールOD錠100mg【サ4】~~ 【後】
（シロスタゾールOD錠50mg【サ4】へ切替）
- 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg（プレタール）
- 【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg（ユリーフOD）
- 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg（ユリーフOD）
- シンデレア細粒4mg→[4mg/P]
（【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包へ切替）
- シンデレアチュアブル錠5mg
（【般】モンテルカストチュアブル錠5mgへ切替）
- シンデレア錠10mg（【般】モンテルカスト錠10mgへ切替）
（2027年3月31日経過措置終了）
- 劇ジintas錠50mg
- シンバスタチン錠5mg【タカ】 【後】
- 【般】シンバスタチン錠5mg（リボバス）
- シンメトレル細粒10%（【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%へ切替）
シンメトレル錠50mg（アマンタジン塩酸塩錠50mg【サ4】へ切替）
（【般】アマンタジン塩酸塩錠50mgへ切替）
- 【ス】
脾外分泌機能検査用PFD内服液500mg→5%→[10mL/瓶]
- スイニー錠100mg
スインブロイク錠0.2mg
- スオード錠100 100mg
スーグラ錠50mg
- スクラルファート内用液10%【NIG】 [10mL/P] 【後】
- 【般】スクラルファート経口液10%
スージャヌ配合錠
- 劇スタラシドカプセル50 50mg
- スタレボ配合錠L 50
- スタレボ配合錠L 100
- 劇スチバーガ錠40mg
- ステララOD錠0.1mg
（【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mgへ切替）
- 劇スーテントカプセル12.5mg（【般】スニチニブカプセル12.5mgへ切替）
- 劇ストットサン錠200mg
ストミンA配合錠
- 劇ストラテラカプセル5mg（【般】アトモキセチンカプセル5mgへ切替）
- 劇ストラテラカプセル10mg（【般】アトモキセチンカプセル10mgへ切替）
- 劇ストラテラカプセル25mg（【般】アトモキセチンカプセル25mgへ切替）
- 劇ストラテラカプセル40mg（【般】アトモキセチンカプセル40mgへ切替）
- 劇ストラテラ内用液0.4%（【般】アトモキセチン経口液0.4%へ切替）
ストロカイン錠5mg
劇ストロメクトール錠3mg
- 【般】スニチニブカプセル12.5mg（スーテント）
スピラマイシン錠150万単位【サ4】
- スピロノラクトン錠25mg【ト7】 【後】
- 【般】スピロノラクトン錠25mg（アルダクトン）
- スピロベント錠10μg
- ズファジラン錠10mg
- ~~【般】ズプラタストトシル酸塩カプセル100mg（トPD）~~

劇スズリセル錠20mg（ダサチニブ錠20mg「NK」へ切替予定）
（【般】ダサチニブ錠20mgへ切替）
劇スズリセル錠50mg（ダサチニブ錠50mg「NK」へ切替予定）
（【般】ダサチニブ錠50mgへ切替）
●劇スマイラフ錠50mg
●劇スマイラフ錠100mg
●【般】スマトリプタン錠50mg（イミグラン）
●スリンダ錠28
○スルピリド錠50mg「アム」【後】
●【般】スルピリド錠50mg（ドグマチール）
●~~【般】スルピリド錠100mg~~（ドグマチール）
●~~【般】スルピリド錠200mg~~（ドグマチール）
【セ】
セイブル錠50mg（院内はミグリトール錠50mg「ト-7」）
（【般】ミグリトール錠50mgへ切替）
●セキノビット錠100mg
劇ゼジュール錠100mg
●ゼスラン小児用シロップ0.03%
●セタプリル錠25mg（【般】アラセプリル錠25mgへ切替）
ゼチーア錠10mg（エゼチミブ錠10mg「JG」へ切替）
（【般】エゼチミブ錠10mgへ切替）
●【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg（テシプール錠）
●【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%
●【般】セチリジン塩酸塩錠10mg（ジルテック）
●劇セディール錠10mg（院内はタドスピロクエン酸塩錠10mg「ト-7」）
（【般】タンドスピロクエン酸塩錠10mgへ切替）
●劇セディール錠20mg（【般】タドスピロクエン酸塩錠20mgへ切替）
向セニラン錠2mg—【後】—（プロマゼパム錠2mg「サド」へ名称変更）
（【般】プロマゼパム錠2mgへ切替）
●向セバゾン錠1 1mg
○劇セバミット細粒1% [10mg/1g/P] 【後】
（2023年3月現在,出荷停止）
（【般】ニフェジピン細粒1% 10mg/1g（包）へ切替）
●セファドール錠25mg（院内はジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」）
●セファランチン末1%
●劇ゼフィックス錠100 100mg
○セフカベン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」【後】（【般】なし）
●【般】セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg（フロモックス）
●【般】セフジニル細粒10%（セフゾン）
セフゾン細粒小児用10%—100mg/g
●セフゾンカプセル100mg（【般】加算なし）
●【般】セフボドキシムプロキセチルシロップ用5%（パナンD.S.）
●劇ゼボジアカプセル0.92mg
●劇ゼボジアカプセルスターターパック
劇セムブリックス錠20mg [25℃以下]
劇セムブリックス錠40mg [25℃以下]
●セラテ錠25mg（【般】エブレネン錠25mgへ切替）
セラテ錠50mg（エブレネン錠50mg「杏林」へ切替）
（【般】エブレネン錠50mgへ切替）
●【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg（セレクトール）
●劇セリンクロ錠10mg
向セルシン散1%
向2mgセルシン錠（院内はジアゼパム錠2mg「アム」）
（【般】ジアゼパム錠2mgへ切替）
向5mgセルシン錠（【般】ジアゼパム錠5mgへ切替）
劇セルセプトカプセル250 250mg
●セルテクトドライシロップ2%—20mg/g
—（【般】オキサトミドシロップ用2%へ切替）—

●セルテクト錠30—30mg—（【般】オキサトミド錠30mgへ切替）—
○劇セルトラリン錠25mg「アム」【後】
●【般】セルトラリン錠25mg（ジェイゾフト）
●【般】セルトラリン錠50mg（ジェイゾフト）
●セルニルトン錠 63mg
●セルベックス細粒10% [0.5g/P]
●セルベックスカプセル50mg（院内はテブレノンカプセル50mg「ト-7」）
劇ゼルヤンツ錠5mg
●セレキノン錠100mg
（【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mgへ切替）
●【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg（エフピー）
●劇セセクトール錠100mg
（【般】セリプロロール塩酸塩錠100mgへ切替）
●【般】セレコキシブ錠100mg（セレコックス）
○劇セレコキシブ錠100mg「JG」【後】
劇セセヨックス錠100mg—（セレコキシブ錠100mg「JG」へ切替）
セセジストO-D錠5mg（院内はタルチレリンO-D錠5mg「サイ」）
（【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mgへ切替）
●セセスタミン配合錠（院内はベタセレミン配合錠）
（【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠へ切替）
セレニカR顆粒40%
セレニカR錠200mg
●劇セセネース細粒1%（院内はハロペリドール細粒1%「ヨシミ」）
（【般】ハロペリドール細粒1%へ切替）
●劇セセネース錠0.75mg（院内はハロペリドール錠0.75mg「ヨシミ」）
（【般】ハロペリドール錠0.75mgへ切替）
●劇セセネース錠1mg（【般】ハロペリドール錠1mgへ切替）
●劇セセネース錠1.5mg（院内はハロペリドール錠1.5mg「ヨシミ」）
（【般】ハロペリドール錠1.5mgへ切替）
●劇セセネース錠3mg（【般】ハロペリドール錠3mgへ切替）
●劇セセネース内服液0.2%
●劇セロタメル細粒50%（【般】クエチアピン細粒50%へ切替）
●劇セロタメル25mg錠（院内はクエチアピン錠25mg「アム」）
（【般】クエチアピン錠25mgへ切替）
●劇セロタメル100mg錠（院内はクエチアピン錠100mg「アム」）
（【般】クエチアピン錠100mgへ切替）
●劇セロタメル200mg錠
（【般】クエチアピン錠200mgへ切替）
●セロクラール錠20mg
劇ゼローダ錠300—300mg（カベシタピン錠300mg「サイ」へ切替）
（【般】カベシタピン錠300mgへ切替）
ゼンタコートカプセル3mg
●【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包（アローゼン）
○センノシド錠12mg「ト-7」【後】
●【般】センノシド錠12mg（プルゼニド）
【ソ】
劇ゾコーバ錠125mg
劇ゾスバタ錠40mg
●向劇ソセゴン錠25mg
ソタコール錠40mg（【般】ソタロール塩酸塩錠40mgへ切替）
（ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」へ切替）
○ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」【後】
●【般】ソタロール塩酸塩錠40mg（ソタコール）
●劇ソーティクツ錠6mg
※劇ゾテピン錠25mg「効々」【後】（販売中止）
（ロドピン錠25mgへ切替）（2027年3月31日経過措置終了）
●【般】ゾテピン錠25mg（ロドピン）（2027年3月31日削除予定）
●【般】ゾニサミド散20%（エクセグラン）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

○劇ゾニサミド錠100mg「アム」 【後】
●劇【般】ゾニサミド錠100mg（エクセグラン）
●劇【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg：T R E（トレリーフOD）
●劇【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg：T R E（トレリーフOD）
●【般】ゾピクロン錠7.5mg（アモバン）
ゾピラックス顆粒40%（【般】アシクロビル顆粒40%へ切替）
●ゾピラックス錠200—200mg（【般】アシクロビル錠200mgへ切替）—
ゾフルーザ錠20mg
●劇ゾーミッドR-M錠2.5mg
（【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mgへ切替）
●向ソラナックス0.4mg錠（院内はアルプラゾラム錠0.4mg「ト7」）
ソランタール錠100mg
○ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ト7」 【後】
●【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg（ベシケア）
劇ゾランザカプセル100mg
○向ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サ7」 【後】
●【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg（マイスリー）
●【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg（マイスリー）
●【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg（マイスリー）
●【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg（ゾーミッドR-M）
【タ】
●ダイアート錠60mg（【般】アゾセミド錠60mgへ切替）
ダイアモックス錠250mg
●ダイオウ末
●劇タイケルブ錠250mg
太虎堂の芍婦調血飲エキス顆粒 [2.0g]EK-230
●【般】耐性乳酸菌散0.6%（ビオフェルミン）
●劇ダイドロネ錠200 200mg
ダイフェン配合顆粒
タウリン散98%「大正」
●劇ダオニール錠1.25mg
（【般】グリベンクラミド錠1.25mgへ切替）
●劇ダオニール錠2.5mg
（【般】グリベンクラミド錠2.5mgへ切替）
●タガメット錠200mg
（【般】シメチジン錠200mgへ切替）
劇ダクチル錠50mg
（【般】ピペリドレート塩酸塩錠50mgへ切替）
劇タグリッソ錠40mg
劇タグリッソ錠80mg
●【般】タクロリムスカプセル0.5mg（プログラフ）
●【般】タクロリムスカプセル1mg（プログラフ）
○劇タクロリムス錠0.5mg「ト7」 【後】
●【般】タクロリムス錠0.5mg
○劇タクロリムス錠1mg「ト7」 【後】
●【般】タクロリムス錠1mg
タケキャブOD錠10mg
タケキャブOD錠20mg
●タケブロンOD錠15mg
（院内はランソプラゾールOD錠15mg「サ7」）
（【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mgへ切替）
●タケブロンOD錠30—30mg
（【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mgへ切替）
●タケルダ配合錠
○劇ダサチニブ錠20mg「NK」 【後】
●【般】ダサチニブ錠20mg（スプリセル）
○劇ダサチニブ錠50mg「NK」 【後】
●【般】ダサチニブ錠50mg（スプリセル）

●劇タンデナカプセル150mg（【般】ニロチニブカプセル150mgへ切替）
劇タシグナカプセル200mg
（院外は【般】ニロチニブカプセル200mgへ切替）
●劇ターゼナカプセル0.25mg
●劇ターゼナカプセル1mg
●【般】タダラフィル錠2.5mg：Z A（ザルティア）
●【般】タダラフィル錠5mg：Z A（ザルティア）
○タダラフィル錠20mg A D「TE」 【後】
●【般】タダラフィル錠20mg：A D（アドシルカ）
タチオン錠100mg（【般】グルタチオン錠100mgへ切替）
劇タナドーパ顆粒75% [750mg/1g/P]
●タナトサル錠5mg（院内はイミダプリル塩酸塩錠5mg「オハ」）
（【般】イミダプリル塩酸塩錠5mgへ切替）
●【般】ダバグリフロジン錠5mg（フォシーガ）
●【般】ダバグリフロジン錠10mg（フォシーガ）
劇タバリス錠100mg
劇タフィンラーカプセル50mg
劇タフィンラーカプセル75mg
ダフクリア錠200mg
タブネオスカプセル10mg
●劇タプレクタ錠150mg
●劇タプレクタ錠200mg
劇ダーブロック錠2mg
劇ダーブロック錠4mg
※ タベジール錠1mg
タミフルドライシロップ3%
（【般】オセルタミビルシロップ用3%へ切替）
タミラルカプセル75—75mg（オセルタミビル錠75mg「サ7」へ切替）
（【般】オセルタミビルカプセル75mgへ切替）
○タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 【後】
●【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg（ハルナール）
●【般】タモキシフェン錠10mg（ノルバデックス）
●【般】タモキシフェン錠20mg（ノルバデックス）
○タモキシフェン錠20mg「サ7」 【後】
ドラシンカプセル150mg
●タリオン錠10mg（【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mgへ切替）
●タリオンOD錠5mg
（【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替）
タリオンOD錠10mg
（ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「ト7」へ切替）
（【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替）
●タリージェ錠2.5mg
●タリージェ錠15mg
●タリージェOD錠2.5mg
タリージェOD錠5mg
タリージェOD錠10mg
●タリージェOD錠15mg
劇タルグレンカプセル75mg
●劇タルセバ錠25mg（【般】エルロチニブ錠25mgへ切替）
※劇タルセバ錠100mg（【般】エルロチニブ錠100mgへ切替）
劇タルセバ錠150mg（【般】エルロチニブ錠150mgへ切替）
○タルチレリンOD錠5mg「サ7」 【後】
●【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg（セレジスト）
炭酸水素ナトリウム末
●【般】炭酸ランタン顆粒250mg（ホスレノール）
劇炭酸リチウム錠100mg「大正」 100mg 【後】
●【般】炭酸リチウム錠100mg（リーマス）

○劇炭酸リチウム錠200mg「大正」 200mg 【後】

● 【般】炭酸リチウム錠200mg（リーマス）
単シロップ（丸石）

○劇タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」 【後】

● 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg（セディール）

● 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠20mg（セディール）
ダントリウムカプセル25mg
タンニン酸アルブミン末
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末（タンニン酸アルブミンより切替）

●劇タンボコール細粒10%

●劇タンボコール錠50mg（フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」へ切替）
（【般】フレカイニド酢酸塩錠50mgへ切替）

【チ】

● 【般】チアブリド塩酸塩細粒10%（グラマリール）

○ チアブリド錠25mg「サリ」 【後】

● 【般】チアブリド塩酸塩錠25mg（グラマリール）

○ チアブリド錠50mg「サリ」 【後】

● 【般】チアブリド塩酸塩錠50mg（グラマリール）

●劇チオデロンカプセル5mg 【冷】
劇チガソнкаプセル10 10mg

○ チクロピジン塩酸塩錠100mg「トリ」 【後】（パナルジン）

● 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg（パナルジン）

○ チザニジン錠1mg「トリ」 【後】

● 【般】チザニジン錠1mg（テルネリン）

●劇チャンピックス錠0.5mg

●劇チャンピックス錠1mg
（0.5mg×11錠,1mg×14錠を「服用のしかた」が記載された
台紙にセットした「チャンピックス スタート用バック」もある。
処方時に「スタート用バック」とコメントを記載する）
調剤用パンビタン末

● チョコラＡ末1万単位/g

●劇チラーゼンＳ錠12.5μg
劇チラーゼンＳ錠25μg
劇チラーゼンＳ錠50μg
チロナミン錠5μg
沈降炭酸カルシウム末
沈降炭酸カルシウム「ケエ」粉末

○ 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 【後】

● 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)

【ツ】

ツイミーグ錠500mg
ツインラインNF 配合経腸用液 【A液200mL, B液200mL】
つくしA・M配合散 【1.3g/P】

劇ツートラム錠25mg
劇ツートラム錠50mg
劇ツートラム錠100mg

●劇ツートラム錠150mg
ツベルミン錠100mg
ツム 安中散エキス顆粒 【2.5g】5
ツム 茵陳蒿湯エキス顆粒 【2.5g】135
ツム 茵陳五苓散エキス顆粒 【2.5g】117
ツム 温経湯エキス顆粒 【2.5g】106
ツム 温清飲エキス顆粒 【2.5g】57
ツム 越婢加朮湯エキス顆粒 【2.5g】28
ツム 黄耆建中湯エキス顆粒 【3.0g】98
ツム 黄連解毒湯エキス顆粒 【2.5g】15

●ツム 黄連湯エキス顆粒 【2.5g】120
ツム 乙字湯エキス顆粒 【2.5g】3

ツム 葛根湯エキス顆粒 【2.5g】1
ツム 加味帰脾湯エキス顆粒 【2.5g】137
ツム 加味逍遙散エキス顆粒 【2.5g】24
ツム 甘麦大棗湯エキス顆粒 【2.5g】72
ツム 桔梗湯エキス顆粒 【2.5g】138
ツム 芎帰膠艾湯エキス顆粒 【3.0g】77
ツム 荊芥連翹湯エキス顆粒 【2.5g】50
ツム 桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒 【2.5g】134
ツム 桂枝加芍薬湯エキス顆粒 【2.5g】60
ツム 桂枝加朮附湯エキス顆粒 【2.5g】18
ツム 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 【2.5g】26
ツム 桂枝湯エキス顆粒 【2.5g】45
ツム 桂枝人参湯エキス顆粒 【2.5g】82
ツム 桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒 【2.5g】125
ツム 啓脾湯エキス顆粒 【2.5g】128
ツム 香蘇散エキス顆粒 【2.5g】70
ツム 五虎湯エキス顆粒 【2.5g】95
ツム 五積散エキス顆粒 【2.5g】63
ツム 牛車腎気丸エキス顆粒 【2.5g】107
ツム 呉茱萸湯エキス顆粒 【2.5g】31
ツム 五苓散エキス顆粒 【2.5g】17
ツム 柴陷湯エキス顆粒 【2.5g】73
ツム 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 【2.5g】12
ツム 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 【2.5g】11
ツム 柴胡桂枝湯エキス顆粒 【2.5g】10
ツム 柴朴湯エキス顆粒 【2.5g】96
ツム 柴苓湯エキス顆粒 【3.0g】114
ツム 三黄瀉心湯エキス顆粒 【2.5g】113
ツム 酸棗仁湯エキス顆粒 【2.5g】103
ツム 三物黄芩湯エキス顆粒 【2.5g】121
ツム 滋陰降火湯エキス顆粒 【2.5g】93
ツム 滋陰至宝湯エキス顆粒 【3.0g】92
ツム 四逆散エキス顆粒 【2.5g】35
ツム 七物降下湯エキス顆粒 【2.5g】46
ツム 四物湯エキス顆粒 【2.5g】71
ツム 炙甘草湯エキス顆粒 【3.0g】64
ツム 芍薬甘草湯エキス顆粒 【2.5g】68
ツム 十全大補湯エキス顆粒 【2.5g】48
ツム 十味敗毒湯エキス顆粒 【2.5g】6
ツム 潤腸湯エキス顆粒 【2.5g】51
ツム 小建中湯エキス顆粒 【2.5g】99
ツム 小柴胡湯エキス顆粒 【2.5g】9
ツム 小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 【2.5g】109
ツム 小青竜湯エキス顆粒 【3.0g】19
ツム 消風散エキス顆粒 【2.5g】22
ツム 辛夷清肺湯エキス顆粒 【2.5g】104
ツム 真武湯エキス顆粒 【2.5g】30
ツム 清上防風湯エキス顆粒 【2.5g】58
ツム 清暑益気湯エキス顆粒 【2.5g】136
ツム 清心蓮子飲エキス顆粒 【2.5g】111
ツム 清肺湯エキス顆粒 【3.0g】90
ツム 川芎茶調散エキス顆粒 【2.5g】124
ツム 疎経活血湯エキス顆粒 【2.5g】53

●ツム 大黄甘草湯エキス顆粒 【2.5g】84
ツム 大黄牡丹皮湯エキス顆粒 【2.5g】33
ツム 大建中湯エキス顆粒 【2.5g】100
ツム 大柴胡湯エキス顆粒 【2.5g】8
ツム 大承気湯エキス顆粒 【2.5g】133

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- ツム 竹茹温胆湯エキス顆粒 [2.5g]91
ツム 治打撲一方エキス顆粒 [2.5g]89
ツム 調胃承気湯エキス顆粒 [2.5g]74
ツム 釣藤散エキス顆粒 [2.5g]47
ツム 猪苓湯エキス顆粒 [2.5g]40
ツム 通導散エキス顆粒 [2.5g]105
ツム 桃核承気湯エキス顆粒 [2.5g]61
ツム 当帰飲子エキス顆粒 [2.5g]86
ツム 当帰建中湯エキス顆粒 [2.5g]123
ツム 当帰逆逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 [2.5g]38
ツム 当帰芍薬散エキス顆粒 [2.5g]23
ツム 当帰湯エキス顆粒 [2.5g]102
ツム ニホ湯エキス顆粒 [2.5g]88
ツム 女神散エキス顆粒 [2.5g]67
ツム 人参湯エキス顆粒 [2.5g]32
●ツム 人参養栄湯エキス顆粒 [3.0g]108
ツム 排膿散及湯エキス顆粒 [2.5g]122
ツム 麦門冬湯エキス顆粒 [3.0g]29
ツム 八味地黄丸エキス顆粒 [2.5g]7
ツム 半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]16
ツム 半夏瀉心湯エキス顆粒 [2.5g]14
●ツム 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 [2.5g]37
ツム 白虎加人參湯エキス顆粒 [3.0g]34
ツム 茯苓飲エキス顆粒 [2.5g]69
ツム 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]116
●ツム 平胃散エキス顆粒 [2.5g]79
ツム 防己黄耆湯エキス顆粒 [2.5g]20
ツム 防風通聖散エキス顆粒 [2.5g]62
ツム 補中益気湯エキス顆粒 [2.5g]41
ツム 麻黄湯エキス顆粒 [2.5g]27
ツム 麻黄附子細辛湯エキス顆粒 [2.5g]127
ツム 麻杏甘石湯エキス顆粒 [2.5g]55
ツム 麻杏薤甘湯エキス顆粒 [2.5g]78
ツム 麻子仁丸エキス顆粒 [2.5g]126
ツム 木防己湯エキス顆粒 [2.5g]36
ツム 薏苡仁湯エキス顆粒 [2.5g]52
ツム 抑肝散エキス顆粒 [2.5g] 54
ツム 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 [2.5g]83
ツム 六君子湯エキス顆粒 [2.5g]43
ツム 立効散エキス顆粒 [2.5g]110
ツム 竜胆瀉肝湯エキス顆粒 [2.5g]76
ツム 苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 [2.5g]119
ツム 苓姜朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]118
ツム 苓桂朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]39
ツム 六味丸エキス顆粒 [2.5g]87
劇ツルバダ配合錠
●【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1%（ホクナリン）
（2027年3月31日削除予定）
【テ】
劇ディアコミットドライシロップ分包250mg
劇ティーエスワン配合顆粒 T 20 [20mg/P]
（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）
劇ティーエスワン配合顆粒 T 25 [25mg/P]
（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）
●劇ティーエスワン配合OD錠T20—（20mgテガファール相当量）—
（院内はエスワンタイホウ配合OD錠T20）
（【般】テガファール20mg・ギメラシル・オタラシル配口腔内崩壊錠へ切替）

- 劇ティーエスワン配合OD錠T25—（25mgテガファール相当量）—
（院内はエスワンタイホウ配合OD錠T25）
（【般】テガファール25mg・ギメラシル・オタラシル配口腔内崩壊錠へ切替）
●デオオパン錠40mg（院内はバルサルタン錠40mg「サリ」）
（【般】バルサルタン錠40mgへ切替）
デオオパン錠80mg
（【般】バルサルタン錠80mgへ切替）
●デオオパン錠160mg
（【般】バルサルタン錠160mgへ切替）
●デオオパンOD錠40mg
（【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mgへ切替）
●デオオパンOD錠80mg
（【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mgへ切替）
●デオオパンOD錠160mg
（【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mgへ切替）
ディナゲスト錠0.5mg（ジェノゲスト錠0.5mg「フダ」へ切替）
（【般】ジェノゲスト錠0.5mgへ切替）
●ディナゲスト錠1mg（【般】ジェノゲスト錠1mgへ切替）
劇ティブソボ錠250mg
●ディレダラ配合錠
（【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠へ切替）
デエビゴ錠2.5mg
デエビゴ錠5mg
●デエビゴ錠10mg
●テオドール錠100mg（院内はテオフィリン徐放錠100mg「サリ」）
○劇テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サリ」【後】
○劇テオフィリン徐放ドライシロップ20%「サリ」—【後】—（販売中止）
（テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サリ」へ切替）
劇テオフィリン錠200mg「フキ」
（【般】テオフィリン徐放錠200mg（12～24時間持続）へ切替）
○テオフィリン徐放錠100mg「サリ」【後】
●—【般】テオフィリン徐放錠100mg（12～24時間持続）—（テオドール）
●劇【般】テオフィリン徐放錠200mg（12～24時間持続）（テオドール）
○劇テオフィリン徐放U錠200mg「トワ」【後】
●【般】テオフィリン徐放錠200mg（24時間持続）（ユニフィルL A）
●【般】テオフィリンシロップ用20%（テオドールドライシロップ）
デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
●—【般】テガファール20mg・ギメラシル・オタラシル配合顆粒（ティーエスワン）
●—【般】テガファール25mg・ギメラシル・オタラシル配合顆粒（ティーエスワン）
●【般】テガファール20mg・ギメラシル・オタラシル配合口腔内崩壊錠（ティーエスワン）
●【般】テガファール25mg・ギメラシル・オタラシル配合口腔内崩壊錠（ティーエスワン）
●—【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩散10%（メジコン）
○デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」【後】
（院外は【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mgへ切替）
●【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg（メジコン）
テクフィデラカプセル120mg
●テクフィデラカプセル240mg
テグレートール細粒50%（【般】なし）
（カルバマゼピン細粒50%「アム」へ切替）
テグレートール錠100mg
テグレートール錠200mg
●デザレックス錠5mg（【般】デスロラタジン錠5mgへ切替）
劇デシコビ配合錠L T
劇デシコビ配合錠H T
●劇テンデール錠1mg（【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mgへ切替）
●劇デジレル錠25—25mg（【般】トラゾドン塩酸塩錠25mgへ切替）
●【般】デスロラタジン錠5mg（デザレックス）

デソパン錠60mg
● デタントール錠1mg
● デタントールＲ錠3mg
テトラミド錠10mg
● テトラミド錠30mg
● テネリア錠40mg
テネリアＯＤ錠20mg
● テネリアＯＤ錠40mg
劇テノゼット錠300mg
デノタスチュアブル配合錠
○ デノパミン錠10mg「日医工」 【後】
● 【般】デノパミン錠10mg（カルグート）
テノミン錠50 50mg（【般】アテノロール錠50mgへ切替）
● デバケン細粒40%（【般】なし）
● デバケン錠200mg（【般】なし）
デバケンＲ錠100mg
（バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg「トワ」へ切替）
デバケンＲ錠200mg
（バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トワ」へ切替）
● デバケンシロップ5%（院内はバルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」）
向デバス細粒1%
（【般】エチゾラム細粒1%へ切替）
● 向デバス錠0.5mg（院内はエチゾラム錠0.5mg「EMEC」）
劇テビケイ錠50mg
● ~~【般】デフェラシロクス顆粒90mg（ジャドニュ）~~
● 【般】デフェラシロクス顆粒360mg（ジャドニュ）
● 劇テプミトコ錠250mg
● ~~【般】テプレノン細粒10%—0.5g/包（セルベックス）~~
○ テプレノンカプセル50mg「トワ」 【後】
● ~~【般】テプレノンカプセル50mg（セルベックス）~~
● デプロメール錠25—25mg
（院内はフルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」）
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替）
● デプロメール錠50—50mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替）
● デプロメール錠75—75mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替）
デベルザ錠20mg
劇デムサーカプセル250mg
○ テモカプリル塩酸塩錠2mg「サリ」 【後】
● 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg（エースコール）
○ 毒テモゾロミド錠20mg「NK」 【後】
● 毒【般】テモゾロミド錠20mg（テモダール）
○ 毒テモゾロミド錠100mg「NK」 【後】
● 毒【般】テモゾロミド錠100mg（テモダール）
毒テモダールカプセル20mg（テモゾロミド錠20mg「NK」へ切替）
毒テモダールカプセル100mg（テモゾロミド錠100mg「NK」へ切替）
デュオドーパ配合経腸用液 [100mL/セット] [2～8℃]
● 【般】デュタステリドカプセル0.5mg：A V（アボルブカプセル）
● デュファストン錠5mg
● 劇【般】デュロキセチンカプセル20mg（サインバルタ）
○ 劇デュロキセチンＯＤ錠20mg「コフ」 【後】
（サインバルタカプセル20mgから切替）
（【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mgへ切替）
● 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg（サインバルタ）
→○ 劇テラムロ配合錠A P「コフ」 【後】
（テラムロ配合錠A P「コフ」がなくなり次第切替）

※劇テラムロ配合錠A P「コフ」 【後】（販売中止）
（テラムロ配合錠A P「EE」へ切替予定）
（【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠へ切替）
○ 劇テルギンGドライシロップ0.1%—【後】—
（クレマスチンD S 0.1%「効効」へ名称変更）
（【般】クレマスチンシロップ用0.1%へ切替）
※○ テルチア配合錠A P「トワ」 【後】（販売中止）
（テルチア配合錠A P「日医工」へ切替予定）
→○ テルチア配合錠A P「日医工」 【後】
（テルチア配合錠A P「トワ」がなくなり次第切替）
● 劇デルティバ錠50mg
テルネサン錠1mg（チザニジン錠1mg「トワ」へ切替）
（【般】チザニジン錠1mgへ切替）
● 劇テルバンズD-S 20%—【後】—
（【般】テオフィリンシロップ用20%へ切替）
○ テルピナフィン錠125mg「VTRS」 【後】
● 【般】テルピナフィン錠125mg（ラミシール）
○ テルミサルタン錠40mg「コフ」—【後】—（販売中止）
○ テルミサルタン錠40mg「日医工」 【後】
● 【般】テルミサルタン錠40mg（ミカルディス）
● 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠（ミカムロA P）
● 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロコルチゾン配合錠（ミコンビA P）
● 【般】テルミサルタン錠80mg（ミカルディス）
● 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠（ミカムロB P）
● 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロコルチゾン配合錠（ミコンビB P）
【ト】
○ 劇トアラセット配合錠「日新」 【後】
（【般】トラマドール・アセトアミノフェンへ切替）
劇ドウベイト配合錠
トウモロコシデンブン末
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒 [2.0g]TY-026
● [東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒 [2.0g]TY-027
● [東洋]四君子湯エキス細粒 [2.0g]TY-054
○ ドキサゾシン錠1mg「コフ」—【後】—
（院内はドキサゾシン錠1mg「コフ」へ切替）
○ ドキサゾシン錠1mg「コフ」 【後】
● 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg（カルデナリン）
● 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg（カルデナリン）
○ ドキサゾシン錠4mg「コフ」 【後】
● 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠4mg（カルデナリン）
● 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg（カルデナリン）
劇ドグマチール細粒50%
● ドグマチール錠50mg（【般】スルピリド錠50mgへ切替）
● 劇ドグマチール錠100mg
● 劇ドグマチール錠200mg
○ トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツハラ」 【後】
● 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒20%（ユベラ）
○ トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トワ」 【後】
● 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg（ユベラ）
● 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg（ユベラN）
● 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%（オゼックス）
● ~~【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg（オゼックス）~~
トチモトのコウジン末A M
トチモトのダイオウ末
○ 劇ドネベジル塩酸塩O D錠5mg「明治」 【後】
● 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg（アリセプト）
● 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg（アリセプト）
● 【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg（アリセプト）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- 【般】ドネベジル塩酸塩錠3mg（アリセプト）
- 【般】ドネベジル塩酸塩錠5mg（アリセプト）
- ドパコール配合錠L 100 【後】
ドバストン散98.5%
トピエース錠4mg
（院外は【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mgへ切替）
- トピエース錠8mg
（【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠8mgへ切替）
- トピナ細粒10%
- ※ トピナ錠50mg（トピラマート錠50mg「アメル」へ切替）
（【般】トピラマート錠50mgへ切替）
- トピナ錠100mg
→ トピラマート錠50mg「アメル」（トピナ錠50mgが無くなり次第切替）
- 【般】トピラマート錠50mg（トピナ）
- 【般】トピラマート錠100mg（トピナ）
- 【般】トフィソパム錠50mg（グランダキシン）
ドプスOD錠100mg（【般】なし）
- ドプテレット錠20mg
- トフラニール錠10mg
トフラニール錠25mg
- ナライコア錠80mg（【般】フェノフィブラート錠80mgへ切替）
劇トラクリア錠62.5mg（【般】ボセンタン錠62.5mgへ切替）
- トラセミドOD錠8mg「TE」 【後】
- 【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg（ルブラック）
トラゼンタ錠5mg
劇トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 【後】
- ~~【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg（デジレル、レスリン）~~
- ~~劇トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」~~ 【後】
- 【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg（デジレル、レスリン）
- トラディアンス配合錠A P
- トラディアンス配合錠B P
- トラニラストカプセル100mg「トリ」 【後】
- ~~【般】トラニラストカプセル100mg（リザベン）~~
- トラネキサム酸カプセル250mg「トリ」 【後】
- 【般】トラネキサム酸カプセル250mg（トランサミン）
- 【般】トラネキサム酸シロップ5%（トランサミン）
- 【般】トラビジル錠100mg（ロコルナール）
トラベルミン配合錠
- 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠（トラムセット）
- 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg（トラマール）
- 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg（トラマール）
- 劇トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 【後】
劇トラマールOD錠25mg
（トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」へ切替）
（【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mgへ切替）
- 劇トラマールOD錠50mg
（【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mgへ切替）
劇トラムセット配合錠（院内はトラアセット配合錠「日新」）
- 向ドラー錠15-15mg（【般】クアゼバム錠15mgへ切替）
- ナランサミンカプセル250mg
（院内はトラネキサム酸カプセル250mg「トリ」）
（【般】トラネキサム酸カプセル250mgへ切替）
トランサミンシロップ5%
（【般】トラネキサム酸シロップ5%へ切替）
劇ランデート錠50mg
- 【般】トリアゾラム錠0.25mg（ハルシオン）
劇トリクロリールシロップ10% 「冷」
- トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 【後】

- 【般】トリクロルメチアジド錠2mg（フルイトラン）
トリブタノール錠10 10mg
- トリブタノール錠25 25mg
- 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%（アーテン）
劇トリメク配合錠
- ~~ナサメブチンマレイン酸塩錠100mg「サリ」~~ 【後】
- 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg（セレキノン）
劇トリンテリックス錠10mg
- 劇トルカブ錠160mg
- 劇トルカブ錠200mg
- 劇トルバプタンOD錠3.75mg「TE」 【後】
（院外は【般】トルバプタン口腔内崩壊錠3.75mgへ切替）
- ○ 劇トルバプタンOD錠7.5mg「オツカ」 【後】
（サムスカOD錠7.5mgと適応が揃うまで切替を保留）
- 【般】トルバプタン顆粒1%（サムスカ）
- 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠3.75mg（サムスカ）
- 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg（サムスカ）
- 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg（サムスカ）
- 劇トレドミン錠15mg（【般】ミルナシبران塩酸塩錠15mgへ切替）
- 劇トレドミン錠25mg（【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mgへ切替）
- 劇トレドミン錠50mg（【般】ミルナシبران塩酸塩錠50mgへ切替）
- 【般】トレミフェン錠40mg（フェアストン）
トレランG液50g [150mL/瓶]（産婦人科外来専用払出し）
トレランG液75g [225mL/瓶]
劇トレリーフOD錠25mg
（【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg：TREへ切替）
- 劇トレリーフOD錠50mg
（【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg：TREへ切替）
- ~~【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg（ドプス）~~
- 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg（ドプス）
- 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg（ドプス）
- 【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg（ドプス）
- 【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg（ナウゼリン）
- ~~【般】ドンペリドン錠5mg（ナウゼリン）~~
- 【般】ドンペリドンシロップ用1%（ナウゼリン）
- ドンペリドン錠10mg「サリ」 【後】
- 【般】ドンペリドン錠10mg（ナウゼリン）
- 【ナ】
ナイキサン錠100mg
ナウゼリンドライシロップ1%
（【般】ドンペリドンシロップ用1%へ切替）
- ナウゼリン錠5 5mg
- ~~ナウゼリンOD錠10mg（院内はドンペリドン錠10mg「サリ」）~~
（【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
- 劇ナゼアOD錠0.1mg
- ナディック錠30mg
- ~~【般】ナテグリニド錠30mg（スターシス）~~
- 【般】ナテグリニド錠90mg（スターシス）
- ナトリックス錠1 1mg
- 劇ナフトジール錠2-2mg 【後】（【般】ニルバジピン錠2mgへ切替）
- ナフトビジルOD錠25mg「効効」 【後】
- 【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg（フリバス）
- 【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg（フリバス）
- 劇ナポールSRカプセル37.5-37.5mg
（【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mgへ切替）
- 【般】ナラトリブタン錠2.5mg（アマージ）
麻劇ナルサス錠2mg
麻劇ナルサス錠6mg

麻劇ナルサス錠12mg
麻劇ナルサス錠24mg

- ナルティークOD錠75mg
- 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg（レミッチ）
- 【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg（レミッチ）

麻劇ナルラビド錠1mg
麻劇ナルラビド錠2mg
麻劇ナルラビド錠4mg

【ニ】

- ~~【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg（ベルジピンLA）~~
- ~~【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg（ベルジピンLA）~~
- ニコランジル錠5mg「サリ」 【後】
- ~~【般】ニコランジル錠5mg（シグマート）~~
- ~~ニザチジンカプセル75mg「サリ」 【後】~~
- ~~【般】ニザチジンカプセル75mg（アシノン）~~
- ~~ニザチジンカプセル150mg「サリ」 【後】~~
- 【般】ニザチジンカプセル150mg（アシノン）
- ~~【般】ニザチジン錠75mg（アシノン）~~
- ニセルゴリン錠5mg「トワ」 【後】（サアミオン錠5mgから切替）
- 【般】ニセルゴリン錠5mg（サアミオン）
- ニッパスカルシウム顆粒100%
- ~~【般】ニトラゼパム細粒1%（ベンザリン）~~
- 【般】ニトラゼパム錠5mg（ベンザリン）
- ~~【般】ニトレンジピン錠10mg（パイロテンシン）~~
- 劇ニトロペン舌下錠0.3mg 【後】
- 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg
- ニトロールRカプセル20mg
（【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mgへ切替）
- ~~ニルバジール錠4mg（【般】ニルバジピン錠4mgへ切替）~~
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠10mg（12時間持続）（アダラートL）~~
劇ニフェジピンL錠20mg「サリ」 【後】
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠20mg（12時間持続）（アダラートL）~~
- 劇ニフェジピンCR錠10mg「サリ」 【後】
- ~~劇ニフェジピンCR錠20mg「サリ」 【後】~~
（ニフェジピンCR錠10mg「サリ」へ切替）
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠10mg（24時間持続）（アダラートCR）~~
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）（アダラートCR）~~
- ~~【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（アダラートCR）~~
- 【般】ニフェジピン細粒1% 10mg/1g（包）（セバミット）
- ニフレック配合内用剤 [137.155g/プラスチックバッグ]
乳酸カルシウム「ケン」 [1g/P]
（乳酸カルシウム水和物「ケン」原末へ名称変更）
乳酸カルシウム水和物「ケン」原末
（乳酸カルシウム「ケン」より名称変更）
乳糖水和物「シエ」
乳糖水和物（粉末）（院内製剤原料）
- 劇ニューベクオ錠300mg
- 劇ニューレプチル細粒10%
- ニューロタン錠25mg（院内はロサルタンK錠25mg「トワ」）
（【般】ロサルタンK錠25mgへ切替）
- ニューロタン錠50mg（【般】ロサルタンK錠50mgへ切替）
- ~~【般】ニルバジピン錠2mg（ニバジール）~~
- 【般】ニルバジピン錠4mg（ニバジール）
- 【般】ニロチニブカプセル150mg（タシグナ）
- 【般】ニロチニブカプセル200mg（タシグナ）

毒ニンラーロカプセル2.3mg
毒ニンラーロカプセル3mg
毒ニンラーロカプセル4mg

【ネ】

- ネイリンカプセル100mg
- ~~ネオドパストン配合錠100（院内はドパコール配合錠L100）~~
（【般】レポドバ100mg・カルビドバ配合錠へ切替）
- ~~ネオマレセルミンTR錠6mg 【後】~~
（d-α-クロルフェニジマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」へ名称変更）
（【般】d-α-クロルフェニジマレイン酸塩徐放錠6mgへ切替）
- 劇ネオオール10mgカプセル（院内はシクロスポリンカプセル10mg「トワ」）
（【般】シクロスポリンカプセル10mg：NEへ切替）
- 劇ネオオール25mgカプセル（院内はシクロスポリンカプセル25mg「トワ」）
（【般】シクロスポリンカプセル25mg：NEへ切替）
- 劇ネオオール50mgカプセル（院内はシクロスポリンカプセル50mg「トワ」）
（【般】シクロスポリンカプセル50mg：NEへ切替）
- 劇ネオオール内用液10% [50mL]
ネキシウムカプセル10mg
（エソメプラゾールカプセル10mg「トワ」へ切替）
（【般】エソメプラゾールカプセル10mgへ切替）
- ネキシウムカプセル20mg
（【般】エソメプラゾールカプセル20mgへ切替）
- ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
- 劇ネクスバール錠200mg
ネクセトール錠180mg
- ネシーナ錠6.25mg
- ネシーナ錠12.5mg
ネシーナ錠25mg

【ノ】

- ~~ノイキナ錠10mg（院内はユビデカレノン錠10mg「トワ」）~~
（【般】ユビデカレノン錠10mgへ切替）
- ノイロトロピン錠4単位
- ノイロビタン配合錠
- ノウリアスト錠20mg
- 劇ノクサフィル錠100mg
- ノバミン錠5mg
- 劇ノービア錠100mg
- ~~ノベルジン錠25mg（酢酸亜鉛錠25mg「サリ」へ切替）~~
（【般】酢酸亜鉛錠25mgへ切替）
- 劇ノベルジン錠50mg（【般】酢酸亜鉛錠50mgへ切替）
- 【般】ノルエチステロン・エチルエストラジオール0.02配合錠（ルナベルULD）
- 【般】ノルエチステロン・エチルエストラジオール0.035配合錠（ルナベルLD）
- 劇ノルバスク錠2.5mg
- 劇ノルバスク錠5mg
- ~~劇ノルバスタOD錠2.5mg~~
- ~~劇ノルバスタOD錠5mg~~
- ~~ノルバデックス錠10mg（【般】タモキシフェン錠10mgへ切替）~~
~~ノルバデックス錠20mg（タモキシフェン錠20mg「サリ」へ切替）~~
（【般】タモキシフェン錠20mgへ切替）
- ノルレボ錠1.5mg

【ハ】

- バイアグラ錠50mg
[男性不妊の治療目的で処方された場合のみ保険適用]
- バイアスピリン錠100mg 【後】
（【般】アスピリン腸溶錠100mgへ切替）
- ハイシー顆粒25% [250mg/1g/P]
劇ハイドレアカプセル500mg
- 劇ハイベン錠200mg（院内はエトドラク錠200mg「SW」）
- ~~ハイボン錠20mg（【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mgへ切替）~~
劇ハイヤスタ錠10mg

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- バイロテンシン錠10mg
- 劇バキシル錠5mg（【般】パロキセチン錠5mgへ切替）
- 劇バキシル錠10mg（【般】パロキセチン錠10mgへ切替）
- 劇バキシル錠20mg（【般】パロキセチン錠20mgへ切替）
劇バキシルC R錠12.5mg
- 劇バキシルC R錠25mg
劇バキロピッドパック300 1シート
劇バキロピッドパック600 1シート
小児用バクシダール錠50mg
- バクタ配合錠（院内はダイフェン配合錠）
- 【般】パゼドキシフェン錠20mg（ビピアント）
パセトシン細粒10%→100mg/g（ワイドシリン細粒20%へ切替）
- 日本薬局方ハチミツ
ハッカ水「ケエ」
ハッカ油「ニコ」（製剤原料）
バップフォー錠10→10mg
（【般】プロピベリン塩酸塩錠10mgへ切替）
- バナルジン錠100mg（院内はチクロピジン塩酸塩錠100mg「ト」）
（【般】チクロピジン塩酸塩錠100mgへ切替）
- バナンドライシロップ5%→50mg/g
（【般】セフボドキシムプロキセチルシロップ用5%へ切替）
劇ハーフジゴキシンK Y錠0.125 0.125mg
- 劇バフェオ錠150mg
- 劇バフェオ錠300mg
- ハーボニー配合錠
劇バタラード錠0.5mg（エンテカビルOD錠0.5mg「サ」へ切替）
（【般】エンテカビル錠0.5mgへ切替）
- ~~【般】パラシクロピル錠500mg~~（パルトレックス）
- バラシクロピル錠500mg「ト」 【後】
- 【般】パラシクロピル錠500mg（パルトレックス）
- 劇バミジンカプセル300mg
バサエット錠5mg（ラベプラゾールNa錠5mg「YD」へ切替）
（【般】ラベプラゾールNa錠5mgへ切替）
- バサエット錠10mg（院内はラベプラゾールNa錠10mg「ト」）
（【般】ラベプラゾールNa錠10mgへ切替）
- バサエット錠20mg（【般】ラベプラゾールNa錠20mgへ切替）
- 毒バリキサドライシロップ5000mg
毒バリキサ錠450mg
- 劇ハリゾンシロップ100mg/mL [24mL] 【後】
バリトップHD [400g/本]
- 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠（エクスフォージ）
- 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠（エクスフォージ）
- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg（ディオバン）
- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg（ディオバン）
- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mg（ディオバン）
- バルサルタン錠40mg「サ」 【後】
- バルサルタン錠40mg「日新」→【後】
（バルサルタン錠40mg「サ」へ切替）
- 【般】バルサルタン錠40mg（ディオバン）
- バルサルタン錠80mg「日新」→【後】
- 【般】バルサルタン錠80mg（ディオバン）
- 【般】バルサルタン錠160mg（ディオバン）
- 【般】バルサルタン・ヒドロクロチアジド 12.5mg配合錠（コディオEX）
- 向ハルシオン0.125mg錠
- 向ハルシオン0.25mg錠（【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替）
パルトレックス顆粒50%
- バルトレックス錠500mg（院内はバラシクロピル錠500mg「ト」）
（【般】バラシクロピル錠500mgへ切替）

- ハルナールD錠0.2mg
（院内はタムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」）
（【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mgへ切替）
- パルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 500mL瓶 【後】
- ~~【般】パルプロ酸Na細粒40%（デパケン）~~
- ~~【般】パルプロ酸Na錠200mg（デパケン）~~
- ~~【般】パルプロ酸Na徐放顆粒40%（デパケンR、セレニカR）~~
パルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg「ト」 【後】
- ~~【般】パルプロ酸Na徐放錠100mg（デパケンR、セレニカR）~~
パルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「ト」 【後】
- ~~【般】パルプロ酸Na徐放錠200mg（デパケンR、セレニカR）~~
- ~~【般】パルプロ酸Naシロップ5%（デパケン）~~
- パルモディア錠0.1mg
パルモディアXR錠0.2mg
- パルモディアXR錠0.4mg
- 向ハルラック錠0.25mg→【後】（【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替）
- ~~パレリシンシロップ5%→【後】~~
（【般】パルプロ酸Naシロップ5%へ切替）
（パルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」へ名称変更）
- 【般】パロキセチン錠5mg（バキシル）
- 【般】パロキセチン錠10mg（バキシル）
- 【般】パロキセチン錠20mg（バキシル）
劇パーロデル錠2.5mg
（【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mgへ切替）
- 劇ハロペリドール細粒1%「ヨ」 【後】
- 【般】ハロペリドール細粒1%（セレネース）
- 劇ハロペリドール錠0.75mg「ヨ」 【後】
- 【般】ハロペリドール錠0.75mg（セレネース）
- 【般】ハロペリドール錠1mg（セレネース）
- 劇ハロペリドール錠1.5mg「ヨ」 【後】
- 【般】ハロペリドール錠1.5mg（セレネース）
- 【般】ハロペリドール錠3mg（セレネース）
パンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
- 【般】パンテチン散20%（パントシン）
- ~~パントシン散20%→（パ）~~
【ヒ】
- ~~ピオグリタゾンシロップ65%→500mL→【後】~~
（ラクツロースシロップ65%「効」へ名称変更）
（【般】ラクツロースシロップ65%へ切替）
脾外分泌機能検査用PFD内服液500mg→5%→[10mL/瓶]
PL配合顆粒 [1g/P]
（【般】プロメタジン1.35%等配合非βリ系感冒剤 1g/包へ切替）
幼児用PPL配合顆粒→[1g/P]
- ピオグリタゾンOD錠15mg「メ」 【後】
（ピオグリタゾンOD錠15mg「ト」（販売中止）が無くなり次第切替）
（院外は【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mgへ切替）
- ※ ピオグリタゾンOD錠15mg「ト」 【後】（販売中止）
（ピオグリタゾンOD錠15mg「メ」へ切替）
- 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg（アクトス）
- 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg（アクトス）
ピオスリー配合OD錠
ピオチン散0.2%「サ」
- ピオフェルミン散剤 【後】
- ピオフェルミンR散 【後】（【般】耐性乳酸菌散0.6%へ切替）
ピオフェルミン錠剤 【後】（【般】ピフィズ菌錠12mgへ切替）
- ビカルタミドOD錠80mg「サ」 【後】
- 劇ビカルタミドOD錠80mg「ト」→【後】（販売中止）
（2027年3月31日経過措置終了）

- 【般】ピカルタミド口腔内崩壊錠80mg（カソデックス）
劇ピクトルビ配合錠
- ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 [10mL/瓶] 【後】
- 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL（ラクソベロン）
- ~~【般】ピコスルファートNa錠2.5mg（ラクソベロン）~~
劇ピ・シフロール錠0.125mg
（【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mgへ切替）
劇ピ・シフロール錠0.5mg
（【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mgへ切替）
ビジクリア配合錠 [50錠/瓶]
- セスロリンH錠200mg
（【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mgへ切替）
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サリ」 【後】 （【般】なし）
- ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ト」 【後】
- 【般】ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg（メインテート）
- 【般】ピソプロロールフマル酸塩錠5mg（メインテート）
- ビタバスタチンCa・OD錠2mg「ト」 【後】
- 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg（リパロ）
- 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg（リパロ）
- 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg（リパロ）
- ベタメゾン配合カプセルB25・25mg（B1と七で）
（【般】ベンゾアミン25mg（B1）・B6・B12配合カプセルへ切替）
- ヒダントール錠25mg
ピドキシール錠10mg（ピリドキシール錠10mg「サリ」へ切替）
（【般】ピリドキシールリン酸エステル錠10mgへ切替）
- ビートル顆粒分包250mg
- ビートルチュアブル錠250mg
- 毒ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サリ」 【後】
（【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg（院外は）へ切替）
- 毒【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg（プラケニル）
覚劇ビバンセカプセル20mg
覚劇ビバンセカプセル30mg
- ゼピアメント錠20mg（【般】バゼドキシフェン錠20mgへ切替）
- 【般】ビフィズス菌錠12mg（ビオフェルミン）
ビフェルトロ錠100mg
- ビプラマイシン錠100mg
劇ビプレッソ徐放錠50mg
- 劇ビプレッソ徐放錠150mg
- ~~ゼベリデン塩酸塩細粒1%「アム」【後】~~
- 【般】ベペリデン塩酸塩細粒1%（アキネトン）
ビフェルトロ錠100mg
- ビペリデン塩酸塩錠1mg「アム」 【後】
- 【般】ベペリデン塩酸塩錠1mg（アキネトン）
- 【般】ベペリドレート塩酸塩錠50mg（ダクテル）
- 劇ヒボカ5mgカプセル
- 劇ヒボカ15mgカプセル
劇ビムパット錠50mg（院外は【般】ラコサミド錠50mgへ切替）
- 劇ビムパット錠100mg（【般】ラコサミド錠100mgへ切替）
劇ビムパットドライシロップ10%
（院外は【般】ラコサミドシロップ用10%へ切替）
- ビモベンダン錠1.25mg「TE」 【後】
- 【般】ビモベンダン錠1.25mg（アカルディ）
- ビヨントラ錠400mg
- 【般】ピラスチン口腔内崩壊錠20mg（ピラノア）
ピラノアOD錠20mg
（院外は【般】ピラスチン口腔内崩壊錠20mgへ切替）
劇ピラフトピカプセル50mg
ピラマイド原末
劇ピリアーノ錠300mg
- ~~ピリドキシール錠10mg「サリ」【後】~~
- ~~ピリドキシール錠10mg「サリ」【後】~~（供給停止）
（ピリドキシール錠10mg「サリ」へ切替）
- 【般】ピリドキシールリン酸エステル錠10mg（ピドキシール）
- 劇ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「ト」 【後】
- 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg（サンリズム）
- ビルダグリブチン錠50mg「ト」
- 【般】ビルダグリブチン錠50mg（エクア）
- 【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠
（エクメット配合錠LD）
- 【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠
（エクメット配合錠HD）
- ビルタサ懸濁用散分包8.4g [2～8℃]
ピルトサシド錠600mg
- 劇ヒルナミン細粒10%
ヒルナミン錠(5mg)
ヒルナミン錠(25mg)
（【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mgへ切替）
- ピルフェニドン錠200mg「日医工」 【後】
- 【般】ピルフェニドン錠200mg（ピレスパ）
劇ピレスパ錠200mg（ピルフェニドン錠200mg「日医工」へ切替）
（【般】ピルフェニドン錠200mgに切替）
- 劇ピレチア細粒10%
ピレチア錠(25mg)
- 【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg（ガストロゼピン）
劇ピンダケルカプセル20mg
- 劇ピンマックカプセル61mg
- 【フ】
劇ファダプス錠10mg
劇ファビハルタカプセル200mg
- 【般】ファムシクロビル錠250mg（ファムビル）
- ~~ファムビル錠250mg~~（【般】ファムシクロビル錠250mgへ切替）
- ファモチジン散2%「ト」 [0.5g/P] 【後】
- 【般】ファモチジン散2% 0.5g/包（ガスター）
- ファモチジンOD錠10mg「ト」 【後】
- ~~ファモチジンOD錠20mg「ト」【後】~~
- ~~【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg（ガスター）~~
- ~~【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg（ガスター）~~
- ファロムドライシロップ小児用10% 100mg/g
ファロム錠200mg
- ~~フィコンパ細粒1%（【般】ペランパネル細粒1%へ切替）~~
フィコンパ錠2mg（院外は【般】ペランパネル錠2mgへ切替）
フィコンパ錠4mg（院外は【般】ペランパネル錠4mgへ切替）
- 【般】フィトナジオン錠5mg（ケーワン）
- ※劇ブイフェンドドライシロップ2800mg [2～8℃]
（ポリコナゾール顆粒20%「タタ」へ切替）
劇ブイフェンド錠50mg（ポリコナゾール錠50mg「ト」へ切替）
劇ブイフェンド錠200mg（ポリコナゾール錠200mg「ト」へ切替）
- 【般】フィンゴリモドカプセル0.5mg（イムセラ）
劇フィンテプラ内用液2.2mg/mL
- 劇フェアストーン錠40～40mg（【般】トレミフェン錠40mgへ切替）
- 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg（アレグラ）
- フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ト」 【後】
- 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg（アレグラ）
- 【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠（デイルグラ）
- 【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg（トビエース）
- 【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠8mg（トビエース）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

向劇フェノパール散10%
向劇フェノパールエリキシル0.4%
○ フェノフィブラート錠80mg「武田パ」 【後】
（リビディル錠80mgから切替）
○ フェブキソスタット錠10mg「JG」 【後】
● 【般】フェブキソスタット錠10mg（フェブリク）
● 【般】フェノフィブラート錠80mg（リビディル）
● フェブキソスタット錠20mg「JG」—【後】—
フェブリク錠20mg（フェブキソスタット錠20mg「JG」へ切替）
（【般】フェブキソスタット錠20mgへ切替）
● 【般】フェブキソスタット錠20mg（フェブリク）
● 劇フェマール錠2.5mg（【般】レトロゾール錠2.5mgへ切替）
フェロミア顆粒8.3%
フェロミア錠50mg
● ラオイパン錠100mg
（院内はカモスタットメシル酸塩錠100mg「トワ」）
（【般】カモスタットメシル酸塩錠100mgへ切替）
● 劇フォサマック錠35mg（【般】アレンドロン酸錠35mgへ切替）
フォシーガ錠5mg（院外は【般】ダバグリフロジン錠5mgへ切替）
フォシーガ錠10mg（院外は【般】ダバグリフロジン錠10mgへ切替）
フォスブロック錠250mg
フォゼベル錠5mg
フォゼベル錠10mg
フォリアミン錠 5mg
向ブコラム口腔用液2.5mg 0.5mL
向ブコラム口腔用液5mg 1mL
向ブコラム口腔用液7.5mg 1.5mL
● 向ブコラム口腔用液10mg 2mL
劇ブシ末（調剤用）「ツム」 3023
ブスコパン錠10mg
● 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg（ブスコパン）
ブフェニール顆粒94%
○ デライアン錠500mg—【後】—
—（【般】エデト酸カルシウム三ナトリウム錠500mgへ切替）—
毒デラケニル錠200mg
（ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サイ」へ切替）
（【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mgへ切替）
ブラザキサカプセル75mg
ブラザキサカプセル110mg
フラジール内服錠250mg
● 【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mg（エフィエント）
● 【般】プラスグレル錠2.5mg（エフィエント）
● 【般】プラスグレル錠3.75mg（エフィエント）
● ブラダロン錠200mg（院内はフラボキサート塩酸塩錠200mg「サイ」）
ブラノパール配合錠
● デラバスタチンN a 錠5mg「タカ」—【後】—
● —【般】デラバスタチンN a 錠5mg（メバロチン）
○ デラバスタチンN a 錠10mg「トワ」 【後】
● 【般】デラバスタチンN a 錠10mg（メバロチン）
● ララピタシンシロップ0.3%（【般】F A D シロップ0.3%へ切替）
● デラピタックス錠25mg（【般】クロビドグレル錠25mgへ切替）
● デラピタックス錠75mg（院内はクロビドグレル錠75mg「アム」）
（【般】クロビドグレル錠75mgへ切替）
○ フラボキサート塩酸塩錠200mg「サイ」 【後】
● —【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg（ブラダロン）
● 【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg（ビ・シフロール）
● 【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg（ビ・シフロール）

● 【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg（ミラベックスL A）
● 【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg（ミラベックスL A）
● ラランドル錠20mg（【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mgへ切替）
○ プランルカストドライシロップ10%「AFP」 【後】
● 【般】プランルカストシロップ用10%（オノン）
○ プランルカストカプセル112.5mg「サイ」 【後】
● 【般】プランルカストカプセル112.5mg（オノン）
● 【般】プランルカスト錠112.5mg（オノン）
● 【般】プランルカスト錠225mg（オノン）
プリイピアクト錠25mg
● プリイピアクト錠50mg
○ フリウェル配合錠L D「モタ」 【後】
（【般】/ルイステロン・エチルエステル/オール0.035配合錠へ切替）
劇プリジスタ錠600mg
● ラサバスO D錠25mg（院内はナフトビジルO D錠25mg「あすか」）
（【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠25mgへ切替）
● ラサバスO D錠75mg
（【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠75mgへ切替）
● プリミドン細粒99.5%「日医工」
● プリモラン錠5mg
劇フリュザクラカプセル1mg
劇フリュザクラカプセル5mg
● プリリント錠60mg
プリリント錠90mg
● デリンペラン錠5—5mg（院内はメトクロプラミド錠5mg「NIG」）
（【般】メトクロプラミド錠5mgへ切替）
プリンペランシロップ0.1%
—（【般】メトクロプラミドシロップ0.1%へ切替）—
● ラルイトラン錠2mg（院内はトリクロロメチアジド錠2mg「NP」）
（【般】トリクロロメチアジド錠2mgへ切替）
劇ブルキンザカプセル80mg
フルコナゾールカプセル100mg「サイ」 【後】（【般】なし）
● —【般】フルコナゾールカプセル100mg（ジラルカン）—
○ フルスルチアミン錠25mg「トワ」 【後】
● 【般】フルスルチアミン錠25mg（アリナミンF）
● 【般】フルタミド錠125mg（オダイン錠）
● 劇フルダラ錠10mg
● 劇フルツロンカプセル200 200mg
○ 向フルニトラゼパム錠1mg「アム」 【後】
● 【般】フルニトラゼパム錠1mg（サイレース）
● 【般】フルバスタチン錠30mg（ローコール）
● デルチエン錠100mg（院内はイブプロフェン錠100mg「タヨ」）
（【般】イブプロフェン錠100mgへ切替）
○ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サイ」 【後】
● 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg（デプロメール）
● 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg（デプロメール）
● 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg（デプロメール）
● 劇フルメジン散0.2%
● フルメジン糖衣錠(0.25) 0.25mg
○ 劇フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 【後】
● 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg（タンボコール）
○ プレガバリンO D錠25mg「明治」 【後】
● プレガバリンO D錠75mg「明治」 【後】
● 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg（リリカ）
● 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg（リリカ）
● 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg（リリカ）
劇プレジコビックス配合錠

- **デレタールOD錠50mg**
(【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mgへ切替)
- **デレタールOD錠100mg**(院内はシロスタゾールOD錠100mg「サリ」)
(【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mgへ切替)
ブレディニン錠25 25mg
- **デレディニン錠50—50mg**
ブレディニンOD錠50 50mg
ブレドニゾロン散「タダ」1%
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)
ブレドニン錠5mg
劇ブレバイミス顆粒分包20mg
劇ブレバイミス顆粒分包120mg
劇ブレバイミス錠240mg
- **ブレマリン錠0.625mg**
デレミネント配合錠H-D
(【般】0.625mg・H-D配合錠へ切替)
- **デレミネント配合錠H-D**
(【般】0.625mg・H-D配合錠へ切替)
- **—【般】—プロカテロール塩酸塩錠0.025mg** (メブチン)
- **—【般】—プロカテロール塩酸塩錠0.05mg** (メブチン)
- **プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」** 【後】
- **【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% 5μg/mL** (メブチン)
- **劇プログラフ顆粒0.2mg** [0.2mg/包]
- **劇プログラフカプセル0.5mg** (院内はタクロリムス錠0.5mg「ト」へ切替)
(【般】タクロリムスカプセル0.5mgへ切替)
- **劇プログラフカプセル1mg** (院内はタクロリムス錠0.5mg「ト」へ切替)
(【般】タクロリムスカプセル1mgへ切替)
- **デロゲステロン錠2.5mg—【後】—**
(メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」へ名称変更)
(【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mgへ切替)
- **劇デロサイラン錠20μg** (院内はペラプロストNa錠20μg「サリ」)
(【般】ペラプロストNa錠20μgへ切替)
劇プロスタグランジンE₂錠0.5mg「科研」
デロスターール錠25—25mg
(院内はクロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」へ切替)
(【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mgへ切替)
- **プロセキソール錠0.5mg**
フロセミド細粒4%「EMEC」 【後】 (【般】なし)
- **—【般】—フロセミド細粒4%**
- **フロセミド錠20mg「NIG」** 【後】
- **【般】フロセミド錠20mg** (ラシックス)
- **【般】フロセミド錠40mg** (ラシックス)
- **向プロチゾラムOD錠0.25mg「バ」** 【後】
- **—【般】—プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg** (レンドルミン)
デロテカジンOD錠10—10mg—(ラフチジン錠10mg「ト」へ切替)—
(【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
プロナーゼMS 20000単位 [0.5g/P]
● **【般】プロナセリン錠4mg** (ロナセン)
- **【般】プロナセリン錠8mg** (ロナセン)
- **劇デロナ錠150mg** (【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mgへ切替)
プロバジール錠50mg
- **劇プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オハ」** 【後】
- **【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg** (プロノン)
- **プロ・バンサイン錠15mg** [2〜8℃]
- **【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg** (バップフォー)
- **【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg** (インデラル)

- **デロプレス錠2mg** (【般】カンデサルタン錠2mgへ切替)
- **デロプレス錠4mg** (院内はカンデサルタン錠4mg「あすか」)
(【般】カンデサルタン錠4mgへ切替)
- **デロプレス錠8mg** (【般】カンデサルタン錠8mgへ切替)
- **デロプレス錠12mg** (【般】カンデサルタン錠12mgへ切替)
- **劇プロベシア錠0.2mg** (保険適用外)
- **劇プロベシア錠1mg** (保険適用外)
デロベラ錠2.5mg (プロゲストン錠2.5mgへ切替)
- **向プロマゼパム錠2mg「サド」** 【後】 (セニラン錠2mgより名称変更)
- **—【般】—プロマゼパム錠2mg** (レキソタン)
- **プロマック顆粒15%** [75mg/0.5g/P]
- **プロマックD錠75** (院内はボラプレジンクOD錠75mg「サリ」)
- **【般】プロムベリドール細粒1%** (インプロメン)
- **【般】プロムベリドール錠1mg** (インプロメン)
- **【般】プロムベリドール錠3mg** (インプロメン)
- **【般】プロマジン1.35%等配合非ヒン系感冒剤 1g/包 (PL)**
- **【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg** (パロデル)
- **フロモックス小児用細粒100mg** (【般】なし)
(【般】セファペンピボキシル塩酸塩細粒10%へ切替)
- **フロモックス錠100mg**
(院内はセファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」)
フロリードゲル経口用2% 5g
劇フロリネフ錠0.1mg
- **デロセナール錠5μg**
(院内はリマプロストアルファデクス錠5μg「サリ」)
(【般】リマプロストアルファデクス錠5μgへ切替)
【へ】
- **ペイスンOD錠0.2mg**
(【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mgへ切替)
- **ペイスンOD錠0.3mg** (院内はボグリボースOD錠0.3mg「ト」)
(【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mgへ切替)
ペオーバ錠50mg
- **劇ペオン錠80—80mg** (【般】ザルトプロフェン錠80mgへ切替)
- **ベザトールSR錠200mg**(院内はベザフィラート徐放錠200mg「ト」)
劇ベサノイドカプセル10mg
- **ベザフィラート徐放錠200mg「ト」** 【後】
- **—【般】—ベザフィラート徐放錠200mg** (ベザトール)
ペンケアOD錠5mg
(ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ト」へ切替)
- 劇ベージニオ錠50mg
劇ベージニオ錠150mg
- **【般】β-ガラクトシダーゼ (アスペルギルス) 散50%** (ガラクターゼ)
- **【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mg** (ケルロング)
- **ベタセレミン配合錠** 【後】
(【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠へ切替)
- **向ベタナミン錠50mg—【後】—** (【般】ペモリン錠50mgへ切替)
劇ベタニス錠50mg
- **ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「ト」** 【後】
- **—【般】—ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg** (メリスロン)
- **【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠** (セレスタミン)
- **—【般】—ベタメタゾン錠0.5mg** (リンデロン)
- **劇ベニジピン塩酸塩錠4mg「ト」** 【後】
- **【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg** (コニール)
劇ベネクレクスタ錠10mg
劇ベネクレクスタ錠50mg
劇ベネクレクスタ錠100mg

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

●劇ベネネット錠2.5mg
（【般】リセドロン酸N a錠2.5mgへ切替）
●劇ベネネット錠17.5mg
（【般】リセドロン酸N a錠17.5mgへ切替）
●ヘバンE D配合内用剤 [80g/P]
●劇ヘプセラ錠10—10mg
劇ペブリコール錠50mg（ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」へ切替）
（【般】ペブリジル塩酸塩錠50mgへ切替）
劇ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」 【後】
●劇【般】ペブリジル塩酸塩錠50mg（ペブリコール）
○ベポタスチンベシル酸塩O D錠10mg「ト7」 【後】
●【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg（タリオン）
●【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg（タリオン）
●【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg（タリオン）
劇ペマジール錠4.5mg
劇ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
●~~【般】ペミロラストK錠10mg（アレギサル）~~
●【般】ペミロラストKシロップ用0.5%（アレギサル）
劇ペマリディ錠25mg
●【般】ペモリン錠50mg（ベタナミン錠）
劇ペラサス七A錠60μg（ケアロードL A錠60μgへ切替）
●【般】ペラバミル塩酸塩錠40mg（ワソラン）
○劇ペラプロストN a錠20μg「サリ」 【後】
●【般】ペラプロストN a錠20μg（プロサイリン）
●【般】ペランパネル細粒1%（フィコンパ）
●【般】ペランパネル錠2mg（フィコンパ）
●【般】ペランパネル錠4mg（フィコンパ）
ペリアタチン錠4mg
ペリアクチンシロップ0.04%
ペリキューボ錠2.5mg
●ペリキューボ錠5mg
ペリキューボ錠10mg
ペリチーム配合顆粒 [1g/P]
●ペリサンドプリルエルブミン錠4mg「サリ」
●【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg（コバシル）
●【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μg（ペルマックス）
●【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg（ペルマックス）
●ペルサンチン錠25mg（院内はジピリダモール錠25mg「ト7」）
（【般】ジピリダモール錠25mgへ切替）
●ペルサンチン錠100mg（院内はジピリダモール錠100mg「ト7」）
●ペルジピン七Aカプセル20mg
（【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mgへ切替）
●ペルジピン七Aカプセル40mg
（【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mgへ切替）
ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg
ヘルベッサー錠30 30mg
（ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ト7」へ切替）
ヘルベッサーRカプセル100mg
（ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サリ」へ切替）
（【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mgへ切替）
●劇ベルマックス錠50μg（【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μgへ切替）
●劇ベルマックス錠250μg（【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μgへ切替）
劇ベレキシブル錠80mg
○劇ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アル」 【後】
●【般】ベロスピロン塩酸塩錠4mg（ルーラン）
●ベングッド錠250mg

●向ベンザリン細粒1%
●向ベンザリン錠5—5mg（【般】ニトラゼパム錠5mgへ切替）
○劇ベンズプロマロン錠50mg「NIG」 【後】
●【般】ベンズプロマロン錠50mg（ユリノーム）
●ペンタサ顆粒94% [250mg/P]
●ペンタサ顆粒94% [1000mg/P]
ペンタサ顆粒94% [2000mg/P]
ペンタサ錠500mg（【般】メサラジン錠500mgへ切替）
●【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル(ビタジン)
【ホ】
劇ボイデヤ錠50mg
ボカブリア錠30mg
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
○ボグリボースO D錠0.3mg「ト7」 【後】
●ボダリボースO Dファルム0.2「QQ」—0.2mg—【後】
●ボダリボースO Dファルム0.3「QQ」—0.3mg—【後】
●【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg（ベイスン）
●【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg（ベイスン）
●劇ボシュリフ錠100mg
ボースデル内用液10 [250mL/袋]
ホスミシンドライシロップ400 400mg/g
●ホスミン錠500 500mg
ホスリボン配合顆粒
●ホスレノール顆粒分包250mg（【般】炭酸ランタン顆粒250mgへ切替）
●ホスレノールチュアブル錠250mg
●ホスレノールチュアブル錠500mg
●【般】ボセンタン錠62.5mg（トラクリア）
●劇ボナロン錠5mg（【般】アレンドロン酸錠5mgへ切替）
●劇ボナロン錠35mg（院内はアレンドロン酸錠35mg「ト7」）
（【般】アレンドロン酸錠35mgへ切替）
劇ボナロン経口ゼリー35mg
●ボノサップバック400 1シート
●ボノピオンバック 1シート
毒ボマリストカプセル1mg
毒ボマリストカプセル2mg
毒ボマリストカプセル3mg
毒ボマリストカプセル4mg
●ボラキス錠2—2mg（【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mgへ切替）
●ボラキス錠3—3mg（【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mgへ切替）
○ボラブレジンクO D錠75mg「サリ」 【後】
●~~【般】ボラブレジンク顆粒15%—75mg/0.5g（包）（プロマック）~~
●~~【般】ボラブレジンク口腔内崩壊錠75mg（プロマック）~~
ポリカルボフィルC a細粒83.3%「日医工」 [1.2g/P] 【後】
→○劇ポリコナゾール顆粒20%「効効」 【後】
（ブイフェンドドライシロップ2800mgが無くなり次第切替）
（院外は【般】ポリコナゾール顆粒20%へ切替）
●【般】ポリコナゾール顆粒20%（ブイフェンド）
○劇ポリコナゾール錠50mg「ト7」 【後】
○劇ポリコナゾール錠200mg「ト7」 【後】
●【般】ポリコナゾール錠50mg（ブイフェンド）
●【般】ポリコナゾール錠200mg（ブイフェンド）
ポリスチレンスルホン酸C a経口ゼリー20%分包25g「三和」 【後】
（アーガメイト20%ゼリー25gより名称変更）
●~~【般】ポリスチレンスルホン酸C a経口液20%—25g/包（カリメート）~~
●【般】ホリナート錠25mg（ロイコポリン）
●ボルズイ錠2.5mg
ボルズイ錠5mg
●ボルズイ錠10mg

劇ボルタレン錠25mg (【般】ジクロフェナクN a錠25mgへ切替)
(院内はジクロフェナクN a錠25mg「ト7」)
ポルトラック原末 [6g/P]
● ボンゾール錠100mg
ポンタールンロップ3.25%
● 劇ボンビバ錠100mg
【マ】
向マイスタン錠5mg
● 向マイスタン錠10mg
● 向マイスラー錠5mg (院内はゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サ7」)
(【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mgへ切替)
● 向マイスラー錠10mg (【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mgへ切替)
● マヴィレット配合錠
マグコロール散68%分包50g
劇マタサルトR-P-D錠10mg
(リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」へ切替)
(【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
● マダニマ錠500mg—【後】— (【般】酸化マグネシウム錠500mgへ切替)
● 劇マスーレッド錠5mg
● 劇マスーレッド錠12.5mg
● 劇マスーレッド錠25mg
● マーズレンS配合顆粒 [0.67g/P]
(【般】アズレニルン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 0.67g/包へ切替)
● マーズレン配合錠1.0ES
マドパー配合錠 (マドパー配合錠L100へ名称変更)
● マドパー配合錠L50
マドパー配合錠L100
● 劇マニジピン塩酸塩錠10mg「サ7」—【後】—
● 【般】マニジピン塩酸塩錠10mg (カルスロット)
● 劇マニジピン塩酸塩錠20mg「サ7」—【後】—
● 【般】マニジピン塩酸塩錠20mg (カルスロット)
● —【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg (ルジオミール)
● 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg (ルジオミール)
● マーベロン21 (保険適用外)
● マリゼブ錠12.5mg
● マリゼブ錠25mg
【ミ】
● ミオカーム内服液33.3% [125mL/瓶]
● ミオナール錠50mg (院内はエペリゾン塩酸塩錠50mg「ト7」)
(【般】エペリゾン塩酸塩錠50mgへ切替)
● 劇ミカトリオ配合錠
劇ミカムロ配合錠A-P (テラムロ配合錠A-P「ニ7」へ切替)
● 劇ミカムロ配合錠B-P
(【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠へ切替)
ミカルディア錠40mg (院内はテルミサルタン錠40mg「ニ7」)
(【般】テルミサルタン錠40mgへ切替)
● ミカルディア錠80mg (【般】テルミサルタン錠80mgへ切替)
ミグシス錠5mg
○ ミグリトール錠50mg「ト7」 【後】
● 【般】ミグリトール錠50mg (セイブル)
小児用ミケラン細粒0.2%
● ミケラン錠5mg (【般】カルテオロール塩酸塩錠5mgへ切替)
● ミケランL Aカプセル15mg (2027年3月31日経過措置終了)
● ミコプティンカプセル150mg
ミコンビ配合錠A-P (院内はテルチア配合錠A-P「ト7」)
(【般】テルミサルタン40mg・ヒドクロロチアジド配合錠へ切替)
● ミコンビ配合錠B-P
(【般】テルミサルタン80mg・ヒドクロロチアジド配合錠へ切替)

● 【般】ミチグリニドCa錠10mg (グルファスト)
● ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
● ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
○ ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 【後】
● 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg (メトリジン)
劇ミニリンメルトOD錠25μg
劇ミニリンメルトOD錠60μg
● 劇ミニリンメルトOD錠120μg
ミネプロOD錠1.25mg
ミネプロOD錠2.5mg
ミネプロOD錠5mg
● —【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg (ミノマイシン)
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「ト7」 【後】
● —【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg (ミノマイシン)
● 【般】ミノドロロン酸錠1mg (ポノテオ)
● 【般】ミノドロロン酸錠50mg (ポノテオ)
ミノマイシン顆粒2% 20mg/g
● ミノマイシン錠50mg
● ミノマイシンカプセル100mg
(院内はミノサイクリン塩酸塩錠100mg「ト7」)
ミヤBM細粒 [1g/P]
劇ミラベックスL A錠0.375mg
(【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mgへ切替)
● 劇ミラベックスL A錠1.5mg
(【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mgへ切替)
○ 劇ミルタザピン錠15mg「ト7」 【後】
● 【般】ミルタザピン錠15mg (リフレックス)
● 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg (トレドミン)
○ 劇ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アム」 【後】
● 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg (トレドミン)
● 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50mg (トレドミン)
ミンクリア内用散布液0.8%
【ム】
● ムコサールドライシロップ1.5% (【般】なし)
—(【般】アンプロキシオール塩酸塩シロップ用1.5%へ切替)—
(2027年3月31日経過措置終了)
● ムコスタ錠100mg (院内はレバミビド錠100mg「ト7」)
(【般】レバミビド錠100mgへ切替)
● ムコソルバンD-S3%—[0.5g/P]
(【般】アンプロキシオール塩酸塩シロップ用3%へ切替)
● ムコソルバン錠15mg
(【般】アンプロキシオール塩酸塩錠15mgへ切替)
● ムコソルバンL錠45mg
(【般】アンプロキシオール塩酸塩徐放錠45mgへ切替)
● 小児用ムコソルバンシロップ0.3%
(【般】アンプロキシオール塩酸塩シロップ0.3%へ切替)
● ムコダインD-S50% (院内はカルボシステインD-S50%「ト7」)
● ムコダイン錠250mg (院内はカルボシステイン錠250mg「ト7」)
● ムコダイシンロップ5%
(院内はカルボシステインシロップ小児用5%「ト7」)
(【般】カルボシステインシロップ5%へ切替)
ムコプサン錠15mg—【後】—
(院内はアンプロキシオール塩酸塩錠15mg「ト7」へ切替)
(【般】アンプロキシオール塩酸塩錠15mgへ切替)
● ムルプレタ錠3mg
※ 劇ムンデシンカプセル100mg
【メ】
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg/g

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- メイアクトMS錠100mg
- 向メイラックス錠1mg（院内はロフラゼパ酸エチル錠1mg「サリ」）
- メインテート錠2.5mg
（院内はピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ト」）
（【般】ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mgへ切替）
- メインテート錠5mg
（【般】ピソプロロールフマル酸塩錠5mgへ切替）
- 劇メキシチールカプセル50mg
- 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg（メキシチール）
劇メキシチールカプセル100mg
（【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mgへ切替）
- 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg（メキシチール）
劇メキシト錠0.5mg [冷]
劇メキシト錠2mg [冷]
劇メクトビ錠15mg
- 【般】メコパミン細粒0.1%500mg 500μg/0.5g包（メチコパール）
- 【般】メコバラミン錠0.5mg（メチコパール）
麻劇メサペイン錠5mg
麻劇メサペイン錠10mg
- 【般】メサラジン錠500mg（ペンタサ）
- メサラジン腸溶錠400mg「サリ」 【後】
- 【般】メサラジン腸溶錠400mg（アサコール）
- ※劇メジコン散10%
（デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」へ切替）
劇メスチノン錠60mg
劇メーゼント錠0.25mg [冷]
劇メーゼント錠2mg [冷]
劇メソトレキセート錠2.5mg
- 劇メタクト配合錠LD
- 劇メタクト配合錠HD
劇メタライト250カプセル 250mg [冷]
メタルカプターゼカプセル50mg
メチコパール細粒0.1% 500μg/0.5g包 【後】
（【般】メコパミン細粒0.1%500mg 500μg/0.5g包へ切替）
- メチコパール錠500μg 【後】
（【般】メコバラミン錠0.5mgへ切替）
劇メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」
- 劇メトアナ配合錠LD
- 劇メトアナ配合錠HD
劇メトグルコ錠250mg
- 劇メトグルコ錠500mg（【般】なし）
- メトクロプラミド錠5mg「NIG」 【後】
- 【般】メトクロプラミド錠5mg（プリンペラン）
- 劇【般】メトトレキサートカプセル2mg（リウマトレックス）
（【般】メトトレキサート錠2mgへ切替）
- 劇メトトレキサート錠2mg「JG」 【後】
- 劇【般】メトトレキサート錠2mg
メトピロンカプセル250mg
- 【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg（ロプレソール）
- 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mgMT（メトグルコ）
- メトサジン錠2mg（【般】ミドドリン塩酸塩錠2mgへ切替）
- メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 【後】
（プロゲストン錠2.5mgより名称変更）
- 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg（プロヘラ）
- 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg（ヒソナ）
メドロール錠2mg
メドロール錠4mg
- 【般】メナテトレノンカプセル15mg（グラケー）

- メニレット70%ゼリー20g/個
（イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」へ名称変更）
- メニレット70%ゼリー30g/個
（イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」へ名称変更）
- メバロチン錠5 5mg
- メバロチン錠10—10mg（院内はプラバスタチンNa錠10mg「ト」）
（【般】プラバスタチンNa錠10mgへ切替）
劇メフィーゴパック
- メブチンドライシロップ0.005%
メブチンミニ錠25μg
—（【般】プロカテロール塩酸塩錠0.025mgへ切替）—
- メブチン錠50μg
—（【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mgへ切替）—
- メブチンシロップ5μg/mL
（院内はプロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」）
（【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005% 5μg/mLへ切替）
- 【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg（トランコロン）
- 劇メマリー錠5mg（【般】メマンチン塩酸塩錠5mgへ切替）
- 劇メマリー錠10mg（【般】メマンチン塩酸塩錠10mgへ切替）
- 劇メマリー錠20mg（【般】メマンチン塩酸塩錠20mgへ切替）
劇メマリーOD錠5mg（メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」へ切替）
（【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替）
- 劇メマリーOD錠10mg
（【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替）
- 劇メマリーOD錠20mg
（【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mgへ切替）
- 劇メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 【後】
- 【般】メマンチン塩酸塩錠5mg（メマリー）
- 【般】メマンチン塩酸塩錠10mg（メマリー）
- 【般】メマンチン塩酸塩錠20mg（メマリー）
- 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg（メマリーOD）
- 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg（メマリーOD）
- 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg（メマリーOD）
メラトベル顆粒小児用0.2% g
- メリスロン錠6mg（院内はベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「ト」）
- メルカゾール錠2.5mg
メルカゾール錠5mg
- メロキシカム錠10mg「ト」 【後】
- 【般】メロキシカム錠10mg（モービック）
【モ】
- モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」 【後】
- 【般】モサブリドクエン酸塩散1%（ガスモチン）
- モサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」 【後】
- —【般】モサブリドクエン酸塩錠5mg（ガスモチン）—
- 向劇モディオダール錠100mg
- モニラックシロップ65% [600mL]
（院内はラクツロースシロップ65%「効」）
- モニラックシロップ65% [10mL/包]
- モーバー錠100mg（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）
- モビコール配合内用剤HD
モビコール配合内用剤LD（モビコール配合内用剤より名称変更）
劇モービック錠10mg（院内はメロキシカム錠10mg「ト」）
（【般】メロキシカム錠10mgへ切替）
モビブレップ配合内用剤
麻毒モルヒネ塩酸塩水和物「効」原末 g
麻劇モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フ」 0.5g/包 【後】
（モルベス細粒2%から名称変更）
- 麻劇【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg（12時間持続）（モルベス）

- 麻酔モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
- 麻酔モルベス細粒2%—[0.5g/包]—【後】—
(モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「ジモト」へ名称変更)
- モンテルカストOD錠10mg「タタ」 【後】
- 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg (キプレス, シングレア)
- 【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包 (キプレス, シングレア)
- 【般】モンテルカスト錠5mg (キプレス, シングレア)
- 【般】モンテルカスト錠10mg (キプレス, シングレア)
- モンテルカストチュアブル錠5mg「トワ」 【後】
(キプレスチュアブル錠5mgから切替)
- 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg (キプレス, シングレア)
- 【ヤ】
薬用炭「日医工」(50g)
- ヤーズ配合錠 1シート
(【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠へ切替)
- ヤーズフレックス配合錠 1シート
(【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠へ切替)
- 【ユ】
●劇ユーエフティE配合顆粒T100 [100mg/0.5g/P]
●劇ユーエフティE配合顆粒T150 [150mg/0.75g/P]
●劇ユーエフティE配合顆粒T200 [200mg/1g/P]
●劇ユーエフティ配合カプセルT100
- ユーゼル錠25mg (【般】ホリナート錠25mgへ切替)
- ユナシン細粒小児用10% 100mg/g
- ユナシン錠375mg
- 劇ユニシア配合錠H-D
(【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠へ切替)
- 劇ユニシア配合錠H-D
(【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替)
- 劇ユニファルヒ-A錠200mg
(院内はテオフィリン徐放U錠200mg「トワ」)
(【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)へ切替)
- 劇ユバンシ配合錠
ユービット錠100mg
- ユビデカレノン錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】ユビデカレノン錠10mg (ノイキノン)
- ユベラ顆粒20%—(販売中止)—
(トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハ」へ切替)
- ユベラ錠50mg (トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トワ」へ切替)
(【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mgへ切替)
- ユベラNカプセル100mg
(【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mgへ切替)
- ユリス錠1mg
- ユリス錠2mg
- 劇ユサーナム錠50mg (院内はベンズプロマロン錠50mg「NIG」)
(【般】ベンズプロマロン錠50mgへ切替)
- 劇ユサーマO-D錠2mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mgへ切替)
- 劇ユサーマO-D錠4mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mgへ切替)
- 向ユーロジン2mg錠 (【般】エスタゾラム錠2mgへ切替)
- 【ヨ】
劇ヨウ化カリウム「コザカイ・M」(院内製剤原料)
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
ヨウ化カサウム末
ヨウ化カリウム内服ゼリー16.3mg「日医工」 (備蓄用) [1g/P]
幼児用P-7配合顆粒—[1g/P]
- 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% (インクレミン)
- ヨクイニンエキス錠「コ知」T72

- 【ラ】
● ラキソベロン錠2.5mg (【般】なし)
—(【般】ピコスルファートNa錠2.5mgへ切替)—
- ラキソベロン内用液0.75%—[75mg/10mL/瓶]
—(【般】ピコスルファートNa経口液0.75%—10mLへ切替)—
- ラクツロースシロップ65%「タタ」 【後】
(ピアーレシロップ65%より名称変更)
- —【般】ラクツロースシロップ65% (モニラック)
- 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g/包 (ラグノスNFゼリー)
- ラグノスNF経口ゼリー分包12g 【後】
(【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g/包へ切替)
- 劇ラゲブリオ錠400mg
- 【般】ラコサミドシロップ用10% (ビムパット)
- 【般】ラコサミド錠50mg (ビムパット)
- 【般】ラコサミド錠100mg (ビムパット)
- ラコールNF配合経腸用半固形剤—[300g/袋]
(イノソリッド配合経腸用半固形剤へ切替)
- ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー)—[200mL/袋]
- ラコールNF配合経腸用液(コーンフレーバー) [200mL/袋]
- ラコールNF配合経腸用液 [400mL/袋]
- ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL/瓶 [2~8℃]
- ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL/瓶 [2~8℃]
- ラシックス細粒4% (院内はフロセミド細粒4%「EMEC」)
(【般】フロセミド細粒4%へ切替)
- ラシックス錠20mg (フロセミド錠20mg「NIG」へ切替)
(【般】フロセミド錠20mgへ切替)
- ラシックス錠40mg (【般】フロセミド錠40mgへ切替)
- ラジレス錠150mg (販売中止)
- 劇ラズクルーズ錠80mg
- 劇ラステットSカプセル25mg
- ラスビック錠75mg
- ラックビー微粒N 1% [1g/P]
- 劇ラツォダ錠20mg
- 劇ラツォダ錠40mg
- 劇ラツォダ錠80mg
- ラディオガルダーゼカプセル500mg
- 劇ラニラピッド錠0.05mg (【般】なし)
- 劇ラニラピッド錠0.1mg—(【般】メチルジゴキシン錠0.1mgへ切替)—
- 劇ラバリムス顆粒0.2%
- 劇ラバリムス錠1mg
- ラフチジン錠10mg「トワ」—【後】—
- 【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg (プロテカジン)
- ラベファインバック 1シート
- ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 【後】
- ラベプラゾールNa錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】ラベプラゾールNa錠5mg (パリエット)
- 【般】ラベプラゾールNa錠10mg (パリエット)
- 【般】ラベプラゾールNa錠20mg (パリエット)
- 向劇ラボナ錠50mg
- 【般】ラマトロバン錠75mg (バイナス)
- ラミデアン錠5mg—【後】— (【般】シンバスタチン錠5mgへ切替)
- 劇ラミクタール錠小児用2mg
- 劇ラミクタール錠小児用5mg
- 劇ラミクタール錠25mg (院内はラモトリギン錠25mg「アメル」)
(【般】ラモトリギン錠25mgへ切替)
- 劇ラミクタール錠100mg (【般】ラモトリギン錠100mgへ切替)
- ラミシール錠125mg (テルビナフィン錠125mg「VTRS」へ切替)
- ラメルテオン錠8mg「JG」 【後】

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

● 【般】ラメルテオン錠8mg（ロゼレム）
● ~~【般】ラモトリギン錠2mg（ラミクタール）~~
● ~~【般】ラモトリギン錠5mg（ラミクタール）~~
○劇ラモトリギン錠25mg「アム」 【後】
● 【般】ラモトリギン錠25mg（ラミクタール）
○劇ラモトリギン錠100mg「アム」 【後】
● 【般】ラモトリギン錠100mg（ラミクタール）
○劇ラモトリギン錠小児用5mg「トー」 【後】
● ラリキシン錠250mg
● 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg（エピスタ）
○ ランソプラゾールO D錠15mg「サリ」 【後】
● 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg（タケブロン）
● 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg（タケブロン）
● 劇ランデル錠20 20mg
ランプレнкаプセル50mg [35℃以上禁]
【リ】
リアルダ錠1200mg [冷]
劇サウマトレックスカプセル2mg
（メトトレキサート錠2mg「JG」へ切替）
（【般】メトトレキサート錠2mgへ切替）
リオナ錠250mg
リオベル配合錠L D
● リオベル配合錠H D
● 劇サカルボン錠1mg（【般】ミノドロン酸錠1mgへ切替）
● 劇サカルボン錠50mg（【般】ミノドロン酸錠50mgへ切替）
リクシアナO D錠15mg
リクシアナO D錠30mg
リクシアナO D錠60mg
○劇リザトリプタンO D錠10mg「VTRS」 【後】
● 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg（マクサルトR P D）
● リザベンカプセル100mg
● 劇サスパダール細粒1%
● 劇サスパダールO D錠1mg
● 劇サスパダール内用液1mg/mL—[30mL/瓶]
● 劇サスパダール内用液1mg/mL—[0.5mL/包]
● 劇サスパダール内用液1mg/mL—[1mL/包]
● 劇サスパダール内用液1mg/mL—[2mL/包]
○劇リスベリドン細粒1%「トー」 【後】
● 【般】リスベリドン細粒1%（リスパダール）
● 劇リスベリドン錠0.5mg「アム」
● ~~【般】リスベリドン錠0.5mg（リスパダール）~~
● ~~【般】リスベリドン錠1mg（リスパダール）~~
○劇リスベリドンO D錠1mg「アム」 【後】
● ~~【般】リスベリドン口腔内崩壊錠1mg（リスパダール）~~
○劇リスベリドン内用液1mg/mL「効効」 【後】
○劇リスベリドン内用液分包0.5mg「アム」 [0.1%0.5mL/包] 【後】
● 【般】リスベリドン経口液0.1% 0.5mL（リスパダール）
● 【般】リスベリドン経口液0.1% 1mL（リスパダール）
● 【般】リスベリドン経口液0.1% 2mL（リスパダール）
● 【般】リスベリドン経口液0.1% 3mL（リスパダール）
● リスミー錠1mg（【後】なし）
● リスミー錠2mg（【般】なし）
● サズミツタ錠10mg
（院内はアメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トー」）
（【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mgへ切替）
● 劇サスモダンカプセル50mg
（院内はジソピラミドカプセル50mg「ファザー」）
（【般】ジソピラミドカプセル50mgへ切替）

劇リスモダンR錠150mg
（【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mgへ切替）
● 向リーゼ錠5mg（院内はクロチアゼパム錠5mg「サリ」）
● 【般】リセドロン酸N a錠2.5mg（アクトネル）
● 【般】リセドロン酸N a錠17.5mg（アクトネル）
● 【般】リセドロン酸N a錠75mg（アクトネル）
○劇リセドロン酸N a錠75mg「トー」 【後】
● 向劇リタリン錠10mg
○ サツタル配合顆粒—[4.74g/P]—【後】（販売中止）
（リーバクト配合顆粒へ切替）
（【般】イロイシ・ロイシ・ハリシ配合顆粒 4.74g/包へ切替）
● 劇リットフォーロカプセル50mg
● 劇リトゴビ錠4mg
○ リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」 【後】
● 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg（ウテメリン）
リーバクト配合顆粒 [4.15g/P]
● リーバクト配合経口ゼリー [20g/個]（2027年3月31日経過措置終了）
● リバクレオン顆粒300mg分包
リバクレオンカプセル150mg
● リバゼブ配合錠L D
● リバゼブ配合錠H D
● サバロO D錠1mg
（【般】ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠1mgへ切替）
● サバロO D錠2mg（院内はピタバスタチンC a・O D錠2mg「トー」）
（【般】ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠2mgへ切替）
● サバロO D錠4mg
（【般】ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠4mgへ切替）
リバーロキサバンO D錠10mg「ハイル」 【後】
● 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg（イゲザレルト）
リバーロキサバンO D錠15mg「ハイル」 【後】
● 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg（イゲザレルト）
サビディール錠80mg
（院内はフェノフィブラート錠80mg「武田テバ」へ切替）
（【般】フェノフィブラート錠80mgへ切替）
● サビトール錠10mg（【般】アトルバスタチン錠10mgへ切替）
● サファジンカプセル150mg
（院内はリファンピシンカプセル150mg「サド」）
リファンピシンカプセル150mg「サド」 【後】（【般】なし）
● ~~【般】サファンピシンカプセル150mg（サファジン）~~
リフキシマ錠200mg
劇リブテンシティ錠200mg
● リフヌア錠45mg
劇リフレックス錠15mg（ミルタザピン錠15mg「トー」へ切替）
（【般】ミルタザピン錠15mgへ切替）
劇リベルサス錠3mg
劇リベルサス錠7mg
● 劇リベルサス錠14mg
向リボトリール細粒0.5%
向リボトリール錠0.5mg
● サボバ錠5—5mg（【般】シンバスタチン錠5mgへ切替）
（2027年3月31日経過措置終了）
● 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg（ハイボン）
劇リーマス錠100—100mg（炭酸リチウム錠100「大正」へ切替）
● 劇リーマス錠200 200mg（院内は炭酸リチウム錠200「大正」）
● 劇リマチル錠100mg
○ リマプロストアルファデクス錠5μg「サリ」 【後】
● 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg（オバルモン、プロレナル）

劇リムパーザ錠100mg
劇リムパーザ錠150mg
毒硫酸アトロピン「紅イ」
（アトロピン硫酸塩水和物「紅イ」原末へ名称変更）
硫酸マグネシウム「東海」（院内製剤原料）（販売中止）
サリカチン錠25mg（プレガバリンOD錠25mg「明治」へ切替）
（【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mgへ切替）
サリカチン錠75mg（プレガバリンOD錠75mg「明治」へ切替）
（【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mgへ切替）
● サリカチン錠150mg
（【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mgへ切替）
○ リルゾール錠50mg「エーロ」 【後】
● 【般】リルゾール錠50mg（リルテック）
サルテック錠50—50mg（サルゾール錠50mg「エーロ」へ切替）
（【般】リルゾール錠50mgへ切替）
● 劇リンヴォック錠7.5mg
● 劇リンヴォック錠15mg
● 劇リンヴォック錠30mg
劇リンヴォック錠45mg
劇リン酸コデイン散1%「紅イ」
● リン酸水素カルシウム水和物「エース」
（リン酸水素カルシウム水和物「ヨダ」から切替）
リンゼス錠0.25mg
リンデロン錠0.5mg
リンデロンシロップ0.01%
【ル】
● ルジオミール錠10mg
● ルジオミール錠25mg（【般】マプロチリン塩酸塩錠25mgへ切替）
ルセフィ錠2.5mg
● ルセフィODフィルム2.5mg
ルトラール錠2mg
● ルナベル配合錠H7D
（【般】ルエチステロン・エチルエストラジオール0.02mg配合錠）
● ルナベル配合錠H7D
（【般】ルエチステロン・エチルエストラジオール0.035mg配合錠へ切替）
ルネスタ錠1mg（エスゾピクロン錠1mg「日新」へ切替）
● ルネスタ錠2mg
ルバフィン錠10mg
劇ルブキネスカプセル7.9mg
ルブテック錠8mg（トラセミドOD錠8mg「TE」へ切替）
● ルボッタス錠25—25mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替）
● ルボッタス錠50—50mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替）
● ルボッタス錠75—75mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替）
劇ルマケラス錠120mg
● 劇ルーラン錠4mg（院内はペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」）
（【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mgへ切替）
【レ】
● 劇レイボー錠50mg
● 劇レイボー錠100mg
劇レキサルティOD錠0.5mg
劇レキサルティOD錠1mg
● 劇レキサルティOD錠2mg
● 向レキソタン錠2—2mg（採用薬はプロマゼパム錠2mg「サント」へ切替）

● 劇レキップ錠0.25mg（【般】ロピニロール錠0.25mgへ切替）
劇レキップ錠1mg（院内はロピニロールOD錠1mg「アメル」）
（【般】ロピニロール口腔内崩壊錠1mgへ切替）
● 劇レキップ錠2mg（【般】ロピニロール錠2mgへ切替）
劇レキップGR錠2mg（院内はロピニロール徐放錠2mg「トワ」）
（【般】ロピニロール徐放錠2mgへ切替）
● 劇レキップGR錠8mg（【般】ロピニロール徐放錠8mgへ切替）
劇レクサプロ錠10mg（【般】エスシタロプラム錠10mgへ切替）
レクチゾール錠25mg
レグテクト錠333mg
● レグナイト錠300mg
● レグバラ錠12.5mg
レグバラ錠25mg
● レザルトス配合錠LD
レザルトス配合錠HD
レスタミンコーワ錠10mg
レスビア静注・経口液60mg 3mL瓶
レスプレ錠20mg
● 劇レスサン錠50—50mg（【般】トラゾドン塩酸塩錠50mgへ切替）
劇レズロック錠200mg
● 劇レットヴィモカプセル40mg
● 劇レットヴィモカプセル80mg
● 劇レットヴィモ錠40mg
● 劇レットヴィモ錠80mg
● 劇レトロゾール錠2.5mg「ヤクル」 【後】
● 【般】レトロゾール錠2.5mg（フェマール）
劇レトロピルカプセル100mg
レナデックス錠4mg
○ 毒レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」 【後】
● 毒【般】レナリドミドカプセル2.5mg（レブラミド）
○ 毒レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 【後】
● 毒【般】レナリドミドカプセル5mg（レブラミド）
● セニペース錠2.5—2.5mg（2027年3月31日経過措置終了）
（【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mgへ切替）
● セニペース錠5mg（院内はエナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トワ」）
（2027年3月31日経過措置終了）
（【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mgへ切替）
○ 劇レバグリニド錠0.25mg「サカイ」 【後】
● 【般】レバグリニド錠0.25mg（シュアポスト）
● 劇レバグリニド錠0.5mg「サカイ」 【後】
● 【般】レバグリニド錠0.5mg（シュアポスト）
レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg
レバチオ錠20mg（【般】シルデナフィル錠20mg：REへ切替）
○ レバミビド錠100mg「トワ」（【般】加算なし）
● 【般】レバミビド錠100mg（ムコスタ）
毒レブラミドカプセル2.5mg
（【般】レナリドミドカプセル2.5mgへ切替）
毒レブラミドカプセル5mg
（【般】レナリドミドカプセル5mgへ切替）
○ レベチラセタムDS50%「トワ」 【後】
○ レベチラセタム錠500mg「サカイ」 【後】
● 【般】レベチラセタム錠500mg（イーケプラ）
● 【般】レベチラセタムシロップ用50%（イーケプラドライシロップ）
○ レボカルニチンFF錠250mg「トワ」 【後】
● 【般】レボカルニチンFF錠250mg（エルカルチン）
○ レボカルニチンFF内用液10%「トワ」 【後】
● 【般】レボカルニチンFF経口液10%（エルカルチン）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サド」 【後】
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ト」 【後】
- 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg（ザイザル）
- ~~【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%（ザイザルシロップ）~~
- 劇レボチロキシンN a錠25 μ g「サド」
- 劇レボチロキシンN a錠50 μ g「サド」
- 【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠（ネオドバストンL）
- ~~【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠（メネシット）~~
- 【般】レボフロキサシン錠250mg
レボフロキサシン錠500mg「サ」 【後】
- 【般】レボフロキサシン錠500mg（クラビット）
- 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg（ヒルナミン）
劇レボレード錠12.5mg
（院外は【般】エルトロンボパグ錠12.5mgへ切替）
- 劇レミッチカプセル2.5 μ g（販売中止）
（【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μ gへ切替）
- 劇レミッチOD錠2.5 μ g
（【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 μ gへ切替）
- 劇レミニールOD錠4mg
（【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mgへ切替）
- 劇レミニールOD錠8mg
（【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mgへ切替）
- 劇レミニールOD錠12mg
（【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mgへ切替）
- レリフェン錠400mg
劇レリミナ錠40mg
- 向レンドルミンD錠0.25mg
劇レンビマカプセル4mg
劇レンビマカプセル10mg
- 【ロ】
劇ロイケリン散10%
ロイコポリン錠5mg
ロイコン錠10mg
- 劇ロカルトロールカプセル0.25-0.25 μ g
（【般】カルシトリオールカプセル0.25 μ gへ切替）
- ローガン錠10mg
- ~~【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg（アルタット）~~
- ロキソニン錠60mg（院内はロキソプロフェンN a錠60mg「ト」）
（【般】ロキソプロフェンN a錠60mgへ切替）
- 【般】ロキソプロフェンN a錠60mg（ロキソニン）
- ロキソプロフェンN a錠60mg「ト」 【後】
ロケルマ懸濁用散分包5g 1包
- ロケルマ懸濁用散分包10g 1包
- ローヨール錠30mg（【般】フルバスタチン錠30mgへ切替）
- ロヨルナール錠100mg（【般】トラビジル錠100mgへ切替）
- ロサルタンK錠25mg「ト」 【後】
- 【般】ロサルタンK錠25mg（ニューロタン）
- 【般】ロサルタンK錠50mg（ニューロタン）
- 【般】ロサルタン100mg・ヒドクロロチアジド配合錠（プレミネントHD）
- 【般】ロサルタン50mg・ヒドクロロチアジド配合錠（プレミネントLD）
ロスゼット配合錠HD
（【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠へ切替）
- ロスバスタチンOD錠2.5mg「ト」 【後】
- 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg（クレストール）
- 【般】ロスバスタチン錠5mg（クレストール）
劇ロズリートレクカプセル100mg
劇ロズリートレクカプセル200mg

- ~~ロゼレム錠8mg（ラメルテオン錠8mg「JG」へ切替）~~
（【般】ラメルテオン錠8mgへ切替）
- 劇ロタリックス内用液 1.5mL/本【冷】
- 劇ロートエキス散 10%
- 劇ロドピン錠25mg（ゾテピン錠25mg「効」2027年3月31日経過措置
終了が無くなり次第切替）
ロトサガ粒状カプセル2g-2g/包
（オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ト」へ切替）
（【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2gへ切替）
- 劇ロナセン錠4mg（【般】プロナンセリン錠4mgへ切替）
- 劇ロナセン錠8mg（【般】プロナンセリン錠8mgへ切替）
- 劇ロビニロールOD錠1mg「アル」 【後】
- 【般】ロビニロール口腔内崩壊錠1mg（レキップ）
- 【般】ロビニロール錠0.25mg（レキップ）
- 【般】ロビニロール錠1mg（レキップ）
- 【般】ロビニロール錠2mg（レキップ）
- 劇ロビニロール徐放錠2mg「ト」 【後】
- 【般】ロビニロール徐放錠2mg（レキップCR）
- 【般】ロビニロール徐放錠8mg（レキップCR）
- 向ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サ」 【後】
- ~~【般】ロフラゼパ酸エチル錠1mg（メイラックス）~~
劇ロブレソール錠20mg
劇ローブレナ錠25mg
劇ローブレナ錠100mg
ロペミン細粒0.1%（【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.1%へ切替）
- ~~ロペミンカプセル1mg（院内はロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サ」）~~
- ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サ」 【後】
- 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg（ロペミン）
- 向ロラゼパム錠0.5mg「サ」 【後】
- ~~【般】ロラゼパム錠0.5mg（ワイバックス）~~
- 【般】ロラタジン錠10mg（クラリチン）
- 【般】ロラタジンシロップ用1% 0.5g（包）（クラリチン）
劇ロルカム錠4mg（ロルノキシカム錠4mg「KO」へ切替）
- 劇ロルノキシカム錠4mg「KO」 【後】
- ~~【般】ロルノキシカム錠4mg（ロルカム）~~
劇ロンサーフ配合錠T15
劇ロンサーフ配合錠T20
- 【ワ】
- 劇ワイテンス錠2mg
ワイドシリン細粒20% 【後】
- 向ワイバックス錠0.5 0.5mg
劇ワゴスチグミン散(0.5%)
ワソラン錠40mg（【般】ベラパミル塩酸塩錠40mgへ切替）
- ワーファリン顆粒0.2%
ワーファリン錠0.5mg
ワーファリン錠1mg
ワーファリンK細粒0.2%「NS」 【後】
- ~~【般】ワルファリンK細粒0.2%（ワーファリン）~~
- 劇ワナアルファ錠0.5 μ g
（【般】アルファカルシドール錠0.5 μ gへ切替）
- 劇ワントラム錠100mg

外用薬リスト

【ア】

- 劇アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL1個
- ~~アイドロイチン1%点眼液5mL【後】~~（販売中止）
（コンドロイチン点眼液1%「日点」へ切替）
（【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mLへ切替）
- 劇アイノフロ吸入用800ppm（NICUの限定使用）
- ~~アイファガン点眼液0.1%5mL~~
（プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」へ切替）
（【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%へ切替）
- アイベータ配合点眼液 5mL/瓶
- アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/瓶
- 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ 【後】
- 【般】亜鉛華単軟膏10%（サトウザルベ）
- ~~アタアチムタリーム1%10g~~（院内はナジフロキサシンクリーム1%「トリ」）
（【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g/本へ切替）
- ~~アタアチムローション1%20mL~~
（ナジフロキサシンローション1%「トリ」へ切替）
（【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本へ切替）
- アクトシン軟膏3% 30g [冷]
- アクトシン軟膏3% 200g [冷]
- アジマイシン点眼液1% 2.5mL/瓶 [冷]
- 劇亜硝酸アミル「AFP」 0.25mL1管 [冷]
- アスタット軟膏1% 10g（【般】なし）
- ~~（【般】ラノヨナゾール軟膏1%10mg/本へ切替）~~
- アズノール軟膏0.033% 20g
- アズノール軟膏0.033%500g（供給停止）
（アズノール軟膏0.033% 20gへ切替）
- アズノールST錠口腔用5mg
- ~~アスプールの液(0.5%)50mL/瓶~~
- アズレンうがい液4%「ケンエー」 5mL 【後】
- 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% 5mL/瓶
- 【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 2g/包（ハチアズレ）
- 劇アセサイド6%消毒液（第一剤，第二剤とも800mLセット）[1～25℃]
[内視鏡洗浄消毒装置OER-4専用]
- 劇アセサイド6%消毒液（第一剤，第二剤とも875mLセット）[1～25℃]
[内視鏡洗浄消毒装置OER-3専用]
- アセチロールタリーム20%25g【後】
- （尿素クリーム20%「SUN」へ名称変更）
（【般】尿素クリーム20% 25g/本へ切替）
- 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg（アンヒバ）
- アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL
- 【般】アダバレンゲル0.1% 15g/本（ディフェリンゲル）
- アテキュラ吸入用カプセル低用量
- アテキュラ吸入用カプセル中用量
- アテキュラ吸入用カプセル高用量
- アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g1瓶
- アドエア100ディスカス60吸入用 60リットル1キット
- アドエア250ディスカス60吸入用 60リットル1キット
- アドエア500ディスカス60吸入用 60リットル1キット
- アドフィードパップ40mg 10cm×14cm(7枚入)
- 劇日点アトロピン点眼液1% 5mL
- アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 1キット
- アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 1キット
- アノーロエリプタ7吸入用 1キット
- アノーロエリプタ30吸入用 1キット

- アバレプト懸濁性点眼液0.3% 5mL/瓶
- ~~アラセナール25μg1枚(10枚入)【後】~~
（トリアムシロロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」へ名称変更）
- ~~アボコート軟膏0.1%5g【後】~~
- アボハイドローション20% 4.32g/本
- アラセナールA軟膏3% 5g（【般】ピダラビン軟膏3% 5g/本へ切替）
- アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g1キット
- （【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用へ切替）
- アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 5mg10g1キット
- （【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用へ切替）
- アリケイス吸入液590mg 8.4mL瓶 [2～8℃]
- 劇アリドネパッチ27.5mg 1枚
- 劇アリドネパッチ55mg 1枚
- ~~（【般】アルロメタゾール点眼液0.1%5g/本（アルメタ軟膏）~~
- アルト原末 500mg1管
- アルメタ軟膏 0.1%5g（【般】なし）
- ~~（【般】アルロメタゾール点眼液0.1%5g/本へ切替）~~
- アレサガテープ4mg 1枚
- アレサガテープ8mg 1枚
- ~~アレジオン点眼液0.1%5mL/瓶~~
（エピナスチン塩酸塩L点眼液0.1%「SEC」へ切替）
（【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%へ切替）
- アレジオン眼瞼クリーム0.5% 2g/本
- 劇アンテベート軟膏0.05%5g
（院内はベタメタゾン酪酸エステル点眼液0.05%「MYK」）
- 劇アンテベートタリーム0.05%5g
（院内はベタメタゾン酪酸エステル点眼液0.05%「MYK」）
- 劇アンテベートローション0.05%10g
（院内はベタメタゾン酪酸エステル点眼液0.05%「JG」）
- アンヒバ坐剤小児用100mg [冷]
- アンヒバ坐剤小児用200mg [冷]
- （【般】アセトアミノフェン坐剤200mgへ切替）
- 麻劇アンベック坐剤10mg
- 【イ】
- イオウ・カンフルローション「東豊」 500mL [冷]
- 劇イクセロンパッチ4.5mg 1枚
（【般】リバスチグミンテープ4.5mgへ切替）
- 劇イクセロンパッチ9mg1枚
（【般】リバスチグミンテープ9mgへ切替）
- 劇イクセロンパッチ13.5mg1枚
（【般】リバスチグミンテープ13.5mgへ切替）
- 劇イクセロンパッチ18mg 1枚
（【般】リバスチグミンテープ18mgへ切替）
- 産婦人科用イソジンクリーム5% 250g
- ~~イソジンゲル点眼液7%30mL~~
（ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mLへ切替）
（【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本へ切替）
- イソジンゲル10% 90g
- イソジンシュガーペースタ軟膏100g【後】
（【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100g/瓶へ切替）
- イソジンシュガーペースタ軟膏500g 【後】
- 【般】イソプロピルウプロストン点眼液0.12% 5mL/瓶（レスキエ）
- イナビル吸入粉末剤20mg 1キット
- 劇イミグラン点鼻液20 20mg0.1mL1個
- 劇イムノブラダー膀胱注用80mg 1瓶（溶解液付） [冷]
- インターナル吸入液1%2mL1管（クロミド）
- インテバンクリーム1% 50g

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- インテパン外用液1%—50mL
- (【般】インドメタシン外用液1% 50mL/本へ切替)
- 【般】インドメタシン外用液1% 50mL/本 (インテパン)
- 【ウ】
- ※ ウエルアップハンドローション0.5% 1L
- (ヒビスコール液A 1% 1Lへ切替)
- ウトロゲスタン腔用カプセル200mg
- ウルティプロ吸入用カプセル
- ウロマチック S 泌尿器科用灌流液3% 3L
- 【エ】
- エイゾゾプト懸濁性点眼液1%—5mL
- (【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶へ切替)
- 劇エイベリス点眼液0.002% 2.5mL [2~8°C]
- エキザルベ軟膏 5g
- エキザルベ軟膏 500g
- エクラープラスター20 μ g/cm² (1.5mg)7.5cm×10cm
- エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用
- エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用
- エクロックゲル5%
- エコリシン眼軟膏 3.5 g
- A C D-A 液 500mL1袋
- エスクレ坐剤「250」 250mg [冷]
- エストラナテープ0.09mg 1.125cm²1枚
- エストラナテープ0.18mg 2.25cm²1枚
- エストラナテープ0.36mg 4.5cm²1枚
- エストラナテープ0.72mg 9cm²1枚
- エストリール腔錠0.5mg
- 【般】エストリオール腔錠0.5mg
- S P トローチ0.25mg「明治」 【後】
- (【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mgへ切替)
- エタノール[局] 500mL
- ~~【般】エタノール外用液~~
- エタノール[無水] 500mL
- エナジア吸入用カプセル中用量
- エナジア吸入用カプセル高用量
- 劇エビデュオゲル 15g
- エピナスチン塩酸塩 L X 点眼液0.1%「SEC」 5mL瓶 【後】
- 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1% (アレジオン L X)
- 【般】エフィナコナゾール外用液10%(クレナフィン爪外用液)
- 劇エムラクリーム 5g [凍結を避け30°C以下]
- 劇エムラパッチ 1枚 [禁凍結]
- エリザスカプセル外用400 μ g
- エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 5.6mg1瓶
- 塩化アルミニウム(6水和物) 500g
- 塩化ナトリウム 500g
- 塩化ベンザルコニウム液 (=逆性石ケン液0.025「ヨシダ」) 0.025%5 L
- エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
- エンペンシド外用液1%—10mL
- (クロトリマゾール外用液1%「日医工」へ切替)
- エンペンシドクリーム1%—10g
- (【般】クロトリマゾールクリーム1% 10g/本へ切替)
- 【オ】
- オイラックスクリーム10% 500g
- オイラックスHクリーム 5g
- オオサキ C H G 消毒綿0.2% [2枚/包] (物品供給センターで取扱い)
- 劇オキシロール軟膏25 μ g/g 10g
- (【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10g/本へ切替)
- 劇オキシロールローション25 μ g/g 10g

- オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」 【後】
- 【般】オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg (オキナゾール)
- オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入 252 μ g1キット
- オキシドール「クエー」 500mL
- オキナゾール腔錠600mg (オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」)
- オクソラレン軟膏0.3%—10g
- オクソラレンローション0.3%—60mL
- オスバン消毒液10% 500mL
- (【般】ベンザルコニウム塩化物外用液10% 500mL/本へ切替)
- オフミック点眼液 5mL/瓶 【後】
- オフロキサシンゲル化点眼液0.3%「わかもと」 5mL [冷] 【後】
- オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッ」 3.5g
- (オフロキシ眼軟膏0.3%より名称変更)
- オフロキシ眼軟膏0.3%—3.5g
- (オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッ」へ名称変更)
- オペガードMA眼灌流液 20mL
- ~~オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%—0.85mL筒—[冷]—【後]—~~
- (ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」へ名称変更)
- オラネジン液1.5% O R 消毒用7リットル10mL
- オラネジン液1.5% O R 消毒用7リットル25mL
- オラビ錠口腔用50mg
- オリブ油 (丸石) 500mL
- オリブ油「ヨシダ」(滅菌済) 100mL
- オルテクサー口腔用軟膏0.1% 5g 【後】
- (【般】トリアムシロニド口腔用軟膏0.1% 5gへ切替)
- オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用 11.2mg6.6 g 1キット
- オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g1キット
- 【般】オロパタジン点眼液0.1% (パタノール)
- オンプレス吸入用カプセル150 μ g
- 【カ】
- カタリンK点眼用0.005% 15mL
- ガチフロ点眼液0.3% 5mL
- カデックス軟膏0.9% 40g
- カルテオロール塩酸塩 L A 点眼液2%「わかもと」 2.5mL 【後】
- 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL/瓶 (ミケラン L A)
- 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本 (フロジン外用液)
- 【キ】
- キサラタン点眼液0.005%—2.5mL—[冷]
- (院内はラタノプロスト点眼液0.005%「グアイ」)
- (【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/瓶へ切替)
- キシロカイン液「4%」 100mL
- キシロカイン点眼液4% 20mL/瓶 [冷]
- 劇キシロカインポンプスプレー8% 80g 【後】
- キシロカインゼリー2% 30mL
- 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 (=塩化ベンザルコニウム液 0.025%)—5L
- (販売中止) (500mL/瓶へ切替)
- 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」
- (=塩化ベンザルコニウム液 0.025%) 500mL/瓶
- キュバール50エアゾール 7mg8.7g
- キュバール100エアゾール 15mg8.7g
- 劇ギリアデル脳内留置用剤7.7mg 1箱 (1枚入) [-15°C以下]
- 【ク】
- クエン酸ナトリウム 500g
- グラアルファ配合点眼液 5mL/瓶
- グラナテック点眼液0.4% 5mL
- クラベット点眼液1.5%—5mL
- (レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」へ切替)
- (【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/瓶へ切替)

- 劇グリジールスカルブローション0.05% 10g/本
(デルモベートスカルブローション0.05%が無くなり次第切替)
グリセリン 500mL
グリセリン「ケエ」(滅菌済) 25mL
グリセリンB C液「ヨシダ」 100mL (ポリ)
グリセリン洗腸液「ワタ」小児用30 50%30mL 【後】
グリセリン洗腸液50%「ケエ」 60mL
グリセリン洗腸液50%「ケエ」 120mL
- 【般】クワダマイシン酸エステルゲル1% 10g/本 (ダラシンTゲル)
グルコン酸クロルヘキシジン液 (=ステリコンW液0.05) 0.05%500mL
- タレナフィン爪外用液10%—3.56g
(院外は【般】エフィナコナゾール外用液10%へ切替)
- 【般】クロトリマゾール外用液1% 15mL/本 (エンベシド外用液)
- 劇クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イキ」 5g/本【後】
- 【般】クハ「タ」ール「ロ」ン酸エステル外用液0.05% 10g/本 (デルモベート)
- 【般】クハ「タ」ール「ロ」ン酸エステル軟膏0.05% 5g/本
- クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イキ」 5g/本
(キンダベート軟膏0.05%が無くなり次第切替)
- 【般】クハ「タ」ン酪酸エステル軟膏0.05% 5g/本 (キンダベート軟膏)
- 【般】クロトリマゾールクリーム1% 10g/本 (エンベシドクリーム)
クロマイ腔錠100mg
クロモグリク酸Na吸入液1%「サウイ」 2mL1管 【後】
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 250mL
- 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.05% 500mL/本 (ヒビテン)
- 【ケ】
- ケトコナゾールクリーム2%「イキ」 10g/本 【後】
(ニゾラールクリーム2%から切替)
- 【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g/本 (ニゾラールクリーム)
- ケトプロフェンテープ20mg「BMD」 7cm×10cm (7枚入) 【後】
- 【般】ケトプロフェンテープ 20mg(7×10cm非温感) 7枚/袋 (モラステープ)
- 【般】ケトプロフェンテープ 40mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (モラステープ)
- ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm (7枚入) 【後】
- 【般】ケトプロフェンパップ 30mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (モラステープ)
- 【般】ケトプロフェンパップ 120mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (モラステープXR)
- ケナロゲ口腔用軟膏0.1%—5g (院内はオルテクサー口腔用軟膏0.1%)
(【般】トリアミノアセトド口腔用軟膏0.1% 5g/本へ切替)
- ゲーベンクリーム1% 500g
- ケラチナミンヨーワタクリーム20%—25g (院内は尿素クリーム20%「SUN」)
(【般】尿素クリーム20% 25g/本へ切替)
- ケンエーハイポアルコール (=ハイポエタノール) 8% 500mL
- ゲンタシン軟膏0.1% 10g
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イキ」 10g/本
- 【コ】
- 麻劇ヨカイン塩酸塩「タダ」原末 (販売中止)
- ヨソゾト配合点眼液—5mL
(【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL/瓶へ切替)
- 劇コムクロシャンプー—0.05% [125g/本]
- コムレクス耳科用液1.5% 5mL/瓶
- コレクチム軟膏0.25% 5g/本
コレクチム軟膏0.5% 5g/本
- コンドロイチン点眼液1%「日点」 5mL/瓶 【後】
- 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mL (コンドロン)
- 【サ】
- サイプレジン1%点眼液 10mL

- サージセル・アデソパ・デール・ヘモスタットガーゼ型—5.1cm×7.6cm—【後】—
- サージセル・アデソパ・デール・ヘモスタットミニット—15.2cm×22.9cm—【後】—
- サージセル・アデソパ・デール・ヘモスタット綿型II(シート)—5.1cm×2.5cm—【後】—
[上記3種(サージセル)は医療機器扱いとなり、薬剤部での取り扱いとは終了]
- サテニジン液10 500mL 【後】
- ザーネ軟膏0.5%—500g
サーファクテン気管注入用120mg 1瓶 [冷]
- 劇サホライド液歯科用38% 5g
- ザラカム配合点眼液—2.5mL—[冷]
(【般】タタブロスト・フェール配合点眼液 2.5mL/瓶へ切替)
- サラゾピリン坐剤500mg
サリチル酸ワセリン軟膏5% (東豊) 500g 【後】
- 【般】サリチル酸軟膏5%
- サリベートエアゾール 50g
サルグマリン吸入用250μg 1瓶 [2〜8℃]
- サンコバ点眼液0.02%—5mL
(【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL/瓶へ切替)
- 劇サンピロ点眼液2% 5mL瓶
劇サンピロ点眼液3% 5mL (販売中止)
- 【シ】
- 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL/瓶 (サンコバ点眼液)
- シェルガン0.5眼粘弾剤 [1〜30℃] 【後】
ジオチルジウムスルサクサネート耳科用液5%「CEO」 10mL/瓶 【後】
- 【般】ジオチルジウムスルサクサネート点耳液5% 10mL/瓶
- ジクアス点眼液3% 5mL/瓶
(【般】ジクアホソルNa点眼液3%5mLへ切替)
ジクアスL X点眼液3% 5mL/瓶
- 【般】ジクアホソルNa点眼液3%5mL (ジクアス)
ジクトルテープ75mg 7cm×10cm 1枚/袋
- ジクロード点眼液0.1% 5mL [冷]
(院内はジクロフェナック点眼液0.1%)
(【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶へ切替)
劇ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 [冷] 【後】
劇ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 [冷] 【後】
劇ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 [冷] 【後】
- 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg (ボルタレン)
- 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg (ボルタレン)
- 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg (ボルタレン)
- 【般】ジクロフェナクNa外用液1% 50g/本 (ボルタレンローション)
- 【般】ジクロフェナクNaテープ15mg(7×10cm非温感) 7枚/袋 (ボルタレントープ)
- 【般】ジクロフェナクNaテープ30mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (ボルタレントープ)
- ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニト」 5mL [冷] 【後】
- 【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶
- 【般】ジフルコルトン吉草酸エステルクリーム0.1% 5g/本 (ネリゾナ)
- 【般】ジフルコルトン・リドカイン配合坐剤 (ネリプロクト)
- 【般】ジフルブレドナートクリーム0.05% 5g/本 (マイザー)
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イキ」 10g/本【後】 (【般】なし)
- 【般】ジフルブレドナート軟膏0.05%—10g/本 (マイザー)—
ジムソ膀胱内注入液50% 50mL/瓶
シムビコートタービュヘイラー60吸入 1キット
(【般】ブテソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入へ切替)
笑気ガス
- 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 1枚 【後】
- 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg (フランドルテープ)
- 劇硝酸銀「VTRS」原末 (院内製剤原料)
消毒用エタノール「ケンエー」 500mL/瓶

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

消毒用エタプロコール 500mL 【後】
親水ワセリン[®]500g
新レシカルボン坐剤 [冷]
【ス】
スクラピインS4%液 500mL
スタデルム軟膏5% 10g
ステリクロンW液0.05 (=グルコン酸クロルヘキジン液 0.05%)
0.05%500mL 【後】
(【般】クロルヘキジン[®]グルコン酸塩外用液0.05% 500mLへ切替)
劇ステサハイド20w/v%[®]500mL
スピオルトレスピマット28吸入 1キット
●スピオルトレスピマット60吸入 1キット
向スピジア点鼻液5mg 0.1mL/瓶
向スピジア点鼻液10mg 0.1mL/瓶
スピリーバ[®]2.5μgレスピマット60吸入 150μg1キット
●スピリーバ吸入用カプセル18μg [冷]
スピール膏M 25cm²1枚
●スプレキュア点鼻液0.15%[®]10mL
(【般】プセリン酢酸塩点鼻液0.15% 15.75mg10mL/瓶へ切替)
劇スープレ[®]吸入麻酔液 240mL/瓶
●スミルスチック3%[®]40g[®]【後】(販売中止)
(【般】フェルピナク軟膏3%[®]40g/本へ切替)
●スミルテープ35mg[®]7cm×10cm[®]【後】
(【般】フェルピナクテープ 35mg(7×10cm非温感) 14枚/袋へ切替)
【セ】
●精製水 オード[®] 単位mL [院外処方専用]
●【般】精製白糖・オビド[®]ノード[®] 配合軟膏 100g/瓶 (イソジン[®]ジョガ[®]ノバ[®]スタ)
生理食塩液(洗浄用：細口開栓) 500mL
生理食塩液(洗浄用：広口開栓) 1L
生理食塩液「ヒカリ」(広口開栓型) 500mL/瓶
※セクターローション3% 50mL (販売中止)
→セクターローション3% 100mL
(セクターローション3% 50mL (販売中止) が無くなり次第切替)
●セタネオ点眼液0.002% 2.5mL/本
●ゼビアックスローション2% 10g
●ゼフナート外用液2% 10mL
●ゼフナートクリーム2% 10g
●ゼベリン点眼液0.1% 5mL
劇セボフルラン吸入麻酔液「ニコ」 250mL 【後】
劇セボフルラン吸入麻酔液[®]250mL
(セボフルラン吸入麻酔液「ニコ」に切替)
●ゼボラストテープ40mg 10cm×14cm (7枚/袋)
●ゼボラスパップ40mg 10cm×14cm (7枚/袋)
●セルタッチテープ70 10cm×14cm (7枚/袋)
●セルタッチパップ70 10cm×14cm (7枚入)
(院内はフェルピナクパップ70mg「NP」)
●セルタッチパップ140 20cm×14cm (7枚入)
●セレベント50ディスカス 50μg60[®]リスタ[®]1キット
【ソ】
ソビラックス眼軟膏3% 5g
ソフラチュール貼付剤10cm (10.8mg)10cm×10cm1枚
【タ】
向ダイアアップ坐剤4 4mg
向ダイアアップ坐剤6 6mg
向ダイアアップ坐剤10 10mg
●【般】大腸菌死菌・ヒト[®]ロル[®]ン配合軟膏 2g/本 (強力[®]ステリ[®]ン)

○タオン外用液1%[®]15mL[®]【後】
(クロトリマゾール外用液1%「日医王」へ名称変更)
(【般】クロトリマゾール外用液1% 15mL/本へ切替)
●【般】タクロリムス軟膏0.1% 5g/本 (プロトピック軟膏)
タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ) 4.8cm×4.8cm [1~30°C]
タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ) 9.5cm×4.8cm [1~30°C]
●劇タブコム配合点眼液 2.5mL
(【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液へ切替)
●【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL (タブコム)
●【般】タフルプロスト点眼液0.005%1mL 2.5mL (タブロス)
※劇タブロス点眼液0.0015% 2.5mL
(【般】タフルプロスト点眼液0.005%1mLへ切替)
●ダランシン干ゲル1%[®]10g
(【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% 10g/本へ切替)
●タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g (院内はオフロキシン眼軟膏0.3%)
タリビッド耳科用液0.3% 5mL
●劇タリムス点眼液0.1% 5mL
【チ】
チモプトールX E 点眼液0.5%[®]2.5mL
※チモロールX E 点眼液0.5%「センジュ」 2.5mL 【後】(販売中止)
(2027年3月31日経過措置終了)
○チモロールX E 点眼液0.5%「ニット」 2.5mL 【後】
●【般】チモロール点眼液0.5%(持続性) 2.5mL/瓶 (チモプトールX E)
注射用水(洗浄用) 500mL
注射用水(洗浄用) 1L
【ツ】
●ツム 紫雲膏 [500g]501
●【般】ツロブテロールテープ0.5mg
○ツロブテロールテープ1mg「QQ」 【後】
●【般】ツロブテロールテープ1mg
○ツロブテロールテープ2mg「QQ」 【後】
●【般】ツロブテロールテープ2mg
【テ】
劇デイスオーパ消毒液0.55%[®]3.8L
(フタラール消毒液0.55%「ソエ」3.8Lへ切替)
●ディビゲル1mg 1包
●劇ディオフェランゲル0.1%[®]15g
(【般】アダパレンゲル0.1% 15g/本へ切替)
●【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg (S P トローチ)
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(2g/本)【後】(販売中止)
○デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/本) 【後】
●【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 5g/本
テゴ[®]51消毒液10%[®]3L (サテニジン液10へ切替)
デスパコーワ口腔用クリーム 5g
劇デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フエリナグ」
125μg5mL/瓶 [10°C以下]
●デタントール0.01%点眼液 5mL
●デュオトラバ配合点眼液[®]2.5mL
(【般】トラバプロスト・チモロール配合点眼液2.5mLへ切替)
麻劇デュロテップM干パッチ2.1mg[®]1枚
(【般】フェンタニルテープ2.1mg (3日用)へ切替)
麻劇デュロテップM干パッチ4.2mg[®]1枚
(【般】フェンタニルテープ4.2mg (3日用)へ切替)
●麻劇デュロテップMT干パッチ8.4mg 1枚 (【般】なし)
(【般】フェンタニルテープ8.4mg (3日用)へ切替)
テラ・コートリル軟膏 5g
テリルジー100エリブタ30吸入用 1キット
テリルジー200エリブタ30吸入用 1キット

- テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サリ」 10g 【後】
- 【般】テルピナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本（ラミシール）
テレミンソフト坐薬2mg [2～8℃]
テレミンソフト坐薬10mg
デンターグル含嗽用散20mg 1包
- 【ト】
劇トービ吸入液300mg 5mL管 [2～8℃]
劇トブシム軟膏0.05% 5g
（【般】フルオシノニド軟膏0.05% 5g/本へ切替）
- 劇トブシムローション0.05% 10g
劇トブラシン点眼液0.3% 5mL
劇トボネックス軟膏50 μ g/g→0.005%→10g
- 劇トボベットゲル 15g
劇トボベット軟膏 15g
- 劇トボベットフォーム 60g/本
- 【般】トラニラスト点眼液0.5% 5mL/瓶（リザベン点眼液）
- トラバタンズ点眼液0.004%→2.5mL [1～25℃]
- 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液
2.5mL/瓶（デュオトラバ配合点眼液）
- 【般】トラボプロスト点眼液0.004% 2.5mL/瓶（トラバタンズ）
劇トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 10mL [←100mL]
- トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μ g「大正」
（アフタシール25 μ gより名称変更）
- 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% 5g/本（ケナログ）
トルソプト点眼液1% 5mL
- 【般】トルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL/瓶（コソト配合点眼液）
劇トレプロスト吸入液1.74mg 2.9mL/管
トロンピン液モチダソフトボトル 1万 1万単位10mL1キット [冷]
- ドンペリドン坐剤10mg「日新」 【後】
- 【般】ドンペリドン坐剤10mg（ナウゼリン）
- 【ナ】
- ナイスピー点鼻液50 μ g→8.5mg8.5g→【後】
（【般】 β -クロメチル「ド」 α -ヒドロキシステル点鼻液50 μ g 8.5g/瓶へ切替）
- ナウゼリン坐剤10mg（院内はドンペリドン坐剤10mg「日新」）
（【般】ドンペリドン坐剤10mgへ切替）
ナウゼリン坐剤60 60mg
- 【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本（アクアチム）
- ナジフロキサシンクリーム1%「ト-7」 10g 【後】
- 【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g（アクアチム）
- ナジフロキサシンローション1%「ト-7」 【後】
- ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用→5mg10g1瓶
（【般】モメタゾン点鼻液50 μ g 10gへ切替）
ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用 9mg18g1瓶
（【般】モメタゾン点鼻液50 μ g 18gへ切替）
- ナナドラーA-Qネーザル50 μ g→8.5mg8.5g1瓶→【後】
（【般】 β -クロメチル「ド」 α -ヒドロキシステル点鼻液50 μ g 8.5g/瓶へ切替）
- 【ニ】
- ニコチネルT T S 10 17.5mg10cm²1枚
- ニコチネルT T S 20 35.0mg20cm²1枚
- ニコチネルT T S 30 52.5mg30cm²1枚
- [上記3種については、ニコチン依存症管理料の算定に伴う
処方時のみ保険適用]
- ニプラールナタリム2%→10g
（院内はケトコナゾールクリーム2%「イキ」へ切替）
（【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g/本へ切替）
- 劇ニトロダームT T S 25mg 10cm²1枚
- ニトロールスプレー1.25mg 10g瓶
- 【般】ニプラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶（ハイバジールコーワ）

- ニプラジロールP F点眼液0.25%「日点」→5mL/瓶→【後】
- 劇ニュープロパッチ2.25mg 2.25mg1枚
劇ニュープロパッチ4.5mg 4.5mg1枚
劇ニュープロパッチ9mg 9mg1枚
- 劇ニュープロパッチ13.5mg 13.5mg1枚
- 劇ニュープロパッチ18mg 18mg1枚
- 尿素クリーム20%「SUN」 25g/本 【後】
（アセチロールクリーム20%より名称変更）
- 【般】尿素クリーム20% 25g/本（ケラチナミンコーワ）
- 【ネ】
- ネオキシテープ73.5mg 1枚
ネオクリーナー「セネ」 10%30mL（歯科専用薬）
ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL
ネオメドロールE E軟膏 3g
ネキソブリッド外用ゲル5g [2～8℃]
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL
- 劇ネリゾナタリム0.1%→5g
（【般】ジフルコロン吉草酸エステルクリーム0.1% 5g/本へ切替）
- 劇ネリゾプロクト坐剤
（【般】ジフルコロン・リド「カイ」配合坐剤へ切替）
- 【ノ】
- 向劇ノルスバンテープ5mg 1枚
- 向劇ノルスバンテープ10mg 1枚
- 向劇ノルスバンテープ20mg 1枚
- 【ハ】
- ハイバジールコーワ点眼液0.25%→5mL
（院内はニプラジロールP F点眼液0.25%「日点」）
（【般】ニプラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶へ切替）
ハイポエタノール 8%（=ケンエハイ「アル」アルコール（健栄）） 500mL
- ハイポライト消毒液10% 有効塩素として10% 500g
[なるべく10℃以下] 【後】
白色ワセリン 500g
- 劇バクスマー点鼻粉末剤3mg V
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g
- パタノール点眼液0.1%→5mL
（【般】オロパタジン点眼液0.1%へ切替）
- 含嗽用ハチアズレ顆粒→0.1%2g1包
（【般】 α -ヒドロキシステルNa・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 2g/包へ切替）
パッチテストパネル（S） 2枚1組 [2～8℃]
- 劇パビロックミニ点眼液0.1% 0.4mL1個
パラオキシ安息香酸エチル（院内製剤原料）
パラマイシン軟膏→10g
パラマイシン軟膏→250g
パルミコート吸入液0.25mg 2mL1管
（【般】ブデソニド吸入液0.25mgへ切替）
- パルミコート吸入液0.5mg→2mL1管
（【般】ブデソニド吸入液0.5mgへ切替）
- パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 22.4mg1瓶
劇ハルロピテープ8mg 枚
- 劇ハルロピテープ16mg 枚
- 劇ハルロピテープ24mg 枚
- 劇ハルロピテープ32mg 枚
- 劇ハルロピテープ40mg 枚
パンコマイシン眼軟膏1% 5g [2～8℃]
- パンデル軟膏0.1% 5g
- パンデルローション0.1% 10mL

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

【ヒ】

- ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 0.85mL
(オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%より名称変更)
- 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL (ヒアレイン)
- 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL (ヒアレイン)
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL
(【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mLへ切替)
- セアレイン点眼液0.3%—5mL
(【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mLへ切替)
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL1個
- ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL1個
PA・ヨード点眼・洗眼液 0.2%20mL1瓶 [冷]
- ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%—0.46%20mL1瓶 (希釈液 (瓶) 付)—
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% 0.46%20mL1瓶 (希釈液 (袋) 付)
- ビソノテープ2mg 1枚
ビソノテープ4mg 1枚
- 【般】ビダラビン軟膏3% 5g/本 (アラセナA)
- 【般】ヒドロコルチゾンフラジオマイシン等配合軟膏—2g/本 (プロクトゼイル)
ヒビスコール液A1% 1L
5%ヒピテン液 500mL
(【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液5% 500mL/本へ切替)
- 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% (ルミガン)
ビマリシン点眼液5%「センジュ」 5mL
ビュアラビング 250mL
- セルトイドタリ—ム0.3%
(【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%へ切替)
セルトイドソナト軟膏0.3%—25g
(ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「プロ」へ切替)
(【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本へ切替)
- セルトイドフォーム0.3%—92g
(【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%へ切替)
- セルトイドローション0.3%—25g
(【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 25g/本へ切替)
ビレーズトリエアロスフィア120吸入 キット
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL 筒 [冷]

【フ】

- ブイタマ—クリーム1%
フィブラストスプレー500 500μg1瓶 (溶解液付) [冷]
劇液状フェノール「ケン—」 500mL
- フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」
- 【般】フェルピナク軟膏3%—40g/本
- 【般】フェルピナテープ 35mg(7×10cm非温感) 14枚/袋
- 【般】フェルピナテープ 70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋
- フェルピナタパップ70mg「東光」10cm×14cm(7枚入) 【後】—
(販売中止)
- 【般】フェルピナテープ 70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋
- 麻劇【般】フェンタニル酸塩テープ0.5mg—(1日用) 1枚 (フェントテープ)
- 麻劇【般】フェンタニル酸塩テープ1mg—(1日用) 1枚 (フェントテープ)
- 麻劇【般】フェンタニル酸塩テープ2mg—(1日用) 1枚 (フェントテープ)
- 麻劇【般】フェンタニル酸塩テープ4mg—(1日用) 1枚 (フェントテープ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ0.84mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ1.7mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ3.4mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ5mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ6.7mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ2.1mg (3日用) (フェンタニルMTテープ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ4.2mg (3日用) (フェンタニルMTテープ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ8.4mg (3日用) (フェンタニルMTテープ)

- 麻劇フェントテープ0.5mg 1枚
- 麻劇フェントテープ1mg 1枚
- 麻劇フェントテープ2mg 1枚
- 麻劇フェントテープ4mg 1枚
複方ヨード・グリセリン「コザイ・M」 500mL
フシジンレオ軟膏2% 10g
- 【般】プセリリン酢酸塩点鼻液0.15% 15.75mg10mL/瓶
劇フタラール消毒液0.55%「シエ」 3.8L (ディスオーバ)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本 (メンタックス)
(2027年3月31日削除予定)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本 (ボレー)
(2027年3月31日削除予定)
- 【般】ブデソニド吸入液0.25mg (パルミコート)
- 【般】ブデソニド吸入液0.5mg (パルミコート)
- 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 (シムコート)
フラジール腔錠250mg
- フラランドルテープ40mg—1枚
(院内は硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」)
(【般】硝酸イソソルビドテープ40mgへ切替)
- プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 mL/瓶 【後】
- 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% (アイファガン)
- 【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶 (エイゾプト)
- 【般】フルオシノニド軟膏0.05% 5g/本 (トプシム)
- フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 5mL 【後】
- フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」—5mL—【後】—
(フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」へ名称変更)
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% 5mL/瓶
- フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 5mL 【後】
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% 5mL/瓶
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 8.83mg10.6g1瓶
- フルタイド100μgエアゾール60吸入用 11.67mg7.0g1瓶
- フルタイド200ディスクス 200μg60ブリスト—1個
- 【般】フルチカソフランカルボキシル酸点鼻液27.5μg56噴霧用 (アラミスト)
- 【般】フルチカソフランカルボキシル酸点鼻液27.5μg120噴霧用 (アラミスト)
- 【般】フルチカソプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 8mL (フルナーゼ)
- フルティフォーム50エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム50エアゾール120吸入用 1瓶
- フルティフォーム125エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム125エアゾール120吸入用 1瓶
- フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用—4.08mg8mL1瓶
(【般】フルチカソプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 8mLへ切替)
- 劇フルメタ軟膏 0.1%5g
- 【般】フルルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)—
(ゼボラストープ)
- 劇プレオS軟膏5mg/g—0.5%5g
- 劇プレグランディン腔坐剤1mg [冷]
- 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%—15g/本—
(リドメックスコーワ)
- 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%—5g/本
(リドメックスコーワ)
- 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%—5g/本
(リドメックスコーワ)
- 劇プロウベス腔用剤10mg 個 [-20℃以下]
- プロタトセディール軟膏—2g
フロジン外用液5% 30mL 【後】
(【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本へ切替)
- 劇プロスタンディン軟膏0.003% 10g
局方プロテイン銀末 25g

- 劇プロトピック軟膏0.1% 5g
- (【般】タクロリムス軟膏0.1% 5g/本へ切替)
- 劇プロトピック軟膏0.03%小児用 5g
- デロナック点眼液0.1%—5mL
- (院内はブロムフェナクN a点眼液0.1%「日点」)
- (【般】ブロムフェナクN a点眼液0.1% 5mL/瓶へ切替)
- プロベト 500g
- デロムフェナクN a点眼液0.1%「日新」—5mL—【後】—
- (ブロムフェナクN a点眼液0.1%「日点」へ切替)
- ブロムフェナクN a点眼液0.1%「日点」 5mL/瓶 【後】
- 【般】ブロムフェナクN a点眼液0.1% 5mL/瓶 (プロナック)
- ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」 45mL 【後】
- 【般】ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL/瓶 (ビソルボン)
- プロメライン軟膏5万単位/g 20g
- フロリード腔坐剤100mg [冷]
- フロリードDクリーム1% 10g (【般】なし)
- 【へ】
- ペガモックス点眼液0.5%—5mL
- (モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」へ切替)
- (【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%へ切替)
- ヘキサックAL1%OR液16mm綿棒セット (物品供給センター取扱い)
- ベキロンクリーム0.5% 10g
- 【般】ベキロンクリーム0.5%点鼻液50μg 8.5g/瓶 (リノコート)
- 【般】ベキロンクリーム0.5%点鼻粉25μg 1.50mg/瓶
- (リノコートパウダースプレー)
- ベシカムクリーム5% 10g
- ベストロン耳鼻科用1% 5mL
- ベストロン点眼用0.5% 5mL
- ベセルナクリーム5% 250mg1包
- 【般】ベタキシロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶 (ベトプティック)
- 【般】ベタキシロール塩酸塩軟膏0.12% 5g/本 (リンデロンV)
- 【般】ベタキシロール塩酸塩外用液0.12% 10mL/本 (リンデロンV)
- 劇ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイク」 5g 【後】
- 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% 5g/本
- (リンデロンDP軟膏)
- ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」5mL【後】
- 【般】ベタメタゾンリン酸エステル外用液0.05%—10g/本 (アンテベート)—
- 劇ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF軟膏0.05%「MYK」 5g 【後】
- (【般】なし)
- 【般】ベタメタゾンリン酸エステル軟膏0.05%—5g/本 (アンテベート)—
- 劇ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF軟膏0.05%「MYK」 5g 【後】
- (【般】なし)
- 【般】ベタメタゾンリン酸エステル軟膏0.05%—5g/本 (アンテベート)—
- 劇ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF軟膏0.05%「JG」 10g 【後】
- (【般】なし)
- 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mL (リンデロン)
- ベトプティック点眼液0.5%—5mL
- (【般】ベタキシロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)
- ベネトリン吸入液0.5% 30mL
- ベノキシール点眼液0.4% 5mL/瓶
- 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (乳剤性) 25g/本 (ヒルドイド)
- 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% (ヒルドイドクリーム)
- 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% (ヒルドイド)
- 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本 (ヒルドイド)
- ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「エド」 25g/本 【後】
- ヘパリン類似物質ローション0.3%「ケル」 50g/本 【後】
- ベピオウォッシュゲル5% 20g/本
- ベピオゲル2.5% 15g/本 [25°C以下][禁凍結]

- ベピオローション2.5% 15g/本 [25°C以下][禁凍結]
- ヘモポリゾン軟膏 2g/本 【後】
- ペリオオフェール歯科用軟膏2%—10mg0.5g—[冷]—【後】—
- (ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」へ名称変更)
- ペリプラストPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組 [冷]
- ペリプラストPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組 [冷]
- ペリプラストPコンビセット組織接着用 5mL2キット1組 [冷]
- ペルベゾロンF点眼・点鼻液—5mL—[冷]—【後】—
- 【般】ペンタシリン塩化物外用液10% 500mL/本 (オスバン)
- ペンタサ坐剤1g
- ペンタサ注腸1g
- 劇ペンレステープ18mg—30.5mm×50.0mm1枚
- (院内はリドカインテープ18mg「YP」)
- 【ホ】
- ボアラ軟膏0.12% 5g
- ホタナサンテープ1mg—1枚 (【般】ソロブテロールテープ1mgへ切替)
- ホタナサンテープ2mg—1枚 (【般】ソロブテロールテープ2mgへ切替)
- 強力ポステリザン(軟膏)—2g—(ヘモポリゾン軟膏へ切替)
- (【般】大腸菌死菌・ヒドコロチン配合軟膏 2g/本へ切替)
- ホスミンS耳科用3% 10mL
- ボスミン外用液0.1% 500mL
- ポビドンヨード外用液10%「明治」 250mL 【後】
- 【般】ポビドンヨード外用液10% (イソノール非含有)
- ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 30mL 【後】
- 【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本
- 【般】ポビドンヨードゲル10% 20g/本 (イソジンゲル)
- ポビヨンスクラブ7.5% 500mL 【後】
- ボラザG軟膏 2.4g
- 劇ボルタレンサボ12.5mg—[冷]
- (院内はジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」)
- 劇ボルタレンサボ25mg—[冷]
- (院内はジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」)
- 劇ボルタレンサボ50mg—[冷]
- (院内はジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」)
- ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm (7枚入)
- ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm (7枚入)
- ボルタレンローション1%—50g
- (【般】ジクロフェナクN a外用液1% 50g/本へ切替)
- 特生ボルビール組織接着用 1mL4瓶1組 [冷]
- 特生ボルビール組織接着用 3mL4瓶1組 [冷]
- 特生ボルビール組織接着用 5mL4瓶1組 [冷]
- 劇ホルマリングアヤコールF G15mL [歯科専用薬]
- ボレー外用液1%—10mL
- (【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本へ切替)
- 劇ボンアルファ軟膏2μg/g 10g
- 劇ボンアルファハイ軟膏20μg/g 10g
- 劇ボンアルファハイローション20μg/g 10g
- 【マ】
- マイザー軟膏0.05%—5g
- (院内はジフルブレドナート軟膏0.05%「イキ」)
- (【般】ジフルブレドナート軟膏0.05% 10g/本へ切替)
- マイザークリーム0.05%—5g
- (【般】ジフルブレドナートクリーム0.05% 5g/本へ切替)
- 劇マイトマイシン眼科外用液用2mg
- 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10g/本 (オキサロール)
- 劇マーデュオックス軟膏 10g

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

【ミ】

- 劇ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g1缶
- ミオピン点眼液 5mL
- ミケランヒ点眼液2%—2.5mL
(院内はカルテオロール塩酸塩 L A点眼液2%「わかもと」へ切替)
(【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL/瓶へ切替)
ミケルナ配合点眼液 2.5mL
ミドリンM点眼液0.4% 5mL
ミドリンP点眼液—10mL (オフミック点眼液へ切替)
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 10mg0.5g [冷] 【後】
(ペリオフィール歯科用軟膏2%から名称変更)
ミレーナ52mg 1個
- ミロル点眼液0.5%—5mL
(【般】レボブノロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)

【ム】

- ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL
- ムコフィリン吸入液20% 17.62%2mL1包

【メ】

- 滅菌精製水 オダ 単位mL [院外処方専用]
メディクスワブ ポビドンヨード 4.5ml (物品供給センター取扱い)
- メトロニダゾールゲル0.75%「マルシ」 100g(チューブ)本 【後】
- 【般】メトロニダゾールゲル0.75% (ロゼックスゲル)
- メノエイドコンビパッチ 1枚 [冷]
メブチンエア—10μg吸入100回 0.0143%5mL1キット
メブチン吸入液0.01% 30mL
- メブチンスイングヘラー—10μg吸入100回 1mg1キット
- メンタツタスタリ—ム1%—10g
(【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本へ切替)

【モ】

- モイゼルト軟膏0.3% 10g/本
- モイゼルト軟膏1% 10g/本
- モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 5mL/瓶 【後】
- 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (ベガモックス)
- 【般】モメタゾン酢酸エステル軟膏0.1%—5g/本 (フルメタ)
- 【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用
- 【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用
- モーラステープ20mg—7cm×10cm (7枚入)—
(ケトプロフェンテープ20mg「BMD」へ切替)
(【般】ケトプロフェンテープ 20mg(7×10cm非温感) 7枚/袋へ切替)
- モーラステープL40mg—10cm×14cm (7枚入)—
(【般】ケトプロフェンテープ 40mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)
- モーラスパップ30mg 10cm×14cm (7枚入)
- モーラスパップ60mg 20cm×14cm (7枚入)
- モーラスパップXR120mg—10cm×14cm (7枚入)—
(【般】ケトプロフェンテープ 120mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)
- モーラスパップXR240mg 20cm×14cm (7枚入)

【ヤ】

- ヤクバンテープ60mg 15cm×14cm (7枚入)

【ユ】

- ユベラ軟膏 56g/本 [15°C以下]
- ユベラ軟膏—500g—[15°C以下] (ユベラ軟膏 56g/本へ切替)

【ラ】

- ラクティオンパップ70mg 10cm×14cm (7枚入)
- ラクリミン点眼液0.05% 5mL瓶
- 【般】ラタノプロスト・フル配合点眼液 2.5mL/瓶 (ザラカム配合)
- ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」 2.5mL/瓶 【後】
- 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/瓶 (キサラタン)
- 【般】ラノコナゾール軟膏1%—10mg/本 (アヌタット)—

劇ラバリムスゲル0.2% 10g [2～8°C]

- ラビジェル 60mL
- ラビジェル 250mL
- ラビショット 500mL
- ラミシールタリ—ム1%—10g
(院内はテルピナフィン塩酸塩クリーム1%「ワリ」)
(【般】テルピナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本へ切替)
- 【リ】
- リザベン点眼液0.5%—5mL
(【般】トラニラスト点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)
リティンパ耳科用250μgセット 1セット (溶解液付) [冷]
- 劇リドカインテープ18mg「YP」 1枚 【後】
リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g
- リドメックスコーワクリーム0.3% 5g
リドメックスコーワローション0.3% 15g (【般】なし)
(【般】デレニゾール吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%—15g/本へ切替)—
- サノヨートパウダースプレー—鼻用25μg—1.50mg—0.9087g1瓶
(【般】ベタメゾン酢酸エステル点鼻粉末25μg1.50mg/瓶へ切替)
- 【般】リバスチグミンテープ4.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)
- 【般】リバスチグミンテープ9mg (1日用) (イクセロンパッチ)
- 【般】リバスチグミンテープ13.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)
- 【般】リバスチグミンテープ18mg (1日用) (イクセロンパッチ)
- 【般】リバスチグミンテープ25.92mg (週2回用)
(リバルエン L A)
- 【般】リバスチグミンテープ51.84mg (週2回用)
(リバルエン L A)
- 劇リバルエンヒ点パッチ25.92mg—1枚—【後】—
- 劇リバルエンヒ点パッチ51.84mg—1枚—【後】—
硫酸バリミキシシンB散50万単位「ファイザー」1瓶
リレンザ 5mg17リスター (1枚：47リスター)
- リンデロン坐剤0.5mg
- リンデロン点眼液0.01% 5mL
- サンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%—5mL
(【般】ベタメゾン酢酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mLへ切替)
- 点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL [冷]
眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g
- 劇サンデロン—D—P軟膏—0.064%5g
(院内はベタメゾン酢酸エステル軟膏0.064%「テイク」)
(【般】ベタメゾン酢酸エステル軟膏0.064% 5g/本へ切替)
リンデロン—V軟膏0.12% 5g
(【般】ベタメゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5g/本へ切替)
リンデロン—Vローション0.12% 10mL
(【般】ベタメゾン吉草酸エステル外用液0.12% 10mL/本へ切替)
- リンデロン—V G軟膏0.12% 5g (院内はルリクールV G軟膏0.12%)
リンデロン—V Gクリーム0.12% 5g
リンデロン—V Gローション 0.12%10mL
- 【ル】
- ル・エストロジェル0.06% 80g
- ルコナック爪外用液5% 3.5g
ルティナス腔錠100mg [1～30°C]
- ルテウム腔用坐剤400mg [25°C以下]
ルミガン点眼液0.03% 2.5mL
(【般】ピマトプロスト点眼液0.03%へ切替)
ルリクールV G軟膏0.12% 5g 【後】
- ルリコナゾールクリーム1%「ワキ」 【後】
- 【般】ルリコナゾールクリーム1% (ルリコン)
ルリコナゾール—ム1%—10g (ルリコナゾールクリーム1%「ワキ」へ切替)
ルリコン液1% 10mL

【レ】

- レクタブル2mg注腸フォーム14回 48mg30.8g1瓶
- ~~レスキュラ点眼液0.12%—5mL—~~[冷]
(【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL/瓶へ切替)
レスタミンコーチゾン軟膏[強力] 10g
レスタミンコーワクリーム1% 1kg
- レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 5mL 【後】
(【般】レバミピド点眼液2%5mLへ切替)
- 【般】レバミピド点眼液2%5mL (ムコスタ)
- 向劇レペタン坐剤0.2mg
- 向劇レペタン坐剤0.4mg
- 【般】レボプロノール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶 (ミロル)
- レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 5mL/瓶 【後】
- 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/瓶 (クラビット)
- レルペア100エリプタ14吸入用 1キット
- レルペア100エリプタ30吸入用 1キット
- レルペア200エリプタ14吸入用 1キット
- レルペア200エリプタ30吸入用 1キット

【ロ】

- ロキソニンゲル1% 50g
(~~【般】ロキソプロフェンNaゲル1%—50g/本へ切替~~)
- ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm (7枚入)
- ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm (7枚入)
- ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm (7枚入)
(院内はロキソプロフェンNaパップ100mg「JG」)
- ~~【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg—(7×10cm非温感)~~
7枚/袋 (ロキソニンテープ)
- ~~【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg—(10×14cm非温感)~~
7枚/袋 (ロキソニンテープ)
- ロキソプロフェンNaパップ100mg「JG」
10cm×14cm 7枚/袋 【後】
劇ロコアテープ 10cm×14cm (7枚入)
ロコイドクリーム0.1% 5g
ロコイド軟膏0.1% 5g
ロゼックスゲル0.75% 15g/本 (皮膚科限定)
(院内はメトロニダゾールゲル0.75%「マルイ」へ切替)
(【般】メトロニダゾールゲル0.75%へ切替)
~~ロゼックスゲル0.75%—50g/本 (15g/本へ切替)~~
劇ロナセンテープ20mg 枚
劇ロナセンテープ40mg 枚

【ワ】

- 向劇ワコビタル坐剤15 15mg [冷]
- 向劇ワコビタル坐剤50 50mg [冷]
- ワンクリノン腔用ゲル90mg
- 麻劇ワンデューロパッチ0.84mg—1枚
(【般】フェンタニルテープ0.84mg (1日用)へ切替)
- 麻劇ワンデューロパッチ1.7mg—1枚
(【般】フェンタニルテープ1.7mg (1日用)へ切替)
- 麻劇ワンデューロパッチ3.4mg—1枚
(【般】フェンタニルテープ3.4mg (1日用)へ切替)
- 麻劇ワンデューロパッチ5mg—1枚
(【般】フェンタニルテープ5mg (1日用)へ切替)
- 麻劇ワンデューロパッチ6.7mg—1枚
(【般】フェンタニルテープ6.7mg (1日用)へ切替)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

注射薬リスト

【ア】
劇アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL 2mg1mLV [2～8℃]
アイモビーグ皮下注70mgペン 1mLキット
劇アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
2mg0.05mL筒 [2～8℃] [禁凍結]
劇アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL 0.07mLV [2～8℃]
劇アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL
0.07mL筒 [2～8℃] [禁凍結]
劇アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 1キット [2～8℃] [禁凍結]
●劇アウィクリ注 フレックスタッチ 総量700単位 1キット [2～8℃] [禁凍結]
劇アーウィナーゼ筋注用10000 10,000単位V [2～8℃]
アエントリベンタート静注1055mg V
劇アガルシダーゼ ペータ B S 点滴静注5mg「JCR」 1mLV [2～8℃] 【後】
劇アガルシダーゼ ペータ B S 点滴静注35mg「JCR」 7mLV [2～8℃] 【後】
劇アキネトン注射液5mg 1mLA (乳酸ビペリデン注5mg「ヨトシ」へ切替)
劇アキラルックス点滴静注250mg 50mLV [2～8℃]
劇アクテムラ点滴静注用200mg 10mLV [2～8℃]
●劇アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mLキット [2～8℃]
劇アクテムラ皮下注162mgシリンジ 0.9mL筒 [2～8℃]
劇アクトヒブ 10μgV [冷]
毒アクプラ静注用50mg V
劇アクラシノン注射用20mg V
アコアラシ静注用600 600国際単位V (溶解液付) [冷]
アコアラシ静注用1800 1800国際単位V (溶解液付) [冷]
アザクタム注射用1g V
○劇アザシチジン注射用100mg「サリ」 V 【後】
アシクロビル点滴静注液250mg「ト」 A 【後】
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター 1.5mLキット [2～8℃]
アスコルビン酸注500mgP B「日新」 A 【後】
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テ」 17.12%10mLキット 【後】
アセテート維持液3G「HK」 500mLP
アセトキープ3G注 (ソフトバッグ) 500mLP 【後】 (販売中止)
(アセテート維持液3G「HK」へ切替)
劇アセリオ静注液1000mgバッグ 100mLP
劇アセレンド注100μg 2mLV
アタラックス-P注射液 (25mg/mL) A
アタラックス-P注射液 (50mg/mL) A
●劇アダリムマブB-S皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」筒 [2～8℃] 【後】
(【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.8mLへ切替)
●【般】アダリムマブ注射用シリンジ20mg0.2mL
●【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.4mL
●【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.8mL
●【般】アダリムマブ注射用シリンジ80mg0.8mL
○劇アダリムマブB-S皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」キット [2～8℃] 【後】
(院外は【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.4mLへ切替)
●劇アダリムマブB-S皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」キット [2～8℃] 【後】
(【般】アダリムマブ注射用ペン型キット80mg0.8mLへ切替)
●劇アダリムマブB-S皮下注40mgペン0.8mL「FKB」キット [2～8℃] 【後】
(【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.8mLへ切替)
●【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.4mL
●【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.8mL
●【般】アダリムマブ注射用ペン型キット80mg0.8mL
アディノベイト静注用キット1000
1000国際単位キット (溶解液付) [冷]

アディノベイト静注用キット2000
2000国際単位キット (溶解液付) [冷]
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 20mL筒 【後】
アデノスキャン注60mg 20mLV
アデホス-L コーワ注10mg A [冷]
劇アトガム点滴静注液250mg 5mLA [2～8℃]
劇アドセトリス点滴静注用50mg V [2～8℃]
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL
劇アドトラザ皮下注150mgシリンジ1mL筒 [2～8℃] [禁凍結]
劇アドトラザ皮下注300mgペン 2mLキット [2～8℃]
アドナ注 (静脈用) 50mg 10mLA
(カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」へ切替)
アトニン-O注5単位 A [冷]
劇アドレナリン注0.1%シリンジ「テ」 1mL筒 【後】
(エピネフリン注0.1%シリンジ「テ」から名称変更)
劇アトロピン注0.05%シリンジ「テ」 1mL筒 【後】
劇アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニ」 0.05%1mLA
劇アナフラニール点滴静注液25mg A
※劇アナベイン注2mg/mL 100mLP
(ロビバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テ」へ切替)
劇アナベイン注7.5mg/mL 10mLA
(ロビバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テ」へ切替)
アネメトロ点滴静注液500mg 100mLV
向アネレム静注用20mg V
向アネレム静注用50mg V
劇アバスチン点滴静注用400mg/16mL V [冷]
劇アービタックス注射液100mg 20mL V [冷]
劇アビドラ注ソロスター 300単位キット [冷]
アブニション静注15mg 3mLA
毒アブラキサン点滴静注用100mg V
劇アブリスゴ筋注用 V (溶解液付) [2～8℃]
劇アフリベルセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」
2mg0.05mL筒 【後】 [2～8℃] [禁凍結]
アブレゾリン注射用20mg A
劇アボカイン皮下注30mg 3mL筒
●劇アボネックス筋注用シリンジ30μg 0.5mL筒 [冷]
●劇アボネックス筋注30μgペン 0.5mLキット [2～8℃]
劇アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 3mLA 【後】
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 2mLA
アミササン注100mg 10%1mLA
アミノレバン点滴静注 500mLP
アミパレン輸液200mL 1袋
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ 0.5mL筒 [禁凍結]
毒アムビゾーム点滴静注用50mg V [冷]
アラセナ-A点滴静注用300mg V
劇アラノンジー静注用250mg 50mLV
アサタストラ皮下注2.5mg 0.5mL筒
アサタストラ皮下注7.5mg 0.6mL筒
アサナミンF50注 50mg20mLA
(フルスルチアミン注50mg「日新」へ切替)
アサナミン注射液10mg 2mLA (販売中止)
劇アサマタ注射用100mg V
(ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」へ切替)
劇アサマタ注射用500mg V
(ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」へ切替)
○ アルガトロバンH I 注10mg/2mL「フ」 A 【後】 (アロノヒ注)
アルギニン点滴静注30g「AY」 10%300mLP (名称変更)
アルギニン点滴静注30g「YD」 10%300mLP

毒アルケラン静注用50mg V (溶解液付) アルスロマチック関節手術用灌流液 3L1P 麻劇アルチバ静注用5mg—V (レミフェタニル静注用5mg「第一三共」に切替) アルツディスポ関節注25mg 2.5mL筒 劇アルプロスタジル注5μg「サリ」 1mLA [冷] 【後】 劇アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「効効」 V 劇アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「効効」 V 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V 献血アルブミン20%静注4g/20mL「効効」 V 献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」—20%50mLV 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV 献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV 劇アレックスビー筋注用 120μgV (溶解液付) [2～8℃] ※劇アレビアチン注250mg 5mLA アレルゲンエキス診断用対照液 1.8mLV アレルゲンエキス治療用希釈液 1.8mLV アレルゲンスクラッチエキスを陽性対照液「トリ」 ヒスタミン二塩酸塩 2mLV [冷] 診断用アレルゲンスクラッチエキスを「トリ」 1mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」ヒダマシ1:1,000 2mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」大麦1:1,000 2mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」カミグラ花粉1:1,000 2mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」カミヤ花粉1:1,000 2mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」カシ1:1,000 2mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」米1:1,000 2mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」ヒダマシ花粉1:1,000 2mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」ヒダマシ花粉1:1,000 2mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」ヒダマシ花粉1:1,000 2mLV [冷] 診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」ヒダマシ花粉1:1,000 2mLV [冷] 治療用アレルゲンエキスを皮下注「トリ」アタシ花粉1:100 2mLV [冷] 治療用アレルゲンエキスを皮下注「トリ」 アタシ花粉1:1,000 2mLV [冷] 治療用アレルゲンエキスを皮下注「トリ」 カシ花粉1:100 2mLV [冷] 劇アロカリス点滴静注235mg 10mLV [2～8℃] 劇アロキシン静注0.75mg—5mLV アロフィセル注 4瓶1組 [専用輸送用容器で15～22℃] (発注管理は診療科で実施) 劇アンカロン注150—150mg3mLA (アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」へ切替) アンサー皮下注20μg 1mLA 安息香酸Naカフェイン注200mg「ア」 20%1mLA 【後】 (アンナカ注「ア」—20%より名称変更) 劇アンチレクス静注10mg 1%1mLA アンナカ注「ア」—20%—1mLA—【後】— (安息香酸Naカフェイン注200mg「ア」へ名称変更) 【イ】 イオパータ300注100mL—64.71%—V—【後】— (イオヘキソール300注100mL「F」へ名称変更) イオパータ300注シリンジ80mL—64.71%—筒—【後】— (イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」へ名称変更) イオパータ350注50mL—75.49%—V—【後】— (イオヘキソール350注50mL「F」へ名称変更) イオパータ350注100mL—75.49%—V—【後】— (イオヘキソール350注100mL「F」へ名称変更) イオパータ350注シリンジ100mL—75.49%—筒—【後】— (イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」へ名称変更) イオパミドール300注20mL「F」 61.24%20mL 【後】 (イオパロミン300注20mLより名称変更) イオパミドール300注50mL「F」 61.24%50mL 【後】 (イオパロミン300注50mLより名称変更) イオパミドール300注100mL「F」 61.24%100mL 【後】 (イオパロミン300注100mLより名称変更) イオパミドール370注20mL「F」 75.52%20mL 【後】 (イオパロミン370注20mLより名称変更) イオパミドール370注50mL「F」 75.52%50mL 【後】 (イオパロミン370注50mLより名称変更) イオパミドール370注100mL「F」 75.52%100mL 【後】 (イオパロミン370注100mLより名称変更) イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 61.24%100mL筒 【後】 (イオパロミン300注シリンジ100mLより名称変更) イオパミドール300注シリンジ150mL「F」 61.24%150mL筒 【後】 (イオパロミン300注シリンジ150mLより名称変更) イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 75.52%100mL筒 【後】 (イオパロミン370注シリンジ100mLより名称変更) イオバミロン注300シリンジ 61.24%100mL筒 イオバミロン注370 75.52%100mLV イオバミロン注370シリンジ 75.52%80mL筒 イオバミロン注370シリンジ 75.52%100mL筒 E O B・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL筒 イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」 62.34%50mL筒 【後】 イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 62.34%100mL筒 【後】 イオヘキソール300注100mL「F」 64.71%100mLV 【後】 (イオパーク300注100mLより名称変更) イオヘキソール350注50mL「F」 75.49%50mLV 【後】 (イオパーク350注50mLより名称変更) イオヘキソール350注100mL「F」 75.49%100mLV 【後】 (イオパーク350注100mLより名称変更) イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」 64.71%80mL筒 【後】 (イオパーク300注シリンジ80mLより名称変更) イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」 75.49%100mL筒 【後】 (イオパーク350注シリンジ100mLより名称変更) イオメロン300注100mL 61.24%V イオメロン300注シリンジ100mL 61.24%筒 イオメロン350注100mL 71.44%V イオメロン350注シリンジ100mL 71.44%筒 イオメロン350注シリンジ135mL (CT・尿路用) 71.44%筒 イーケプラ点滴静注500mg—5mLV (レベチラセタム点滴静注500mg「ア」へ切替) 劇イジュド点滴静注25mg 1.25mLV [2～8℃] 劇イジュド点滴静注300mg 15mLV [2～8℃] 劇イズカーゴ点滴静注用10mg V [2～8℃][禁凍結] イスコチン注100mg A 劇イストダックス点滴静注用10mg—10mg—V—(溶解液付)— インビスト注240 51.26%10mLV インビスト注300 64.08%10mLV 毒イダマイシン静注用5mg 5mgV イデルピオン静注用1000—1000国際単位V—(溶解液付)—[2～25℃] イデルピオン静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [2～25℃] ● イデルピオン静注用3500 3500国際単位V (溶解液付) [2～25℃] 劇イノバン注0.3%シリンジ 50mL筒 劇イノバン注100mg 5mLA 劇イブグリース皮下注250mgオートインジェクター 2mLキット [2～8℃]

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

イベニティ皮下注105mgシリンジ 1.17mL筒 [2～8℃]
劇注射用イホマイド1g V
●劇イミグランキット皮下注3mg 0.5mL筒
劇イミフィンジ点滴静注120mg 2.4mLV [2～8℃]
劇イミフィンジ点滴静注500mg 10mLV [2～8℃]
劇イムデトラ点滴静注1mg V（輸液安定化液付） [2～8℃]
劇イムデトラ点滴静注10mg V（輸液安定化液付） [2～8℃]
劇イムネース注35 35万国内標準単位V（溶解液付） [冷]
劇イムノマックス-γ注100 100万国内標準単位 V（溶解液付）
[凍結を避け10℃以下]
劇イモバックスポリオ皮下注0.5mL筒 [2～8℃]
劇イラリス皮下注射液150mg 1mLV [2～8℃]
劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト-7」 2mLV 【後】
劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト-7」 5mLV 【後】
劇イルミア皮下注100mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃]
●イロクテイト静注用1000 1000国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
●イロクテイト静注用1500 1500国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
●イロクテイト静注用2000 2000国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
●イロクテイト静注用3000 3000国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
●イロクテイト静注用4000 4000国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
インジゴカルミン注20mg「AFP」 0.4%5mLA
○劇インスリンアスパルトB S注ソロスターNR「サフィ」
300単位キット [2～8℃] 【後】
（院外は【般】インスリンアスパルト注射用ペン型キット300単位:NRへ切替）
●【般】インスリンアスパルト注射用ペン型キット300単位：NR
●劇インスリングルアルギンB S注カート「リ-」 300単位キット [2～8℃] 【後】
●劇インスリングルアルギンB S注キット「FFP」 300単位キット [2～8℃] 【後】
劇インスリングルアルギンB S注ミリオペン「リ-」
300単位キット [2～8℃] 【後】
●【般】インスリンリスプロ注射液100単位/mL：HU
○劇インスリンリスプロB S注ソロスターHU「サフィ」
300単位キット [2～8℃] 【後】
（院外は【般】インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位:HUへ切替）
【般】インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位：HU
劇インダシン静注用1mg V
劇インデラル注射液2mg 2mLA
イントラリボス輸液20% 100mLP 【後】
劇インフリキシマブB S点滴静注用100mg「NK」 V [2～8℃] 【後】
劇インフルエンザHA77チン 1mLV [冷]
【ウ】
劇ウィフガート点滴静注400mg 20mLV [2～8℃]
ヴィーンD輸液 500mLP（袋）
献血ヴェノグロブリンI H10%静注0.5g/5mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H10%静注2.5g/25mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H10%静注5g/50mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H10%静注10g/100mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H10%静注20g/200mL V [冷]
劇ウゴービ皮下注0.25mg SD 0.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]
●劇ウゴービ皮下注0.5mg SD 0.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]
●劇ウゴービ皮下注1.0mg SD 0.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]
●劇ウゴービ皮下注1.7mg SD 0.75mLキット [2～8℃] [禁凍結]
●劇ウゴービ皮下注2.4mg SD 0.75mLキット [2～8℃] [禁凍結]
●劇ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD 1mg1.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]
●劇ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD 2mg1.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]
●劇ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD 4mg3mLキット [2～8℃] [禁凍結]
●劇ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD 6.8mg3mLキット [2～8℃] [禁凍結]
●劇ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD 9.6mg3mLキット [2～8℃] [禁凍結]
ウログラライン注60%20mLA（ビジパーク270注20mLへ切替）

ウロナーゼ静注用6万単位 V
ウロミテキサン注100mg 1mLA
ウロミテキサン注400mg 4mLA
【エ】
劇エアウィン皮下注用45mg V [2～8℃]
劇エアウィン皮下注用60mg V [2～8℃]
HMG注用150単位「あすか」 V（溶解液付） [冷] 【後】
HMG注射用75IU「フェリク」 75単位V（溶解液付） 【後】
（2023年3月現在 供給停止）
乾燥H Bグロブリン筋注用200単位「ニヤク」 1mLV（溶解液付） [冷]
劇エキシデンサー皮下注100mgペン 1mLキット [2～8℃]
劇エクザール注射用10mg V [冷]
エクストラニール腹膜透析液（ツインバッグ）1.5LP
エクストラニール腹膜透析液（UVツインバッグ）1.5LP
エクストラニール腹膜透析液（シングルバッグ）2LP
エクストラニール腹膜透析液（シングルバッグ・機器専用）2LP
●エクストラニール腹膜透析液（ツインバッグ）2LP
劇エジャイモ点滴静注1.1g 22mLV [2～8℃] [禁凍結]
劇エスポー注射液750750国際単位A [冷]
（エポエチンアルファB S注750「JCR」へ切替）
●劇エタネルセプトB-S皮下注25mgペン0.5mL「MA」
25mg0.5mLキット [2～8℃] 【後】
（【般】エタネルセプト注射用ペン型キット25mgへ切替）
●劇エタネルセプトB-S皮下注50mgペン1.0mL「MA」
50mg1.0mLキット [2～8℃] 【後】
（【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mgへ切替）
●劇エタネルセプトB-S皮下注50mgペン1.0mL「TY」
50mg1.0mLキット [2～8℃] 【後】（販売中止）
（【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mgへ切替）
●【般】エタネルセプト注射用シリンジ25mg
●【般】エタネルセプト注射用シリンジ50mg
●【般】エタネルセプト注射用ペン型キット25mg
●【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mg
劇エトキシスクレロール1%注射液 30mLV
劇エトポシド点滴静注液100mg「サド」 5mLV 【後】
●エヌジェンラ皮下注60mgペン 1.2mL/キット [2～8℃]
エネフリード輸液 550mLキット
劇エビペン注射液0.15mg 1mg/2mL筒（注射量は0.3mL）
劇エビペン注射液0.3mg 2mg/2mL筒（注射量は0.3mL）
劇エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ 300mgキット
劇エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ 400mgキット
劇エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 V [2～8℃] 【後】
劇エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 V [2～8℃] 【後】
劇エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 V 【後】
劇エフェドリン「カキ」注射液40mg 1mLA
劇エブキンリ皮下注4mg 0.8mLV [2～8℃]
劇エブキンリ皮下注48mg 0.8mLV [2～8℃]
劇エポエチンアルファB S注750「JCR」
750国際単位0.5mLV [2～8℃] 【後】
劇エポジン皮下注シリンジ2400024000国際単位0.5mL筒 [冷]
劇エホチール注10mg 1%1mLA
劇エポプロステノール静注用0.5mg「ヤセン」 V 【後】
劇エポプロステノール静注用1.5mg「ヤセン」 V 【後】
エポプロステノール静注用「ヤセン」専用溶解液 50mLV
劇エボルトラ点滴静注20mg 20mLV
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター 1mLキット [2～8℃]
劇エムデラシンティ点滴静注用300mgV [2～8℃]
劇エムデラシンティ点滴静注用400mgV [2～8℃]

注射用エラスパール100 100mg V
劇エラプレース点滴静注液6mg 3mLV [2～8℃]
劇エリル点滴静注液30mg 2mLA
L H-R H注0.1mg「ニフ」 0.1mgA
モルカルチンF F 静注1000mgシリンジ5mL筒
(レボカルチンF F 静注1000mgシリンジ「トフ」へ切替)
劇エルシトニン注40単位 1mLA
劇エルゾニス点滴静注1000μg 1mLV [-20±5℃]
エルネオバNF1号輸液 1000mLキット
エルネオバNF2号輸液 1000mLキット
毒エルプラット点滴静注液100mg—20mLV
(オキサリプラチン点滴静注100mg「トフ」へ切替)
劇エルレフィオ皮下注44mg 1.1mLV [2～8℃]
劇エルレフィオ皮下注76mg 1.9mLV [2～8℃]
塩化ナトリウム10% 20mLA
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「効効」—0.5%2mLA 【後】
(プリンペラン注射液10mgへ切替)
劇エンスプリング皮下注120mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃]
劇エンタイビオ点滴静注用300mg V [2～8℃]
劇エンタイビオ皮下注108mgペン 0.68mLキット [2～8℃]
劇注射用エンドキサン500mg V [冷]
劇エンハーツ点滴静注用100mg V [2～8℃]
●劇エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL 1キット [2～8℃]
●劇エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL 1キット [2～8℃]
劇エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL—筒—[2～8℃]
(【般】エタネルセプト注射用シリンジ25mgへ切替)
●劇エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL—筒—[2～8℃]
(【般】エタネルセプト注射用シリンジ50mgへ切替)
●劇エンブレル皮下注50mgペン1.0mL—キット—[2～8℃]
(【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mgへ切替)
【オ】
オイパロミン300注20mL—61.24%—V—【後】—
(イオパミドール300注20mL「F」へ名称変更)
オイパロミン300注50mL—61.24%—V—【後】—
(イオパミドール300注50mL「F」へ名称変更)
オイパロミン300注100mL—61.24%—V—【後】—
(イオパミドール300注100mL「F」へ名称変更)
オイパロミン300注シリンジ100mL—61.24%—筒—【後】—
(イオパミドール300注シリンジ100mL「F」へ名称変更)
オイパロミン300注シリンジ150mL—61.24%—筒—【後】—
(イオパミドール300注シリンジ150mL「F」へ名称変更)
オイパロミン370注20mL—75.52%—V—【後】—
(イオパミドール370注20mL「F」へ名称変更)
オイパロミン370注50mL—75.52%—V—【後】—
(イオパミドール370注50mL「F」へ名称変更)
オイパロミン370注100mL—75.52%—V—【後】—
(イオパミドール370注100mL「F」へ名称変更)
オイパロミン370注シリンジ100mL—75.52%—筒—【後】—
(イオパミドール370注シリンジ100mL「F」へ名称変更)
大塚生食注2ポート100mL キット 【後】
毒オキサリプラチン点滴静注100mg「トフ」 20mLV 【後】
劇オキサロール注5μg 1mLA [冷]
麻劇オキファスト注50mg 1%5mLA
劇オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サド」 1mLA [冷] 【後】
オザグレルNa点滴静注80mg「効効」 4mLV 【後】
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg 0.75mL筒 [2～8℃]
劇オゼンピック皮下注2mg 1.5mLキット [2～8℃]
劇乾燥毒生おたふくかぜワクチン「効効」 1人用V [冷]

オーツカMV注
劇オニバイド点滴静注43mg 10mLV [2～8℃]
劇オノアクト点滴静注用150mg V
オパホルモンデポー筋注5mg—A
オビザー静注用500 500単位V (溶解液付) [2～8℃]
劇オビソート注射用0.1g A (溶解液付)
劇オビドレル皮下注シリンジ250μg 0.5mL筒 [2～8℃]
オフサグリーン静注用25mg V (溶解液付)
劇オブジーポ点滴静注20mg 2mLV [2～8℃]
劇オブジーポ点滴静注120mg 12mLV [2～8℃]
劇オブジーポ点滴静注240mg 24mLV [2～8℃]
オブチレイ320注シリンジ100mL 67.8%筒
オブチレイ350注シリンジ100mL 74.1%筒
オムニパーク240注10mL 51.77%V
オムニパーク300注シリンジ80mL 64.71%筒
オムニパーク300注シリンジ150mL 64.71%筒
オムニパーク350注シリンジ45mL 75.49%筒
オムニパーク350注シリンジ100mL 75.49%筒
オメブラゾール注射用20mg「日医工」 V 【後】
劇オサベス点滴用1%—200mLP—【後】—
(リドカイン点滴静注液1%「効効」へ名称変更)
劇オルダミン注射用1g 10%10gV
劇オルドレブ点滴静注用150mg V
オルプロサタス静注用3000—3000国際単位V (溶解液付)—[2～8℃]
劇オレンシア点滴静注用250mg V [2～8℃]
●劇オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL キット [2～8℃]
●劇オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL 筒 [2～8℃]
劇オンキャスパー点滴静注用3750 3,750国際単位V [2～8℃]
劇オンコピン注射用1mg V [冷]
劇オندانセトロン注4mgシリンジ「マルシ」 2mL筒 【後】
オンデキサ静注用200mg V [2～8℃]
劇オンパットロ点滴静注2mg/mL—8.8mg4.4mLV—[2～8℃]
(アムヴトラ皮下注25mgシリンジへ切替)
劇オンポー点滴静注300mg 15mLV [2～8℃]
劇オンポー皮下注100mgオートインジェクター 1mLキット [2～8℃]
劇オンポー皮下注200mgオートインジェクター 2mLキット [2～8℃]
【カ】
劇カイトサル注3mg—3mLA
(採用薬はグラニセトロン静注液3mg「サリ」へ切替)
毒カイプロリス点滴静注用10mg V [2～8℃]
毒カイプロリス点滴静注用40mg V [2～8℃]
劇カコージン注100mg—5mLA—【後】—
劇ガザイバ点滴静注1000mg 40mLV [2～8℃]
ガスター注射液20mg—2mLA
(ファモチジン静注20mg「日新」へ切替)
注射用カタクロット40mg—V
(オザグレルNa点滴静注80mg「効効」へ切替)
劇カタボンH点滴注600mg÷0.3%—200mLP
(ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」へ切替)
劇カドサイラ点滴静注用100mg V
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」 筒 【後】
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL 60.47%5mL筒
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL 60.47%10mL筒
カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 A
●劇ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ 0.5mL筒
カブリビ注射用10mg V (溶解液付) [2～8℃]
劇ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サリ」 V 【後】
劇ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サリ」 V 【後】

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

カーボスター透析剤~~1号~~ 6L瓶（カーボスター透析剤2号・Lへ切替）
カーボスター透析剤2号・L 9L瓶（炭酸水素ナトリウム液付）
カーミC A液 [KBS-200CA8L(C)] 200mL採血用
カーミC A液 [KBS-400CA8L(C)] 400mL採血用
カーミC A液 [KBT-400CA8L(C)] 400mL採血用
劇カルセド注射用20mg V
カルチコール注射液8.5%5mL A
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」
0.5%10mLA 【後】
カルペニン点滴用0.5g~~1~~V
毒カルボプラチン注射液50mg「NK」 5mLV
毒カルボプラチン注射液150mg「NK」 15mLV 【後】
毒カルボプラチン注射液450mg「NK」 45mLV 【後】
劇カンサイダス点滴静注用50mg V [2～8℃]
毒ガンシクロピル点滴静注用500mg「VTRS」 V 【後】（デノシン）
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニキウ」 1mLV（溶解液付）[冷]
劇乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タダ」 1人用V [冷]
劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 V（溶解液付）[冷]
劇乾燥弱毒生麻疹ワクチン「タダ」 1人分V（溶解液付）[冷]
劇乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V（溶解液付）[冷]
【キ】
劇キイトルーダ点滴静注100mg 4mLV [2～8℃]
劇キシロカイン注射液1% 100mLV
劇歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mLA [冷]
劇キシロカイン注ポリアンブ1%~~10mLA~~
（リドカイン塩酸塩注1%「日新」へ切替）
劇キシロカイン注ポリアンブ2%~~10mLA~~
（リドカイン塩酸塩注2%「日新」へ切替）
劇キシロカイン注射液「1%」エビレシ（1:100,000）含有 20mLV [冷]
キドパレン輸液
キドミン輸液 200mLP
劇ギャバロン髄注0.005% 1mLA
劇ギャバロン髄注0.05% 20mLA
劇ギャバロン髄注0.2% 5mLA
劇キャップボックス筋注シリンジ 0.5mL筒 [2～8℃] [禁凍結]
キュービシン静注用350mg~~1~~V [2～8℃]
（ダブトマイシン静注用350mg「コブ」へ切替）
キュービトル20%皮下注4g/20mL V [冷]
劇キロサイド注20mg A
劇キロサイド注100mg A
劇キロサイドN注1g~~1~~V
（採用薬はシタラピン点滴静注液1g「NIG」へ切替）
キンダリー透析剤A F5号 6LV（炭酸水素ナトリウム液付）
【ク】
劇クダニセトロン静注液3mg「アイム」~~3mLA~~ 【後】
劇グラニセトロン静注液3mg「サイ」 3mLA 【後】
クラピット点滴静注バッグ500mg/100mL~~1~~キット
（レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」へ切替）
グランシリンジ75 75 μ g 0.3mL筒 [冷]
（【般】フィルグラスチム注射用シリンジ75 μ gへ切替）
グランシリンジ150 150 μ g 0.6mL筒 [冷]
（【般】フィルグラスチム注射用シリンジ150 μ gへ切替）
※ グランシリンジM300 300 μ g 0.7mL筒 [冷]
クリアクター静注用80万 80万国際単位V
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mLP 【後】
劇クリースピータ皮下注10mg 1mLV [2～8℃]
劇タラーズピータ皮下注20mg 1mLV [2～8℃]
劇クリースピータ皮下注30mg 1mLV [2～8℃]

●劇クリースピータ皮下注20mgシリンジ 0.67mL筒 [2～8℃]
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 4mLA
グルアセト35注（ソフトバッグ） 500mLP 【後】
劇グルカゴンGノボ注射用1mg（添付溶解液なし） V [15℃以下]
※劇グルカゴンGノボ注射用1mg V（溶解液付） [15℃以下]
（グルカゴンGノボ注射用1mg（添付溶解液なし）へ切替）
グルトバ注1200万 1200万国際単位 V（溶解液付）
劇クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL筒
劇クレセンバ点滴静注用200mg V [2～8℃]
● グロウジェクト皮下注12mg 筒 [冷]
● クロスエイトMC静注用250単位 V（溶解液付）
● クロスエイトMC静注用1000単位 V（溶解液付）
献血グロベニン~~1~~ 静注用2500mg 50mLV（溶解液付）
献血グロベニン~~1~~ 静注用5000mg 100mLV（溶解液付）
【ケ】
KCL注20mEqキット「テモ」 1~~10~~20mLキット 【後】
ケイセントラ静注用500 500国際単位V（溶解液付） [25℃以下]
ケイセントラ静注用1000 1000国際単位V（溶解液付） [25℃以下]
ケイツーN静注10mg A
劇ケサンラ点滴静注液350mg 20mLV [2～8℃]
劇ケシンプタ皮下注20mgペン 0.4mLキット [2～8℃]
麻劇ケタラール静注用50mg 5mLA
ケナコルト~~1~~A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL V
劇ケブザラ皮下注200mgシリンジ~~1.14mL筒~~ [2～8℃]
●劇ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター 1.14mLキット [2～8℃]
~~1~~劇ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター 1.14mLキット [2～8℃]
（ケブザラ皮下注200mgシリンジが無くなり次第切替）
劇ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「サド」 V [2～8℃] 【後】
献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V
献血アルブミン20%静注4g/20mL「タダ」 V
献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」~~20%50mLV~~
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV
献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV
献血ヴェノグロブリンH10%静注0.5g/5mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンH10%静注2.5g/25mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンH10%静注10g/100mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンH10%静注20g/200mL V [冷]
献血グロベニン~~1~~ 静注用2500mg 50mLV（溶解液付）
献血グロベニン~~1~~ 静注用5000mg 100mLV（溶解液付）
献血ノンスロン500注射用 500単位V（溶解液付）
献血ノンスロン1500注射用 1500単位V（溶解液付）
献血ベニロン~~1~~ 静注用2500mg 50mLV（溶解液付）
献血ベニロン~~1~~ 静注用5000mg 100mLV（溶解液付）
劇ゲンタシン注40 40mgA
【コ】
コアテック注5mg 5mLA
劇コアベータ静注用12.5mg V
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
（=ローブリン） V（溶解液付）[冷]
劇コスメゲン静注用0.5mg V [冷]
劇コセンティクス皮下注150mgペン 1mLキット [2～8℃]
●劇コセンティクス皮下注300mgペン 2mLキット [2～8℃]
コートロシン注射用0.25mg V（溶解液付）[冷]
コートロシンZ筋注0.5mg V [冷]
劇ゴナックス皮下注用80mg V（溶解液付）
劇ゴナックス皮下注用120mg V（溶解液付）

ゴナトロピン注用5000単位 V [冷] (アンプルからバイアルへ切替)

- ゴナールエフ皮下注ベン300 300国際単位0.5mL筒 [冷]
- ゴナールエフ皮下注ベン450 450国際単位0.75mL筒 [冷]
- ゴナールエフ皮下注ベン900 900国際単位1.5mL筒 [冷]
- コパキソン皮下注20mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃]
- コバルトリイ 静注用250 250国際単位V (溶解液付) [冷]
- コバルトリイ 静注用500 500国際単位V (溶解液付) [冷]
- コバルトリイ 静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [冷]
- コバルトリイ 静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [冷]
- コバルトリイ 静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [冷]

劇ゴビーック水性懸濁注シリンジ 0.5mL筒 [10℃以下]

劇コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 0.03mg/0.3mL1筒 [2～8℃]

劇コントミン筋注25mg 5mLA

コンファクト F 静注用500単位 500単位V (溶解液付) [10℃以下]

【サ】

ザイボックス注射液600mg 300mLP

劇注射用サイメリン50mg V [冷]

劇サイモグロブリン点滴静注用25mg V [冷]

劇サイラムザ点滴静注液100mg 10mLV [冷]

劇サイラムザ点滴静注液500mg 50mLV [冷]

向サイレース静注2mg A

劇サークリサ点滴静注100mg 5mLV [2～8℃]

劇サークリサ点滴静注500mg 25mLV [2～8℃]

劇ザノサー点滴静注用1g V [2～8℃]

ザバクサ配合点滴静注用 V [2～8℃]

劇サーバリックス 0.5mL筒 [冷]

(シルガード9水性懸濁筋注シリンジへ切替)

劇サビーン点滴静注用500mg V

劇サフネロー点滴静注300mg 2mLV [2～8℃]

サブバック血液ろ過用補充液-B i 2020mLキット 【後】

サブラッド血液ろ過用補充液B-S-G 2020mLキット

劇サムタス点滴静注用8mg V

劇ザルトラップ点滴静注100mg 4mLV [2～8℃]

劇サンディミュン点滴静注用250mg 5%5mLA

劇サンドスタチン皮下注用50 μ g 1mLA [冷]

(採用薬はオクトレオチド酢酸塩皮下注50 μ g「サド」へ切替)

劇サンドスタチンLAR筋注用キット20mg 筒 (溶解液付) [2～8℃]

劇サンラベリン点滴静注用250mg V [冷]

劇サンリズム注射液50 50mg5mLA

【シ】

ジアグノグリーン注射用25mg V (溶解液付)

向ジアゼパム注射液10mg「NIG」 A 【後】

シアノキット注射用5gセット 5gV (溶解液付)

注射用GHRP科研100 100 μ gV [10℃以下] [禁凍結]

(注射用GHRP科研100 (溶解液付) より切替)

注射用GHRP科研100 100 μ gV (溶解液付) [冷]

- ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg キット [冷]
- ジェノトロピンゴークイック注用12mg キット [冷]

(院内はソマトロピンB-S皮下注10mg「サド」シュエパルへ切替)

- ジェノトロピンTC注用5.3mg 5.33mg筒 (溶解液付) [冷]
- ジェノトロピンTC注用12mg 筒 (溶解液付) [冷]

劇ジェービックV (=乾燥細胞培養日本脳炎77c) V (溶解液付) [冷]

毒ジェブタナ点滴静注60mg 1.5mLV (溶解液付) [15～30℃]

劇ジェムザール注射用1g V

(ゲムスタピン点滴静注液1g/25mL「サド」へ切替)

劇ジオン注無痛化剤付 10mLV (希釈液付)

劇ジギラノゲン注0.4mg 2mLA

劇シグニフォーLAR筋注用キット40mg 1キット (溶解液付) [2～8℃]

シグマート注2mg V [冷]

シグマート注48mg V [冷]

(ニコランジル点滴静注用48mg「サイ」へ切替)

シザナリン配合点滴静注液 2mLA 【後】

毒シスプラチン点滴静注10mg「マル」 20mLV 【後】

毒シスプラチン点滴静注50mg「マル」 100mLV 【後】

ジスロマック点滴静注用500mg V

劇歯科用シタネスト-オクタプレシナートリッジ 3%1.8mLA [冷]

○劇シタラピン点滴静注液1g「NIG」 50mLV 【後】

ジトリペンタートカル静注1000mg V

シナジス筋注液50mg 0.5mLV [2～8℃]

シナジス筋注液100mg 1mLV [2～8℃]

- ジビイ 静注用3000 3,000国際単位V (溶解液付) [2～8℃]

劇ジフォルタ注射液20mg 1mLV [2～8℃]

劇洗降ジフテリア破傷風混合トキソイド「サダ」 1mLV [冷]

劇ジブレキサ筋注用10mg V

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「フ」 200mLP 【後】

シベクトロ点滴静注用200mg V

劇シベノール静注70mg 5mL筒

劇シムジア皮下注200mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃]

劇シムジア皮下注200mgオートクリックス 1mLキット [2～8℃]

劇シムレクト 静注用20mg V (溶解液付) [冷]

シメチジン注200mg「NP」 2mLA 【後】

ジョイタル関節注30mg 3mL筒 [2～8℃]

ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL筒 [2～8℃]

ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド 0.36mLキット [2～8℃]

劇シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]

劇ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ 0.574mL筒 [2～8℃]

劇シングリックス筋注用 一人分V (溶解液付) [2～8℃]

劇シンビット 静注用50mg V

劇シンボニー皮下注50mgシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]

劇シンボニー皮下注50mgオートインジェクター 0.5mLキット [2～8℃]

【ス】

劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 V (溶解液付) [冷]

水溶性ブレドニン20mg A

スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルシ」 2mL筒 【後】

劇スキヤンドネストカートリッジ3% 1.8mLA

劇スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL 筒 [2～8℃]

劇スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL 筒 [2～8℃]

劇スキリージ皮下注360mgオートドーズ 2.4mLキット [2～8℃]

劇スキリージ点滴静注600mg 10mLV [2～8℃]

ステミラック注 1回分 [-80℃以下]

(輸血免疫移植部でのみ取扱い)

劇ステララ点滴静注130mg 26mLV [2～8℃]

劇ステララ皮下注45mgシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]

ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ 筒 [2～8℃]

ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 V

スピラザ髄注12mg 5mLV [2～8℃]

劇ズファジラン筋注5mg 0.5%1mLA

劇スミフェロン注D-S300万IU 筒 (注射針同梱) [冷]

劇スミフェロン注D-S600万IU 筒 (注射針同梱) [冷]

スルバシサン 静注用1.5g V

スルバシリン 静注用3g V

スロニメナH+注10mg/2mL A

(アルガトロバンH+注10mg/2mL「フ」へ切替)

【セ】

劇一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25 μ gV (溶解液付) [冷]

生食注シリンジ「NP」10mL 筒 【後】

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

● 生食注シリンジ「オツカ」10mL 筒 【後】
生食注シリンジ50mL「ニプロ」 筒 【後】
生理食塩液 20mLA
生理食塩液 50mLV
生理食塩液 100mLV
生理食塩液 250mLP
生理食塩液 500mLP (プラボトルからバッグへ切替)
生理食塩液「フレ」 1000mLP
生理食塩液 P L「フー」 2LP
※毒ゼオマイン筋注用100単位 V [25℃以下]
(ゼオマイン注用100単位へ名称変更)
→毒ゼオマイン注用100単位 V
●劇ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
●劇ゼップバウンド皮下注5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
●劇ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
●劇ゼップバウンド皮下注10mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
●劇ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
●劇ゼップバウンド皮下注15mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
劇セトロタイド注射用0.25mg V (溶解液付) [2～8℃]
セパセルインテグラ C A 400mL採血用 [ABD-400CA8FL]
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 V 【後】
劇セファランチン注10mg 2mLA
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 V 【後】
セフォタックス注射用1g V
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 V 【後】
セフトジジム静注用1g「VTRS」 V
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 V
セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 V 【後】
※劇ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ 25mg1キット
劇ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ 50mg1キット
劇ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ 75mg1キット
劇ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ 100mg1キット
劇ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ 150mg1キット
劇ゼプリオン T R I 水懸筋注525mgシリンジ 525mg1キット
劇セレネース注5mg 1mLA
【ソ】
●ソグルーヤ皮下注5mg 1.5mLキット [2～8℃]
●ソグルーヤ皮下注10mg 1.5mLキット [2～8℃]
●ソグルーヤ皮下注15mg 1.5mLキット [2～8℃]
ゾシン静注用4.5—4.5gV (タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」へ切替)
向劇ソセゴン注射液15mg A
ゾピラックス点滴静注用—250mgV
(アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」へ切替)
ソナゾイド注射用16μL V (溶解液付)
劇ソマチュリン皮下注90mg 筒 [冷]
劇ソマチュリン皮下注120mg 筒 [冷]
●ソマトロピン B S 皮下注5mg「サント」シュアパル
5mg筒 [2～8℃] 【後】
→ソマトロピン B S 皮下注10mg「サント」シュアパル
10mg筒 [2～8℃] 【後】
(ジェノトロピンゴックイック注用12mgが無くなり次第切替)
劇ゾメタ点滴静注4mg/100mL—V
(ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」へ切替)
劇ゾラデックス3.6mgデボ 筒 [冷]
劇ゾラデックス L A 10.8mgデボ 筒 [冷]
劇ソリクア配合注ソロスター キット [2～8℃]
劇ソリリス点滴静注300mg 30mLV [冷]
ソルアセト F 輸液 500mLP 【後】

ソル・コーテフ注射用100mg V (溶解液付)
ソル・コーテフ静注用500mg V (溶解液付)
劇ソルダクトン静注用100mg A
ソルデム1輸液 200mLP 【後】
ソルデム1輸液 500mLP 【後】
ソルデム3 A 輸液 200mLP 【後】
ソルデム3 A 輸液 500mLP 【後】
劇ゾルトファイ配合注フレックスタッチ キット [2～8℃]
ソル・メドロール静注用40mg 40mgV (溶解液付)
ソル・メドロール静注用125mg 125mgV (溶解液付)
ソル・メドロール静注用500mg 500mgV (溶解液付)
ソラクト輸液 500mLP 【後】
劇ゾレア皮下注150mgペン 1mL1キット [2～8℃]
劇ゾレア皮下注300mgペン 2mL1キット [2～8℃]
劇ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」 P 【後】
【タ】
ダイアニール—N—P—D—2 1.5腹膜透析液(シゲルバッグ) 2LP (販売中止)
ダイアニール—N—P—D—2 2.5腹膜透析液(シゲルバッグ) 2LP (販売中止)
●ダイアニール—N—P—D—4 1.5腹膜透析液(シゲルバッグ) 1LP
ダイアニール—N—P—D—4 1.5腹膜透析液(シゲルバッグ) 2LP (販売中止)
●ダイアニール—N—P—D—4 1.5腹膜透析液(シゲルバッグ) 5LP
●ダイアニール—N—P—D—4 2.5腹膜透析液(シゲルバッグ) 1LP
ダイアニール—N—P—D—4 2.5腹膜透析液(シゲルバッグ) 2LP (販売中止)
●ダイアニール—N—P—D—4 2.5腹膜透析液(シゲルバッグ) 5LP
ダイアニール P—D—2 4.25腹膜透析液(シゲルバッグ) 2LP
ダイアモックス注射用500mg V
劇タイガシル点滴静注用50mg V
劇タイサブリ点滴静注300mg 15mLV [2～8℃]
タイロゲン筋注用0.9mg V [冷]
劇ダウノマイシン静注用20mg V
タガメット注射液200mg—2mLA— (シメチジン注200mg「NP」へ切替)
劇ダカルバジン注用100 100mgV [冷]
タケブロン静注用30mg V
劇注射用タゴシッド200mg—V
(テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」へ切替)
タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」 4.5gV
タチオン注射用100mg A
劇ダトロウエイ点滴静注用100mg V [2～8℃]
ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」 V 【後】 (キュービシン)
劇ダラキューロ配合皮下注 15mLV [2～8℃]
劇ダラザレックス点滴静注100mg—5mLV—[2～8℃]
劇ダラザレックス点滴静注400mg—20mLV—[2～8℃]
ダルテパリン N a 静注5000単位/5mL「日新」
5,000低分子ヘパリン国際単位A 【後】 (フラグミン)
劇ダルビアス点滴静注用135mg V [2～8℃]
○劇ダルベゴエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」
0.5mL筒 【後】 [2～8℃] (ネスブ)
○劇ダルベゴエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」
0.5mL筒 【後】 [2～8℃] (ネスブ)
ダントリウム静注用20mg V
劇タンボコール静注50mg 5mLA
【チ】
チエナム点滴静注用0.5g V
注射用水 20mLA
注射用水 (=大塚蒸留水) 100mLV
注射用水 (=大塚蒸留水) 500mLV (PET専用・物流のみ)
注射用水 (洗浄用) 500mLV
注射用水 (洗浄用) 1000mLV

注射用水バッグ「フー」 1LP
劇チラーゼンS 静注液200 μ g 1mLA
劇沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mLV [冷]
劇沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「サダ」1mLA [冷]
(D T ピックへ切替)
【ツ】
劇一般診断用精製ツベルクリン (PPD)
1人用 0.25 μ g V (溶解液付) [冷]
【テ】
T R H 注0.5mg「フー」 A [冷]
劇テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」 V 【後】 (出荷停止)
劇D T ピック (=沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド) 0.1mLV [冷]
劇1%ディプリバン注-キット 500mg50mL筒
低分子デキストラン糖注 500mLP 【後】
デカドロン注射液1.65mg-0.5mL [冷]
(院内はデキサート注射液1.65mg)
デカドロン注射液6.6mg-2mL [冷]
(院内はデキサート注射液6.6mg)
○ デキサート注射液1.65mg 0.5mLA 【後】
○ デキサート注射液6.6mg 2mLV 【後】
劇デクスメドミジン静注液200 μ g「フー」 2mLV 【後】
劇テクベイリ皮下注30mg 3mLV [2~8℃]
劇テクベイリ皮下注153mg 1.7mLV [2~8℃]
テスチンデポー筋注用125mg 1mLA
劇テゼスパイア皮下注210mgペン 1.91mLキット [2~8℃]
劇テセントリク点滴静注840mg 14mLV [2~8℃]
劇テセントリク点滴静注1200mg 20mLV [2~8℃]
テタノプリン I H 静注250単位 V [冷]
テタノプリン I H 静注1500単位-V [冷]
劇テッペーザ点滴静注用500mg V [2~8℃]
デトキソール静注液2g 20mLV
劇テトラピクタ皮下注シリンジ-0.5mL筒 [冷]
毒デメニン点滴静注用500mg-V
(ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」へ切替)
劇テビムプラ点滴静注100mg 10mLV [2~8℃] [禁凍結]
デファイテリオ静注200mg 2.5mLV
劇テブダック点滴静注用40mg V [2~8℃]
テムセル H S 注 10.8mL1P [液体室素 (気相中)]
(輸血移植免疫部でのみ取扱い)
毒テモダール点滴静注用100mg V [2~8℃]
※劇デュピクセント皮下注200mgシリンジ 1.14mL筒 [2~8℃] [禁凍結]
(デュピクセント皮下注200mgペンへ切替)
劇デュピクセント皮下注200mgペン 1.14mLキット [2~8℃] [禁凍結]
劇デュピクセント皮下注300mgペン 2mLキット [2~8℃] [禁凍結]
劇テラルピシン注射用10mg V [冷]
劇テラルピシン注射用20mg V [冷]
○ テリバラチド B S 皮下注キット600 μ g「フダ」 キット [2~8℃] 【後】
(院外は【般】テリバラチド注射用キット600 μ g:FOへ切替)
● 【般】テリバラチド注射用キット600 μ g:FO
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター キット [2~8℃]
テルモ血液バッグ C P D A 200mL採血用セット [BB-SCD200J8A]
【ト】
劇ドキシル注20mg 10mLV [冷]
劇ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サド」-5mLV [冷]-【後】
(販売中止) (2027年3月31日経過措置終了 (予定))
劇ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」 V 【後】

劇ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サド」-25mLV [冷]-【後】
(販売中止) (ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」へ切替)
(2027年3月31日経過措置終了 (予定))
毒ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「フー」 V 【後】
毒ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「フー」 V 【後】
ドバストン静注50mg 0.25%20mLA
→劇ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 0.3%200mL袋 【後】
(ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」が無くなり次第切替)
※劇ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」 0.3%200mL袋 【後】
(ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」へ切替予定)
劇ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サウ」 5mLA 【後】
劇ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」-50mL筒-【後】
(ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テル」へ名称変更)
劇ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テル」 0.3%50mL筒 【後】
(ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」より名称変更)
劇ドブトレックス注射液100mg-A
(ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サウ」へ切替)
劇ドブポン注0.3%シリンジ-50mL-【後】
(ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」へ名称変更)
(ドブトレックス K 注600mgより切替)
劇トブラシン注60mg-A
劇ドブラム注射液400mg 20mLV
劇トボテン点滴静注40mg-2mLV
(院内はイリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トー」)
劇トボテン点滴静注100mg-5mLV
(院内はイリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トー」)
トラスツズマブ B-S 点滴静注用60mg「NK」-V [2~8℃]-【後】
トラスツズマブ B-S 点滴静注用150mg「NK」 V [2~8℃] 【後】
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 10%10mLA 【後】
劇トラマル注100 100mgA
トランサミン注10% 10mLA
毒トリセノックス点滴静注12mg 6mLV
劇トリピック (=沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン)
0.5mLV [10℃以下] [禁凍結]
劇トルツ皮下注80mgオートインジェクター 1mLキット [2~8℃]
向ドルミカム注射液10mg 2mLA (ミダゾラム注10mg「サド」へ切替)
劇トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL1キット [2~8℃]
●劇トルリシティ皮下注1.5mgアテオス 0.5mL1キット [2~8℃]
劇トリアキシン点滴静注液100mg/4mL V [2~8℃]
劇トリーバ注フレックスタッチ 300単位キット [2~8℃]
劇トレプロスト注射液200mg 20mLV
劇トレムフィア点滴静注200mg 20mLV [2~8℃]
劇トレムフィア皮下注100mgシリンジ 100mg1mL筒 [2~8℃]
劇トレムフィア皮下注200mgペン 2mLキット [2~8℃]
劇トロデルビ点滴静注用200mg V [2~8℃]
劇ドロレブタン注射液25mg 10mLV
【ナ】
●劇ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター 0.375mLキット [2~8℃]
劇ナノゾラ皮下注30mgシリンジ 0.375mL筒 [2~8℃]
劇ナファモスタット注射用10mg「SW」 V 【後】
毒ナーブローック筋注2500単位-0.5mLV-[2~8℃]
毒ナベルピン注40 4mLV [冷] (ロゼウス静注液40mgへ切替)
麻劇ナルベイン注2mg 1mLA
劇ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mLA
【ニ】
劇ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 2mLA 【後】
(サリベックス注 0.1% 2mg2mLより名称変更)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

劇ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 10mLA 【後】
(サリベックス注0.1% 10mg10mLより名称変更)
●ニコペリック腹膜透析液1.5L 袋(排液用パック付) 【後】
ニコランジル点滴静注用48mg「サリ」 V [冷] 【後】
ニモサン注射液500mg—10mLA
毒ニトプロ持続静注液6mg 2mLA [冷]
劇ニドラン注射用50mg—V
劇ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 A 【後】
劇ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「TE」 筒 【後】
ニトロール注5mgシリンジ 10mL筒
ニトロール持続静注25mgシリンジ 50mL筒
劇乳酸ビペリデン注5mg「ヨシ」 0.5%1mLA 【後】
劇ニューモバックスN Pシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]
【ヌ】
劇ヌーカラ皮下注100mgペン 1mLキット [2～8℃]
劇小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL筒 [2～8℃]
【ネ】
ネオアミュー輸液—200mLP
劇ネオシネジンコーワ注1mg 1mLA
劇ネオビタカイン注シリンジ5mL 筒
ネオファーゲン静注20mL A
ネオフィリン注250mg 10mLA
劇ネスズ注射液30 μ gプラシリンジ—0.5mL筒—[2～8℃]
(ダルベゴエチンアルファ注30 μ gシリンジへ切替)
劇ネスズ注射液60 μ gプラシリンジ—0.5mL筒—[2～8℃]
(ダルベゴエチンアルファ注60 μ gシリンジへ切替)
劇ネスズ注射液120 μ gプラシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]
【ノ】
ノイアート静注用1500単位—V—(溶解液付)—
(献血ノンスロン1500注射用へ切替)
ノイトロジン注50 μ g V (溶解液なし)
ノイトロジン注100 μ g V (溶解液なし)
ノイトロジン注250 μ g V (溶解液なし)
ノイロトロン注射液3.6単位 3mLA
劇ノクサフィル点滴静注300mg 16.7mLV [2～8℃]
ノバミン筋注5mg—1mLA (販売中止)
毒ノバントロン注10mg 5mLV
向劇ノーベルパール静注用250mg V
●ノボエイト静注用1500 1500国際単位V (溶解液付) [2～8℃]
ノボセブンH I 静注用5mgシリンジ 5mLV (溶解液付) [冷]
劇ノボラピッド注100単位/mL 10mLV [冷]
●劇ノボラピッド注フレックスタッチ—300単位キット—[冷]
(院内はインスリンアスパルトB S注用スターNR「サリ」へ切替予定)
(【般】インスリンアスパルト注射用ペン型キット300単位:NRへ切替)
●劇ノボラピッド注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボラピッド50ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボリンR注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボリンN注フレックスペン 300単位キット [2～8℃]
劇ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mLA
●ノルディトロピン フレックスプロ注5mg キット [冷]
●ノルディトロピン フレックスプロ注10mg キット [冷]
献血ノンスロン500注射用 500単位V (溶解液付)
献血ノンスロン1500注射用 1500単位V (溶解液付)
【ハ】
劇ハイカムチン注射用1.1mg—V (販売中止)
劇ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL V [2～8℃]
ハイカリックR F 輸液 500mLP

特生ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL 1セット [2～8℃]
パイタロット配合静注用—V—(溶解液付)—[10℃以下]
(パイクロット配合静注用2.5mLへ名称変更)
特生パイクロット配合静注用2.5mL V (2.5mL溶解液付)
特生ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL—V—[2～25℃] (販売中止)
特生ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ 筒 [2～25℃]
水溶性ハイドロコートン注射液100mg 2mLV
パクトラミン注 5mLA
毒パクリタキセル注100mg/16.7 mL「NK」 V 【後】
毒パクリタキセル注射液100mg「NP」—16.7mLV—【後】—(販売中止)
(2027年3月31日経過措置終了)
劇パーサビブ静注透析用シリンジ5mg 2mL筒 [2～8℃]
劇パージェタ点滴静注420mg/14mL V [2～8℃]
劇沈降破傷風トキシイド「生研」 0.5mLV [冷]
ハーセプチン注射用150 150mgV (溶解液なし) [2～8℃]
劇パドセブ点滴静注用30mg V [2～8℃]
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 1mLA
劇パピースモ硝子体内注射液120mg/mL—0.05mLV—[2～8℃]
劇パピースモ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg0.05mL筒 [2～8℃]
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100mLV [冷]
劇ハベカシン注射液200mg 4mLA
劇バベンチオ点滴静注200mg 10mLV [2～8℃]
パム静注500mg 20mLA
毒ハラヴェン静注1mg 2mLV
毒パラプラチン注射液50mg—5mLV
(カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」へ切替)
毒パラプラチン注射液150mg—15mLV
(カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」へ切替)
毒パラプラチン注射液450mg—45mLV
(カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」へ切替)
バル筋注100mg「AFP」 10%1mLA [冷]
劇パルタス注5 μ g—1mLA[冷]
(採用薬はアルブロスタジル注5 μ g「サリ」へ切替)
劇パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タリ」 P 【後】
劇ハロマンズ注100mg 1mLA
バンコマイシン点滴静注用0.5g「トリ」 V 【後】
パンテノール注500mg「KCC」—A—【後】—(供給停止)—
パンテノール注射液500mg—A
劇ハンブ注射用1000 1000 μ gV
【ヒ】
劇ピアスカイ注340mg 2mLV [2～8℃]
劇ビグラッツ点滴静注液150mg 6mLV
ピカネイト輸液 500mLP (ピカーボン輸液から切替)
ピカネイト輸液 1000mLP
ピカーボン輸液—500mLP (ピカネイト輸液 500mLへ切替)
劇ビキセオス配合静注用 (144mg) V [2～8℃]
ビクシリン注射用2g V
注射用ビクシリンS500 500mgV 【後】
劇ビクトーザ皮下注18mg 3mLキット [冷]
劇B C Gワクチン「デイス」乾燥 12mg 1人用V [冷]
ビジパーク270注20mL 54.97%V
劇ビシバニール注射用1KE V (溶解液なし) [10℃以下]
劇ビシバニール注射用5KE V (溶解液なし) [10℃以下]
劇ビスダイン静注用15mg V
セスタゲロピン皮下注用—V—(溶解液付)—[冷]
ゼンサルボン注4mg—0.2%2mLA
(プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タリ」へ切替)

劇ビダーザ注射用100mg—V
(アザチジン注射用100mg「ワイ」へ切替)
ピタンミン注射液500mg—A—[冷]
(アスコルビン酸注500mg P B「日新」へ切替)
ビタメジン静注用 V
→ ビリドキサル注10mg「イイ」 A
ヒトC R H 静注用100 μ g「コロ」 V (溶解液付)
ビトレシン注射液20 20単位1mLA [冷]
劇セフデラ配合皮下注—5.6mLV—[2～8℃]
(ヒフデラ配合皮下注シリンジへ切替)
劇ヒフデラ配合皮下注シリンジ 5mL筒 [2～8℃]
ビーフリード輸液 500mLキット
ビペラシリン N a 注射用1g「NIG」 V 【後】
(ペントシリン注射用1gVから切替)
ヒベルナ注25mg 2.5%1mLA
劇ビームゲン注[HB7ケチ] 5 μ g0.25mLV [冷]
劇ビームゲン注[HB7ケチ]—10 μ g0.5mLV—[冷]
(ヘプタボックス-IIへ切替)
劇ビムパット点滴静注100mg 10mLV
劇ビムパット点滴静注200mg—20mLV
劇ヒューマリン R 注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]
●劇ヒューマリン R 注カート 300単位筒 [冷]
劇ヒューマリン R 注ミリオペン 300単位キット [冷]
劇ヒューマリン N 注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]
劇ヒューマリン N 注ミリオペン—300単位キット—[冷]
●劇ヒューマリン3/7注ミリオペン [冷]
●劇ヒューマログ注100単位/mL—1000単位10mLV—[冷]
(【般】インスリンリスプロ注射液100単位/mL :HUへ切替)
●劇ヒューマログ注カート 300単位筒 [冷]
●劇ヒューマログ注ミリオペン—300単位キット—[冷]
(【般】インスリンスプリント注射用ペン型キット300単位:HUへ切替)
●劇ヒューマログ注ミリオペンHD—300単位キット—[冷]
(【般】インスリンスプリント注射用ペン型キット300単位:HUへ切替)
●劇ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位キット [冷]
●劇ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位キット [冷]
●劇ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL—筒—[冷]
(【般】アダリムマブ注射用シリンジ20mg0.2mLへ切替)
●劇ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL—筒—[冷]
(【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.4mLへ切替)
劇ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL キット [冷]
(【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.4mLへ切替)
○劇ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL 筒 [冷]
(院外は【般】アダリムマブ注射用シリンジ80mg0.8mLへ切替)
劇ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL キット [冷]
(【般】アダリムマブ注射用ペン型キット80mg0.8mLへ切替)
ビリヴィジェン10%静注2.5g/25mL V [2～25℃] [禁凍結]
ビリヴィジェン10%静注5g/50mL V [2～25℃] [禁凍結]
ビリヴィジェン10%静注10g/100mL V [2～25℃] [禁凍結]
ピリスコピン点滴静注50 10.55% 100mLV
劇ビーリンサイト点滴静注35 μ g V [2～8℃]
ビルテプソ点滴静注250mg 5mL V [冷]
ヒルトニン0.5mg注射液 A
劇ピロイ点滴静注100mg V [2～8℃]
劇ピロイ点滴静注300mg V [2～8℃]
劇ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター 1mLキット [2～8℃]
●劇ピンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター 2mLキット [2～8℃]

【フ】
ファイバ静注用1000 20mLV [2～8℃]
劇5—F U 注250mg—V—[2～8℃]
(フルオロウラシル注250mg「トワ」へ切替)
ファーストシン静注用1g V
劇ファセンラ皮下注30mgシリンジ—1mL筒—[2～8℃]
劇ファセンラ皮下注30mgペン 1mLキット [2～8℃]
劇ファブラザイム点滴静注用5mg V [冷]
劇ファブラザイム点滴静注用35mg V [冷]
劇ファルモルピシン注射用10mg—V
(エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」へ切替)
ファモチジン静注20mg「日新」 20mLA 【後】
劇ファンガード点滴用50mg—V
(ミカファンギン N a 点滴静注用50mg「コロ」へ切替)
フィコンパ点滴静注用2mg V
ライジオ35輸液—500mL P (グルアセット35注 500mLへ切替)
フィジオ140輸液 500mLP
フィニボックス点滴静注用0.5g V
劇ブイフェンド200mg静注用 V
フィブリノゲン H T 静注用1g「JB」 V (溶解液付) [冷]
フィプロガミン P 静注用 V [冷]
●フィラジル皮下注30mgシリンジ 3mL筒 [冷]
○フィルグラスチム B S 注75 μ gシリンジ「NK」
0.3mL/筒 [2～8℃] 【後】
(院外は【般】フィルグラスチム注射用シリンジ75 μ gへ切替)
○フィルグラスチム B S 注150 μ gシリンジ「NK」
0.6mL/筒 [2～8℃] 【後】
(院外は【般】フィルグラスチム注射用シリンジ150 μ gへ切替)
○フィルグラスチム B S 注300 μ gシリンジ「F」
0.7mL/筒 [10℃以下 禁凍結] 【後】
(院外は【般】フィルグラスチム注射用シリンジ300 μ gへ切替)
●【般】フィルグラスチム注射用シリンジ75 μ g
●【般】フィルグラスチム注射用シリンジ150 μ g
●【般】フィルグラスチム注射用シリンジ300 μ g
劇注射用フィルデシン1mg V [冷]
フェインジェクト静注500mg 10mLV
フェジン静注40mg 2mLA
劇フェスゴ配合皮下注M A 10mLV [2～8℃]
劇フェスゴ配合皮下注 I N 15mLV [2～8℃]
劇フェンロデックス筋注250mg 5mL筒 [冷]
フェトロージャ点滴静注用1g V [2～8℃]
向劇フェノバール注射液100mg—1mLA
○麻劇フェンタニル注射液0.1mg「テル」 0.005%2mLA 【後】
○麻劇フェンタニル注射液0.5mg「テル」 0.005%10mLA 【後】
●フェオルテオ皮下注キット600 μ g—0.005%10mLA
(【般】テリパラチド注射用キット600 μ g:FOへ切替)
劇注射用アサン10—10mgV
(ナファモスタット注射用10mg「SW」へ切替)
劇注射用アサン50 50mgV
劇ブスコパン注20mg 2%1mLA
劇ブスルフェクス点滴静注用60mg V [冷]
ブドウ糖 5% 20mLA
ブドウ糖 5% 50mLV
ブドウ糖 5% 100mLV
ブドウ糖 5% 250mLP (ブドウ糖からバックへ切替)
ブドウ糖 5% 500mLP (ブドウ糖からバックへ切替)
ブドウ糖 10% 20mLA
ブドウ糖 20% 20mLA

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

ゼドウ糖—50%20mL—（50%ブドウ糖注射液「ニッソ」へ切替）
ブドウ糖 50% 500mL P
ゼドウ糖—70%350mL P
50%ブドウ糖注射液「ニッソ」 20mLA
劇デラリア皮下注60mgシリンジ—1mL筒—[2～8℃]
劇ブラリアHⅠ皮下注60mgシリンジ0.5mL 筒 [2～8℃] 【禁凍結】
ブリビアクト 静注25mg 2.5mLV
ブリズバインド 静注液2.5g 50mLV [2～8℃]
デサディオオン 静注200mg—2mLV—
（スガマデクス 静注液200mgシリンジ「マルイ」へ切替）
プリンペラン注射液10mg 0.5%2mLA
（塩酸メトクロプラミド注射液10mg「効効」が無くなり次第切替）
フルオレサイト 静注500mg 5mLV 【後】
劇フルオロウラシル注250mg「トワ」 V [2～8℃] 【後】
劇フルオロウラシル注1000mg「トワ」 V [2～8℃] 【後】
フルカリック1号輸液 903mLキット
フルカリック2号輸液 1003mLキット
フルカリック3号輸液 1103mLキット
フルコナゾール 静注液50mg「ガイ」 0.1%50mLV 【後】
フルスルチアミン注50mg「日新」 20mLA 【後】
劇フルダラ 静注用50mg V
劇フルデカシン筋注25mg 1mLV
劇フルマゼニル 静注0.5mgシリンジ「アル」 5mL筒 【後】
フルマリン 静注用1g V
ブレアミン-P 注射液 200mL P
劇ブレオ注射用15mg V
劇ブレースデックス 静注液200μg「マルイ」—2mLV—
（デクスメデトミジン 静注液200μg「ニッソ」へ切替）
劇ブレースデックス 静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」 筒
水溶性ブレドニン20mg A
劇ブレバミス点滴静注240mg 12mLV
劇ブレビブロック注100mg 10mLV
劇ブレベナー20水性懸濁注 0.5mLキット [2～8℃]
劇ブーレンレップ点滴静注用100mg V [2～8℃]
デロイメンド点滴静注用150mg—V—[2～8℃]
（ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」へ切替）
プロギノン・デポー筋注10mg 1mLA
劇プログラフ注射液2mg 0.4mLA
デロゲデポー筋注125mg—1mLA—（販売中止）
（2027年3月31日経過措置終了）
デロゲホルモン筋注用25mg—1mLA—（販売中止）
（2027年3月31日経過措置終了）
プロジフ 静注液200 8%2.5mLV [冷]
劇プロスタルモン・F 注射液1000 1mg1mLA
劇プロスタンディオン注射用20μg—V—
（アルプロスタジラルファデクス注射用20μg「効効」へ切替）
劇プロスタンディオン500μg—V—
（アルプロスタジラルファデクス点滴静注用500μg「効効」へ切替）
○ フロセミド注20mg「NIG」 A 【後】
フロセミド注20mg「トワ」—A—【後】—
（フロセミド注20mg「NIG」へ切替）
劇プロタノールL 注0.2mg 0.02%1mLA
プロタミン硫酸塩 静注100mg「モダ」 1%10mLV
（ノボ・硫酸プロタミン 静注用100mgから名称変更）
プロハンス 静注シリンジ13mL 筒
劇プロポフォール 静注1%20mL「マルイ」 200mg20mLA 【後】
劇プロポフォール 静注1%100mL「マルイ」 1g100mLV 【後】
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイソ」 0.2%2mLA 【後】

劇静注用フローラン0.5mg V（溶解液無）
劇静注用フローラン1.5mg V（溶解液無）
静注用フローラン専用溶解液 50mLV
【へ】
ペイフォータス筋注50mgシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]
ペイフォータス筋注100mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃]
劇ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg0.05mL筒 [2～8℃]
劇ペガシス皮下注180μg—1mLV—[冷]
劇ペクティビックス点滴静注100mg 5mLV [冷]
ペグフィルグラスチムB S 皮下注3.6mg「ニッソ」
0.36mL筒 [バイオ後続] [2～8℃]
ペクルリー点滴静注用100mg V
毒ベスボンサ点滴静注用1mg V [2～8℃]
劇ベスレミ皮下注250μgシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃] 【禁凍結】
●劇ベタフェロン皮下注用960万国単位 V（溶解液付）
麻ベチロルファン注射液—1mLA—
麻ベチロルファン配合注H D 1mLA
劇ベナンボックス注用300mg V
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 V
献血ベニロン-I 静注用2500mg 50mLV（溶解液付）
献血ベニロン-I 静注用5000mg 100mLV（溶解液付）
ベネフィクス 静注用1000—1000万国単位V（溶解液付）—[1～30℃]
●ベネフィクス 静注用3000 3000万国単位V（溶解液付） [1～30℃]
劇ベバシズマブB S 点滴静注100mg「CTNK」4mLV—[2～8℃]—【後】—
劇ベバシズマブB S 点滴静注100mg「第一三共」
4mLV—[2～8℃]—【後】—（販売中止）
劇ベバシズマブB S 点滴静注400mg「CTNK」16mLV [2～8℃] 【後】
劇ベバシズマブB S 点滴静注400mg「第一三共」
16mLV—[2～8℃]—【後】—（販売中止）
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モダ」 筒 【後】
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ
「オツカ」10mL（ルアースリップタイプ） 筒 【後】
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ
「オツカ」5mL（ルアロックタイプ） 筒 【後】
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ
「オツカ」10mL（ルアースリップタイプ） 筒 【後】
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」—A—
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」—V—（名称変更）
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「YD」 V
劇ベズンド注100mg—5mLV—
（エトボシド点滴静注液100mg「サド」へ切替）
ヘブスプリンIH 静注1000単位 5mLV [冷]
劇ヘブタックス-II 水溶性懸濁注シリンジ0.5mL 筒 [2～8℃]
●ヘムライブラ皮下注30mg 1mLV [2～8℃]
ヘムライブラ皮下注60mg 0.4mLV [2～8℃]
ヘムライブラ皮下注90mg 0.6mLV [2～8℃]
ヘムライブラ皮下注105mg 0.7mLV [2～8℃]
ヘムライブラ皮下注150mg 1mLV [2～8℃]
劇ベメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 4mLV 【後】
劇ベメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 20mLV 【後】
●ペリセート360N 腹膜透析液 1.5LP（排液用バグ付）
●ペリセート400N 腹膜透析液 1.5LP
（排液用バグ付）【セフキャップシステム用】
ペリナートP 静注用500
（正常人血漿1mL中含有量の500倍（溶解液付）） V [冷]
毒ベルケイド注射用3mg V
ヘルニコア椎間板注用1.25単位 V [冷]
劇ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トワ」 V [2～8℃] 【後】

ペントキシラン注射用1g→V
(ピペラシリンNa注射用1g「NIG」V【後】へ切替)
劇ペンリスタ点滴静注用120mg V [2～8℃]
劇ペンリスタ点滴静注用400mg V [2～8℃]
劇ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター 1mLキット [2～8℃]
【ホ】
ボカブリア水懸筋注600mg 3mLV
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 V [2～8℃] 【後】
毒点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 6g250mLV
劇ホストイン静注750mg 10mLV [冷]
ホスホマイシナトリウム静注用2g「日医工」 V 【後】
劇ボスミン注1mg 0.1%1mLA
● ボックスゾゴ皮下注用0.4mg V (溶解液付) [2～8℃]
● ボックスゾゴ皮下注用0.56mg V (溶解液付) [2～8℃]
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg V (溶解液付) [2～8℃]
劇ボテリジオ点滴静注20mg 5mLV [2～8℃]
毒ボトックス注用50単位 V [冷]
劇ボートラザ点滴静注液800mg 50mLV [2～8℃]
劇ボナロン点滴静注バッグ900μg 100mLP
劇ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL P
劇ボプスカイン0.5%注50mg/10mL A
劇ボプスカイン0.75%注75mg/10mL A
ホメビゾール点滴静注1.5g「効タ」 V
劇ボライビー点滴静注用30mg V [2～8℃]
劇ボライビー点滴静注用140mg→V [2～8℃]
ボララミン注5mg 1mLA
劇ボリドカステレオール0.5%注2mL→A
劇ボリドカステレオール1%注2mL→A
劇ボリドカステレオール3%注2mL A
毒ボルテゾミブ注射用3mg「ト7」 V 【後】
ボルベン輸液6% 500mLP
劇ボンビバ静注1mgシリリンジ→1mL筒
ボンベンディ 静注用1300 1300国際単位V (溶解液付)
【マ】
劇マイトマイシン注用2mg V
毒マイロタージュ点滴静注用5mg V [2～8℃]
劇マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mLA
劇マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mLA
注射用マキシペーム1g→V
(セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」へ切替)
マキューイド眼注用40mg V
マグセント注100mL V
マグネスコープ静注38%シリリンジ13mL 筒
マグネスコープ静注38%シリリンジ15mL 筒
劇乾燥弱毒生麻しんワクチン「効タ」 1人分V (溶解液付) [冷]
劇乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン (=ミールビックII皮下注用)
1人分V (溶解液付) [8℃以下]
劇乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V (溶解液付) [冷]
劇マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
劇マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
● 劇マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
● 劇マンジャロ皮下注10mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
● 劇マンジャロ皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
● 劇マンジャロ皮下注15mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]
20%マンニトール注射液「YD」(袋) 300mL袋
【ミ】
劇ミオヨール静注5mg→10mLA【後】
(ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」へ名称変更)

ミオテクター冠血管注 A液 495mLV
ミオテクター冠血管注 B液 5mLA
劇ミカファンギンNa点滴静注用50mg「フナ」 V 【後】
(ファンガード点滴用50mgから切替)
向ミダゾラム注射液10mg「NIG」 2mLA 【後】
向ミダゾラム注10mg「サト」→2mLA【後】 (出荷停止)
(ミダゾラム注射液10mg「NIG」へ切替)
向ミダフレッサ静注0.1% 10mg10mLV
劇ミチーガ皮下注用30mgバイアル V [2～8℃]
劇ミチーガ皮下注用60mgシリリンジ 筒
ミッドペリック135腹膜透析液 1.5LP (排液用バッグ付)
● ミッドペリック135腹膜透析液 2LP (排液用バッグ付)
ミッドペリック135腹膜透析液→2LP (排液用バッグ無し)
● ミッドペリック250腹膜透析液 1.5LP (排液用バッグ付)
ミッドペリック250腹膜透析液→2LP (排液用バッグ無し)
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」 V 【後】
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイ」→V【後】
(ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」へ名称変更)
ミノマイシン点滴静注用100mg→V
(ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」へ切替)
ミラクリッド注射液5万単位 1mLA
ミラクリッド注射液10万単位 2mLA
劇ミリブラ動注用70mg V [冷]
ミリブラ用懸濁用液4mL A
劇ミルセラ注シリリンジ25μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミルセラ注シリリンジ50μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミルセラ注シリリンジ75μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミルセラ注シリリンジ100μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミルセラ注シリリンジ150μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミールビックII皮下注用 (=乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン)
1人分V (溶解液付) [8℃以下]
劇ミリリン注10mg「効タ」 10mLA 【後】
劇ミルサーラ注射液10mg→10mLA (ミリリン注10mg「効タ」へ切替)
【ム】
無水エタノール注「フナ」 5mLA
【メ】
メイロン静注7% 20mLA
メイロン静注7% 250mLP
メイロン静注8.4% 20mLA
劇メグルダーゼ静注用1000 1000単位V [2～8℃]
○ メコバラミン注500μg「NP」 0.5mgA 【後】
劇注射用メソトレキセート50mg V
劇メソトレキセート点滴静注液200mg 8mLV
劇メソトレキセート点滴静注液1000mg 40mLV
メチコパール注射液500μg→A
(院内はメコバラミン注500μg「NP」)
劇メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 0.02%1mLA [冷] 【後】
劇メチレンブルー静注50mg「第一三共」 10mLA
● 劇メトジェクト皮下注7.5mgシリリンジ0.15mL 筒 [25℃以下][禁凍結]
(院内はメトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL切替)
● 劇メトジェクト皮下注10mgシリリンジ0.20mL 筒 [25℃以下][禁凍結]
(院内はメトジェクト皮下注10mgペン0.20mL切替)
● 劇メトジェクト皮下注12.5mgシリリンジ0.25mL 筒 [25℃以下][禁凍結]
(院内はメトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL切替)
● 劇メトジェクト皮下注15mgシリリンジ0.30mL 筒 [25℃以下][禁凍結]
(院内はメトジェクト皮下注15mgペン0.30mL切替)
劇メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL キット [25℃以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注7.5mgシリリンジ0.15mLが無くなり次第切替)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

劇メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL キット [25℃以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mLが無くなり次第切替)
劇メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL キット [25℃以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mLが無くなり次第切替)
劇メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL キット [25℃以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mLが無くなり次第切替)
劇メナクトラ筋注—0.5mLV—[2～8℃]
(メンクアッドフィ筋注へ切替)
メルカゾール注10mg A
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 V 【後】
メロペネム点滴用バイアル0.5g—V
(メロペネム点滴静注用0.5g「明治」へ切替)
劇メンクアッドフィ筋注 0.5mLV [2～8℃]
(メナクトラ筋注から切替)
【モ】
劇モゾビル皮下注24mg 1.2mLV
モノヴァー静注1000mg 10mLV
モリヘパミン点滴静注—500mLP
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1%1mLA
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タダ」 1%5mLA
【ヤ】
劇ヤーボイ点滴静注液50mg 10mLV [2～8℃]
【ユ】
ユナシン—S 静注用1.5g—V (スルバシリン静注用1.5gへ切替)
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g V
劇ユニツキシム点滴静注17.5mg/5mL V [2～8℃]
劇ユプリズナ点滴静注100mg 10mLV [2～8℃]
劇ユルトミリスH I 点滴静注300mg/3mL V [2～8℃]
【ヨ】
毒ヨンデリス点滴静注用0.25mg V [2～8℃]
毒ヨンデリス点滴静注用1mg V [2～8℃]
【ラ】
ライザケア輸液 1L袋 (ルタテラ静注専用)
劇ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位キット [2～8℃]
劇ライブリバント点滴静注350mg 7mLV [2～8℃]
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mLキット
ラシセタス注20mg—A (フロセミド注20mg「トリ」へ切替)
劇ラスピック点滴静注キット150mg キット (希釈液付)
劇ラスリテック点滴静注用1.5mg V (溶解液付) [冷]
劇ラニビズマブB S 硝子体内注射用キット10mg/mL「セツェ」
0.5mg0.05mL筒 [2～8℃] 【後】
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg 60mLP
劇ラボナール注射用0.5g A
毒ランダ注—10mg20mLV
(シスプラチン注「マルコ」10mg20mLへ切替)
毒ランダ注—50mg100mLV
(シスプラチン注「マルコ」50mg100mLへ切替)
●劇ランタス注ソロスター 300単位キット [冷]
劇ランタスX R 注ソロスター 450単位キット [冷]
劇ランマー—タ皮干注120mg 1.7mLV [2～8℃]
劇ランマークH I 皮下注120mgシリンジ1.0mL 1mL筒 [2～8℃][禁凍結]
【リ】
劇リカムビス水懸筋注900mg 3mLV [2～8℃]
劇リクラスト点滴静注液5mg(バッグ) 100mLP
リコモジュリン点滴静注用12800 12800単位V
劇リサイオ点滴静注液100mg 2.5mLV [2～8℃]
劇リストイーゴ皮下注280mg 2mLV [2～8℃]
劇リスパダールコンスタ筋注用25mg—キット (懸濁用液付)—[冷]

リツキサン点滴静注100mg 10mLV [2～8℃]
リツキサン点滴静注500mg 50mLV [2～8℃]
リツキシマブB S 点滴静注100mg「KHK」 10mLV [2～8℃] 【後】
リツキシマブB S 点滴静注500mg「KHK」 50mLV [2～8℃] 【後】
劇リドカイン点滴静注液1%「効タ」 200mLP 【後】 (出荷停止)
劇リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mLA 【後】
劇リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mLA 【後】
劇リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 5mL筒 【後】
劇リトドラン塩酸塩点滴静注液50mg「FF」—1%5mLA
[2～8℃]—【後】—(販売中止) (2027年3月31日経過措置終了(予定))
劇リトドラン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 1%5mLA
[5℃以下] 【後】
リビオドール480注10mL A
劇リブタヨ点滴静注350mg 7mLV [2～8℃]
劇リブレガル点滴静注用3.5mg V [冷]
劇リメタゾン静注2.5mg 1mLA
硫酸Mg 補正液1mEq/mL 0.5%#20mLA
劇リユーブリン注射用キット1.88mg—筒
(リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」へ切替)
劇リユーブリン注射用キット3.75mg—筒
(リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」へ切替)
劇リユープリンP R O 注射用キット22.5mg 筒
劇リユープリンS R 注射用キット11.25mg 筒
劇リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 筒 【後】
劇リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 筒 【後】
○劇リユープロレリン酢酸塩S R 注射用キット11.25mg「NP」 筒 【後】
リン酸Na 補正液0.5mmol/mL 0.5%#20mLA
リンデロン注2mg(0.4%) A [冷]
【ル】
劇ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL 0.5mg0.05mLV [2～8℃]
劇ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL
0.5mg0.05mL筒—[2～8℃]
※劇ルミセフ皮下注210mgシリンジ 1.5mL筒 [2～8℃]
(ルミセフ皮下注210mgペンへ切替予定)
→劇ルミセフ皮下注210mgペン 1.5mLキット [2～8℃]
(ルミセフ皮下注210mgシリンジが無くなり次第切替)
劇ルムジェブ注ミリオペン 300単位キット [冷]
劇ルンスミオ皮下注5mg 0.5mLV [2～8℃]
劇ルンスミオ皮下注45mg 1mLV [2～8℃]
【レ】
レギチーン注射液5mg 0.5%1mLV [冷]
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(ツインバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(UVツインバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(ツインバッグ) 2LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(UVツインバッグ) 2LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(シングルバッグ・機器専用) 2.5LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(シングルバッグ・機器専用) 5LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(ツインバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(UVツインバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(ツインバッグ) 2LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(シングルバッグ・機器専用) 2.5LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(シングルバッグ・機器専用) 5LP
レギュニールH C a 4.25腹膜透析液(シングルバッグ) 2LP
レギュニールL C a 4.25腹膜透析液(ツインバッグ・排液用バッグ付) 2LP
レギュニールL C a 4.25腹膜透析液(UVツインバッグ・排液用バッグ付) 2LP
レクビオ皮下注300mgシリンジ 1.5mL筒
劇レケンピ点滴静注200mg 2mLV [2～8℃]
劇レケンピ点滴静注500mg 5mLV [2～8℃]

- レコベル皮下注12 μ gペン 0.36mLキット [2～8℃]
- レコベル皮下注36 μ gペン 1.08mLキット [2～8℃]
- レコベル皮下注72 μ gペン 2.16mLキット [2～8℃]
- 劇注射用レザフィリン100mg V [冷]
- レスピア静注・経口液60mg 3mLV
- レパーサ皮下注140mgペン 1mLキット [2～8℃]
- 劇レプロジル皮下注用25mg V [2～8℃]
- 劇レプロジル皮下注用75mg V [2～8℃]
- 劇レベスティブ皮下注用0.95mg V (溶解液付) [2～8℃][禁凍結]
- 向劇レペタン注0.2mg A
- レベチラセタム点滴静注500mg「アム」 5mLA 【後】 (イーケプラ)
- 劇レベミル注フレックスベン 300単位キット [冷]
- 劇レベミル注ベンフィル 300単位筒 [冷]
- レボカルニチンF F 静注1000mgシリンジ「ト-7」 5mL/筒 (ルア-ロク) 【後】
- レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 キット 【後】
- (クラビット点滴静注バッグ500mg/100mLから切替)
- レボホリナート点滴静注用25mg「ヤルト」 V 【後】
- レボホリナート点滴静注用100mg「ヤルト」 V 【後】
- 劇レミケード点滴静注用100 100mgV [冷]
- 劇レミトロ点滴静注用300 μ g V [2～8℃]
- 麻劇レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 V 【後】
- 麻劇レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 V 【後】
- 【ロ】
- ロイコボリン注3mg 1mLA
- 劇ロイナーゼ注用10000 10000K単位V [冷]
- 劇ロカイン注1% 5mLA
- 毒ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「アルイシ」 V 【後】
- 毒ロゼウス静注液40mg 4mLV 【後】 (ナベルピン注より切替)
- ロゼバラミン筋注用25mg V
- ロセファオン静注用1g—V
- (セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」へ切替)
- 劇ロピオン静注50mg 5mLA
- 劇ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「アルト」 1袋 【後】
- 劇ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「アルト」 A 【後】
- ロープリン (=抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」)
- 250 μ g V [冷]
- ロミプレート皮下注250 μ g調製用 V [2～8℃]
- 向ロラピタ静注2mg 1mLV [2～8℃]
- 【ワ】
- ワイスタール配合静注用1g V 【後】
- 劇ワソラン静注5mg 2mLA
- 毒ワナンタキソテル点滴静注20mg/1mL—V
- (ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニブ」へ切替)
- 毒ワナンタキソテル点滴静注80mg/4mL—V
- (ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニブ」へ切替)

生薬

- ウチダのウイキョウM（茴香）
- 劇ウチダの烏頭（ウズ）
- ウチダのエンゴサクM（延胡索）
ウチダのオウギ末M（黄耆）
- ウチダのオウヒM（桜皮）
- ウチダのオンジM（遠志）
- ウチダのガイヨウM（艾葉）
- ウチダのキンギンカM（金銀花）
- ウチダのクコシM（枸杞子）
- ウチダのコウイM（膠飴）
- ウチダのコウカM（紅花）
- ウチダのゴシュユM（呉茱萸）
- ウチダのゴマM（胡麻）
- ウチダのゴミシM（五味子）
- ウチダのシコンM（紫根）
- ウチダのシソシM（紫蘇子）
- ウチダのゼンコM（前胡）
- ウチダのセンコツM（川骨）
- ウチダのソウハクヒM（桑白皮）
- ウチダのテンナンショウM（天南星）
- ウチダのテンマM（天麻）
- ウチダのテンモンドウM（天門冬）
- ウチダのトウドクカツM（唐独活）
- ウチダのニンドウM（忍冬）
- ウチダのビャクゴウM（百合）
- ウチダのビワヨウM（枇杷葉）
- 劇ウチダの附子（ブシ）
- ウチダのポウコンM（茅根）
- 劇ウチダの炮附子（ホウブシ）
- ウチダのマンケイシM（蔓荊子）
- ウチダのモッカM（木瓜）
- ウチダのヤクモソウM（益母草）
- ウチダのリュウガンニクM（竜眼肉）
- ウチダのリュウタンM（竜胆）
- ウチダのレンニクM（蓮肉）
- トチモトのアキョウ（阿膠）
- トチモトのイレイセン（威靈仙）
- トチモトのインチンコウ（茵陳蒿）
- トチモトのウバイ（烏梅）
- トチモトのウヤク（烏薬）
- トチモトのオウギ（黄耆）
- トチモトのオウゴン（黄芩）
- トチモトのオウバク（黄柏）
- トチモトのオウレン（黄連）

- トチモトのカシュウ（何首烏）
- トチモトのガジュツ（莪朮）
- トチモトのカッコウ（藹香）
- トチモトのカッココン（葛根）
- トチモトのカッセキ（滑石）
- トチモトのカロコン（栝楼根）
- トチモトのカロニン（栝楼仁）
- トチモトのカンキョウ（乾姜）
- トチモトのカンゾウ（甘草）
- トチモトのキキョウ（桔梗）
- トチモトのキクカ（菊花）
- トチモトのキジツ（枳殼・キコク）
- トチモトのキジツ（枳実）
- トチモトのキッピ（橘皮）
- トチモトのキョウカツ（羌活）
- トチモトのキョウニン（杏仁）
- トチモトのクジン（苦参）
- トチモトのケイガイ（荊芥）
- トチモトのケイヒ（桂皮）
- トチモトのケイヒ末（桂皮）
- トチモトのケツメイシ（決明子）
- トチモトのゲンジン（玄参）
- トチモトのコウジン（紅参）
トチモトのコウジン末AM（紅参）
- トチモトのコウブシ（香附子）
- トチモトのコウベイ（粳米）
- トチモトのコウボク（厚朴）
- トチモトのゴシツ（牛膝）
- トチモトのゴボウシ（牛蒡子）
- トチモトのサイコ（柴胡）
- トチモトのサイシン（細辛）
- トチモトのサイチャ（細茶）
- トチモトのサフラン
- トチモトのサンザシ（山査子）
- トチモトのサンシシ（山梔子）
- トチモトのサンシュユ（山茱萸）
- トチモトのサンショウ（山椒）
- トチモトのサンソウニン（酸棗仁）
- トチモトのサンヤク（山藥）
- トチモトのジオウ（乾地黄）
- トチモトのジオウ（熟地黄）
- トチモトのジオウ（生地黄）
- トチモトのシオン（紫苑）
- トチモトのジコッピ（地骨皮）
- トチモトのシツリシ（蒺藜子）
- トチモトのシテイ（柿蒂）

- トチモトのシャクヤク（芍薬）
- トチモトのシャクヤク末（芍薬）
- トチモトのジャショウシ（蛇床子）
- トチモトのシャゼンシ（車前子）
- トチモトのジュウヤク（十薬）
- トチモトのシュクシャ（縮砂）
- トチモトのショウキョウ（生姜）
- トチモトのショウバク（小麦）
- トチモトのショウマ（升麻）
- トチモトのシンイ（辛夷）
- トチモトのセッコウ（石膏）
- トチモトのセンキュウ（川芎）
- トチモトのセンキュウ末（川芎）
- トチモトのセンタイ（蟬退）
- トチモトのソウジュツ（蒼朮）
- トチモトのソボク（蘇木）
- トチモトのソヨウ（蘇葉）
- トチモトのダイオウ（大黄）
- トチモトのダイオウ末（大黄）
- トチモトのタイソウ（大棗）
- トチモトのタクシャ（沢瀉）
- トチモトのタクシャ末（沢瀉）
- トチモトのチクジョ（竹茹）
- トチモトのチクセツニンジン（竹節人参）
- トチモトのチモ（知母）
- トチモトのチョウジ（丁字）
- トチモトのチョウトウコウ（釣藤鉤）
- トチモトのチョレイ（猪苓）
- トチモトのチンピ（陳皮）
- トチモトのトウガシ（冬瓜子）
- トチモトのトウキ（当帰）
- トチモトのトウキ末（当帰）
- トチモトのトウニン（桃仁・原形）
- トチモトのトウニン（桃仁・刻み）
- トチモトのトチュウ（杜仲）
- トチモトのニンジン（人参）
- トチモトのバイモ（貝母）
- トチモトのバクガ（麦芽）
- トチモトのバクモンドウ（麦門冬）
- トチモトのハッカ（薄荷）
- トチモトのハンゲ（半夏）
- トチモトのビャクシ（白芷）
- トチモトのビャクジュツ（白朮）
- トチモトのビャクジュツ末（白朮）
- トチモトのビンロウジ（檳榔子）
- トチモトのブクリョウ（茯苓）
- トチモトのブクリョウ末（茯苓）
- トチモトのベッコウ（土別甲）
- トチモトのボウイ（防已）
- トチモトのボウフウ（防風）
- トチモトのボクソク（樸楸）
- トチモトのボタンピ（牡丹皮）
- トチモトのボタンピ末（牡丹皮）
- トチモトのボレイ（牡蠣）
- トチモトのマオウ（麻黄）
- トチモトのマシニン（麻子仁）
- トチモトのモクツウ（木通）
- トチモトのモッコウ（木香）
- トチモトのヨクイニン（薏苡仁）
- トチモトのリュウコツ（竜骨）
- トチモトのリュウキョウ（良姜）
- トチモトのレンギョウ（連翹）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

人工鼻

- エクストラフローHME 30個/箱
- エクストラモイストHME 30個/箱
- アドヒーシブ ナイト用シール 15枚/箱
- アドヒーシブ 円形敏感肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 円形普通肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 強化型シール 15枚/箱
- アドヒーシブ 楕円形敏感肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 楕円形普通肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 大型敏感肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 大型普通肌用シール 30枚/箱
- プロヴォックス ライフ エナジー HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ ゴー HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ ナイト HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ フリーハンズ用 HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ ホーム HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ 細菌・ウイルスフィルター付 HME 15個/箱

再生医療等製品（輸血部）

アロフィセル注
イエスカルタ点滴静注
ステミラック注
テムセルHS注
ブレヤンジ静注