

当 院 採 用 薬 等 一 覧 2026. 10

〈採用薬・院外処方専用薬〉

(2026(令和8)年10月1日より適用開始)

目 次

内用薬リスト	1
外用薬リスト	29
注射薬リスト	38
生 薬	52
人 工 鼻	54
再生医療等製品	54

一覧中の記号注釈

本資料	オーダーリンク
マーク	表示マーク
↓	↓
記号無：採用薬	：◎
(院内・院外処方可)	
※：削除予定薬	：◎
●：院外処方専用薬	：●
☆：院外処方専用予定薬	：◎
○：院内専用後発品である薬	：○
→：使用開始日に特に注意を要する採用薬	

注意点

1. 「削除予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、院内・院外とも全面削除になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
2. 「院外処方専用予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、「院外処方専用薬」になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
3. 2019(平成31)年2月1日より院外処方で一般名処方を開始しました。

2026. 9. 28
福島県立医科大学

薬剤部

作成
附属病院

D I 室

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

内用薬リスト

- 【ア】
- 劇アイクルシ錠15mg
- 劇アイセントレス錠400mg
- アイトロール錠20mg（院内は一硝酸イソソルビド錠20mg「サリ」）
 - アイピーディカプセル100 100mg
 - アイピーディロシロップ5%
 - 劇アイミクス配合錠7D
（【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替）
 - 劇アイミクス配合錠H D
（【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠へ切替）
 - 【般】アカルボース錠50mg（グルコバイ）
 - 【般】アカルボース錠100mg（グルコバイ）
 - テキネトン細粒1%（【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%へ切替）
テクネトン錠1mg（院内はビペリデン塩酸塩錠1mg「マル」）
（【般】ビペリデン塩酸塩錠1mgへ切替）
 - テタトスO D錠15mg（院内はピオグリタゾンO D錠15mg「VTRS」）
（【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mgへ切替）
 - テタトスO D錠30mg（【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mgへ切替）
 - 劇テタトネル錠2.5mg（【般】リセドロン酸N a錠2.5mgへ切替）
 - 劇テタトネル錠17.5mg（【般】リセドロン酸N a錠17.5mgへ切替）
劇テタトネル錠75mg（リセドロン酸N a錠75mg「トリ」へ切替）
 - 劇テダリリンカプセル0.5mg（【般】アナグレリドカプセル0.5mgへ切替）
 - アコニンサン錠 166.67mg ST-01
アコファイド錠100mg
 - テサヨール錠400mg（院内はメサラジン腸溶錠400mg「サリ」）
（【般】メサラジン腸溶錠400mgへ切替）
アザルフィジンE N錠500mg
（【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mgへ切替）
 - 【般】アシクロビル顆粒40%（ゾビラックス）
アシクロビル錠200mg「サリ」 【後】（【般】なし）
 - ~~【般】アシクロビル錠200mg（ゾビラックス）~~
 - アジスロマイシン錠250mg「トリ」 【後】
アシテアダニ舌下錠100単位（「R」）
 - アシテアダニ舌下錠300単位（「R」）
アシノン錠75mg
 - 【般】アジスロマイシン細粒10%（ジスロマック）
 - 【般】アジスロマイシン錠250mg（ジスロマック）
 - ~~【般】アジルサルタン錠10mg（アジルバ）~~
 - 【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠10mg（アジルバ）
 - ~~【般】アジルサルタン錠20mg（アジルバ）~~
 - ~~【般】アジルサルタン錠40mg（アジルバ）~~
 - 劇【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠（サ「ラス」配合錠H D）
 - アジルサルタンO D錠10mg「DSEP」 【後】
 - アジルバ顆粒1%
アジルバ錠10mg（【般】アジルサルタン錠10mgへ切替）
アジルバ錠20mg（【般】アジルサルタン錠20mgへ切替）
アジルバ錠40mg（【般】アジルサルタン錠40mgへ切替）
 - 劇アジレクト錠0.5mg
 - 劇アジレクト錠1mg
 - 【般】アスコルビン酸・パントテン酸C a配合顆粒 1g/包（シナール）
アストミン錠10mg
アストミンシロップ0.25%
アスパラカリウム錠300mg
 - アスパラ配合錠
アスピリン原末「マルシ」

- 【般】アスピリン腸溶錠100mg（バイアスピリン）
- 劇アスベノンカプセル10mg（院内はア「リ」ンジン塩酸塩カ「セル」10mg「NP」）
（【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mgへ切替）
アスベリン散10%
アスベリンシロップ0.5%
- 【般】ア「レ」ンスルホン酸N a・L「ー」グ「ル」タミン配合顆粒0.67g（マーズレンS）
- アズロキサ錠15mg
- ~~【般】アセトアミノフェン細粒50%（カロナール）~~
- 【般】アセトアミノフェン錠200mg（カロナール）
- 【般】アセトアミノフェン錠300mg（カロナール）
- アセトアミノフェン錠300mg「マルシ」 【後】
- 劇アセトアミノフェン錠500mg「マルシ」~~【後】~~
（アセトアミノフェン錠300mg「マルシ」へ切替）
- 【般】アセトアミノフェン錠500mg（カロナール）
- 【般】アセトアミノフェンシロップ2%（カロナール）
- 【般】アセトアミノフェンシロップ用40%（カロナール）
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL/瓶
アセノベル徐放錠500mg
- アゼブチン錠1mg
- 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg（アゼブチン）
- アゼルニジピン錠16mg「トリ」 【後】
- 【般】アゼルニジピン錠16mg（カルブロック）
アゾセミド錠30mg「JG」 【後】
- ~~アゾセミド錠60mg「JG」【後】~~
- 【般】アゾセミド錠60mg（ダイアート）
- アダブチノール錠5mg
- アタラックス錠10mg
- 劇アダラート7錠10mg
- 劇アダラート7錠20mg（院内はニフェジピンL錠20mg「サリ」）
- 劇アダラートC R錠20mg
- 劇アダラートC R錠40mg
- アーチスト錠2.5mg（院内はカルベジローラ錠2.5mg「トリ」）
- ~~アーチスト錠10mg（院内はカルベジローラ錠10mg「トリ」）~~
（【般】カルベジローラ錠10mgへ切替）
- アデカット15mg錠
- アデカット30mg錠
- アテディオ配合錠
- ~~アテノロール錠50mg「NikP」【後】~~
- 【般】アテノロール錠50mg（テノーミン）
アデホスコワ顆粒10% [1g/P]
- アデホスコワ腸溶錠20 20mg（【般】なし）
劇アデムバス錠0.5mg
劇アデムバス錠1.0mg
- ~~アテレック錠10—10mg（【般】シルニジピン錠10mgへ切替）~~
- ~~アテレック錠20—20mg（【般】シルニジピン錠20mgへ切替）~~
- ~~アーテン散1%（【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%へ切替）~~
アーテン錠(2mg)（【般】加算なし）
アドシルカ錠20mg（タダラフィル錠20mg A D「TE」へ切替）
（【般】タダラフィル錠20mg：A Dへ切替）
- ~~アトローゼット配合錠7D~~
（【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠へ切替）
- ~~アドナ散10%（【般】カルバゾクロムスルホン酸N a散10%へ切替）~~
アドナ錠30mg（カルバゾクロムスルホン酸N a錠30mg「YD」へ切替）
（【般】カルバゾクロムスルホン酸N a錠30mgへ切替）
- 【般】アトモキセチンカプセル5mg（ストラテラ）
- 【般】アトモキセチンカプセル10mg（ストラテラ）
- 【般】アトモキセチンカプセル25mg（ストラテラ）
- 【般】アトモキセチンカプセル40mg（ストラテラ）

- 劇アトモキセチン錠5mg「トワ」 【後】
（院外は【般】アトモキセチン錠5mgへ切替）
- 劇アトモキセチン錠25mg「トワ」 【後】
（院外は【般】アトモキセチン錠25mgへ切替）
- 【般】アトモキセチン錠5mg
 - 【般】アトモキセチン錠25mg
 - 【般】アトモキセチン経口液0.4%（ストラテラ）
 - アトルバスタチン錠10mg「日医工」 【後】
 - 【般】アトルバスタチン錠10mg（リピトール）
- アトルバスタチンOD錠5mg「トワ」 【後】
- 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg（リピトールOD）
毒アトロピン硫酸塩水和物「虹」原末
 - 【般】アナグレリドカプセル0.5mg（アグリリン）
- 劇アナストロゾール錠1mg「トワ」 【後】
- 【般】アナストロゾール錠1mg（アリミデックス）
- 劇アナストロゾール錠1mg「明治」 【後】
- アナフラニール錠10mg
- アナフラニール錠25mg
 - アバズロ錠50mg（【般】イルベサルタン錠50mgへ切替）
アバズロ錠100mg（イルベサルタン錠100mg「DSPB」へ切替）
（【般】イルベサルタン錠100mgへ切替）
 - アバズロ錠200mg（【般】イルベサルタン錠200mgへ切替）
 - 【般】アビラテロン酢酸エステル錠250mg（ザイティガ）
- 劇アフィニール錠2.5mg
劇アフィニール錠5mg
麻劇アブストラル舌下錠100μg
麻劇アブストラル舌下錠200μg
麻劇アブストラル舌下錠400μg
- 劇アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 【後】
- 【般】アブリンジン塩酸塩カプセル10mg（アスペノン）
アブレゾリン錠10mg
- アブレピタントカプセル80mg「NK」 【後】
- 【般】アブレピタントカプセル80mg（イメンド）
- アブレピタントカプセル125mg「NK」 【後】
- 【般】アブレピタントカプセル125mg（イメンド）
- 劇アベロックス錠400mg
- 劇アボルブカプセル0.5mg
（【般】デュタステリドカプセル0.5mg：A Vへ切替）
- 劇アマージ錠2.5mg（【般】ナラトリブタン錠2.5mgへ切替）
 - 劇アマサル0.5mg錠（【般】グリメピリド錠0.5mgへ切替）
 - 劇アマリール1mg錠（院内はグリメピリド錠1mg「トワ」）
 - 劇アマサル3mg錠（【般】グリメピリド錠3mgへ切替）
- アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワ」 【後】
- アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 【後】
 - 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%（シンメトレル）
 - 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg（シンメトレル）
- 毒アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 【後】
- アミティーザカプセル12μg
- アミティーザカプセル24μg
アミノレバンE N配合散（フルーツ味） [50g/P]
 - アミノレバンE N配合散（コーヒー味） [50g/P]
 - アミュー配合顆粒 [2.5g/P]
劇アムノレイク錠2mg
- 劇アムバロ配合OD錠「トワ」 【後】（販売中止）
（2027年3月31日経過措置終了）
- 劇アムバロ配合OD錠「日医工」 【後】
- 【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠（カデュエット2番）
 - 【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠（カデュエット4番）
- 劇アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 【後】
- 劇アムロジピンOD錠2.5mg「サワ」 【後】
- 劇アムロジピンOD錠5mg「サワ」 【後】
 - 劇アムロジピンODフィルム5mg「QQ」 【後】
 - 劇アムロジン錠2.5mg
 - 劇アムロジンOD錠2.5mg
 - 劇アムロジンOD錠5mg
- ※ アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トワ」 【後】（販売中止）
（アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」へ切替）
- アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 【後】
（アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トワ」（販売中止）から切替）
（院外は【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mgに切替）
- 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg（リズムック）
アメナリーフ錠200mg
- アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 【後】（【般】なし）
- 【般】アモキシシリンカプセル250mg（サワシリン）
- 向アモバン錠7.5→7.5mg（2027年3月31日経過措置終了）
（【般】ゾピクロン錠7.5mgへ切替）
- 【般】アラセプリル錠25mg（セタプリル）
アラベル内用剤1.5g [1.5g/瓶]
 - アリッサ配合錠
劇アリセプトドライシロップ1%
●劇アリセプト錠3mg（【般】ドネペジル塩酸塩錠3mgへ切替）
●劇アリセプト錠5mg（【般】ドネペジル塩酸塩錠5mgへ切替）
●劇アリセプト錠3mg
（【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mgへ切替）
劇アリセプト錠5mg（院内はドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」）
（【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替）
 - 劇アリセプト錠10mg
（【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替）
劇アーリーダ錠60mg
25mgアサナミンF糖衣錠（院内はフルスルチアミン錠25mg「トワ」）
（【般】フルスルチアミン錠25mgへ切替）
- 劇アリピプラゾール錠1mg「サワ」 【後】
（エビリファイ錠1mgから切替）
- 【般】アリピプラゾール散1%（エビリファイ）
 - 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg（エビリファイ）
 - 【般】アリピプラゾール錠1mg（エビリファイ）
 - 【般】アリピプラゾール錠3mg（エビリファイ）
 - 【般】アリピプラゾール錠6mg（エビリファイ）
 - 【般】アリピプラゾール錠12mg（エビリファイ）
 - 【般】アリピプラゾール経口液0.1%1mL（エビリファイ）
 - 【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mL（エビリファイ）
 - 【般】アリピプラゾール経口液0.1%6mL（エビリファイ）
 - 【般】アリピプラゾール経口液0.1%12mL（エビリファイ）
劇アサミデックス錠1mg（アナストロゾール錠1mg「トワ」へ切替）
（【般】アナストロゾール錠1mgへ切替）
 - アリメジンシロップ0.05%
アルギU配合顆粒
毒アルケラン錠2mg [冷]
 - テルサルミン内用液10%→10mL/P
（院内はスクラルファート内用液10%「NIG」）
（【般】スクラルファート経口液10%へ切替）
 - 劇アルシオドールカプセル1μg 【後】
（【般】アルファカルシドールカプセル1μgへ切替）
アルダクトンA細粒10%
テルダクトンA錠25mg（スピロラクトン錠25mg「トワ」へ切替）
（【般】スピロラクトン錠25mgへ切替）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- アルタットカプセル75mg
アルドメット錠250 250mg
- ~~劇アルファカルシドールカプセル0.25μg【ト7】~~【後】
- 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg（アルファロール）
- ~~劇アルファカルシドールカプセル1μg【ト7】~~【後】
- 【般】アルファカルシドールカプセル1μg（アルファロール）
- 劇アルファカルシドール錠0.25μg【7M】 【後】
- ~~劇アルファカルシドール錠0.5μg【7M】~~【後】
- （アルファカルシドール錠0.25μg【7M】へ切替）
- 【般】アルファカルシドール錠0.25μg（ワンアルファ）
- 【般】アルファカルシドール錠0.5μg（ワンアルファ）
- 劇アルファロールカプセル0.25μg
（【般】アルファカルシドールカプセル0.25μgへ切替）
- 劇アルファロールカプセル1μg
（【般】アルファカルシドールカプセル1μgへ切替）
- 劇アルファロール内用液0.5μg/mL [10mL/瓶]
- 向アルプラザラム錠0.4mg【ト7】 【後】
- アルロイドG内用液5% [600mL/瓶]
- 劇アルンブリグ錠30mg
- 劇アルンブリグ錠90mg
- テレゲラ錠30mg（【般】フェキシフェナジン塩酸塩錠30mgへ切替）
- テレゲラ錠60mg（院内はフェキシフェナジン塩酸塩錠60mg【ト7】）
（【般】フェキシフェナジン塩酸塩錠60mgへ切替）
- テレジオン錠20→20mg（【般】エピナスチン塩酸塩錠20mgへ切替）
（エピナスチン塩酸塩錠20mg【7M】へ切替）
- 劇アレセンサカプセル150mg
- 劇アレビアチン散10%
アレビアチン錠100mg
- テレロクタ顆粒0.5%→[0.5g/P]
- （【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g（包）へ切替）
- テレロクタOD錠5mg
（院内はオロパタジン塩酸塩OD錠5mg【ト7】）
（【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替）
- 【般】アレンドロン酸錠5mg（ボナロン）
- 劇アレンドロン酸錠35mg【ト7】 【後】
- 【般】アレンドロン酸錠35mg（ボナロン）
- アローゼン顆粒 [0.5g/P]
（【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包へ切替）
- テロチノール塩酸塩錠10mg【DSP】
（アルマール錠10より名称変更）
- 【般】アロチノール塩酸塩錠10mg（アルマール）
- テロチノール錠100mg【7M】→【後】
- （アロシトール錠100mgから名称変更）
- （アロプリノール錠100mg【7M】へ名称変更）
- アロプリノール錠100mg【7M】 【後】
- 【般】アロプリノール錠100（アロシトール）
- テロマニン錠25mg（【般】エキセメスタン錠25mgへ切替）
- 毒アンカロン錠100mg（アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg【TE】へ切替）
- 劇アンコチル錠500mg
- アンジュ28錠（保険適用外）
- 劇安息香酸ナトリウムカフェイン末
劇安息香酸ナトリウム【7M】（院内製剤）
- テンデラーダ錠50mg
（院内はサルボグレラート塩酸塩錠50mg【ト7】）
（【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mgへ切替）
- テンデラーダ錠100mg
（【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mgへ切替）
- 【般】アンプリセンタン錠2.5mg（ヴォリプリス）

- アンプロキソール塩酸塩錠15mg【ト7】 【後】
- 【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg（ムコソルバン）
- 【般】アンプロキソール塩酸塩徐放錠45mg（ムコソルバン）
- 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3%（ムコソルバン）
- アンプロキソール塩酸塩D-S小児用1.5%【効効】→【後】
- （院外は【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5%へ切替）
- 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5%（ムコソルバン）
- 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用3%（ムコソルバン）
- 【イ】
- イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg
- ※ イグザレルト錠2.5mg
イグザレルトOD錠10mg
（リバーロキサバンOD錠10mg【7M】へ切替）
（【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
- イグザレルトOD錠15mg
（リバーロキサバンOD錠15mg【7M】へ切替）
（【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mgへ切替）
- 劇イクスタンジ錠40mg
- 劇イクスタンジ錠80mg
- 劇イグラチモド錠25mg【あゆみ】
- 【般】イグラチモド錠25mg（ケアラム）
- イーケブラドライシロップ50%（レベチラセタムDS50%【ト7】へ切替）
（【般】レベチラセタムシロップ用50%へ切替）
- イーケブラ錠500mg（レベチラセタム錠500mg【7M】へ切替）
（【般】レベチラセタム錠500mgへ切替）
- 【般】イコサベント酸エチルカプセル300mg（エパデール）
- イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg【TC】 【後】
- 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg（エパデール）
- イスコチン原末
イスコチン錠100mg
- 劇イスツリサ錠1mg [25℃以下]
- 劇イセルティ錠100mg
- イソソルビド内用液70%分包40mL【CEO】→【後】
- イソソルビド内服ゼリー70%分包20g【日医工】
（メニレット70%ゼリー20gから名称変更）
- イソソルビド内服ゼリー70%分包30g【日医工】
（メニレット70%ゼリー30gから名称変更）
- 【般】イソソルビド経口液70%40mL（イソバイト）
（2027年3月31日削除予定）
- イソバイドシロップ70%分包20mL
イソバイドシロップ70%分包30mL
- イソプリノシン錠400mg
- ~~【般】イソプリノシン配合顆粒4.74g/包（リサケル）~~
- 一硝酸イソソルビド錠20mg【7M】 【後】
- （アイトロール錠20mgより切替）
- イドピンソ配合錠
- イトブリド塩酸塩錠50mg【7M】 【後】
- 【般】イトブリド塩酸塩錠50mg（ガナトン）
- イトラコナゾール錠50mg【科研】 【後】
- 【般】イトラコナゾールカプセル50mg（イトリゾール）
- イトラコナゾール内用液1%【VTRS】 【後】
- （【般】イトラコナゾール経口液1%）
- イトラゾールカプセル50mg
（【般】イトラコナゾールカプセル50mg）
- 【般】イトラコナゾール経口液1%（イトリゾール）
- 劇イニシンク配合錠
イノソリッド配合経腸用半固形剤
- イノベロン錠200mg

イノラス配合経腸用液(紅茶フレーバー) [125mL/袋]	ウテメサン錠5mg- (【般】リトドリン塩酸塩錠5mgへ切替)
イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) [125mL/袋]	(院内はリトドリン塩酸塩錠5mg「日新」)
イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー) [187.5mL/袋]	ウブトラビ錠0.2mg
イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー) [187.5mL/袋]	ウブトラビ錠0.4mg
イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー) [187.5mL/袋]	● ウブトラビ錠0.8mg
劇イフェクサー S Rカプセル37.5mg	毒ウブレチド錠5mg
劇イフェクサー S Rカプセル75mg	● ウラリット-U 配合散 [1g/P]
麻劇イーフェンバック錠50μg (販売中止)	● ウラリット配合錠
● 麻劇イーフェンバック錠400μg (販売中止)	● ウリアデック錠40mg
● 麻劇イーフェンバック錠600μg (販売中止)	● ウルグートカプセル200mg
● 麻劇イーフェンバック錠800μg (販売中止)	ウルソ顆粒5%
● イフェンプロゾル酒石酸塩錠20mg「日医王」【後】-	ウルソ錠100mg (ウルソデオキシコール酸錠100mg「トワ」へ切替)
イブプロフェン錠100mg「NIG」 【後】 (【般】なし)	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トワ」 【後】
劇イブランス錠25mg	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トワ」 【後】
劇イブランス錠125mg	● ウロカルン錠225mg
○ 劇イマチニブ錠100mg「サイ」 【後】	【エ】
● 【般】イマチニブ錠100mg (グリベック)	● エカード配合錠H-D
● 【般】イマチニブ錠200mg (グリベック)	(【般】カンデサルタン4mg・ヒドクロロチアジド 配合錠へ切替)
● 劇イミダラン錠50-50mg (【般】スマトリプタン錠50mgへ切替)	● エカード配合錠H-D
● 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg (ステープラOD)	(【般】カンデサルタン8mg・ヒドクロロチアジド 配合錠へ切替)
○ イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハ」 【後】	● -【般】エカペトNa 顆粒66.7%-1.5g/包 (ガストローム)-
● 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg (タナトリル)	● 【般】エキセメスタン錠25mg (アロマシン)
劇イムセラカプセル0.5mg	エタア錠50mg(【般】ビルダグリプチン錠50mgへ切替)
(院外は【般】フィンゴリモドカプセル0.5mgへ切替)	(ビルダグリプチン錠50mg「トワ」へ切替)
劇イムブルピカカプセル140mg	● 劇エタセゲラン散20% (【般】ゾニサミド散20%へ切替)
イムラン錠50mg	● 劇エタセゲラン錠100mg (【般】ゾニサミド錠100mgへ切替)
● 劇イリボーOD錠2.5μg	劇エクフィナ錠50mg
● 劇イリボーOD錠5μg	劇エクメット配合錠LD
● イルトラ配合錠LD	(院外は【般】ビルダグリプチン・メトホルミ塩酸塩250mg配合錠へ切替)
● イルトラ配合錠HD	● 劇エクメット配合錠H-D
● 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠(アイミクスLD)	(院外は【般】ビルダグリプチン・メトホルミ塩酸塩500mg配合錠へ切替)
● 【般】イルベサルタン・アムロジン10mg配合錠(アイミクスHD)	劇エサンプトール錠250mg
○ イルベサルタン錠100mg「DSPB」 【後】	劇エジュラント錠25mg
● 【般】イルベサルタン錠50mg(アバプロ)	● エーヌヨール錠2mg (院内はテモカプリル塩酸塩錠2mg「サイ」)
● 【般】イルベサルタン錠100mg(アバプロ)	(【般】テモカプリル塩酸塩錠2mgへ切替)
● 【般】イルベサルタン錠200mg(アバプロ)	● 【般】エシタロプラム錠10mg(レクサプロ)
劇イレッサ錠250-250mg (ゲフィチニブ錠250mg「NK」へ切替)	● SG 配合顆粒 [1g/P]
(【般】ゲフィチニブ錠250mgへ切替)	○ エスゾピクロン錠1mg「日新」 【後】
劇インヴェガ錠3mg	● 【般】エスゾピクロン錠1mg(ルネスタ)
○ インクレミンシロップ5% 【後】	● 【般】エスゾピクロン錠2mg(ルネスタ)
(【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%へ切替)	● 向エスタゾラム錠2mg「アキ」【後】-
劇インチュニブ錠1mg	● 【般】エスタゾラム錠2mg(ユーロジン)
● 劇インチュニブ錠3mg	● 劇エストラサイトカプセル156.7mg 140mg [冷]
劇インデラル錠10mg (【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mgへ切替)	(販売中止) (2027年3月31日経過措置終了)
● 劇インフリーSカプセル200mg	● 【般】エストラジオール錠0.5mg(ジュリナ)
劇インライタ錠1mg	● エストリール錠1mg
劇インライタ錠5mg	○ 劇エスワнтаイホウ配合OD錠T20 【後】 (20mgテガファール相当量)
【ウ】	(【般】テガファール20mg・ギメシル・オラシル配合口腔内崩壊錠へ切替)
● 劇ヴァイトラックピカプセル25mg	○ 劇エスワнтаイホウ配合OD錠T25 【後】 (25mgテガファール相当量)
● 劇ヴァイトラックピカプセル100mg	(【般】テガファール25mg・ギメシル・オラシル配合口腔内崩壊錠へ切替)
劇ヴァンフリタ錠17.7mg	○ エゼチミブ錠10mg「JG」 【後】
劇ヴァンフリタ錠26.5mg	● 【般】エゼチミブ錠10mg(ゼチーア)
● 劇ウインタミン細粒(10%)	● 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠(アトゼットLD)
劇ウェリレグ錠40mg	● 【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠(ロズゼットHD)
劇ヴォトリエント錠200mg	○ エソメプラゾールカプセル10mg「トワ」 【後】
ヴォリプリス錠2.5mg (【般】アンプリセンタン錠2.5mgへ切替)	● 【般】エソメプラゾールカプセル10mg(ネキシウム)
ウチダのオウギ末M	● エソメプラゾールカプセル20mg「トワ」【後】-
ウチダの八味丸M [20丸/P]	● 【般】エソメプラゾールカプセル20mg(ネキシウム)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

● 【般】エチゾラム細粒1%（デバス）
○向エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 【後】
●劇モックスフォージ配合錠
（【般】パルサルタン・アムロジピン配合錠へ切替）
劇モックスフォージ配合0-D錠
（院内はアムバロ配合0-D錠「ト-7」へ切替）
（【般】パルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠へ切替）
劇エディロールカプセル0.75μg
（【般】エルデカルシトールカプセル0.75μgへ切替）
（エルデカルシトールカプセル0.75μg「ト-7」へ切替）
○劇エトドラク錠200mg「SW」 【後】
劇エドルミズ錠50mg
●エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ト-7」 【後】
エナプリルマレイン酸塩錠5mg「ト-7」 【後】
●劇エナロイ錠2mg
●劇エナロイ錠4mg
エネーゴ配合経腸用液 [250mL/缶]
●【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg（エバステル）
●【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg（エバステル）
●【般】エバスチン錠10mg（エバステル）
●エバステル錠10mg（【般】エバスチン錠10mgへ切替）
●エバステル0-D錠5mg（【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mgへ切替）
●エバステル0-D錠10mg
（【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
●エバデールE Mカプセル2g
●エバデールカプセル—300mg
（【般】イコサベント酸エチルカプセル300mgへ切替）
●エバデールS 900—900mg
（【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mgへ切替）
●向エバミール錠1.0 1mg
○エバルレスタット錠50mg「VTRS」 【後】
●【般】エバルレスタット錠50mg（キネダック）
●エビヌタ錠60mg
（【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mgへ切替）
○エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 【後】
●【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
劇エピビル錠150 150mg
●劇エピサファイ散1%（【般】アリピプラゾール散1%へ切替）
劇エピサファイ錠1mg（院内はアリピプラゾール錠1mg「サリ」へ切替）
（【般】アリピプラゾール錠1mgへ切替）
●劇エピサファイ錠3mg（【般】アリピプラゾール錠3mgへ切替）
劇エピリファイ錠6mg（【般】アリピプラゾール錠6mgへ切替）
●劇エピサファイ錠12mg（【般】アリピプラゾール錠12mgへ切替）
●劇エピサファイ0-D錠24mg
（【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mgへ切替）
劇エピリファイ内用液0.1% [1mL/包]
（【般】アリピプラゾール経口液0.1%1mLへ切替）
●劇エピサファイ内用液0.1%—[3mL/包]
（【般】アリピプラゾール経口液0.1%3mLへ切替）
劇エピリファイ内用液0.1% [6mL/包]
（【般】アリピプラゾール経口液0.1%6mLへ切替）
●劇エピサファイ内用液0.1%—[12mL/包]
（【般】アリピプラゾール経口液0.1%12mLへ切替）
※ エフィエント錠2.5mg（プラスグレル錠2.5mg「DSEP」へ切替）
（院外は【般】プラスグレル錠2.5mgへ切替）
※ エフィエント錠3.75mg（プラスグレル錠3.75mg「DSEP」へ切替）
（院外は【般】プラスグレル錠3.75mgへ切替）

※ エフィエント0-D錠20mg（プラスグレル0-D錠20mg「DSEP」へ切替）
（院外は【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mgへ切替）
●エブクルーサ配合錠
覚劇エフピー0-D錠2.5 2.5mg
（【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mgへ切替）
●エフメノカプセル100mg
エブランチルカプセル15mg
劇エブリスディドライシロップ60mg [25°C以下]
●【般】エブレレノン錠25mg（セララ）
○エブレレノン錠50mg「杏林」 【後】
●【般】エブレレノン錠50mg（セララ）
○エペリゾン塩酸塩錠50mg「ト-7」 【後】
●【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg（ミオナール）
劇エベレンゾ錠20mg
劇エベレンゾ錠50mg
●エボザックカプセル30mg
●劇エミレース錠3mg
麻劇M S コンチン錠10mg
●麻劇M S コンチン錠60mg
エリキュース錠2.5mg
エリキュース錠5mg
エリスロシンドライシロップW20%
エリスロシン錠100mg
モルカルチンF F 錠250mg
（レボカルニチンF F 錠250mg「ト-7」へ切替）
（【般】レボカルニチンF F 錠250mgへ切替）
モルカルチンF F 内用液10%
（レボカルニチンF F 内用液10%「ト-7」へ切替）
（【般】レボカルニチンF F 経口液10%へ切替）
L-ケフレックス顆粒 [1g/包]
○エルデカルシトールカプセル0.75μg「ト-7」 【後】
●【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg（エディロールカプセル）
●【般】エルトロンボパグ錠12.5mg（レボレード）
●【般】エルロチニブ錠25mg（タルセバ）
●【般】エルロチニブ錠100mg（タルセバ）
●【般】エルロチニブ錠150mg（タルセバ）
エレンタール配合内用剤 [80g/P]
エレンタールP 乳幼児用配合内用剤 [80g/P]
劇塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」
●エンシュア・H（バナラ） [250mL/缶]
●エンシュア・H（バナナ） [250mL/缶]
エンシュア・H（コーヒー） [250mL/缶]
●エンシュア・H（黒糖） [250mL/缶]
●エンシュア・H（メロン） [250mL/缶]
●エンシュア・リキッド [250mL/缶]
○エンタカボン錠100mg「JG」 【後】
●【般】エンタカボン錠100mg（コムタン）
●【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg（バラクルード）
○劇エンテカビル0-D錠0.5mg「サリ」 【後】
劇エンドキサン錠50mg
●エンレスト錠50mg
エンレスト錠100mg
エンレスト錠200mg
【オ】
●【般】オキサトミド錠1.0mg・オキサトミド等配合錠（エビプロスタット）
●【般】オキサトミド錠30mg（セルテクト）
●【般】オキサトミドシロップ用2%（セルテクト）

○麻劇オキシコドン錠2.5mgN X「第一三共」 【後】
（【般】オキシコドン錠2.5mg（乱用防止製剤）へ切替）
○麻劇オキシコドン錠5mgN X「第一三共」 【後】
（【般】オキシコドン錠5mg（乱用防止製剤）へ切替）
○麻劇オキシコドン錠10mgN X「第一三共」 【後】
（【般】オキシコドン錠10mg（乱用防止製剤）へ切替）
○麻劇オキシコドン錠20mgN X「第一三共」 【後】
（【般】オキシコドン錠20mg（乱用防止製剤）へ切替）
●麻劇【般】オキシコドン錠2.5mg（乱用防止製剤）
●麻劇【般】オキシコドン錠5mg（乱用防止製剤）
●麻劇【般】オキシコドン錠10mg（乱用防止製剤）
●麻劇【般】オキシコドン錠20mg（乱用防止製剤）
麻劇オキシコドン徐放錠5mgN X「第一三共」 【後】 （【般】なし）
（オキシコンチンＴＲ錠5mgへ切替）
麻劇オキシコドン徐放錠10mgN X「第一三共」 【後】 （【般】なし）
（オキシコンチンＴＲ錠10mgへ切替）
麻劇オキシコドン徐放錠20mgN X「第一三共」 【後】 （【般】なし）
（オキシコンチンＴＲ錠20mgへ切替）
麻劇オキシコドン徐放錠40mgN X「第一三共」 【後】 （【般】なし）
（オキシコンチンＴＲ錠40mgへ切替）
●麻劇【般】オキシコドン経口液2.5mg（オキシコドン内服液）
●麻劇【般】オキシコドン経口液5mg（オキシコドン内服液）
●麻劇【般】オキシコドン経口液10mg（オキシコドン内服液）
●麻劇【般】オキシコドン経口液20mg（オキシコドン内服液）
○麻劇オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」 2.5mL/包 【後】
（【般】オキシコドン経口液2.5mgへ切替）
●麻劇オキシコドン内服液5mg「日本臓器」 2.5mL/包 【後】
（【般】オキシコドン経口液5mgへ切替）
●麻劇オキシコドン内服液10mg「日本臓器」 5mL/包 【後】
（【般】オキシコドン経口液10mgへ切替）
●麻劇オキシコドン内服液20mg「日本臓器」 5mL/包 【後】
（【般】オキシコドン経口液20mgへ切替）
麻劇オキシコンチンＴＲ錠5mg （【般】なし）
麻劇オキシコンチンＴＲ錠10mg （【般】なし）
麻劇オキシコンチンＴＲ錠20mg （【般】なし）
麻劇オキシコンチンＴＲ錠40mg （【般】なし）
● 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg（ポラキス）
● 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg（ポラキス）
●麻劇オキノーム散2.5mg（院内はオキシコドン錠2.5mgN X「第一三共」）
●麻劇オキノーム散5mg（院内はオキシコドン錠5mgN X「第一三共」）
●麻劇オキノーム散10mg（院内はオキシコドン錠10mgN X「第一三共」）
●麻劇オキノーム散20mg（院内はオキシコドン錠20mgN X「第一三共」）
オグメンチン配合錠250RS
●オースグ 桂枝加苓朮附湯エキスG [3.0g]SG-18R
オースグ 小半夏加茯苓湯エキスG [1.0g]SG-21
オースグ 大黄甘草湯エキスＴ錠 [2錠/P]SG-84T
●オスボロット錠50mg
●オゼツクス細粒小児用15% 150mg/g
（【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%へ切替）
●オゼツクス錠150 150mg
○オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 【後】
● 【般】オセルタミビルカプセル75mg（タミフル）
● 【般】オセルタミビルシロップ用3%（タミフル）
●劇オダイン錠125mg（【般】フルタミド錠125mgへ切替）
●劇オテズラ錠10mg
●劇オテズラ錠20mg
●劇オテズラ錠30mg
劇オデフシ配合錠

オノンドライシロップ10%
（برانلカストドライシロップ10%「AFP」へ切替）
（【般】برانلカストシロップ用10%へ切替）
●オノンカプセル112.5mg
（院内はبرانلカストカプセル112.5mg「サワイ」）
（【般】برانلカストカプセル112.5mgへ切替）
●オパルモン錠5μg
（【般】リマプロストアルファデクス錠5μgへ切替）
劇オフエブカプセル100mg
劇オフエブカプセル150mg
劇オブスミット錠10mg
●麻劇オブソ内服液5mg [2.5mL/P]
●麻劇オブソ内服液10mg [5mL/P]
劇オペプリム 1カプセル500mg
劇オムジャラ錠100mg
劇オムジャラ錠150mg
○オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トワ」 【後】
● 【般】オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル2g（ロトリガ）
● 【般】オメプラゾール錠10mg（オメプラール）
●オメプラゾール腸溶錠20mg「武田ファ」 【後】
● 【般】オメプラゾール錠20mg（オメプラール）
オラベネム小児用細粒10% 100mg/g
● 【般】オランザピン細粒1%（ジブレキサ）
○劇オランザピン錠2.5mg「アメル」 【後】
● 【般】オランザピン錠2.5mg
○劇オランザピンOD錠5mg「トワ」 【後】
● 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg
● 【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mg（ジブレキサ）
劇オルケディア錠1mg
●劇オルケディア錠4mg
●劇オルミエント錠2mg
劇オルミエント錠4mg
○オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 【後】
● 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg（オルメテック）
● 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg（オルメテック）
● 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg（オルメテック）
●オルメテックOD錠5mg
●オルメテックOD錠10mg
●オルメテックOD錠20mg
（院内はオルメサルタンOD錠20mg「DSEP」）
●オルメテックOD錠40mg
● 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g（包）（アレロック）
○オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トワ」 【後】
● 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg（アレロック）
●オンゲリザ錠2.5mg（【般】サキサグリブチン錠2.5mgへ切替）
●オンゲリザ錠5mg（【般】サキサグリブチン錠5mgへ切替）
劇オンジェンティス錠25mg
【力】
劇カイトリル錠1mg
ガスコン錠40mg（ジメチコン錠40mg「YD」へ切替）
（【般】ジメチコン錠40mgへ切替）
ガスコンドロップ内用液2%
（【般】ジメチコンシロップ2%へ切替）
●ガスター散2% [10mg/0.5g]（院内はファモチジン散2%「トワ」）
（【般】ファモチジン散2% 0.5g/包へ切替）
●ガスターD錠10mg（院内はファモチジンOD錠10mg「トワ」）
●ガスターD錠20mg（院内はファモチジンOD錠20mg「トワ」）
ガストログラフィン経口・注腸用 [100mL]

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- ガスモチン錠5mg（院内はモサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」）
- ガスロンN・O D錠4mg
- 劇カソデックスO D錠80mg（ピカルタミドO D錠80mg「ト7」へ切替）
（【般】ピカルタミド口腔内崩壊錠80mgへ切替）
カタプレス錠75μg
カチーフN散10mg/g
- 劇カデュエット配合錠2番
（【般】アムロジピン2.5mg・アトルvastatin10mg配合錠：2へ切替）
- 劇カデュエット配合錠4番
（【般】アムロジピン5mg・アトルvastatin10mg配合錠：4へ切替）
カナダル錠100mg
カナグルO D錠100mg
- ガナトロン錠50mg（院内はイトブリド塩酸塩錠50mg「サ7」）
（【般】イトブリド塩酸塩錠50mgへ切替）
カナマイシンカプセル250mg「明治」
カナリア配合錠（カナリア配合O D錠へ切替予定）
カナリア配合O D錠（カナリア配合錠が無くなり次第切替）
カーバデル分散錠200mg
- 劇カバサル錠0.25mg（【般】なし）
- 劇カバサル錠1.0mg（院内はカベルゴリン錠1.0mg「サ7」）
ガバベン錠200mg
- ガバベン錠300mg
ガバベンシロップ5% [2~8℃]
カプトリル錠12.5mg
- カプトリル-Rカプセル18.75mg
劇カプレルサ錠100mg
- 劇カベシタピン錠300mg「サ7」 【後】
- 【般】カベシタピン錠300mg（ゼロード）
- ~~【般】カベルゴリン錠0.25mg（カバサル）~~
劇カベルゴリン錠1.0mg「サ7」 【後】（【般】なし）
- ~~【般】カベルゴリン錠1mg（カバサル）~~
劇カボメティクス錠20mg
劇カボメティクス錠60mg
- 劇カムザイオスカプセル1mg
劇カムザイオスカプセル2.5mg
- 劇カムザイオスカプセル5mg
- カモスタットメシル酸塩錠100mg「ト7」 【後】
- 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg（フォイバン）
- ガランターゼ散50% [0.5g/P]
- 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg（レミニールO D）
- 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg（レミニールO D）
- 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg（レミニールO D）
- 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位（カルナクリン）
カリメート散 [5g/P]
- カリメートドライシロップ92.59% [5.4g/P]
- カリメート経口液20% [25g/P]（【般】なし）
カルゲート錠10→10mg（【般】デノバミン錠10mgへ切替）
（院内はデノバミン錠10mg「日医工」）
劇カルケンスカプセル100mg
劇カルケンス錠100mg
- 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg（ロカルトロール）
- 劇カルスロット錠10→10mg（【般】マニジピン塩酸塩錠10mgへ切替）
- 【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg（ミケラン）
- カルデナリンO D錠1mg（院内はドキサゾシン錠1mg「タハ」）
- カルデナリンO D錠4mg（院内はドキサゾシン錠4mg「タハ」）
カルナタリン錠50→50単位
（【般】カリジノゲナーゼ錠50単位へ切替）
- 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10%（アドナ）

- カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 【後】
- 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg（アドナ）
カルバマゼピン細粒50%「アメル」
- ~~【般】カルバマゼピン細粒50%（テグレートール）~~
- カルプロクタ錠16mg（院内はアゼルニジピン錠16mg「ト7」）
（【般】アゼルニジピン錠16mgへ切替）
- カルベジロール錠2.5mg「ト7」 【後】
- カルベジロール錠10mg「ト7」 【後】
- 【般】カルベジロール錠10mg（アーチスト）
- カルボシステインDS50%「ト7」 【後】
- カルボシステイン錠250mg「ト7」 【後】
- ~~【般】カルボシステイン錠250mg（ムヨダイン）~~
- カルボシステインシロップ小児用5%「ト7」 【後】
- 【般】カルボシステインシロップ5%
カルメロースナトリウム原末「マルシ」（院内製剤原料）
劇カセトラ配合錠
劇カログラ錠120mg
劇カロナル細粒50% 【後】（【般】なし）
- 劇カロナル錠300→300mg~~【後】~~
（【般】アセトアミノフェン錠300mgへ切替）
劇カロナルシロップ2% 【後】
（【般】アセトアミノフェンシロップ2%へ切替）
- ~~カロリールゼリー40.496%→16.05g「タカホース」として6.5g含有】~~【後】~~~~
- 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒
- 【般】カンデサルタン錠2mg（プロプレス）
- カンデサルタン錠4mg「あすか」 【後】
- 【般】カンデサルタン錠4mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン錠8mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン錠12mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠（ユニシアLD）
- 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠（ユニシアHD）
- 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロクロチアジド配合錠（エカードLD）
- 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロチアジド配合錠（エカードHD）
- 【キ】
キシロカインビスカス2% [100mL]
- ※ キックリン顆粒86.2%（2027年3月販売中止予定）
- ※ ● キックリンカプセル250mg（2027年3月販売中止予定）
- キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」
キプレス細粒4mg [4mg/P]
（【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包へ切替）
キプレスチュアアブル錠5mg
（院内はモンテルカストチュアアブル錠5mg「ト7」へ切替）
（【般】モンテルカストチュアアブル錠5mgへ切替）
- キプレス錠5mg（【般】モンテルカスト錠5mgへ切替）
- キプレス錠10mg（【般】モンテルカスト錠10mgへ切替）
- キプレスO D錠10mg（院内はモンテルカストO D錠10mg「タタ」）
（【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mgへ切替）
- ギボンズ錠1mg~~【後】~~（【般】チザニジン錠1mgへ切替）
劇ギャバロン錠10mg
キャピリン配合錠
- ~~【般】球形吸着炭カプセル200mg（クレメジン）~~
- 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 [2g/P] 【後】
- 【般】球形吸着炭細粒 2g/包（クレメジン）
- 【ク】
- 【般】クアゼバム錠15mg（ドラルール）
- 【般】クエチアピン細粒50%（セロクエル）
- 劇クエチアピン錠12.5mg「アメル」 【後】
- 【般】クエチアピン錠12.5mg（セロクエル）

- 劇クエチアピン錠25mg「アメル」 【後】
- 【般】クエチアピン錠25mg（セロクエル）
- 劇クエチアピン錠100mg「アメル」 【後】
- 【般】クエチアピン錠100mg（セロクエル）
 - 【般】クエチアピン錠200mg（セロクエル）
- ケエン酸第一鉄Na錠50mg「サリ」 【後】
- （院内はフェロミア錠50mg）
- クエン酸ナトリウム末
- クービピック錠25mg
- クービピック錠50mg
 - グーフイス錠5mg
 - グラクティブ錠12.5mg
 - グラクティブ錠25mg
 - グラクティブ錠50mg
 - グラクティブ錠100mg
 - グラケーカプセル15mg
 - （【般】メナテレノンカプセル15mgへ切替）
 - ｸﾗｼﾞ 加味帰脾湯エキス細粒 [2.5g] EK-49
 - ｸﾗｼﾞ 桂枝茯苓丸料エキス細粒 [2.0g] EK-25
 - ｸﾗｼﾞ 神秘湯エキス細粒 [2.0g] EK-85
 - ｸﾗｼﾞ 大柴胡湯エキス細粒 [2.0g] EK-8
 - ※ ｸﾗｼﾞ 人參養榮湯エキス細粒 [2.5g] EK-108
 - ｸﾗｼﾞ 人參養榮湯エキス細粒 [3.75g] KB-108
 - （ｸﾗｼﾞ 人參養榮湯エキス細粒 [2.5g] EK-108が無くなり次第切替）
 - 劇グラセプターカプセル0.5mg
 - 劇グラセプターカプセル1mg
 - クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg/g
 - タラピット錠250mg（【般】レボフロキサシン錠250mgへ切替）
 - タラピット錠500mg（院内はレボフロキサシン錠500mg「タベ」）
 - （【般】レボフロキサシン錠500mgへ切替）
 - デラマサール細粒10%（【般】チアプリド塩酸塩細粒10%へ切替）
 - デラマサール錠25mg（【般】チアプリド塩酸塩錠25mgへ切替）
 - デラマサール錠50mg（チアプリド錠50mg「サリ」へ切替）
 - （【般】チアプリド塩酸塩錠50mgへ切替）
 - タラサリッド錠50mg小児用
 - （クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」へ切替）
 - 【般】クラリスロマイシン錠50mg（クラリシッド、クラリス）
 - タラサリッド錠200mg（院内はクラリスロマイシン錠200mg「トリ」）
 - タラサス錠200—200mg
 - クラリスロマイシンD S小児用10%「効効」 【後】（【般】なし）
 - クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」 【後】
 - クラリスロマイシン錠200mg「トリ」 【後】（【般】なし）
 - タラサチンドライシロップ1%—[5mg/0.5g/P]
 - （【般】ロラタジンシロップ用1% 0.5g（包）へ切替）
 - タラサチン錠10mg（【般】ロラタジン錠10mgへ切替）
 - デランダキシン錠50—50mg（【般】トフィソパム錠50mgへ切替）
 - 劇クリアミン配合錠S 0.5
 - クリアナール錠200mg
 - 【般】グリクラジド錠40mg（グリミクロン）
 - （2027年3月31日削除予定）
 - グリチロン配合錠
 - クリノリル錠100 100mg
 - 劇ダサベッタ錠100mg（イマチニブ錠100mg「サリ」へ切替）
 - （【般】イマチニブ錠100mgへ切替）
 - 【般】グリベンクラミド錠2.5mg（ダオニール）
 - 劇ダサミタロンHA錠20mg（【般】グリクラジド錠20mgへ切替）
 - 劇ダサミタロン錠40mg（【般】グリクラジド錠40mgへ切替）
 - 劇グリメピリド錠1mg「トリ」 【後】（【般】なし）
 - 【般】グリメピリド錠0.5mg（アマリール）
 - 【般】グリメピリド錠3mg（アマリール）
 - グルコンサンK細粒4mEq/g
 - 【般】グルタチオン錠100mg（タチオン）
 - デルファースト錠10mg（【般】ミチグリニドCa錠10mgへ切替）
 - グルベス配合錠
 - グルベス配合OD錠
 - タレストール錠5mg（【般】ロスバスタチン錠5mgへ切替）
 - デレースピーット錠50mg（シタフロキサシン錠50mg「サリ」へ切替）
 - 劇クレセンバカプセル40mg
 - 劇クレセンバカプセル100mg
 - 【般】クレマスチンシロップ用0.1%（テルギンG）
 - 劇クレマスチンDS 0.1%「効効」 【後】
 - （テルギンGドライシロップ0.1%より名称変更）
 - 劇クレミン錠25mg
 - タレメジン細粒分包2g（院内は球形吸着炭細粒分包2g「日医工」）
 - （【般】球形吸着炭細粒 2g/包へ切替）
 - クレメジン速崩錠500mg
 - 劇クロザリル錠25mg
 - 劇クロザリル錠100mg
 - 向クロチアゼパム錠5mg「サリ」 【後】
 - —【般】クロピドグレル—アスピリン配合錠（コンプラベリン配合錠）—
 - 【般】クロピドグレル錠25mg（プラビックス）
 - クロピドグレル錠75mg「トリ」 【後】
 - 【般】クロピドグレル錠75mg（プラビックス）
 - クロフェクトン顆粒10%
 - クロフェクトン錠10mg
 - クロフェクトン錠25mg
 - クロミッド錠50mg
 - d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 【後】
 - 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg（ポララミン）
 - クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 【後】
 - （プロスタール錠25から切替）
 - 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg（プロスタール）
 - 【ケ】
 - 劇ケアラム錠25mg（【般】イグラチモド錠25mgへ切替）
 - 劇ケアロードLA錠60μg
 - ケイキサレートドライシロップ76% [3.27g/P]
 - （販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）
 - ケイツーカプセル5mg
 - ケイツーシロップ0.2% [1mL/P]
 - ケタスカプセル10mg
 - 【般】ケトチフェンカプセル1mg（ザジテン）
 - ケトチフェンDS小児用0.1%「サリ」 【後】
 - 【般】ケトチフェンシロップ用0.1%（ザジテン）
 - 【般】ゲフィチニブ錠250mg（イレッサ）
 - ケララール細粒小児用100mg（出荷停止）
 - （セファクロル細粒20%「日医工」へ切替）
 - ケルロゲン錠10mg（【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mgへ切替）
 - ケレンディア錠10mg
 - ケレンディア錠20mg
 - ケーワン錠5mg（【般】フィトナジオン錠5mgへ切替）
 - 劇ゲンボイヤ配合錠
 - 【コ】
 - コスパノンカプセル40mg
 - 劇コセルゴカプセル10mg
 - 劇コセルゴカプセル25mg

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

コ如- 葛根湯加辛夷川芎エキス細粒 [3.0g]N2
コ如- 桔梗石膏エキス細粒 [2.0g]N324
コ如- 九味檳榔湯エキス細粒 [2.0g]N311
コ如- 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 [2.5g]N12
コ如- 柴胡清肝湯エキス細粒 [3.0g]N80
●コ如- 梔子柏皮湯エキス細粒 [2.0g]N314
コ如- 大柴胡湯去大黄エキス細粒 [3.0g]N319
コ如- 腸癰湯エキス細粒 [2.0g]N320
コ如- 半夏白朮天麻湯エキス細粒 [3.0g]N37
●ヨディオ配合錠E×
(【般】パルサルタン・ヒドクロチアジド 12.5mg配合錠へ切替)
劇コデインリン酸塩散1%「ヒイ」
麻劇コデインリン酸塩散10%「サグ」
コートリル錠10mg
●コートン錠25mg
●劇ヨニール錠4mg (院内はベニジピン塩酸塩錠4mg「トワ」)
(【般】ベニジピン塩酸塩錠4mgへ切替)
ヨムタン錠100mg (エンタカポン錠100mg「JG」へ切替)
●コメリアンコーワ錠50 (ジラゼパム塩酸塩錠50mg「トワ」へ切替)
●コメリアンコーワ錠100 (ジラゼパム塩酸塩錠100mg「トワ」へ切替)
(【般】ジラゼパム塩酸塩錠100mgへ切替)
劇コララン錠2.5mg
●劇コララン錠5mg
●劇コララン錠7.5mg
劇コルヒチン錠0.5mg「タタ」
●劇コレアジン錠12.5mg
●コレチメント錠9mg
●コレバイン錠500mg
●コレバインミニ83% [1.81g/P]
向劇コンサータ錠18mg
●向劇コンサータ錠27mg
コントミン糖衣錠12.5mg
●コンプラビン配合錠 (【般】なし)
(【般】クロビドグレル・アスピリン配合錠へ切替)
【サ】
サアミオン錠5mg (院内はニセルゴリン錠5mg「トワ」へ切替)
(【般】ニセルゴリン錠5mgへ切替)
劇ザイアジェン錠300mg
サイクロセリンカプセル250mg「明治」
ザイザル錠5mg (レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サド」へ切替)
(【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mgへ切替)
ザイザルシロップ0.05%
(レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トワ」へ切替)
劇ザイティガ錠250mg
(院外は【般】アピラテロン酢酸エステル錠250mgへ切替)
●劇ザイティガ錠500mg
劇サイトテック錠100 100μg
●劇サイバインコ錠50mg
●劇サイバインコ錠100mg
●劇サイバインコ錠200mg
ザイボックス錠600mg (【般】リネゾリド錠600mgへ切替)
●向サイレース錠1mg (フルニトラゼパム錠1mg「アル」へ切替)
(【般】フルニトラゼパム錠1mgへ切替)
劇サインバルタカプセル20mg
(院内はデュロキセチンOD錠20mg「フロ」へ切替)
(【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mgへ切替)
●【般】サキサグリブチン錠2.5mg (オングリザ)
●【般】サキサグリブチン錠5mg (オングリザ)

○劇酢酸亜鉛顆粒5%「サワ」 【後】
●劇【般】酢酸亜鉛顆粒5% (ノベルジン)
○劇酢酸亜鉛錠25mg「サワ」 【後】
●劇【般】酢酸亜鉛錠25mg (ノベルジン)
●劇【般】酢酸亜鉛錠50mg (ノベルジン)
劇ザタラス配合錠ヒド
劇ザタラス配合錠Hヒド (院内はジルムロ配合錠H D「武田チ」へ切替)
●劇ザーコリカプセル200mg
※劇ザーコリカプセル250mg
ザジテンドライシロップ0.1%
(ケトチフェンD S小児用0.1%「サワ」へ切替)
●ザジテンカプセル1mg (【般】ケトチフェンカプセル1mgへ切替)
劇サーティカン錠0.25mg
●劇サーティカン錠0.5mg
●劇サーティカン錠0.75mg
●向劇サノレックス錠0.5mg
ザファテック錠100mg
劇サブリル散分包500mg [500mg/P]
劇サムスカ顆粒1% (【般】トルバプタン顆粒1%へ切替)
※劇サムスカOD錠7.5mg
(トルバプタンOD錠7.5mg「オウ」へ切替予定 (適応が揃い次第))
(【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mgへ切替)
●劇サムスカOD錠15mg
(【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mgへ切替)
劇サムスカOD錠30mg
サムチレール内用懸濁液15% [5mL/P]
●劇サラジェン顆粒0.5% [5mg/1g/P]
劇サラジェン錠5mg
●【般】サラゾスルファピリジン錠500mg (サラゾピリン)
●サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」【後】
●【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg (アザルフィジンEN)
●サラゾピリン錠500mg
●ザルティア錠2.5mg (【般】タダラフィル錠2.5mg：ZAへ切替)
ザルティア錠5mg (【般】タダラフィル錠5mg：ZAへ切替)
●【般】ザルトプロフェン錠80mg (ペオン錠80mg)
サルブレップ配合内用液 480mLV
○サルボグレート塩酸塩錠50mg「トワ」 【後】
●【般】サルボグレート塩酸塩錠50mg (アンブラーグ)
●【般】サルボグレート塩酸塩錠100mg (アンブラーグ)
毒サレドカプセル25 25mg
毒サレドカプセル100 100mg
●ザロンチンシロップ5%
●サワシリンカプセル250—250mg
(院内はアモキシシリンカプセル250mg「日医工」)
(【般】アモキシシリンカプセル250mgへ切替)
酸化マグネシウム原末「マルシ」
●【般】酸化マグネシウム錠250mg
○酸化マグネシウム錠330mg「ケン」 【後】
●【般】酸化マグネシウム錠330mg
●【般】酸化マグネシウム錠500mg
●劇サンサズムカプセル50mg
(院内はビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トワ」)
(【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mgへ切替)
三和 荳蔕湯エキス細粒 [2.5g]S-35
三和 葛根加朮附湯エキス細粒 [2.5g]S-07
劇三和 桂芍知母湯エキス細粒 [3.0g]S-10
劇三和 附子理中湯エキス細粒 [1.5g]S-09

【シ】
○向ジアゼパム錠2mg「アメル」 【後】
● 【般】ジアゼパム錠2mg（セルシン）
● 【般】ジアゼパム錠5mg（セルシン）
劇シアナマイド内用液1%「オパ」 [100mL]—[冷]
● シアリス錠10mg
[男性不妊の治療目的で処方された場合のみ保険適用]
劇ジェイゾロフト錠25mg（院内はセルトラリン錠25mg「アメル」）
（【般】セルトラリン錠25mgへ切替）
●劇ジェイゾロフト錠50mg（【般】セルトラリン錠50mgへ切替）
●劇ジェセリ錠40mg
ジェニナック錠200mg
○ ジエノゲスト錠0.5mg「モダ」 【後】
● 【般】ジエノゲスト錠0.5mg（ディナゲスト）
● 【般】ジエノゲスト錠1mg（ディナゲスト）
● ジェミーナ配合錠
●劇ジオトリフ錠20mg
劇ジオトリフ錠30mg
劇ジオトリフ錠40mg
劇ジカディア錠150mg
● シグマート錠5mg（院内はニコランジル錠5mg「サリ」）
劇シクレスト舌下錠5mg
劇シクレスト舌下錠10mg
●劇シクロスボリン細粒17%「VTRS」 【後】
○劇シクロスボリンカプセル10mg「ト」 【後】
● 【般】シクロスボリンカプセル10mg：N E（ネオオーラル）
○劇シクロスボリンカプセル25mg「ト」 【後】
● 【般】シクロスボリンカプセル25mg：N E（ネオオーラル）
○劇シクロスボリンカプセル50mg「ト」 【後】
● 【般】シクロスボリンカプセル50mg：N E（ネオオーラル）
● 【般】ジクロフェナクN a徐放カプセル37.5mg（ボルタレンSR）
○劇ジクロフェナクN a錠25mg「ト」 【後】
● 【般】ジクロフェナクN a錠25mg（ボルタレン）
劇ジゴシン散0.1%
劇ジゴシン錠0.25mg
劇ジゴシンエリキシル0.05mg/mL
●劇ジスバルカプセル40mg
ジスロマック細粒小児用10%
（【般】アジスロマイシン細粒10%へ切替）
● ジスロマック錠250mg（【般】アジスロマイシン錠250mgへ切替）
●劇ジセラカ錠100mg
●劇ジセラカ錠200mg
● 【般】ジソピラミドカプセル50mg（リスモダン）
● 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg（リスモダンR）
● シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
● シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
シタフロキサシン錠50mg「サリ」 【後】 （【般】なし）
● ~~【般】シタフロキサシン錠50mg（グレースビット）~~
シナール配合顆粒 [1g/P]
（【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 1g/包へ切替）
○ ジピリダモール散12.5%「JG」 【後】
● 【般】ジピリダモール散12.5%（アデギナール）
○ ジピリダモール錠25mg「ト」 【後】
● 【般】ジピリダモール錠25mg（ペルサンチン）
○ ジピリダモール錠100mg「ト」 【後】
○ ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 【後】
○ ~~ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タロ」~~ 【後】
（ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」へ名称変更）

● ジラルカンカプセル100mg
（【般】フルコナゾールカプセル100mgへ切替）
●劇ジブレキサ細粒1%
（【般】オランザピン細粒1%へ切替）
●劇ジブレキサザイディス錠5mg（院内はオランザピンOD錠5mg「ト」）
（【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mgへ切替）
●劇ジブレキサザイディス錠10mg
（【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
シプロキサン錠200mg
シベクトロ錠200mg
●劇シペノール錠50mg（院内はシベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サリ」）
○劇シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サリ」 【後】
● 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg（シペノール）
● 【般】ジメチコンシロップ2%（ガスコン）
○ ジメチコン錠40mg「YD」 【後】
● 【般】ジメチコン錠40mg（ガスコン）
● 【般】ジメチジン錠200mg（タガメット）
劇ジャイパーカ錠50mg
劇ジャイパーカ錠100mg
劇ジャカビ錠5mg
劇ジャカビ錠10mg
劇ジャカビ内用液小児用0.5% [2~8℃]
ジャディアンス錠10mg
● ジャディアンス錠25mg
劇ジャドニュ顆粒分包90mg
劇ジャドニュ顆粒分包360mg（【般】デフェノックス顆粒360mgへ切替）
ジャスビア錠12.5mg（グラクティブ錠12.5mgへ切替）
● ジャスビア錠25mg
ジャスビア錠50mg（グラクティブ錠50mgへ切替）
劇ジャルカ配合錠
臭化カリウム「マゼン」
ジュリナ錠0.5mg（【般】エストラジオール錠0.5mgへ切替）
● ジュンコ四物湯F Cエキス細粒医療用 [2.5g]FC71
● 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg（ニトロールR）
● 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg（フランドル錠）
● 小児用トコソナルバンシロップ0.3%
（【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3%へ切替）
● 【般】シラザプリル錠0.5mg（インヒベース）
● 【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mg（コメリアンコーワ）
○ ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サリ」 【後】
● 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg（ヘルベッサーR）
○ ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ト」 【後】
● ジルテック錠10~10mg（販売中止）
（【般】セチリジン塩酸塩錠10mgへ切替）
● 【般】シルデナフィル錠20mg：RE（レバチオ）
● シルニジピン錠10mg「JG」 【後】
（【般】シルニジピン錠10mgへ切替）
● 【般】シルニジピン錠10mg（アテレック錠）
● 【般】シルニジピン錠20mg（アテレック錠）
○劇ジルムロ配合錠HD「武田」 【後】
（ザクラス配合錠HDから切替）
● 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg（プレタール）
○ シロスタゾールOD錠50mg「サリ」 【後】
○ シロスタゾールOD錠100mg「サリ」 【後】
（シロスタゾールOD錠50mg「サリ」へ切替）
● 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg（プレタール）
● 【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg（ユリーフOD）
● 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg（ユリーフOD）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- シンデレア細粒4mg―[4mg/P]
(【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包へ切替)
- シンデレアチュアブル錠5mg
(【般】モンテルカストチュアブル錠5mgへ切替)
- シンデレア錠10mg (【般】モンテルカスト錠10mgへ切替)
(2027年3月31日経過措置終了)
- 劇ジintas錠50mg
- シンバスタチン錠5mg「アム」―【後】―
- 【般】シンバスタチン錠5mg (リボバス)
シンメトレル錠50mg (アマンタジン塩酸塩錠50mg「サリ」へ切替)
(【般】アマンタジン塩酸塩錠50mgへ切替)
- 【ス】
脾外分泌機能検査用P-F-D内服液500mg―5%―[10mL/瓶]
- スイニー錠100mg
スインプロイク錠0.2mg
- スオード錠100 100mg
スーグラ錠50mg
- スクラルファート内服液10%「NIG」 [10mL/P] 【後】
- 【般】スクラルファート経口液10%
スージャヌ配合錠
- 劇スタラシドカプセル50 50mg
- スタレボ配合錠L 50
- スタレボ配合錠L 100
- 劇スチバー錠40mg
- ステーブラO-D錠0.1mg
(【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mgへ切替)
- 劇スーテントカプセル12.5mg(【般】スニチニブカプセル12.5mgへ切替)
ストミンA 配合錠
- 劇ストラテラカプセル5mg (【般】アトモキセチンカプセル5mgへ切替)
- 劇ストラテラカプセル10mg (【般】アトモキセチンカプセル10mgへ切替)
- 劇ストラテラカプセル25mg (【般】アトモキセチンカプセル25mgへ切替)
- 劇ストラテラカプセル40mg (【般】アトモキセチンカプセル40mgへ切替)
- 劇ストラテラ内服液0.4% (【般】アトモキセチン経口液0.4%へ切替)
ストロカイン錠5mg
劇ストロメクトール錠3mg
- 【般】スニチニブカプセル12.5mg (スーテント)
スピラマイシン錠150万単位「サリ」
- スピロノラクトン錠25mg「トリ」 【後】
- 【般】スピロノラクトン錠25mg (アルダクトン)
スピロベント錠10μg
- ズファジラン錠10mg
- ―【般】スプラタストトシル酸塩カプセル100mg(トP-D)―
劇スプラセル錠20mg (ダサチニブ錠20mg「NK」へ切替予定)
(【般】ダサチニブ錠20mgへ切替)
- 劇スプラセル錠50mg (ダサチニブ錠50mg「NK」へ切替予定)
(【般】ダサチニブ錠50mgへ切替)
- 劇スマイラフ錠50mg
- 劇スマイラフ錠100mg
- 【般】スマトリプタン錠50mg (イミグラン)
- スリンダ錠28
- スルピリド錠50mg「アム」 【後】
- 【般】スルピリド錠50mg (ドグマチール)
- 【セ】
セイデル錠50mg (院内はミグリトール錠50mg「トリ」)
(【般】ミグリトール錠50mgへ切替)
- セキノビット錠100mg
劇ゼジャー錠100mg
- ゼスラン小児用シロップ0.03%

- セタズサル錠25mg (【般】アラセプリル錠25mgへ切替)
ゼチーア錠10mg (エゼチミブ錠10mg「JG」へ切替)
(【般】エゼチミブ錠10mgへ切替)
- 【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg (テシブル錠)
- 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%
- 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg (シルテック)
- 劇セディール錠10mg (院内はタンドスピロン酸塩錠10mg「トリ」)
(【般】タンドスピロン酸塩錠10mgへ切替)
- 劇セディール錠20mg (【般】タンドスピロン酸塩錠20mgへ切替)
向セミラン錠2mg―【後】― (プロマゼパム錠2mg「サリ」へ名称変更)
(【般】プロマゼパム錠2mgへ切替)
- 向セバゾン錠1 1mg
- 劇セバミット細粒1% [10mg/1g/P] 【後】
(2023年3月現在,出荷停止)
(【般】ニフェジピン細粒1% 10mg/1g (包) へ切替)
セファクロル細粒20%「日医工」
- セファドール錠25mg (院内はジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」)
- セファランチン末1%
- 劇ゼフィックス錠100 100mg
- セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 【後】 (【般】なし)
- 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg (フロモックス)
- 【般】セフジニル細粒10% (セフゾン)
セラゾン細粒小児用10%―100mg/g
- セフゾンカプセル100mg (【般】加算なし)
- 【般】セフボドキシムプロキセチルシロップ用5% (パナンD.S.)
- 劇ゼボジアカプセル0.92mg
- 劇ゼボジアカプセルスターターバック
劇セムブリックス錠20mg [25°C以下]
劇セムブリックス錠40mg [25°C以下]
- セララ錠25mg (【般】エブレネン錠25mgへ切替)
セララ錠50mg (エブレネン錠50mg「杏林」へ切替)
(【般】エブレネン錠50mgへ切替)
- 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg (セレクトール)
- 劇セリンク錠10mg
向セルシン散1%
向2mgセルシン錠 (院内はジアゼパム錠2mg「アム」)
(【般】ジアゼパム錠2mgへ切替)
向5mgセルシン錠 (【般】ジアゼパム錠5mgへ切替)
劇セルセプトカプセル250 250mg
- 劇セルトラリン錠25mg「アム」 【後】
- 【般】セルトラリン錠25mg (ジェイゾフト)
- 【般】セルトラリン錠50mg (ジェイゾフト)
- セルニルトン錠 63mg
- セルベックス細粒10% [0.5g/P]
- セルベックスカプセル50mg (院内はテブレノンカプセル50mg「トリ」)
劇ゼルヤンツ錠5mg
- 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg (エフピー)
- 劇セレクタール錠100mg
(【般】セリプロロール塩酸塩錠100mgへ切替)
- 【般】セレコキシブ錠100mg (セレコックス)
- 劇セレコキシブ錠100mg「JG」 【後】
劇セレーヨックス錠100mg (セレコキシブ錠100mg「JG」へ切替)
セレジストO-D錠5mg (院内はタルチレリンO-D錠5mg「サリ」)
(【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- セレスタミン配合錠 (院内はベタセレミン配合錠)
(【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠へ切替)
セレニカR 顆粒40%
セレニカR 錠200mg

- 劇セレネース細粒1%（院内はハロペリドール細粒1%「ヨシミ」）
（【般】ハロペリドール錠1%へ切替）
- 劇セレネース錠0.75mg（院内はハロペリドール錠0.75mg「ヨシミ」）
（【般】ハロペリドール錠0.75mgへ切替）
- 劇セレネース錠1mg（【般】ハロペリドール錠1mgへ切替）
- 劇セレネース錠1.5mg（院内はハロペリドール錠1.5mg「ヨシミ」）
（【般】ハロペリドール錠1.5mgへ切替）
- 劇セレネース錠3mg（【般】ハロペリドール錠3mgへ切替）
- 劇セレネース内服液0.2%
- 劇セロクエル細粒50%（【般】クエチアピン細粒50%へ切替）
- 劇セロクエル25mg錠（院内はクエチアピン錠25mg「アム」）
（【般】クエチアピン錠25mgへ切替）
- 劇セロクエル100mg錠（院内はクエチアピン錠100mg「アム」）
（【般】クエチアピン錠100mgへ切替）
- 劇セロクエル200mg錠
（【般】クエチアピン錠200mgへ切替）
- セロクラール錠20mg
劇ゼローダ錠300—300mg（カペシタビン錠300mg「ザイ」へ切替）
（【般】カペシタビン錠300mgへ切替）
ゼンタコートカプセル3mg
- 【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包（アローゼン）
- センノシド錠12mg「トワ」 【後】
- 【般】センノシド錠12mg（ブルゼニド）
- 【ソ】
劇ゾコーバ錠125mg
劇ゾスパタ錠40mg
- 向劇ソセゴン錠25mg
- ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 【後】
- 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg（ソタコール）
- 劇ソーティクツ錠6mg
- ※劇ゾテピン錠25mg「効効」 【後】（販売中止）
（ロドピン錠25mgへ切替）（2027年3月31日経過措置終了）
- 【般】ゾテピン錠25mg（ロドピン）（2027年3月31日削除予定）
- 【般】ゾニサミド散20%（エクセグラン）
- 劇ゾニサミド錠100mg「アム」 【後】
- 劇【般】ゾニサミド錠100mg（エクセグラン）
- 劇【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg：T R E（トレリーフOD）
- 劇【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg：T R E（トレリーフOD）
- 【般】ゾピクロン錠7.5mg（アモバン）
ゾピラックス顆粒40%（【般】アシクロビル顆粒40%へ切替）
- ゾピラックス錠200—200mg（【般】アシクロビル錠200mgへ切替）—
ゾフルーザ錠20mg
- 劇ゾーミッゲR M錠2.5mg
（【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mgへ切替）
- 向ソラナックス0.4mg錠（院内はアルプラゾラム錠0.4mg「トワ」）
ソランタール錠100mg
- ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トワ」 【後】
- 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg（ベシケア）
劇ゾサンザカデセル100mg
- 向ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「ザイ」 【後】
- 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg（マイスリー）
- 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg（マイスリー）
- 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg（マイスリー）
- 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg（ゾーミッゲR M）
- 【タ】
- ダイアート錠60mg（【般】アゾセミド錠60mgへ切替）
ダイアモックス錠250mg
- ダイオウ末
- 劇タイケルブ錠250mg
太虎堂の芍帰調血飲エキス顆粒 [2.0g]EK-230
- 【般】耐性乳酸菌散0.6%（ピオフェルミンR）
- 劇ダイドロネル錠200 200mg
ダイフェン配合顆粒
ダイフェン配合錠
タウリン散98%「大正」
- タガメット錠200mg
（【般】シメチジン錠200mgへ切替）
- 劇ダクチル錠50mg
（【般】ピペリドレート塩酸塩錠50mgへ切替）
- 劇タグリッソ錠40mg
劇タグリッソ錠80mg
- 【般】タクロリムスカプセル0.5mg（プログラフ）
- 【般】タクロリムスカプセル1mg（プログラフ）
- 劇タクロリムス錠0.5mg「トワ」 【後】
- 【般】タクロリムス錠0.5mg
- 劇タクロリムス錠1mg「トワ」 【後】
- 【般】タクロリムス錠1mg
- タケキャブ錠10mg
- タケキャブ錠20mg
タケキャブOD錠10mg
タケキャブOD錠20mg
- タケブロンOD錠15mg
（院内はランソプラゾールOD錠15mg「ザイ」）
（【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mgへ切替）
- タケブロンOD錠30—30mg
（【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mgへ切替）
- タケルダ配合錠
- 劇ダサチニブ錠20mg「NK」 【後】
- 【般】ダサチニブ錠20mg（スプリセル）
- 劇ダサチニブ錠50mg「NK」 【後】
- 【般】ダサチニブ錠50mg（スプリセル）
- 劇タンデナカプセル150mg（【般】ニロチニブカプセル150mgへ切替）
劇タシグナカプセル200mg
（院外は【般】ニロチニブカプセル200mgへ切替）
- 劇ターゼナカプセル0.25mg
- 劇ターゼナカプセル1mg
- 【般】タダラフィル錠2.5mg：Z A（ザルティア）
- 【般】タダラフィル錠5mg：Z A（ザルティア）
- タダラフィル錠20mg A D「TE」 【後】
- 【般】タダラフィル錠20mg：A D（アドシルカ）
タチオン錠100mg（【般】ゲルタチオン錠100mgへ切替）
劇タナドーバ顆粒75% [750mg/1g/P]
- タナトサル錠5mg（院内はイミダプリル塩酸塩錠5mg「オハ」）
（【般】イミダプリル塩酸塩錠5mgへ切替）
- 【般】ダバグリフロジン錠5mg（フォシーガ）
- 【般】ダバグリフロジン錠10mg（フォシーガ）
劇タバリス錠100mg
劇タフィンラーカプセル50mg
劇タフィンラーカプセル75mg
ダフクリア錠200mg
タブネオスカプセル10mg
- 劇タブレクタ錠150mg
- 劇タブレクタ錠200mg
劇ダーブロック錠2mg
劇ダーブロック錠4mg
- ※ タベジール錠1mg

タミフルドライシロップ3%

（【般】オセルタミビルシロップ用3%へ切替）

タミフルカプセル75—75mg（オセルタミビル75mg「ザイ」へ切替）

（【般】オセルタミビルカプセル75mgへ切替）

○ タムスロシン塩酸塩 O D錠0.2mg「VTRS」 【後】

● 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg（ハルナール）

● 【般】タモキシフェン錠10mg（ノルバデックス）

● 【般】タモキシフェン錠20mg（ノルバデックス）

○ タモキシフェン錠20mg「ザイ」 【後】

ダラシンカプセル150mg

● タリオン錠10mg（【般】ベポタスチンベシル塩酸塩錠10mgへ切替）

● タリオン O-D錠5mg

（【般】ベポタスチンベシル塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替）

タリオン O-D錠10mg

（ベポタスチンベシル塩酸塩 O D錠10mg「トー」へ切替）

（【般】ベポタスチンベシル塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替）

● タリージェ錠2.5mg

● タリージェ錠15mg

● タリージェ O D錠2.5mg

タリージェ O D錠5mg

タリージェ O D錠10mg

● タリージェ O D錠15mg

劇タルグレチンカプセル75mg

● 劇タルセバ錠25mg（【般】エルロチニブ錠25mgへ切替）

※ 劇タルセバ錠100mg（【般】エルロチニブ錠100mgへ切替）

劇タルセバ錠150mg（【般】エルロチニブ錠150mgへ切替）

○ タルチレリン O D錠5mg「ザイ」 【後】

● 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg（セレジスト）

炭酸水素ナトリウム末

● 【般】炭酸ランタン顆粒250mg（ホスレノール）

劇炭酸リチウム錠100mg「大正」 100mg 【後】

● 【般】炭酸サチウム錠100mg（リーマス）

○ 劇炭酸リチウム錠200mg「大正」 200mg 【後】

単シロップ（丸石）

○ 劇タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「メル」 【後】

● 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg（セディール）

● 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠20mg（セディール）

ダントリウムカプセル25mg

タンニン酸アルブミン末

→ タンニン酸アルブミン「ケン」

（タンニン酸アルブミン「VTRS」原末（販売中止）から切替）

※ タンニン酸アルブミン「VTRS」原末（販売中止）

（タンニン酸アルブミン「ケン」へ切替）

● 劇タンポコール細粒10%

劇タンポコール錠50mg（フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」へ切替）

（【般】フレカイニド酢酸塩錠50mgへ切替）

【チ】

● 【般】チアブリド塩酸塩細粒10%（グラマリール）

○ チアブリド錠25mg「ザイ」 【後】

● 【般】チアブリド塩酸塩錠25mg（グラマリール）

○ チアブリド錠50mg「ザイ」 【後】

● 【般】チアブリド塩酸塩錠50mg（グラマリール）

● 劇チオデロンカプセル5mg [冷]

劇チガソンカプセル10 10mg

○ チクロピジン塩酸塩錠100mg「トー」 【後】（パナルジン）

（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）

● 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg（パナルジン）

○ チザニジン錠1mg「トー」 【後】

● 【般】チザニジン錠1mg（テルネリン）

● 劇チャンピックス錠0.5mg

● 劇チャンピックス錠1mg

（0.5mg×11錠,1mg×14錠を「服用のしかた」が記載された台紙にセットした「チャンピックス スタート用パック」もある。処方時に「スタート用パック」とコメントを記載する）

調剤用パンピタン末

● チョコラ A 末1万単位/g

● 劇チラーゼン S 錠12.5 μg

劇チラーゼン S 錠25 μg

劇チラーゼン S 錠50 μg

チロナミン錠5 μg

沈降炭酸カルシウム末

沈降炭酸カルシウム「ケン」粉末

○ 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 【後】

● 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（高リン血症用）

【ソ】

ツイミーク錠500mg

ツインライン N F 配合経腸用液 [A 液200mL, B 液200mL]

● 劇ツカイザ錠50mg

● 劇ツカイザ錠150mg

つくし A・M 配合散 [1.3g/P]

劇ツートラム錠25mg

劇ツートラム錠50mg

劇ツートラム錠100mg

● 劇ツートラム錠150mg

ツベルミン錠100mg

ツム 安中散エキス顆粒 [2.5g]5

ツム 茵陳蒿湯エキス顆粒 [2.5g]135

ツム 茵陳五苓散エキス顆粒 [2.5g]117

ツム 温経湯エキス顆粒 [2.5g]106

ツム 温清飲エキス顆粒 [2.5g]57

ツム 越婢加朮湯エキス顆粒 [2.5g]28

ツム 黄耆建中湯エキス顆粒 [3.0g]98

ツム 黄連解毒湯エキス顆粒 [2.5g]15

● ツム 黄連湯エキス顆粒 [2.5g]120

ツム 乙字湯エキス顆粒 [2.5g]3

ツム 葛根湯エキス顆粒 [2.5g]1

ツム 加味帰脾湯エキス顆粒 [2.5g]137

ツム 加味逍遙散エキス顆粒 [2.5g]24

ツム 甘麦大棗湯エキス顆粒 [2.5g]72

ツム 桔梗湯エキス顆粒 [2.5g]138

ツム 芎帰膠艾湯エキス顆粒 [3.0g]77

ツム 荊芥連翹湯エキス顆粒 [2.5g]50

ツム 桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒 [2.5g]134

ツム 桂枝加芍薬湯エキス顆粒 [2.5g]60

ツム 桂枝加朮附湯エキス顆粒 [2.5g]18

ツム 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 [2.5g]26

ツム 桂枝湯エキス顆粒 [2.5g]45

ツム 桂枝人参湯エキス顆粒 [2.5g]82

ツム 桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒 [2.5g]125

ツム 啓脾湯エキス顆粒 [2.5g]128

ツム 香蘇散エキス顆粒 [2.5g]70

ツム 五虎湯エキス顆粒 [2.5g]95

ツム 五積散エキス顆粒 [2.5g]63

ツム 牛車腎気丸エキス顆粒 [2.5g]107

ツム 呉茱萸湯エキス顆粒 [2.5g]31

- ツム 五苓散エキス顆粒 [2.5g]17
ツム 柴陷湯エキス顆粒 [2.5g]73
ツム 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 [2.5g]12
ツム 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 [2.5g]11
ツム 柴胡桂枝湯エキス顆粒 [2.5g]10
ツム 柴朴湯エキス顆粒 [2.5g]96
ツム 柴苓湯エキス顆粒 [3.0g]114
ツム 三黄瀉心湯エキス顆粒 [2.5g]113
ツム 酸棗仁湯エキス顆粒 [2.5g]103
ツム 三物黄芩湯エキス顆粒 [2.5g]121
ツム 滋陰降火湯エキス顆粒 [2.5g]93
ツム 滋陰至宝湯エキス顆粒 [3.0g]92
ツム 四逆散エキス顆粒 [2.5g]35
ツム 七物降下湯エキス顆粒 [2.5g]46
ツム 四物湯エキス顆粒 [2.5g]71
ツム 炙甘草湯エキス顆粒 [3.0g]64
ツム 芍薬甘草湯エキス顆粒 [2.5g]68
ツム 十全大補湯エキス顆粒 [2.5g]48
ツム 十味敗毒湯エキス顆粒 [2.5g]6
ツム 潤腸湯エキス顆粒 [2.5g]51
ツム 小建中湯エキス顆粒 [2.5g]99
ツム 小柴胡湯エキス顆粒 [2.5g]9
ツム 小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 [2.5g]109
ツム 小青竜湯エキス顆粒 [3.0g]19
ツム 消風散エキス顆粒 [2.5g]22
ツム 辛夷清肺湯エキス顆粒 [2.5g]104
ツム 真武湯エキス顆粒 [2.5g]30
ツム 清上防風湯エキス顆粒 [2.5g]58
ツム 清暑益気湯エキス顆粒 [2.5g]136
ツム 清心蓮子飲エキス顆粒 [2.5g]111
ツム 清肺湯エキス顆粒 [3.0g]90
ツム 川芎茶調散エキス顆粒 [2.5g]124
ツム 疎経活血湯エキス顆粒 [2.5g]53
●ツム 大黃甘草湯エキス顆粒 [2.5g]84
ツム 大黃牡丹皮湯エキス顆粒 [2.5g]33
ツム 大建中湯エキス顆粒 [2.5g]100
ツム 大柴胡湯エキス顆粒 [2.5g]8
ツム 大承気湯エキス顆粒 [2.5g]133
ツム 竹筴温胆湯エキス顆粒 [2.5g]91
ツム 治打撲一方エキス顆粒 [2.5g]89
ツム 調胃承気湯エキス顆粒 [2.5g]74
ツム 釣藤散エキス顆粒 [2.5g]47
ツム 猪苓湯エキス顆粒 [2.5g]40
ツム 通導散エキス顆粒 [2.5g]105
ツム 桃核承気湯エキス顆粒 [2.5g]61
ツム 当帰飲子エキス顆粒 [2.5g]86
ツム 当帰建中湯エキス顆粒 [2.5g]123
ツム 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 [2.5g]38
ツム 当帰芍薬散エキス顆粒 [2.5g]23
ツム 当帰湯エキス顆粒 [2.5g]102
ツム 二朮湯エキス顆粒 [2.5g]88
ツム 女神散エキス顆粒 [2.5g]67
ツム 人參湯エキス顆粒 [2.5g]32
●ツム 人參養栄湯エキス顆粒 [3.0g]108
ツム 排膿散及湯エキス顆粒 [2.5g]122
ツム 麦門冬湯エキス顆粒 [3.0g]29
ツム 八味地黄丸エキス顆粒 [2.5g]7
ツム 半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]16
ツム 半夏瀉心湯エキス顆粒 [2.5g]14
●ツム 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 [2.5g]37
ツム 白虎加人參湯エキス顆粒 [3.0g]34
ツム 茯苓飲エキス顆粒 [2.5g]69
ツム 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]116
●ツム 平胃散エキス顆粒 [2.5g]79
ツム 防己黃耆湯エキス顆粒 [2.5g]20
ツム 防風通聖散エキス顆粒 [2.5g]62
ツム 補中益気湯エキス顆粒 [2.5g]41
ツム 麻黄湯エキス顆粒 [2.5g]27
ツム 麻黄附子細辛湯エキス顆粒 [2.5g]127
ツム 麻杏甘石湯エキス顆粒 [2.5g]55
ツム 麻杏薏甘湯エキス顆粒 [2.5g]78
ツム 麻子仁丸エキス顆粒 [2.5g]126
ツム 木防己湯エキス顆粒 [2.5g]36
ツム 薏苡仁湯エキス顆粒 [2.5g]52
ツム 抑肝散エキス顆粒 [2.5g] 54
ツム 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 [2.5g]83
ツム 六君子湯エキス顆粒 [2.5g]43
ツム 立効散エキス顆粒 [2.5g]110
ツム 竜胆瀉肝湯エキス顆粒 [2.5g]76
ツム 苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 [2.5g]119
ツム 苓姜朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]118
ツム 苓桂朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]39
ツム 六味丸エキス顆粒 [2.5g]87
劇ツルバダ配合錠
●【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1%（ホクナリン）
（2027年3月31日削除予定）
【テ】
劇ディアコミットドライシロップ分包250mg
劇ティーエスワン配合顆粒 T 20 [20mg/P]
（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）
※劇ティーエスワン配合顆粒 T 25 [25mg/P]
（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）
●劇ティーエスワン配合○D錠 T 20（20mgテガファール相当量）
（院内はエスワンタイホウ配合○D錠 T 20）
（【般】テガファール20mg・ギメラシ・オラシル配口腔内崩壊錠へ切替）
●劇ティーエスワン配合○D錠 T 25（25mgテガファール相当量）
（院内はエスワンタイホウ配合○D錠 T 25）
（【般】テガファール25mg・ギメラシ・オラシル配口腔内崩壊錠へ切替）
●デオオパン錠40mg（院内はバルサルタン錠40mg「サリ」）
（【般】バルサルタン錠40mgへ切替）
デオオパン錠80mg
（【般】バルサルタン錠80mgへ切替）
●デオオパン錠160mg
（【般】バルサルタン錠160mgへ切替）
●デオオパン○D錠40mg
（【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mgへ切替）
●デオオパン○D錠80mg
（【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mgへ切替）
●デオオパン○D錠160mg
（【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mgへ切替）
ディオナゲスト錠0.5mg（ジェノゲスト錠0.5mg「セダ」へ切替）
（【般】ジェノゲスト錠0.5mgへ切替）
●ディオナゲスト錠1mg（【般】ジェノゲスト錠1mgへ切替）
劇ティブソボ錠250mg
●ディオレゲラ配合錠
（【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠へ切替）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

デエビゴ錠2.5mg
デエビゴ錠5mg
● デエビゴ錠10mg
● テオドール錠100mg（院内はテオフィリン徐放錠100mg【ザイ】）
○劇テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%【ザイ】 【後】
○劇テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%【ザイ】—【後】—（販売中止）
（テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%【ザイ】へ切替）
○ テオフィリン徐放錠100mg【ザイ】 【後】
●劇【般】テオフィリン徐放錠200mg（12～24時間持続）（テオドール）
○劇テオフィリン徐放U錠200mg【トワ】 【後】
● 【般】テオフィリン徐放錠200mg（24時間持続）（ユニフィルL A）
● 【般】テオフィリンシロップ用20%（テオドールドライシロップ）
デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
● —【般】テガフル20mg・ギメサル・オテナルカリウム配合顆粒（ティーエスワン）
● —【般】テガフル25mg・ギメサル・オテナルカリウム配合顆粒（ティーエスワン）
● 【般】テガフル20mg・ギメサル・オテナルカリウム配合口腔内崩壊錠（ティーエスワン）
● 【般】テガフル25mg・ギメサル・オテナルカリウム配合口腔内崩壊錠（ティーエスワン）
● —【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩散10%（メジコン）
○ デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg【NP】 【後】
（院外は【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mgへ切替）
● 【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg（メジコン）
テクフィデラカプセル120mg
● テクフィデラカプセル240mg
テダレートール細粒50%（【般】なし）
（カルバマゼピン細粒50%【アメル】へ切替）
テグレートール錠100mg
テグレートール錠200mg
● デザレックス錠5mg（【般】デスロラタジン錠5mgへ切替）
劇デシコビ配合錠L T
劇デシコビ配合錠H T
●劇テンプール錠1mg（【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mgへ切替）
● 【般】デスロラタジン錠5mg（デザレックス）
デソバン錠60mg
● デタントール錠1mg
● デタントールR錠3mg
テトラミド錠10mg
● テトラミド錠30mg
● テネリア錠40mg
テネリアOD錠20mg
● テネリアOD錠40mg
劇テネゼット錠300mg
デノタスチュアブル配合錠
○ デノバミン錠10mg【日医工】 【後】
● 【般】デノバミン錠10mg（カルグート）
テノーミン錠50 50mg（【般】アテノロール錠50mgへ切替）
● デバケン細粒40%（【般】なし）
● デバケン錠200mg（【般】なし）
デバケンR錠100mg
（バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg【トワ】へ切替）
デバケンR錠200mg
（バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg【トワ】へ切替）
● デバケンシロップ5%（院内はバルプロ酸ナトリウムシロップ5%【DSP】）
向デバス細粒1%
（【般】エチゾラム細粒1%へ切替）
● 向デバス錠0.5mg（院内はエチゾラム錠0.5mg【EMEC】）
劇テビケイ錠50mg

● 【般】デフェラシロクス顆粒360mg（ジャドニユ）
●劇テブミトコ錠250mg
● —【般】テブレノン細粒10%—0.5g/包（セルベックス）
○ テブレノンカプセル50mg【トワ】 【後】
● デブロメール錠25—25mg
（院内はフルボキサミンマレイン酸塩錠25mg【NP】）
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替）
● デブロメール錠50—50mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替）
● デブロメール錠75—75mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替）
デベルザ錠20mg
劇デムサーカプセル250mg
○ テモカプリル塩酸塩錠2mg【ザイ】 【後】
● 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg（エースコール）
○毒テモゾロミド錠20mg【NK】 【後】
●毒【般】テモゾロミド錠20mg（テモダール）
○毒テモゾロミド錠100mg【NK】 【後】
●毒【般】テモゾロミド錠100mg（テモダール）
毒テモダールカプセル20mg（テモゾロミド錠20mg【NK】へ切替）
毒テモダールカプセル100mg（テモゾロミド錠100mg【NK】へ切替）
デュオドーパ配合経腸用液 [100mL/セット] [2～8℃]
● 【般】デュタステリドカプセル0.5mg：A V（アボルブカプセル）
● デュファストン錠5mg
●劇【般】デュロキセチンカプセル20mg（サインバルタ）
○劇デュロキセチンOD錠20mg【ニプロ】 【後】
（サインバルタカプセル20mgから切替）
（【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mgへ切替）
● 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg（サインバルタ）
○劇テラムロ配合錠A P【EE】 【後】
劇テラムロ配合錠A P【ニプロ】—【後】—（販売中止）
（【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠へ切替）
○ テルチア配合錠A P【トワ】—【後】—（販売中止）
○ テルチア配合錠A P【日医工】 【後】
●劇デルティバ錠50mg
テルネサン錠1mg（チザニジン錠1mg【トワ】へ切替）
（【般】チザニジン錠1mgへ切替）
○ テルピナフィン錠125mg【VTRS】 【後】
● 【般】テルピナフィン錠125mg（ラミシール）
○ テルミサルタン錠40mg【ニプロ】—【後】—（販売中止）
（2027年3月31日経過措置終了）
○ テルミサルタン錠40mg【日医工】 【後】
● 【般】テルミサルタン錠40mg（ミカルディス）
● 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠（ミカムロA P）
● 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロチアジド配合錠（ミコンビA P）
● 【般】テルミサルタン錠80mg（ミカルディス）
● 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠（ミカムロB P）
● 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロチアジド配合錠（ミコンビB P）
【ト】
○劇トアラセット配合錠【日新】 【後】
（【般】トラマドール・アセトアミノフェンへ切替）
劇ドウベイト配合錠
トウモロコシデンブン末
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒 [2.0g]TY-026
● [東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒 [2.0g]TY-027
● [東洋]四君子湯エキス細粒 [2.0g]TY-054

- 【般】ドンペリドン錠10mg（ナウゼリン）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

【ナ】

- ナイクサン錠100mg
 - ナウゼリンドライシロップ1%
 - （【般】ドンペリドンシロップ用1%へ切替）
 - ナウゼリン錠5 5mg
 - ナウゼリンOD錠10mg（院内はドンペリドン錠10mg「サリ」）
 - （【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
 - 劇ナゼアOD錠0.1mg
 - ナディック錠30mg
 - ~~【般】ナテグリニド錠30mg（スターシス）~~
 - 【般】ナテグリニド錠90mg（スターシス）
 - ナトリックス錠1 1mg
 - ナフトピジルOD錠25mg「効効」 【後】
 - 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg（フリバス）
 - 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg（フリバス）
 - 劇ナポールS-Rカプセル37.5—37.5mg
 - （【般】ジクロフェナクN a徐放カプセル37.5mgへ切替）
 - 【般】ナラトリプタン錠2.5mg（アマージ）
 - 麻劇ナルサス錠2mg
 - 麻劇ナルサス錠6mg
 - 麻劇ナルサス錠12mg
 - 麻劇ナルサス錠24mg
 - ナルティークOD錠75mg
 - 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg（レミッチ）
 - 【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg（レミッチ）
 - 麻劇ナルラピド錠1mg
 - 麻劇ナルラピド錠2mg
 - 麻劇ナルラピド錠4mg
- ## 【ニ】
- ~~【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg（ベルジピンL A）~~
 - ~~【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg（ベルジピンL A）~~
 - ニコランジル錠5mg「サリ」 【後】
 - ~~ニザチジンカプセル75mg「サリ」~~ 【後】
 - ~~【般】ニザチジンカプセル75mg（アシノン）~~
 - ~~ニザチジンカプセル150mg「サリ」~~ 【後】
 - 【般】ニザチジンカプセル150mg（アシノン）
 - ~~【般】ニザチジン錠75mg（アシノン）~~
 - ニセルゴリン錠5mg「トリ」 【後】（サアミオン錠5mgから切替）
 - 【般】ニセルゴリン錠5mg（サアミオン）
 - ニッパスカルシウム顆粒100%
 - 【般】ニトラゼパム錠5mg（ベンザリン）
 - 劇ニトロペン舌下錠0.3mg 【後】
 - 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg
 - ニトロールRカプセル20mg
 - （【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mgへ切替）
 - 劇ニバザール錠4mg（【般】ニルバジピン錠4mgへ切替）
 - 劇ニフェジピンL錠20mg「サリ」 【後】
 - 劇ニフェジピンC-R錠10mg「サリ」 【後】
 - 劇ニフェジピンC-R錠20mg「サリ」 【後】
 - （ニフェジピンC-R錠10mg「サリ」へ切替）
 - 【般】ニフェジピン細粒1% 10mg/1g（包）（セバミット）
 - ニフレック配合内用剤 [137.155g/プラスチックバッグ]
 - 乳酸カルシウム「ケン」 [1g/P]
 - （乳酸カルシウム水和物「ケン」原末へ名称変更）
 - 乳酸カルシウム水和物「ケン」原末
 - （乳酸カルシウム「ケン」より名称変更）

乳糖水和物「シエ」

乳糖水和物（粉末）（院内製剤原料）

- 劇ニューベクオ錠300mg
 - 劇ニューレプチル細粒10%
 - ミューロタン錠25mg（院内はロサルタンK錠25mg「トリ」）
 - （【般】ロサルタンK錠25mgへ切替）
 - ミューロタン錠50mg（【般】ロサルタンK錠50mgへ切替）
 - 【般】ニルバジピン錠4mg（ニバジール）
 - 【般】ニロチニブカプセル150mg（タシグナ）
 - 【般】ニロチニブカプセル200mg（タシグナ）
 - 毒ニンラーロカプセル2.3mg
 - 毒ニンラーロカプセル3mg
 - 毒ニンラーロカプセル4mg
- ## 【ネ】
- ネイリンカプセル100mg
 - ネオドパストン配合錠100（院内はドパコール配合錠L100）
 - （【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠へ切替）
 - 劇ネオール10mgカプセル（院内はシクロスポリンカプセル10mg「トリ」）
 - （【般】シクロスポリンカプセル10mg：NEへ切替）
 - 劇ネオール25mgカプセル（院内はシクロスポリンカプセル25mg「トリ」）
 - （【般】シクロスポリンカプセル25mg：NEへ切替）
 - 劇ネオール50mgカプセル（院内はシクロスポリンカプセル50mg「トリ」）
 - （【般】シクロスポリンカプセル50mg：NEへ切替）
 - 劇ネオール内用液10% [50mL]
 - ネキシウムカプセル10mg
 - （エソメプラゾールカプセル10mg「トリ」へ切替）
 - （【般】エソメプラゾールカプセル10mgへ切替）
 - ネキシウムカプセル20mg
 - （【般】エソメプラゾールカプセル20mgへ切替）
 - ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
 - ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
 - 劇ネクスバール錠200mg
 - ネクセトール錠180mg
 - ネシーナ錠6.25mg
 - ネシーナ錠12.5mg
 - ネシーナ錠25mg
- ## 【ノ】
- ナイキノン錠10mg（院内はユビデカレノン錠10mg「トリ」）
 - （【般】ユビデカレノン錠10mgへ切替）
 - ノイロトロピン錠4単位
 - ノイロピタン配合錠
 - ノウリアスト錠20mg
 - 劇ノクサフィル錠100mg
 - ノバミン錠5mg
 - 劇ノービア錠100mg
 - 劇ノベルゲン錠25mg（酢酸亜鉛錠25mg「サリ」へ切替）
 - （【般】酢酸亜鉛錠25mgへ切替）
 - 劇ノベルジン錠50mg（【般】酢酸亜鉛錠50mgへ切替）
 - 【般】ノルバデックス錠10mg（【般】ノルバデックス錠10mg「サリ」へ切替）
 - 【般】ノルバデックス錠20mg（【般】ノルバデックス錠20mg「サリ」へ切替）
 - 劇ノルバス錠2.5mg
 - 劇ノルバス錠5mg
 - 劇ノルバスターOD錠2.5mg
 - 劇ノルバスターOD錠5mg
 - ノルバデックス錠10mg（【般】タモキシフェン錠10mgへ切替）
 - ノルバデックス錠20mg（タモキシフェン錠20mg「サリ」へ切替）
 - （【般】タモキシフェン錠20mgへ切替）
 - ノルレボ錠1.5mg

【ハ】

- バイアグラ錠50mg
[男性不妊の治療目的で処方された場合のみ保険適用]
- バイアスピリン錠100mg 【後】
(【般】アスピリン腸溶錠100mgへ切替)
ハイシー顆粒25% [250mg/1g/P]
劇ハイドレアカプセル500mg
- 劇ハイベン錠200mg (院内はエトドラク錠200mg「SW」)
- ~~ハイボン錠20mg~~ (【般】リポフラビン酪酸エステル錠20mgへ切替)
劇ハイヤスタ錠10mg
- バイロテンシン錠10mg
劇バキシルC R錠12.5mg
- 劇バキシルC R錠25mg
劇バキロピッドパック300 1シート
劇バキロピッドパック600 1シート
小児用バクシダール錠50mg
- バクタ配合錠 (院内はダイフェン配合錠)
- 【般】パゼドキシフェン錠20mg (ビピアント)
- 日本薬局方ハチミツ
ハッカ水「ケン」
ハッカ油「ニコ」(製剤原料)
~~バツプフォー錠10~~10mg
(【般】プロビペリン塩酸塩錠10mgへ切替)
- ~~パナルジン錠100mg~~ (院内はチクロピジン塩酸塩錠100mg「ト7」)
(【般】チクロピジン塩酸塩錠100mgへ切替)
- ~~パナンドライシロップ5%—50mg/g~~
(【般】セフボドキシムプロキセチルシロップ用5%へ切替)
劇ハーフジゴキシンK Y錠0.125 0.125mg
- 劇バフセオ錠150mg
- 劇バフセオ錠300mg
- ハーボニー配合錠
劇バラタクルード錠0.5mg (エンテカビルOD錠0.5mg「サイ」へ切替)
(【般】エンテカビル錠0.5mgへ切替)
- バラシクロビル錠500mg「ト7」 【後】
- 【般】バラシクロビル錠500mg (パルトレックス)
- 劇バラミヂンカプセル300mg
バサエット錠5mg (ラベプラゾールNa錠5mg「YD」へ切替)
(【般】ラベプラゾールNa錠5mgへ切替)
- バサエット錠10mg (院内はラベプラゾールNa錠10mg「ト7」)
(【般】ラベプラゾールNa錠10mgへ切替)
- バサエット錠20mg (【般】ラベプラゾールNa錠20mgへ切替)
- 毒バリキサドライシロップ5000mg
毒バリキサ錠450mg
- 劇ハリゾンシロップ100mg/mL [24mL] 【後】
バリトップHD [400g/本]
- 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠(エクスフォージ)
- 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠(エクスフォージ)
- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg (ディオバン)
- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg (ディオバン)
- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mg (ディオバン)
- バルサルタン錠40mg「サイ」 【後】
- ~~バルサルタン錠40mg「日新」~~【後】
(バルサルタン錠40mg「サイ」へ切替)
- 【般】バルサルタン錠40mg (ディオバン)
- ~~バルサルタン錠80mg「日新」~~【後】
- 【般】バルサルタン錠80mg (ディオバン)
- 【般】バルサルタン錠160mg (ディオバン)
- 【般】~~バルサルタン・ヒドクロロチアジド~~ 12.5mg配合錠 (コディオEX)

- 向ハルシオン0.125mg錠
- 向ハルシオン0.25mg錠 (【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替)
パルトレックス顆粒50%
- ~~パルトレックス錠500mg~~(院内はバラシクロビル錠500mg「ト7」)
(【般】バラシクロビル錠500mgへ切替)
- ~~ハルナールD錠0.2mg~~
(院内はタムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」)
(【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mgへ切替)
- パルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 500mL瓶 【後】
- ~~パルプロ酸Na細粒40% (デパケン)~~
- ~~パルプロ酸Na錠200mg (デパケン)~~
パルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「ト7」 【後】
- ~~パルプロ酸Na徐放錠100mg (デパケンR, セレニカR)~~
パルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト7」 【後】
- パルモディア錠0.1mg
パルモディアXR錠0.2mg
- パルモディアXR錠0.4mg
- ~~向ハルラック錠0.25mg~~【後】 (【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替)
- 【般】パロキセチン錠5mg (バキシル)
- 【般】パロキセチン錠10mg (バキシル)
- 【般】パロキセチン錠20mg (バキシル)
劇パーデル錠2.5mg
(【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mgへ切替)
- ※○ 劇ハロペリドール細粒1%「ヨトミ」 【後】 (販売中止)
- 【般】ハロペリドール細粒1% (セレネース)
- 劇ハロペリドール錠0.75mg「ヨトミ」 【後】
- 【般】ハロペリドール錠0.75mg (セレネース)
- 【般】ハロペリドール錠1mg (セレネース)
- 劇ハロペリドール錠1.5mg「ヨトミ」 【後】
- 【般】ハロペリドール錠1.5mg (セレネース)
- 【般】ハロペリドール錠3mg (セレネース)
パンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
- 【般】パンテチン散20% (パントシン)
- ~~パントシン散20% (パナ)~~
- 【ヒ】
- ~~ピオグリーシロップ65%—500mL~~【後】
(ラクツロースシロップ65%「効効」名称変更)
(【般】ラクツロースシロップ65%へ切替)
腸外分泌機能検査用PFD内服液500mg—5%—[10mL/瓶]
PL配合顆粒 [1g/P]
(【般】プロメジン1.35%等配合非βリン系感冒剤 1g/包へ切替)
幼児用PL配合顆粒—[1g/P]
- ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」 【後】
(院外は【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mgへ切替)
~~ピオグリータゾンOD錠15mg「ト7」~~【後】 (販売中止)
- 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg (アクトス)
- 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg (アクトス)
ピオスリー配合OD錠
ピオチン散0.2%「サイ」
- ピオフェルミン散剤 【後】
- ピオフェルミンR散 【後】 (【般】耐性乳酸菌散0.6%へ切替)
ピオフェルミン錠剤 【後】 (【般】ビフィズス菌錠12mgへ切替)
- ビカルタミドOD錠80mg「サイ」 【後】
- ~~劇ビカルタミドOD錠80mg「ト7」~~【後】 (販売中止)
(2027年3月31日経過措置終了)
- 【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg (カンデックス)
劇ビクトルビ配合錠

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

○ ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 [10mL/瓶] 【後】
● 【般】ピコスルファート N a 経口液0.75% 10mL (ラキソベロン)
● ~~【般】ピコスルファート N a 錠2.5mg (ラキソベロン)~~
劇ビ・シフロール錠0.125mg
(【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mgへ切替)
劇ビ・シフロール錠0.5mg
(【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mgへ切替)
ビジクリア配合錠 [50錠/瓶]
● セスロンH錠200mg
(【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mgへ切替)
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サリ」 【後】 (【般】なし)
○ ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ト」 【後】
● 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg (メインテート)
● 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg (メインテート)
○ ビタバスタチン C a ・ O D 錠2mg「ト」 【後】
● 【般】ビタバスタチン C a 口腔内崩壊錠1mg (リバロ)
● 【般】ビタバスタチン C a 口腔内崩壊錠2mg (リバロ)
● 【般】ビタバスタチン C a 口腔内崩壊錠4mg (リバロ)
● ベタメゾン配合カプセルB25-25mg (B1と七で)
(【般】ベンゾアミン25mg (B1) ・ B6 ・ B12配合カプセルへ切替)
● ヒダントール錠25mg
ゼドキシール錠10mg (ピリドキサル錠10mg「サリ」へ切替)
(【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mgへ切替)
● ビートル顆粒分包250mg
● ビートルチュアブル錠250mg
○ 毒ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サリ」 【後】
(【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg (院外は) へ切替)
● 毒【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg (プラケニル)
覚劇ビバンセカプセル20mg
覚劇ビバンセカプセル30mg
● ゼビアミド錠20mg (【般】バゼドキシフェン錠20mgへ切替)
● 【般】ビフィズス菌錠12mg (ビオフェルミン)
ビフェルトロ錠100mg
● ビプラマイシン錠100mg
劇ビプレッソ徐放錠50mg
● 劇ビプレッソ徐放錠150mg
● ゼベリデン塩酸塩細粒1%「サリ」 【後】
● 【般】ベリデン塩酸塩細粒1% (アキネトン)
○ ベリデン塩酸塩錠1mg「アル」 【後】
● 【般】ベリデン塩酸塩錠1mg (アキネトン)
● 【般】ベリドレート塩酸塩錠50mg (ダクテル)
● 劇ヒボカ5mgカプセル
● 劇ヒボカ15mgカプセル
劇ビムパット錠50mg (院外は【般】ラコサミド錠50mgへ切替)
● 劇ビムパット錠100mg (【般】ラコサミド錠100mgへ切替)
劇ビムパットドライシロップ10%
(院外は【般】ラコサミドシロップ用10%へ切替)
○ ビモベンダン錠1.25mg「TE」 【後】
● 【般】ビモベンダン錠1.25mg (アカルディ)
● ビヨントラ錠400mg
→○ ビラスチン O D 錠20mg「杏林」 【後】
(ピラノア O D 錠20mgから切替)
(院外は【般】ピラスチン口腔内崩壊錠20mgへ切替)
● 【般】ピラスチン口腔内崩壊錠20mg (ピラノア)
※ ピラノア O D 錠20mg (ピラスチン O D 錠20mg「杏林」へ切替)
(院外は【般】ピラスチン口腔内崩壊錠20mgへ切替)
劇ピラフトピカプセル50mg
ピラマイド原末

劇ピサアード錠300mg
ピリドキサル錠10mg「サリ」 【後】
○ ~~ピリドキサル錠10mg「サリ」 【後】~~ (供給停止)
(ピリドキサル錠10mg「サリ」へ切替)
● 【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg (ピドキサル)
○ 劇ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「ト」 【後】
● 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg (サンリズム)
○ ビルダグリプチン錠50mg「ト」
● 【般】ビルダグリプチン錠50mg (エクア)
● 【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠
(エクメット配合錠 L D)
● 【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠
(エクメット配合錠 H D)
● ビルタサ懸濁用散分包8.4g [2~8℃]
ゼルトリシド錠600mg
● 劇ヒルナミン細粒10%
ヒルナミン錠(5mg)
ヒルナミン錠(25mg)
(【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mgへ切替)
○ ビルフェニドン錠200mg「日医工」 【後】
● 【般】ビルフェニドン錠200mg (ピレスパ)
劇ピレスパ錠200mg (ビルフェニドン錠200mg「日医工」へ切替)
(【般】ビルフェニドン錠200mgに切替)
● 劇ピレチア細粒10%
ピレチア錠(25mg)
● 【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg (ガストロゼピン)
劇ビンダケルカプセル20mg
● 劇ビンマックカプセル61mg
【フ】
劇ファダブス錠10mg
劇ファビハルタカプセル200mg
● 【般】ファムシクロビル錠250mg (ファムビル)
● ファムビル錠250mg (【般】ファムシクロビル錠250mgへ切替)
○ ファモチジン散2%「ト」 [0.5g/P] 【後】
● 【般】ファモチジン散2% 0.5g/包 (ガスター)
○ ファモチジン O D 錠10mg「ト」 【後】
● ~~ファモチジン O D 錠20mg「ト」 【後】~~
● ファロムドライシロップ小児用10% 100mg/g
ファロム錠200mg
● ファイコンパ細粒1% (【般】ペランパネル細粒1%へ切替)
フィコンパ錠2mg (院外は【般】ペランパネル錠2mgへ切替)
フィコンパ錠4mg (院外は【般】ペランパネル錠4mgへ切替)
● 【般】フィトナジオン錠5mg (ケーワン)
※ 劇ブイフェンドドライシロップ2800mg [2~8℃]
(ポリコナゾール顆粒20%「効」へ切替)
劇ブイフェンド錠50mg (ポリコナゾール錠50mg「ト」へ切替)
劇ブイフェンド錠200mg (ポリコナゾール錠200mg「ト」へ切替)
● 【般】フィンゴリモドカプセル0.5mg (イムセラ)
劇フィンテプラ内用液2.2mg/mL
● 劇フェアストーン錠40-40mg (【般】トレミフェン錠40mgへ切替)
● 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg (アレグラ)
○ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ト」 【後】
● 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg (アレグラ)
● 【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠 (デイルグ)
● 【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg (トビエース)
● 【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠8mg (トビエース)
向劇フェノバール散10%
向劇フェノバールエリキシル0.4% (2027年3月販売中止予定)

- フェノフィブラート錠80mg「武田パ」 【後】
(リビディル錠80mgから切替)
- 【般】フェノフィブラート錠80mg (リビディル)
- フェブキシostat錠10mg「JG」 【後】
- 【般】フェブキシostat錠10mg (フェブリク)
- フェブキシostat錠20mg「JG」 【後】
- 【般】フェブキシostat錠20mg (フェブリク)
- フェブリク錠20mg (フェブキシostat錠20mg「JG」へ切替)
- (【般】フェブキシostat錠20mgへ切替)
- 劇フェマール錠2.5mg (【般】レトロゾール錠2.5mgへ切替)
- フェロミア顆粒8.3%
- フェロミア錠50mg
- トラオイパン錠100mg
(院内はカモスタットメシル酸塩錠100mg「トワ」)
- (【般】カモスタットメシル酸塩錠100mgへ切替)
- 劇フォサマック錠35mg (【般】アレンドロン酸錠35mgへ切替)
- フォシーガ錠5mg (院外は【般】ダバグリフロジン錠5mgへ切替)
- フォシーガ錠10mg (院外は【般】ダバグリフロジン錠10mgへ切替)
- フォスブロック錠250mg
- フォゼベル錠5mg
- フォゼベル錠10mg
- フォリアミン錠 5mg
- 向ブコラム口腔用液2.5mg 0.5mL
- 向ブコラム口腔用液5mg 1mL
- 向ブコラム口腔用液7.5mg 1.5mL
- 向ブコラム口腔用液10mg 2mL
- 劇ブシ末 (調剤用)「ツム」 3023
- ※ ブスコパン錠10mg (販売中止)
- (ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハ」へ切替)
- (院外は【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mgへ切替)
- ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハ」 【後】
(ブスコパン錠10mg (販売中止) から切替)
- (院外は【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mgへ切替)
- 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg (ブスコパン)
- ブフェニール顆粒94%
- デライアン錠500mg 【後】
- (【般】エデト酸カルシウム三ナトリウム錠500mgへ切替)
- 毒デラケニル錠200mg
(ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サイ」へ切替)
- (【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mgへ切替)
- ブラザキサカプセル75mg
- ブラザキサカプセル110mg
- フラジール内服錠250mg
- プラスグレルOD錠20mg「DSEP」 【後】
(エフィエントOD錠20mgから切替)
- (院外は【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mgに切替)
- 【般】プラスグレル口腔内崩壊錠20mg (エフィエント)
- プラスグレル錠2.5mg「DSEP」 【後】
(エフィエント錠2.5mgから切替)
- (院外は【般】プラスグレル錠2.5mgに切替)
- 【般】プラスグレル錠2.5mg (エフィエント)
- プラスグレル錠3.75mg「DSEP」 【後】
(エフィエント錠3.75mgから切替)
- (院外は【般】プラスグレル錠3.75mgに切替)
- 【般】プラスグレル錠3.75mg (エフィエント)
- ブラダロン錠200mg (2027年3月31日経過措置終了)
- (院内はフラボキサート塩酸塩錠200mg「サイ」)
- ブラノバル配合錠
- デラバスタチンNa錠5mg「タミナ」 【後】
- プラバスタチンNa錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】プラバスタチンNa錠10mg (メパロチン)
- デラピックス錠25mg (【般】クロビドグレル錠25mgへ切替)
- デラピックス錠75mg (院内はクロビドグレル錠75mg「メル」)
- (【般】クロビドグレル錠75mgへ切替)
- フラボキサート塩酸塩錠200mg「サイ」 【後】
- 【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg (プラダロン)
- 【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg (ピ・シフロール)
- 【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg (ピ・シフロール)
- 【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg (ミラベックスLA)
- 【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg (ミラベックスLA)
- プランルカストドライシロップ10%「AFP」 【後】
- 【般】プランルカストシロップ用10% (オノン)
- プランルカストカプセル112.5mg「サイ」 【後】
- 【般】プランルカストカプセル112.5mg (オノン)
- 【般】プランルカスト錠112.5mg (オノン)
- 【般】プランルカスト錠225mg (オノン)
- プリイピアクト錠25mg
- プリイピアクト錠50mg
- フリウェル配合錠LD「モダ」 【後】
(【般】ルエチステロン・エチニステロンオール0.035配合錠へ切替)
- 劇プリジスタ錠600mg
- トラサバスOD錠25mg (院内はナフトビジルOD錠25mg「あすか」)
- (【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠25mgへ切替)
- トラサバスOD錠75mg
(【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠75mgへ切替)
- プリミドン細粒99.5%「日医工」
- プリモボラン錠5mg
- 劇フリュザクラカプセル1mg
- 劇フリュザクラカプセル5mg
- プリリント錠60mg
- プリリント錠90mg
- デサンペラン錠5—5mg (院内はメトクロプラミド錠5mg「NIG」)
- (【般】メトクロプラミド錠5mgへ切替)
- プリンペランシロップ0.1%
- (【般】メトクロプラミドシロップ0.1%へ切替)
- トラライトラン錠2mg (院内はトリクロロメチアジド錠2mg「NP」)
- (【般】トリクロロメチアジド錠2mgへ切替)
- 劇ブルキンザカプセル80mg
- フルコナゾールカプセル100mg「サイ」 【後】 (【般】なし)
- 【般】フルコナゾールカプセル100mg (ジラルカン)
- フルスルチアミン錠25mg「トワ」 【後】
- 【般】フルスルチアミン錠25mg (アリナミンF)
- 【般】フルタミド錠125mg (オダイン錠)
- 劇フルダラ錠10mg
- 劇フルツロンカプセル200 200mg
- 向フルニトラゼパム錠1mg「メル」 【後】
- 【般】フルニトラゼパム錠1mg (サイレース)
- 【般】フルバスタチン錠30mg (ローコール)
- デルタフェン錠100mg (院内はイブプロフェン錠100mg「タヨ」)
- (【般】イブプロフェン錠100mgへ切替)
- フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サイ」 【後】
- 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg (デプロメール)
- 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg (デプロメール)
- 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg (デプロメール)
- 劇フルメジン散0.2%
- フルメジン糖衣錠(0.25) 0.25mg

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

○劇フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 【後】
● 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg（タンボコール）
○ プレガバリンOD錠25mg「明治」 【後】
● プレガバリンOD錠75mg「明治」 【後】
● 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg（リリカ）
● 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg（リリカ）
● 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg（リリカ）
劇プレジコビックス配合錠
● デレタールOD錠50mg
（【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mgへ切替）
● デレタールOD錠100mg（院内はシロスタゾールOD錠100mg「サリ」）
（【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mgへ切替）
ブレディニン錠25 25mg
→ ブレディニン錠50 50mg
（ブレディニンOD錠50 50mg（販売中止）から切替）
※ ブレディニンOD錠50 50mg（販売中止）
（ブレディニン錠50へ切替）
ブレドニゾロン散「タダ」1%
ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）
ブレドニン錠5mg
劇ブレバイミス顆粒分包20mg
劇ブレバイミス顆粒分包120mg
劇ブレバイミス錠240mg
● プレマリン錠0.625mg
デレミネント配合錠7D
（【般】0.625mg・ヒドロコルチゾン配合錠へ切替）
● デレミネント配合錠H
（【般】0.625mg・ヒドロコルチゾン配合錠へ切替）
● 【般】プロカテロール塩酸塩錠0.025mg（メブチン）
● 【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg（メブチン）
○ プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」 【後】
● 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% 5μg/mL（メブチン）
● 劇プログラフ顆粒0.2mg [0.2mg/包]
● 劇プログラフカプセル0.5mg（院内はタクロリムス錠0.5mg「ト」へ切替）
（【般】タクロリムスカプセル0.5mgへ切替）
● 劇プログラフカプセル1mg（院内はタクロリムス錠0.5mg「ト」へ切替）
（【般】タクロリムスカプセル1mgへ切替）
● 劇デロサイラン錠20μg（院内はペラブロストNa錠20μg「サリ」）
（【般】ペラブロストNa錠20μgへ切替）
劇プロスタグランジンE₂錠0.5mg「科研」
デロスターール錠25-25mg
（院内はクロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」へ切替）
（【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mgへ切替）
● プロセキソール錠0.5mg
フロセミド細粒4%「EMEC」 【後】（【般】なし）
● 【般】フロセミド細粒4%
○ フロセミド錠20mg「NIG」 【後】
● 【般】フロセミド錠20mg（ラシックス）
● 【般】フロセミド錠40mg（ラシックス）
○向プロチゾラムOD錠0.25mg「ナ」 【後】
デロテカジンOD錠10-10mg（ラフチジン錠10mg「ト」へ切替）
（【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
プロナゼMS 20000単位 [0.5g/P]
● 【般】プロナゼ錠4mg（ロナセン）
● 【般】プロナゼ錠8mg（ロナセン）
● 劇デロナ錠150mg（【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mgへ切替）
プロバジール錠50mg

○劇プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オハ」 【後】
● 【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg（プロノン）
● プロ・バンサイン錠15mg [2~8°C]
● 【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg（バップフォー）
● 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg（インデラル）
● デロズレス錠2mg（【般】カンデサルタン錠2mgへ切替）
● デロズレス錠4mg（院内はカンデサルタン錠4mg「あすか」）
（【般】カンデサルタン錠4mgへ切替）
● デロズレス錠8mg（【般】カンデサルタン錠8mgへ切替）
● デロズレス錠12mg（【般】カンデサルタン錠12mgへ切替）
● 劇プロベシア錠0.2mg（保険適用外）
● 劇プロベシア錠1mg（保険適用外）
デロベラ錠2.5mg（プロゲストン錠2.5mgへ切替）
○向プロマゼパム錠2mg「サド」 【後】（セニラン錠2mgより名称変更）
● プロマック顆粒15% [75mg/0.5g/P]
● プロマックD錠75（院内はボラブレジンOD錠75mg「サリ」）
● 【般】プロムベリドール細粒1%（インプロメン）
● 【般】プロムベリドール錠1mg（インプロメン）
● 【般】プロムベリドール錠3mg（インプロメン）
● 【般】プロメジン1.35%等配合非ピリソ系感冒剤1g/包（PL）
● 【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg（パロデル）
● フロモックス小児用細粒100mg（【般】なし）
（【般】セファペンピボキシル塩酸塩細粒10%へ切替）
● フロモックス錠100mg
（院内はセファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」）
フロリードゲル経口用2% 5g
劇フロリネフ錠0.1mg
【へ】
● ペイスイソD錠0.2mg
（【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mgへ切替）
● ペイスイソD錠0.3mg（院内はボグリボースOD錠0.3mg「ト」）
（【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mgへ切替）
ペオバ錠50mg
● 劇ペオン錠80-80mg（【般】ザルトプロフェン錠80mgへ切替）
● ペザトールSR錠200mg（院内はペザフィラート徐放錠200mg「ト」）
劇ベサノイドカプセル10mg
○ ペザフィラート徐放錠200mg「ト」 【後】
ペンケアOD錠5mg
（ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ト」へ切替）
劇ベージニオ錠50mg
劇ベージニオ錠150mg
● 【般】β-ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）散50%（ガラクターゼ）
● 【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mg（ケルロンG）
○ ベタセレミン配合錠 【後】
（【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠へ切替）
● 向ベタナミン錠50mg【後】（【般】ペモリン錠50mgへ切替）
劇ベタニス錠50mg
○ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「ト」 【後】
● 【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠（セレストミン）
○劇ベニジピン塩酸塩錠4mg「ト」 【後】
● 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg（コニール）
劇ベネクレクスタ錠10mg
劇ベネクレクスタ錠50mg
劇ベネクレクスタ錠100mg
● 劇ベネネット錠2.5mg
（【般】リセドロン酸Na錠2.5mgへ切替）
● 劇ベネネット錠17.5mg
（【般】リセドロン酸Na錠17.5mgへ切替）

- ヘバンＥＤ配合内用剤 [80g/P]
劇ペブサコール錠50mg (ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」へ切替)
(【般】ペブリジル塩酸塩錠50mgへ切替)
劇ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」 【後】
- 劇【般】ペブリジル塩酸塩錠50mg (ペブリコール)
- ペポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「ト7」 【後】
- 【般】ペポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg (タリオン)
- 【般】ペポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg (タリオン)
- 【般】ペポタスチンベシル酸塩錠10mg (タリオン)
- 劇ペマジール錠4.5mg
劇ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
- 【般】ペミロラストKシロップ用0.5% (アレギサル)
- 劇ペムリディ錠25mg
- 【般】ペモリン錠50mg (ベタナミン錠)
- 劇ペラサスヒA錠60μg (ケアロードL A錠60μgへ切替)
- 【般】ペラバミル塩酸塩錠40mg (ワソラン)
- 劇ペラプロストNa錠20μg「サ1」 【後】
- 【般】ペラプロストNa錠20μg (プロサイリン)
- 【般】ペランパネル細粒1% (フィコンパ)
- 【般】ペランパネル錠2mg (フィコンパ)
- 【般】ペランパネル錠4mg (フィコンパ)
- ペリアタチン錠4mg
ペリアクチンシロップ0.04%
- ペリキューボ錠2.5mg
- ペリキューボ錠5mg
ペリキューボ錠10mg
ペリチーム配合顆粒 [1g/P]
- ペリサンドプリルエルブミン錠4mg「サ1」
- 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg (コバシル)
- 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μg (ペルマックス)
- 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg (ペルマックス)
- ペルサンチン錠25mg (院内はジピリダモール錠25mg「ト7」)
(【般】ジピリダモール錠25mgへ切替)
- ペルサンチン錠100mg (院内はジピリダモール錠100mg「ト7」)
- ペルジピンヒAカプセル20mg
(【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mgへ切替)
- ペルジピンヒAカプセル40mg
(【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mgへ切替)
- ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg
ヘルベッサ錠30 30mg
(ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ト7」へ切替)
ヘルベッサRカプセル100mg
(ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サ1」へ切替)
(【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mgへ切替)
- 劇ベルマックス錠50μg (【般】ベルゴリドメシル酸塩錠50μgへ切替)
- 劇ベルマックス錠250μg (【般】ベルゴリドメシル酸塩錠250μgへ切替)
- 劇ベレキシブル錠80mg
- 劇ベロスピロン塩酸塩錠4mg「ア1」 【後】
- 【般】ベロスピロン塩酸塩錠4mg (ルーラン)
- ベングッド錠250mg
- 向ベンザリン細粒1%
- 向ベンザリン錠5—5mg (【般】ニトラゼパム錠5mgへ切替)
- 劇ベンズプロマロン錠50mg「NIG」 【後】
- 【般】ベンズプロマロン錠50mg (ユリノーム)
- ペンタサ顆粒94% [250mg/P]
- ペンタサ顆粒94% [1000mg/P]
ペンタサ顆粒94% [2000mg/P]
- ペンタサ錠500mg (【般】メサラジン錠500mgへ切替)
- 【般】ペンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル(ビタジン)
【ホ】
劇ボイデヤ錠50mg
ボカブリア錠30mg
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
- ボグリボースOD錠0.3mg「ト7」 【後】
- ボダリボースODフィルム0.2「QQ」—0.2mg—【後】—
- ボダリボースODフィルム0.3「QQ」—0.3mg—【後】—
- 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg (ベイスン)
- 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg (ベイスン)
- 劇ボシュリフ錠100mg
ボースデル内用液10 [250mL/袋]
ホスミシンドライシロップ400 400mg/g
- ホスミシン錠500 500mg
ホスリボン配合顆粒
- ホスレノール顆粒分包250mg(【般】炭酸ランタン顆粒250mgへ切替)
- ホスレノールチュアブル錠250mg
- ホスレノールチュアブル錠500mg
- 【般】ボセンタン錠62.5mg (トラクリア)
- 劇ボナロン錠5mg (【般】アレンドロン酸錠5mgへ切替)
- 劇ボナロン錠35mg (院内はアレンドロン酸錠35mg「ト7」)
(【般】アレンドロン酸錠35mgへ切替)
- 劇ボナロン経口ゼリー35mg
- ボノサップバック400 1シート
- ボノピオンバック 1シート
- 毒ボマリストカプセル1mg
毒ボマリストカプセル2mg
毒ボマリストカプセル3mg
毒ボマリストカプセル4mg
- ボラキス錠2—2mg (【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mgへ切替)
- ボラキス錠3—3mg (【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mgへ切替)
- 劇ボラニゴ錠10mg
- ボラブレジックOD錠75mg「サ1」 【後】
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 [1.2g/P] 【後】
- 劇ポリコナゾール顆粒20%「効効」 【後】
(ブイフェンドドライシロップ2800mgが無くなり次第切替)
(院外は【般】ポリコナゾール顆粒20%へ切替)
- 【般】ポリコナゾール顆粒20% (ブイフェンド)
- 劇ポリコナゾール錠50mg「ト7」 【後】
- 劇ポリコナゾール錠200mg「ト7」 【後】
- 【般】ポリコナゾール錠50mg (ブイフェンド)
- 【般】ポリコナゾール錠200mg (ブイフェンド)
- ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 【後】
(アーガメイト20%ゼリー25gより名称変更)
- 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%—25g/包 (カリメート)
- 【般】ホリナート錠25mg (ロイコポリン)
- ボルズイ錠2.5mg
ボルズイ錠5mg
- ボルズイ錠10mg
- 劇ボルタレン錠25mg (【般】ジクロフェナクNa錠25mgへ切替)
(院内はジクロフェナクNa錠25mg「ト7」)
- ポルトラック原末 [6g/P]
- ボンゾール錠100mg
ボンターリンロップ3.25%
- 劇ボンビバ錠100mg

【マ】

- 向マイスタン錠5mg
- 向マイスタン錠10mg
- 向マイスラー錠5mg（院内はゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg【ワ】）
（【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mgへ切替）
- 向マイスラー錠10mg（【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mgへ切替）
- マヴィレット配合錠
マグコロール散68%分包50g
- 劇マタサルトリP-D錠10mg
（リザトリプタンOD錠10mg【VTRS】へ切替）
（【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
- マダニット錠500mg—【後】—（【般】酸化マグネシウム錠500mgへ切替）
- 劇マスーレッド錠5mg
- 劇マスーレッド錠12.5mg
- 劇マスーレッド錠25mg
- マーズレンS配合顆粒 [0.67g/P]
（【般】アズレシホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 0.67g/包へ切替）
- マーズレン配合錠1.0ES
マドパー配合錠（マドパー配合錠L100へ名称変更）
- マドパー配合錠L50
マドパー配合錠L100
- 劇マニジピン塩酸塩錠10mg【ワ】—【後】—
- 【般】マニジピン塩酸塩錠10mg（カルスロット）
- 劇マニジピン塩酸塩錠20mg【ワ】—【後】—
- 【般】マニジピン塩酸塩錠20mg（カルスロット）
- 【般】—マプロチリン塩酸塩錠10mg（ルジオミール）
- 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg（ルジオミール）
- マーベロン21（保険適用外）
- マリゼプ錠12.5mg
- マリゼプ錠25mg
- 【ミ】
- ミオカーム内服液33.3% [125mL/瓶]
- ミオナール錠50mg（院内はエペリゾン塩酸塩錠50mg【ト】）
（【般】エペリゾン塩酸塩錠50mgへ切替）
- 劇ミカトリオ配合錠
劇ミカムロ配合錠A-P（テラムロ配合錠A-P【ト】へ切替）
- 劇ミカムロ配合錠B-P
（【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠へ切替）
ミカルディオ錠40mg（院内はテルミサルタン錠40mg【ト】）
（【般】テルミサルタン錠40mgへ切替）
- ミカルディオ錠80mg（【般】テルミサルタン錠80mgへ切替）
ミグシス錠5mg
- ミグリトール錠50mg【ト】 【後】
- 【般】ミグリトール錠50mg（セイブル）
小児用ミケラン細粒0.2%
- ミケラン錠5mg（【般】カルテオロール塩酸塩錠5mgへ切替）
- ミケランL Aカプセル15mg（2027年3月31日経過措置終了）
- ミコプティンカプセル150mg
ミコンビ配合錠A-P（院内はテルチア配合錠A-P【ト】）
（【般】テルミサルタン40mg・ヒドロキサジン配合錠へ切替）
- ミコンビ配合錠B-P
（【般】テルミサルタン80mg・ヒドロキサジン配合錠へ切替）
- 【般】ミチグリニドCa錠10mg（グルファスト）
- ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
- ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
- ミドドリン塩酸塩錠2mg【JG】 【後】
- 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg（メトリジン）

- 劇ミニリンメルトOD錠25μg
- 劇ミニリンメルトOD錠60μg
- 劇ミニリンメルトOD錠120μg
ミネプロOD錠1.25mg
ミネプロOD錠2.5mg
ミネプロOD錠5mg
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg【ト】 【後】
- 【般】ミノドロン酸錠1mg（ポノテオ）
- 【般】ミノドロン酸錠50mg（ポノテオ）
ミノマイシン顆粒2% 20mg/g
- ミノマイシン錠50mg
- ミノマイシнкаプセル100mg
（院内はミノサイクリン塩酸塩錠100mg【ト】）
ミヤBM細粒 [1g/P]
- 劇ミラベックスL A錠0.375mg
（【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mgへ切替）
- 劇ミラベックスL A錠1.5mg
（【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mgへ切替）
- 劇ミルタザピン錠15mg【ト】 【後】
- 【般】ミルタザピン錠15mg（リフレックス）
- 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg（トレドミン）
- 劇ミルナシプラン塩酸塩錠25mg【メル】 【後】
- 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg（トレドミン）
- 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠50mg（トレドミン）
ミンクリア内用散布液0.8%
- 【ム】
- ムコサールドライシロップ1.5%（【般】なし）
—（【般】—アンプロキシオール塩酸塩シロップ用1.5%へ切替）—
（2027年3月31日経過措置終了）
- ムコスタ錠100mg（院内はレバミビド錠100mg【ト】）
（【般】レバミビド錠100mgへ切替）
- ムコナルバン錠15mg
（【般】アンプロキシオール塩酸塩錠15mgへ切替）
- ムコナルバンL錠45mg
（【般】アンプロキシオール塩酸塩徐放錠45mgへ切替）
- 小児用ムコナルバンシロップ0.3%
（【般】アンプロキシオール塩酸塩シロップ0.3%へ切替）
- ムコダインDS50%（院内はカルボシステインDS50%【ト】）
- ムコダイン錠250mg（院内はカルボシステイン錠250mg【ト】）
- ムコダインシロップ5%
（院内はカルボシステインシロップ小児用5%【ト】）
（【般】カルボシステインシロップ5%へ切替）
- ムコダイン錠15mg—【後】—
（院内はアンプロキシオール塩酸塩錠15mg【ト】へ切替）
（【般】アンプロキシオール塩酸塩錠15mgへ切替）
- ムルプレタ錠3mg
- ※劇ムンデシнкаプセル100mg
- 【メ】
- メiakトMS小児用細粒10% 100mg/g
- メiakトMS錠100mg
- 向メiラックス錠1mg（院内はロフラゼブ酸エチル錠1mg【ワ】）
- メiンテート錠2.5mg
（院内はピソプロロール fumarate 錠2.5mg【ト】）
（【般】ピソプロロール fumarate 錠2.5mgへ切替）
- メiンテート錠5mg
（【般】ピソプロロール fumarate 錠5mgへ切替）
- 劇メキシチールカプセル50mg
- 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg（メキシチール）

劇メキシチールカプセル100mg
（【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mgへ切替）
● 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg（メキシチール）
劇メキニスト錠0.5mg 〔冷〕
劇メキニスト錠2mg 〔冷〕
劇メクトビ錠15mg
● 【般】メコパミン細粒0.1%500mg 500μg/0.5g包（メチコパール）
● 【般】メコバロミン錠0.5mg（メチコパール）
麻劇メサペイン錠5mg
麻劇メサペイン錠10mg
● 【般】メサラジン錠500mg（ペンタサ）
○ メサラジン腸溶錠400mg「サリ」 【後】
● 【般】メサラジン腸溶錠400mg（アサコール）
※劇メジコン散10%
（デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」へ切替）
劇メスチノン錠60mg
劇メーゼント錠0.25mg 〔冷〕
劇メーゼント錠2mg 〔冷〕
劇メソトレキセート錠2.5mg
● 劇メタクト配合錠L D
● 劇メタクト配合錠H D
劇メタライト250カプセル 250mg 〔冷〕
メタルカプターゼカプセル50mg
メチコパール細粒0.1% 500μg/0.5g包 【後】
（【般】メコパミン細粒0.1%500mg 500μg/0.5g包へ切替）
○ メチコパール錠500μg 【後】
（【般】メコバロミン錠0.5mgへ切替）
劇メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」
● 劇メトアナ配合錠L D
● 劇メトアナ配合錠H D
劇メトグルコ錠250mg
● 劇メトグルコ錠500mg（【般】なし）
○ メトクロプラミド錠5mg「NIG」 【後】
● 【般】メトクロプラミド錠5mg（プリンペラン）
● 劇【般】メトトレキサートカプセル2mg（リウマトレックス）
（【般】メトトレキサート錠2mgへ切替）
○ 劇メトトレキサート錠2mg「JG」 【後】
● 劇【般】メトトレキサート錠2mg
メトピロンカプセル250mg
● 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mgMT（メトグルコ）
● メトサジン錠2mg（【般】ミドドリン塩酸塩錠2mgへ切替）
○ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 【後】
（プロゲストン錠2.5mgより名称変更）
● 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg（プロヘラ）
● 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg（ヒメロンH）
メドロール錠2mg
メドロール錠4mg
● 【般】メナテトレノンカプセル15mg（グラケー）
● メニレット70%ゼリー20g/個
（イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」へ名称変更）
● メニレット70%ゼリー30g/個
（イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」へ名称変更）
● メパロチン錠5 5mg
● メパロチン錠10 10mg（院内はプラバスタチンN a錠10mg「トー」）
（【般】プラバスタチンN a錠10mgへ切替）
劇メフィーゴバック
● メブチンドライシロップ0.005%

メブチンミニ錠25μg
（【般】プロカテロール塩酸塩錠0.025mgへ切替）
● メブチン錠50μg
（【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mgへ切替）
● メブチンシロップ5μg/mL
（院内はプロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」）
（【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% 5μg/mLへ切替）
● 【般】メベンゾラート臭化物錠7.5mg（トランコロン）
● 劇メマリー錠5mg（【般】メマンチン塩酸塩錠5mgへ切替）
● 劇メマリー錠10mg（【般】メマンチン塩酸塩錠10mgへ切替）
● 劇メマリー錠20mg（【般】メマンチン塩酸塩錠20mgへ切替）
劇メマリーOD錠5mg（メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」へ切替）
（【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替）
● 劇メマリーOD錠10mg
（【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替）
● 劇メマリーOD錠20mg
（【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mgへ切替）
○ 劇メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 【後】
● 【般】メマンチン塩酸塩錠5mg（メマリー）
● 【般】メマンチン塩酸塩錠10mg（メマリー）
● 【般】メマンチン塩酸塩錠20mg（メマリー）
● 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg（メマリーOD）
● 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg（メマリーOD）
● 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg（メマリーOD）
メラトベル顆粒小児用0.2% g
● メリスロン錠6mg（院内はベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トー」）
● メルカゾール錠2.5mg
メルカゾール錠5mg
○ メロキシカム錠10mg「トー」 【後】
● 【般】メロキシカム錠10mg（モービック）
【モ】
○ モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」 【後】
● 【般】モサブリドクエン酸塩散1%（ガスモチン）
○ モサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」 【後】
● 【般】モサブリドクエン酸塩錠5mg（ガスモチン）
● 向劇モディオダール錠100mg
● モニラックシロップ65% [600mL]
（院内はラクツロースシロップ65%「タタ」）
● モニラックシロップ65% [10mL/包]
● モーバー錠100mg（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了）
● モビコール配合内用剤H D
モビコール配合内用剤L D（モビコール配合内用剤より名称変更）
劇モービック錠10mg（院内はメロキシカム錠10mg「トー」）
（【般】メロキシカム錠10mgへ切替）
モビブレップ配合内用剤
麻毒モルヒネ塩酸塩水和物「タタ」原末 g
麻劇モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジ」 0.5g/包 【後】
（モルベス細粒2%から名称変更）
● 麻劇【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg（12時間持続）（モルベス）
● 麻劇モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
○ モンテルカストOD錠10mg「タタ」 【後】
● 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg（キプレス、シングレア）
● 【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包（キプレス、シングレア）
● 【般】モンテルカスト錠5mg（キプレス、シングレア）
● 【般】モンテルカスト錠10mg（キプレス、シングレア）
○ モンテルカストチュアブル錠5mg「トー」 【後】
（キプレスチュアブル錠5mgから切替）
● 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg（キプレス、シングレア）

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

【ヤ】

- 薬用炭「日医工」(50g)
- ヤーズ配合錠 1シート
(【般】ドロスピロノ・エチルエストラジオール配合錠・ﾌﾞﾚｯｸﾞ錠へ切替)
 - ヤーズフレックス配合錠 1シート
(【般】ドロスピロノ・エチルエストラジオール配合錠へ切替)
- 【ユ】
- 劇ユーエフティ E 配合顆粒 T 100 [100mg/0.5g/P]
 - 劇ユーエフティ E 配合顆粒 T 150 [150mg/0.75g/P]
 - 劇ユーエフティ E 配合顆粒 T 200 [200mg/1g/P]
 - 劇ユーエフティ 配合カプセル T 100
 - ユーゼル錠25mg (【般】ホリナート錠25mgへ切替)
 - ※ ユナシン細粒小児用10% 100mg/g
 - ユナシン錠375mg
 - 劇ユニシア配合錠7+D
(【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠へ切替)
 - 劇ユニシア配合錠H+D
(【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替)
 - 劇ユバンシ配合錠
ユービット錠100mg
 - ユビデカレノン錠10mg「ﾄｰﾌﾞ」 【後】
 - 【般】ユビデカレノン錠10mg (ノイキノン)
ユベラ錠50mg (トコフェロール酢酸エステル錠50mg「ﾄｰﾌﾞ」へ切替)
(【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mgへ切替)
 - ユベラNカプセル100mg
(【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mgへ切替)
 - ユリス錠1mg
 - ユリス錠2mg
 - 劇ユリナーム錠50mg (院内はベンズプロマロン錠50mg「NIG」)
(【般】ベンズプロマロン錠50mgへ切替)
 - 劇ユリナーマ錠2mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mgへ切替)
 - 劇ユリナーマ錠4mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mgへ切替)
 - 向ユーロジン2mg錠 (【般】エスタゾラム錠2mgへ切替)
- 【ヨ】
- 劇ヨウ化カリウム「コザカイ・M」(院内製剤原料)
- ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
- ヨウ化カサウム末
- ヨウ化カリウム内服ゼリー16.3mg「日医工」 (備蓄用) [1g/P]
- 幼児用P7配合顆粒 1[g/P]
- 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% (インクレミン)
 - ヨクイニンエキス錠「ｺﾓｰ」T72
- 【ラ】
- ラキソベロン錠2.5mg (【般】なし)
(【般】ピコスルファートNa錠2.5mgへ切替)
 - ラキソベロン内用液0.75% [75mg/10mL/瓶]
(【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mLへ切替)
 - ラクツロースシロップ65%「効外」 【後】
(ピアーレシロップ65%より名称変更)
 - 【般】ラクツローースシロップ65% (モニラック)
 - 【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g/包 (ラグノスNFゼリー)
 - ラグノスNF経口ゼリー分包12g 【後】
(【般】ラクツロース経口ゼリー54.167% 12g/包へ切替)
- 劇ラゲブリオ錠400mg
- 【般】ラコサミドシロップ用10% (ビムパット)
 - 【般】ラコサミド錠50mg (ビムパット)
 - 【般】ラコサミド錠100mg (ビムパット)

- ラコールNF配合経腸用半固形剤 1[300g/袋]
(イノソリッド配合経腸用半固形剤へ切替)
- ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー) 1[200mL/袋]
- ラコールNF配合経腸用液(コーンフレーバー) [200mL/袋]
 - ラコールNF配合経腸用液 [400mL/袋]
 - ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL/瓶 [2~8℃]
 - ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL/瓶 [2~8℃]
 - ラシックス細粒4% (院内はフロセミド細粒4%「EMEC」)
(【般】フロセミド細粒4%へ切替)
 - ラシックス錠20mg (フロセミド錠20mg「NIG」へ切替)
(【般】フロセミド錠20mgへ切替)
 - ラシックス錠40mg (【般】フロセミド錠40mgへ切替)
 - ラジレス錠150mg (販売中止) (2027年3月31日経過措置終了)
- 劇ラズクルーズ錠80mg
- 劇ラステットSカプセル25mg
- ラスビック錠75mg
- ラックビー微粒N 1% [1g/P]
- 劇ラツォダ錠20mg
- 劇ラツォダ錠40mg
 - 劇ラツォダ錠80mg
- ラディオガルダーゼカプセル500mg
- 劇ラニラピッド錠0.05mg (【般】なし)
- 劇ラバリムス顆粒0.2%
- 劇ラバリムス錠1mg
- ラフチジン錠10mg「ﾄｰﾌﾞ」 【後】
- 【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg (プロテカジン)
 - ラベファインバック 1シート
 - ラベプラゾールNa錠5mg「YD」 【後】
 - ラベプラゾールNa錠10mg「ﾄｰﾌﾞ」 【後】
 - 【般】ラベプラゾールNa錠5mg (パリエット)
 - 【般】ラベプラゾールNa錠10mg (パリエット)
 - 【般】ラベプラゾールNa錠20mg (パリエット)
- 向劇ラボナ錠50mg
- 【般】ラマトロバン錠75mg (バイナス)
 - 劇ラミクタール錠小児用2mg
 - 劇ラミクタール錠小児用5mg
 - 劇ラミクタール錠25mg (院内はラモトリギン錠25mg「ｱﾏﾙ」)
(【般】ラモトリギン錠25mgへ切替)
 - 劇ラミクタール錠100mg (【般】ラモトリギン錠100mgへ切替)
 - ラミシール錠125mg (テルピナフィン錠125mg「VTRS」へ切替)
 - ラメルテオン錠8mg「JG」 【後】
 - 【般】ラメルテオン錠8mg (ロゼレム)
 - 【般】ラモトリギン錠2mg (ラミクタール)
 - 劇ラモトリギン錠25mg「ｱﾏﾙ」 【後】
 - 【般】ラモトリギン錠25mg (ラミクタール)
 - 劇ラモトリギン錠100mg「ｱﾏﾙ」 【後】
 - 【般】ラモトリギン錠100mg (ラミクタール)
 - 劇ラモトリギン錠小児用5mg「ﾄｰﾌﾞ」 【後】
 - ラリキシン錠250mg
 - 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg (エビスタ)
 - ランソプラゾールOD錠15mg「ｶｲ」 【後】
 - 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg (タケブロン)
 - 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg (タケブロン)
 - 劇ランデル錠20 20mg
 - ランブレンカプセル50mg [35℃以上禁]

【リ】

- リアルダ錠600mg [冷]
リアルダ錠1200mg [冷]
劇サウマトレックスカプセル2mg
(メトトレキサート錠2mg「JG」へ切替)
(【般】メトトレキサート錠2mgへ切替)
リオナ錠250mg
リオベル配合錠L D
- リオベル配合錠H D
- 劇サカルボン錠1mg (【般】ミノドロン酸錠1mgへ切替)
- 劇サカルボン錠50mg (【般】ミノドロン酸錠50mgへ切替)
リクシアナO D錠15mg
リクシアナO D錠30mg
リクシアナO D錠60mg
- 劇リザトリプタンO D錠10mg「VTRS」 【後】
- 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg (マクサルトR P D)
- リザベンカプセル100mg
- 劇リスパダール細粒1%
- 劇リスパダールO D錠1mg
- 劇リスパダール内用液1mg/mL [30mL/瓶]
- 劇リスパダール内用液1mg/mL [0.5mL/包]
- 劇リスパダール内用液1mg/mL [1mL/包]
- 劇リスパダール内用液1mg/mL [2mL/包]
- 劇リスベリドン細粒1%「ト」 【後】
- 【般】リスベリドン細粒1% (リスパダール)
- 劇リスベリドン錠0.5mg「アム」
- ~~【般】リスベリドン錠0.5mg (リスパダール)~~
- 劇リスベリドンO D錠1mg「アム」 【後】
- 劇リスベリドン内用液1mg/mL「効効」 【後】
- 劇リスベリドン内用液分包0.5mg「アム」 [0.1%0.5mL/包] 【後】
- 【般】リスベリドン経口液0.1% 0.5mL (リスパダール)
- 【般】リスベリドン経口液0.1% 1mL (リスパダール)
- 【般】リスベリドン経口液0.1% 2mL (リスパダール)
- 【般】リスベリドン経口液0.1% 3mL (リスパダール)
- リスミー錠1mg (【後】なし)
- リスミー錠2mg (【般】なし)
- サズミツ錠10mg
(院内はアメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「ト」)
(【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mgへ切替)
- 劇サスモダンカプセル50mg
(院内はジソピラミドカプセル50mg「ファザー」)
(【般】ジソピラミドカプセル50mgへ切替)
劇リスモダンR錠150mg
(【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mgへ切替)
- 向リーゼ錠5mg (院内はクロチアゼパム錠5mg「サリ」)
- 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg (アクトネル)
- 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg (アクトネル)
- 【般】リセドロン酸Na錠75mg (アクトネル)
- 劇リセドロン酸Na錠75mg「ト」 【後】
- 向劇リタリン錠10mg
- 劇リットフォーロカプセル50mg
- 劇リトゴビ錠4mg
- リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」 【後】
- 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg (ウテメリン)
リーバクト配合顆粒 [4.15g/P]
- リーバクト配合経口ゼリー [20g/個] (2027年3月31日経過措置終了)
- リバクレオン顆粒300mg分包
リバクレオンカプセル150mg

- リバゼブ配合錠L D
- リバゼブ配合錠H D
- サバロO D錠1mg
(【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mgへ切替)
- サバロO D錠2mg (院内はピタバスタチンCa・O D錠2mg「ト」)
(【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mgへ切替)
- サバロO D錠4mg
(【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mgへ切替)
リバーロキサバンO D錠10mg「ハイル」 【後】
- 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg (イグザレルト)
リバーロキサバンO D錠15mg「ハイル」 【後】
- 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg (イグザレルト)
サビディール錠80mg
(院内はフェノフィブラート錠80mg「武田」へ切替)
(【般】フェノフィブラート錠80mgへ切替)
- サビトール錠10mg (【般】アトルバスタチン錠10mgへ切替)
- サファジンカプセル150mg
(院内はリファンピシンカプセル150mg「サド」)
リファンピシンカプセル150mg「サド」 【後】 (【般】なし)
- ~~【般】リファンピシンカプセル150mg (リファジン)~~
リフキシマ錠200mg
劇リブテンシティ錠200mg
- リフヌア錠45mg
劇リフレックス錠15mg (ミルタザピン錠15mg「ト」へ切替)
(【般】ミルタザピン錠15mgへ切替)
劇リベルサス錠3mg
劇リベルサス錠7mg
- 劇リベルサス錠14mg
向リボトリール細粒0.5%
向リボトリール錠0.5mg
- サボマス錠5—5mg (【般】シンバスタチン錠5mgへ切替)
(2027年3月31日経過措置終了)
- 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg (ハイボン)
劇サーマス錠100—100mg (炭酸リチウム錠100「大正」へ切替)
- 劇リーマス錠200 200mg (院内は炭酸リチウム錠200「大正」)
- 劇リマチル錠100mg
- リマプロストアルファデクス錠5μg「サリ」 【後】
- 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg (オバルモン, プレナール)
劇リムパーザ錠100mg
劇リムパーザ錠150mg
硫酸マダネニウム「東海」(院内製剤原料)(販売中止)
ササカO D錠25mg (プレガバリンO D錠25mg「明治」へ切替)
(【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mgへ切替)
ササカO D錠75mg (プレガバリンO D錠75mg「明治」へ切替)
(【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mgへ切替)
- ササカO D錠150mg
(【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mgへ切替)
- リルゾール錠50mg「ニロ」 【後】
- 【般】リルゾール錠50mg (リルテック)
サルテック錠50—50mg (リルゾール錠50mg「ニロ」へ切替)
(【般】リルゾール錠50mgへ切替)
- 劇リンヴォック錠7.5mg
- 劇リンヴォック錠15mg
- 劇リンヴォック錠30mg
劇リンヴォック錠45mg
劇リン酸コデイン散1%「サリ」
- リン酸水素カルシウム水和物「エス」
(リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」から切替)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

リンゼス錠0.25mg
リンデロン錠0.5mg
リンデロンシロップ0.01%
【ル】
● ルジオミール錠10mg
● ~~ルジオミール錠25mg~~（【般】 マプロチリン塩酸塩錠25mgへ切替）
ルセフィ錠2.5mg
● ルセフィODフィルム2.5mg
ルトラール錠2mg
● ~~ルナベル配合錠7.5~~
（【般】 ~~ルエチステロン・エチニエストラジ~~ オール0.02mg配合錠）
● ~~ルナベル配合錠7.5~~
（【般】 ~~ルエチステロン・エチニエストラジ~~ オール0.035mg配合錠へ切替）
ルネスタ錠1mg（エスゾピクロン錠1mg「日新」へ切替）
● ルネスタ錠2mg
ルパフィン錠10mg
劇ルピネスカプセル7.9mg
ルプラック錠8mg（トラセミドOD錠8mg「TE」へ切替）
● ルボタックス錠25—25mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替）
● ルボタックス錠50—50mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替）
● ルボタックス錠75—75mg
（【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替）
劇ルマケラス錠120mg
● ~~劇ルーラン錠4mg~~（院内はペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」）
（【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mgへ切替）
【レ】
● 劇レイボー錠50mg
● 劇レイボー錠100mg
劇レキサルティOD錠0.5mg
劇レキサルティOD錠1mg
● 劇レキサルティOD錠2mg
● 向レキソタン錠2—2mg（採用薬はプロマゼパム錠2mg「サド」へ切替）
● ~~劇レキップ錠0.25mg~~（【般】ロビニロール錠0.25mgへ切替）
~~劇レキップ錠1mg~~（院内はロビニロールOD錠1mg「アメル」）
（【般】ロビニロール口腔内崩壊錠1mgへ切替）
● ~~劇レキップ錠2mg~~（【般】ロビニロール錠2mgへ切替）
~~劇レキップC-R錠2mg~~（院内はロビニロール徐放錠2mg「ト-7」）
（【般】ロビニロール徐放錠2mgへ切替）
● ~~劇レキップC-R錠8mg~~（【般】ロビニロール徐放錠8mgへ切替）
劇レクサプロ錠10mg（【般】エスシタロプラム錠10mgへ切替）
レクチゾール錠25mg
レグテクト錠333mg
● レグナイト錠300mg
● レグバラ錠12.5mg
レグバラ錠25mg
● レザルタス配合錠LD
レザルタス配合錠HD
レスタミンコーワ錠10mg
レスピア静注・経口液60mg—3mL瓶
レスプレン錠20mg
● ~~劇レスサン錠50—50mg~~（【般】トラゾドン塩酸塩錠50mgへ切替）
劇レズロック錠200mg
● 劇レットヴィモカプセル40mg
● 劇レットヴィモカプセル80mg
● 劇レットヴィモ錠40mg
● 劇レットヴィモ錠80mg

● ~~劇レトロゾール錠2.5mg「ヤクト」~~—【後】—
● 【般】レトロゾール錠2.5mg（フェマール）
~~劇レトロビルカプセル100mg~~
レナデックス錠4mg
○ 毒レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」—【後】—
● 毒【般】レナリドミドカプセル2.5mg（レブラミド）
○ 毒レナリドミドカプセル5mg「BMSH」—【後】—
● 毒【般】レナリドミドカプセル5mg（レブラミド）
● ~~セニペース錠2.5—2.5mg~~（2027年3月31日経過措置終了）
（【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mgへ切替）
● ~~セニペース錠5mg~~（院内はエナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ト-7」）
（2027年3月31日経過措置終了）
（【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mgへ切替）
○ 劇レバグリニド錠0.25mg「サイ」—【後】—
● 【般】レバグリニド錠0.25mg（シュアポスト）
● ~~劇レバダリニド錠0.5mg「サイ」~~—【後】—
● 【般】レバグリニド錠0.5mg（シュアポスト）
~~レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg~~
レバチオ錠20mg（【般】シルデナフィル錠20mg：REへ切替）
○ レバミピド錠100mg「ト-7」（【般】加算なし）
● 【般】レバミピド錠100mg（ムコスタ）
毒レブラミドカプセル2.5mg
（【般】レナリドミドカプセル2.5mgへ切替）
毒レブラミドカプセル5mg
（【般】レナリドミドカプセル5mgへ切替）
○ レベチラセタムDS50%「ト-7」—【後】—
○ レベチラセタム錠500mg「サイ」—【後】—
● 【般】レベチラセタム錠500mg（イーケプラ）
● 【般】レベチラセタムシロップ用50%（イーケプラドライシロップ）
○ レボカルニチンFF錠250mg「ト-7」—【後】—
● 【般】レボカルニチンFF錠250mg（エルカルチン）
○ レボカルニチンFF内用液10%「ト-7」—【後】—
● 【般】レボカルニチンFF経口液10%（エルカルチン）
○ レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サド」—【後】—
~~レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ト-7」~~—【後】—
● 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg（ザイザル）
● 劇レボチロキシンNa錠25μg「サド」
● 劇レボチロキシンNa錠50μg「サド」
● 【般】レボドバ100mg・カルビドバ配合錠（ネオドバストンL）
● ~~—【般】レボドバ250mg・カルビドバ配合錠（メネシット）—~~
● 【般】レボフロキサシン錠250mg
レボフロキサシン錠500mg「サイ」—【後】—
● 【般】レボフロキサシン錠500mg（クラビット）
● 【般】レボメブロマジンマレイン酸塩錠25mg（ヒルナミン）
劇レボレード錠12.5mg
（院外は【般】エルトロンボバグ錠12.5mgへ切替）
劇レミッチOD錠2.5μg
（【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μgへ切替）
劇レミニールOD錠4mg
（【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mgへ切替）
劇レミニールOD錠8mg
（【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mgへ切替）
● ~~劇レミニールOD錠12mg~~
（【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mgへ切替）
● レリフェン錠400mg
劇レルミナ錠40mg
● 向レンドルミンD錠0.25mg

劇レンビマカプセル4mg
劇レンビマカプセル10mg
【ロ】
劇ロイケリン散10%
ロイコボリン錠5mg
ロイコン錠10mg
●劇ロカルトロールカプセル0.25—0.25 μ g
（【般】カルシトリオールカプセル0.25 μ gへ切替）
●ローガン錠10mg
●ロキソニン錠60mg（院内はロキソプロフェンN a錠60mg「ト7」）
（【般】ロキソプロフェンN a錠60mgへ切替）
●【般】ロキソプロフェンN a錠60mg（ロキソニン）
○ロキソプロフェンN a錠60mg「ト7」 【後】
ロケルマ懸濁用散分包5g 1包
●ロケルマ懸濁用散分包10g 1包
●ロヨーール錠30mg（【般】フルバスタチン錠30mgへ切替）
●ロヨルナール錠100mg（【般】トラビジル錠100mgへ切替）
○ロサルタンK錠25mg「ト7」 【後】
●【般】ロサルタンK錠25mg（ニューロタン）
●【般】ロサルタンK錠50mg（ニューロタン）
●【般】ロサルタン100mg・ヒドロクロチアジド配合錠（プレミネントHD）
●【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロチアジド配合錠（プレミネントLD）
ロソーゼット配合錠HD
（【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠へ切替）
※○ロスバスタチンOD錠2.5mg「サ7」 【後】（販売中止）
（ロスバスタチンOD錠2.5mg「ト7」へ切替）
（院外は【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mgへ切替）
●【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg（クレストール）
○ロスバスタチンOD錠2.5mg「ト7」 【後】
（院外は【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mgへ切替）
●【般】ロスバスタチン錠5mg（クレストール）
劇ロズリートレカプセル100mg
劇ロズリートレカプセル200mg
ロゼレム錠8mg（ラメルテオン錠8mg「JG」へ切替）
（【般】ラメルテオン錠8mgへ切替）
劇ロタリックス内用液 1.5mL/本 [冷]
●劇ロートエクス散 10%
劇ロドピン錠25mg（ゾテピン錠25mg「効効」2027年3月31日経過措置
終了が無くなり次第切替）
ロトサガ粒状カプセル2g—[2g/包]
（オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ト7」へ切替）
（【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2gへ切替）
劇ロナセン錠4mg（【般】プロナンセリン錠4mgへ切替）
●劇ロナセン錠8mg（【般】プロナンセリン錠8mgへ切替）
○劇ロビニロールOD錠1mg「アル」 【後】
●【般】ロビニロール口腔内崩壊錠1mg（レキップ）
●【般】ロビニロール錠0.25mg（レキップ）
●【般】ロビニロール錠1mg（レキップ）
●【般】ロビニロール錠2mg（レキップ）
○劇ロビニロール徐放錠2mg「ト7」 【後】
●【般】ロビニロール徐放錠2mg（レキップCR）
●【般】ロビニロール徐放錠8mg（レキップCR）
○向ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サ7」 【後】
劇ロプレソール錠20mg
劇ローブレナ錠25mg
劇ローブレナ錠100mg
ロベミン細粒0.1%（【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.1%へ切替）
●ロベミンカプセル1mg（院内はロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サ7」）

○ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サ7」 【後】
●【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg（ロペミン）
○向ロラゼパム錠0.5mg「サ7」 【後】
●【般】ロラタジン錠10mg（クラリチン）
●【般】ロラタジンシロップ用1% 0.5g（包）（クラリチン）
劇ロルカム錠4mg（ロルノキシカム錠4mg「KO」へ切替）
○劇ロルノキシカム錠4mg「KO」 【後】
劇ロンサーフ配合錠T15
劇ロンサーフ配合錠T20
【ワ】
●劇ワイテンス錠2mg
ワイドシリン細粒20% 【後】
●向ワイバックス錠0.5 0.5mg
劇ワゴスチグミン散(0.5%)
ワソラン錠40mg（【般】ペラパミル塩酸塩錠40mgへ切替）
●ワーファリン顆粒0.2%
ワーファリン錠0.5mg
ワーファリン錠1mg
ワルファリンK細粒0.2%「NS」 【後】
●劇ワンアルファ錠0.5 μ g
（【般】アルファカルシドール錠0.5 μ gへ切替）
劇ワントラム錠100mg

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

外用薬リスト

- 【ア】
劇アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL1個
アイドロイチン1%点眼液—5mL—【後】—（販売中止）
（コンドロイチン点眼液1%「日点」へ切替）
（【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mLへ切替）
劇アイノフロ吸入用800ppm （NICUの限定使用）
アイマザガン点眼液0.1%—5mL—
（プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」へ切替）
（【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%へ切替）
● アイベータ配合点眼液 5mL/瓶
アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/瓶
○ 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ 【後】
● 【般】亜鉛華単軟膏10%（サトウザルベ）
アタアチムクリーム1%—10g（院内はナジフロキサシンクリーム1%「トリ」）
（【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g/本へ切替）
アタアチムローション1%—20mL—
（ナジフロキサシンローション1%「トリ」へ切替）
（【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本へ切替）
アクトシン軟膏3% 30g [冷]
アクトシン軟膏3% 200g [冷]
アジマイシン点眼液1% 2.5mL/瓶 [冷]
劇亜硝酸アミル「AFP」 0.25mL1管 [冷]
● アスタット軟膏1% 10g （【般】なし）
—（【般】ラノヨナゾール軟膏1%—10mg/本へ切替）—
アズノール軟膏0.033% 20g
アズノール軟膏0.033%—500g（供給停止）
（アズノール軟膏0.033% 20gへ切替）
アズノールST錠口腔用5mg
アスプール液（0.5%） 50mL/瓶 [遮光]
○ アズレンうがい液4%「ケンエー」 5mL 【後】
● 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% 5mL/瓶
● 【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 2g/包（ハチアズレ）
劇アセサイド6%消毒液（第一剤，第二剤とも800mLセット）[1～25℃]
[内視鏡洗浄消毒装置OER-4専用]
劇アセサイド6%消毒液（第一剤，第二剤とも875mLセット）[1～25℃]
[内視鏡洗浄消毒装置OER-3専用]
○ アセチロールクリーム20%—25g—【後】—
（尿素クリーム20%「SUN」へ名称変更）
（【般】尿素クリーム20% 25g/本へ切替）
● 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg（アンヒバ）
● アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL
● 【般】アダバレンゲル0.1% 15g/本（ディフェリンゲル）
● アテキュラ吸入用カプセル低用量
アテキュラ吸入用カプセル中用量
アテキュラ吸入用カプセル高用量
アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g1瓶
アドエア100ディスクス60吸入用 60ブリスタ1キット
● アドエア250ディスクス60吸入用 60ブリスタ1キット
● アドエア500ディスクス60吸入用 60ブリスタ1キット
● アドフィードパップ40mg 10cm×14cm(7枚入)
劇日点アトロピン点眼液1% 5mL
● アニユイティ100μgエリプタ30吸入用 1キット
● アニユイティ200μgエリプタ30吸入用 1キット
● アノーロエリプタ7吸入用 1キット
アノーロエリプタ30吸入用 1キット

- アバレプト懸濁性点眼液0.3% 5mL/瓶
● アボハイドローション20% 4.32g/本
アラセナー-A軟膏3% 5g （【般】ピダラビン軟膏3% 5g/本へ切替）
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g1キット
（【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用へ切替）
● アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 5mg10g1キット
（【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用へ切替）
アリケイス吸入液590mg 8.4mL瓶 [2～8℃]
● 劇アリドネパッチ27.5mg 1枚
● 劇アリドネパッチ55mg 1枚
● —【般】アルメタゲンアロヒン酸エステル軟膏0.1%—5g/本（アルメタ軟膏）—
アルト原末 500mg1管
● アルメタ軟膏 0.1%5g （【般】なし）
—（【般】アルメタゲンアロヒン酸エステル軟膏0.1%—5g/本へ切替）—
● アレサガテープ4mg 1枚
● アレサガテープ8mg 1枚
アレジオンLX点眼液0.1%—5mL/瓶
（エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」へ切替）
（【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%へ切替）
アレジオン眼瞼クリーム0.5% 2g/本
● 劇アンテベート軟膏0.05%—5g—
（院内はベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」）
● 劇アンテベートクリーム0.05%—5g—
（院内はベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」）
● 劇アンテベートローション0.05%—10g—
（院内はベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」）
アンヒバ坐剤小児用100mg [冷]
アンヒバ坐剤小児用200mg [冷]
（【般】アセトアミノフェン坐剤200mgへ切替）
麻劇アンベック坐剤10mg
【イ】
イオウ・カンフルローション「東豊」—500mL—[冷]（販売中止）
劇イクセロンパッチ4.5mg 1枚
（【般】リバスチグミンテープ4.5mgへ切替）
● 劇イクセロンパッチ9mg—1枚—
（【般】リバスチグミンテープ9mgへ切替）
● 劇イクセロンパッチ13.5mg—1枚—
（【般】リバスチグミンテープ13.5mgへ切替）
劇イクセロンパッチ18mg 1枚
（【般】リバスチグミンテープ18mgへ切替）
産婦人科用イソジンクリーム5% 250g
イソジンガーゲル液7%—30mL—
（ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」30mLへ切替）
（【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本へ切替）
イソジンゲル10% 90g
○ イソジンシュガーパスタ軟膏100g—【後】—（販売中止）
（【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100g/瓶へ切替）
○ イソジンシュガーパスタ軟膏500g—【後】—（販売中止）
（ポビシュガーパスタ軟膏へ切替）
● 【般】イソプロピルウプロストン点眼液0.12% 5mL/瓶（レスキア）
イナビル吸入粉末剤20mg 1キット
● 劇イミグラン点鼻液20 20mg0.1mL1個
劇イムノブラダー膀胱注用80mg 1瓶（溶解液付） [冷]
● インタール吸入液1%—2mL1管（カモグリン酸Na吸入液1%「サワイ」）
● インテバンクリーム1% 50g
● インテバン外用液1%—50mL—
（【般】インドメタシン外用液1% 50mL/本へ切替）
● 【般】インドメタシン外用液1% 50mL/本（インテバン）

【ウ】

※ ウエルアップハンドローション0.5% 1L

(ヒビスコール液A 1% 1Lへ切替)

● ウトロゲスタン腔用カプセル200mg

● ウルティプロ吸入用カプセル

ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3% 3L

【エ】

● エイゾプロト懸濁性点眼液1%—5mL

(【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶へ切替)

劇エイベリス点眼液0.002% 2.5mL [2～8℃]

エキザルベ軟膏 5g

エキザルベ軟膏 500g

エクラープラスター $20\mu\text{g}/\text{cm}^2$ (1.5mg)7.5cm×10cm

● エクリラ400 μg ジェヌエア30吸入用

● エクリラ400 μg ジェヌエア60吸入用

● エクロックゲル5%

● エコリシン眼軟膏 3.5g

A C D-A 液 500mL1袋

エスケレ坐剤「250」 250mg [冷]

● エストラナテープ0.09mg 1.125cm^2 1枚

● エストラナテープ0.18mg 2.25cm^2 1枚

● エストラナテープ0.36mg 4.5cm^2 1枚

エストラナテープ0.72mg 9cm^2 1枚

エストリール腔錠0.5mg

● 【般】エストリオール腔錠0.5mg

○ S P トローチ0.25mg「明治」 【後】

(【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mgへ切替)

エタノール[局] 500mL

エタノール[無水] 500mL

エナジア吸入用カプセル中用量

エナジア吸入用カプセル高用量

● 劇エビデュオゲル 15g

エピナスチン塩酸塩L X 点眼液0.1%「SEC」 5mL瓶 【後】

● 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1% (アレジオンL X)

● 【般】エフィナコナゾール外用液10% (クレナフィン爪外用液)

劇エムラクリーム 5g [凍結を避け30℃以下]

劇エムラパッチ 1枚 [禁凍結]

● エリザスカプセル外用400 μg

● エリザス点鼻粉末200 μg 28噴霧用 5.6mg1瓶

塩化アルミニウム(6水和物) 500g

塩化ナトリウム 500g

塩化ベンザルコニウム液0.025% (=逆性石ケン液0.025「ヨダ」)

500mL/瓶

塩化ベンザルコニウム液0.025% (=逆性石ケン液0.025「ヨダ」)

0.025%57 (販売中止) (500mL/瓶へ切替)

● エンクラッセ62.5 μg エリプタ30吸入用

● エンペンドクサーム1%—10g

(【般】クロトリマゾールクリーム1% 10g/本へ切替)

【オ】

オイラックスクリーム10% 500g

オイラックスHクリーム 5g

オオサキC H G 消毒綿0.2% [2枚/包] (物品供給センターで取扱い)

劇オキサロール軟膏25 $\mu\text{g}/\text{g}$ 10g

(【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10g/本へ切替)

● 劇オキサロールローション25 $\mu\text{g}/\text{g}$ 10g

○ オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」 【後】

● 【般】オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg (オキナゾール)

オーキシス9 μg タービュヘイラー28吸入 252 μg 1キット

オキシドール「ケン」 500mL

オキナゾール腔錠600mg (オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」)

オクサラレン軟膏0.3%—10g

オクサラレンローション0.3%—60mL

オスバン消毒液10% 500mL

(【般】ベンザルコニウム塩化物外用液10% 500mL/本へ切替)

オフミック点眼液 5mL/瓶 【後】

● オフロキサシンゲル化点眼液0.3%「わかもと」 5mL [冷] 【後】

オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッ」 3.5g

(オフロキシシン眼軟膏0.3%より名称変更)

オフロキシシン眼軟膏0.3%—3.5g

(オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッ」へ名称変更)

オペガードMA眼灌流液 20mL

オラネジン液1.5% O R 消毒用7リットル10mL

オラネジン液1.5% O R 消毒用7リットル25mL

オラビ錠口腔用50mg

オリブ油 (丸石) 500mL

オリブ油「ヨダ」 (滅菌済) 100mL

○ オルテクサー口腔用軟膏0.1% 5g 【後】

(【般】トリムシロキサート口腔用軟膏0.1% 5gへ切替)

● オルベスコ100 μg インヘラー112吸入用 11.2mg6.6g 1キット

オルベスコ200 μg インヘラー56吸入用 11.2mg3.3g 1キット

● 【般】オロパタジン点眼液0.1% (パタノール)

● オンプレス吸入用カプセル150 μg

【カ】

● カタリンK 点眼用0.005% 15mL

● ガチフロ点眼液0.3% 5mL

カデックス軟膏0.9% 40g

○ カルテオロール塩酸塩L A 点眼液2%「わかもと」 2.5mL 【後】

● 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL/瓶 (ミケランL A)

● 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本 (フロジン外用液)

【キ】

キサラタン点眼液0.005%—2.5mL—[冷]

(院内はラタノプロスト点眼液0.005%「サリ」)

(【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/瓶へ切替)

キシロカイン液「4%」 100mL

キシロカイン点眼液4% 20mL/瓶 [冷]

劇キシロカインポンプスプレー8% 80g 【後】

キシロカインゼリー2% 30mL

逆性石ケン液0.025「ヨダ」 (=塩化ベンザルコニウム液0.025%)—5L

(販売中止) (500mL/瓶へ切替)

逆性石ケン液0.025「ヨダ」

(=塩化ベンザルコニウム液0.025%) 500mL/瓶

● キュバール50エアゾール 7mg8.7g

● キュバール100エアゾール 15mg8.7g

劇ギリアダデル脳内留置用剤7.7mg 1箱 (1枚入) [-15℃以下]

【ク】

クエン酸ナトリウム 500g

グラアルファ配合点眼液 5mL/瓶

グラナテック点眼液0.4% 5mL

● クラベピット点眼液1.5%—5mL

(レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」へ切替)

(【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/瓶へ切替)

○ 劇グリジールスカルプローション0.05% 10g/本

(デルモベートスカルプローション0.05%が無くなり次第切替)

グリセリン 500mL

グリセリン「ケン」 (滅菌済) 25mL

グリセリンB C 液「ヨダ」 100mL (ポリ)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- グリセリン浣腸【特】小児用30 50%30mL 【後】
グリセリン浣腸液50%「ケエ」 60mL
グリセリン浣腸液50%「ケエ」 120mL
- 【般】 クリダマイシン酸エステルゲル1% 10g/本（ダラシンTゲル）
グルコン酸クロルヘキシジン液（＝ステロンW液0.05） 0.05%500mL
 - テレナフィオン外用液10%—3.56g
（院外は【般】 エフィナコナゾール外用液10%へ切替）
 - 【般】 クロトリマゾール外用液1% 15mL/本（エンベシド外用液）
- 劇クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イキ」 5g/本【後】
- 【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% 10g/本（デルモベート）
 - 【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5g/本
- クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イキ」 5g/本
（キンダベート軟膏0.05%が無くなり次第切替）
- 【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 5g/本（キンダベート軟膏）
 - 【般】 クロトリマゾールクリーム1% 10g/本（エンベシドクリーム）
クロマイ腔錠100mg
クロモグリク酸Na吸入液1%「サウ」 2mL1管 【後】
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 250mL
- 【般】 クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.05% 500mL/本（ヒビテン）
- 【ケ】
- ケトコナゾールクリーム2%「イキ」 10g/本 【後】
（ニゾラールクリーム2%から切替）
- 【般】 ケトコナゾールクリーム2% 10g/本（ニゾラールクリーム）
- ケトプロフェンテープ20mg「BMD」 7cm×10cm（7枚入） 【後】
- 【般】 ケトプロフェンテープ 20mg（7×10cm非温感）7枚/袋（モラステープ）
 - 【般】 ケトプロフェンテープ 40mg（10×14cm非温感）7枚/袋（モラステープ）
- ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 10cm×14cm（7枚入） 【後】
- 【般】 ケトプロフェンパップ 120mg（10×14cm非温感）7枚/袋（モラステープXR）
ケナロゲン口腔用軟膏0.1%—5g（院内はオルテクサー口腔用軟膏0.1%）
（【般】 トリアムシロアセトド口腔用軟膏0.1% 5g/本へ切替）
ゲーベンクリーム1% 500g
 - ケラチナミンコーワクリーム20%—25g（院内は尿素クリーム20%「SUN」）
（【般】 尿素クリーム20% 25g/本へ切替）
ケンエーハイポアルコール（＝ハイポエタノール） 8% 500mL
 - ゲンタシン軟膏0.1% 10g
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イキ」 10g/本
- 【コ】
- コソバト配合点眼液—5mL
（【般】 ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL/瓶へ切替）
 - 劇コムクロシャンプー0.05% [125g/本]
 - コムレクス耳科用液1.5% 5mL/瓶
 - コレクチム軟膏0.25% 5g/本
コレクチム軟膏0.5% 5g/本
- コンドロイチン点眼液1%「日点」 5mL/瓶 【後】
- 【般】 コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mL（コンドロン）
- 【サ】
- サイプレジン1%点眼液 10mL
サテニジン液10 500mL 【後】
ザーネ軟膏0.5%—500g
サーファクテン気管注入用120mg 1瓶 [冷]
- 劇サホライド液歯科用38% 5g
- ザラカム配合点眼液—2.5mL—[冷]
（【般】 ザラカム・ステロイド配合点眼液 2.5mL/瓶へ切替）
 - サラゾピリン坐剤500mg
サリチル酸ワセリン軟膏5%（東豊） 500g 【後】
 - 【般】 サリチル酸軟膏5%
 - サリベートエアゾール 50g

- サルグマリ吸入用250μg 1瓶 [2~8℃]
- サンコバ点眼液0.02%—5mL
（【般】 シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL/瓶へ切替）
- 劇サンピロ点眼液2% 5mL瓶
劇サンピロ点眼液3% 5mL（販売中止）
（2027年3月31日経過措置終了）
- 【シ】
- 【般】 シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL/瓶（サンコバ点眼液）
- シェルガン0.5眼粘弾剤 [1~30℃] 【後】
ジオチルソウムスルサクシネート耳科用液5%「CEO」 10mL/瓶 【後】
- 【般】 ジオチルソウムスルサクシネート点耳液5% 10mL/瓶
 - ジクアス点眼液3% 5mL/瓶
（【般】 ジクアホソルNa点眼液3%5mLへ切替）
ジクアスLX点眼液3% 5mL/瓶
 - 【般】 ジクアホソルNa点眼液3%5mL（ジクアス）
ジクトルテープ75mg 7cm×10cm 1枚/袋
 - ジクロード点眼液0.1% 5mL [冷]
（院内はジクロフェナック点眼液0.1%）
（【般】 ジクロフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶へ切替）
劇ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 [冷] 【後】
劇ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 [冷] 【後】
劇ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 [冷] 【後】
 - 【般】 ジクロフェナクNa外用液1% 50g/本（ボルタレンテープ）
 - ~~【般】 ジクロフェナクNaテープ30mg（10×14cm非温感）7枚/袋（ボルタレンテープ）~~
- ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニト」 5mL [冷] 【後】
- 【般】 ジクロフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶
 - 【般】 ジフルコルトン吉草酸エステル0.1% 5g/本（ネリゾナ）
 - 【般】 ジフルコルトン・リドカイン配合坐剤（ネリプロクト）
 - 【般】 ジフルプレドナートクリーム0.05% 5g/本（マイザー）
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イキ」 10g/本【後】（【般】 なし）
 - ~~【般】 ジフルプレドナート軟膏0.05%—10g/本（マイザー）—~~
ジムソ膀胱内注入液50% 50mL/瓶
シムビコートタービュヘイラー60吸入 1キット
（【般】 プテソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入へ切替）
笑気ガス
- 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 1枚 【後】
- 【般】 硝酸イソソルビドテープ40mg（フランドルテープ）
劇硝酸銀「VTRS」原末（院内製剤原料）
消毒用エタノール「ケンエ」 500mL/瓶
消毒用エタプロコール 500mL 【後】
親水ワセサン—500g
新レシカルボン坐剤 [冷]
- 【ス】
- スクラビンS4%液 500mL
スタデルム軟膏5% 10g
ステリクロンW液0.05（＝グルコン酸クロルヘキシジン液 0.05%）
0.05%500mL 【後】
（【般】 クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.05% 500mLへ切替）
劇ステリハイド20w/v%—500mL
- ステロネマ注腸3mg一個—【後】—
（院外は【般】 ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤3.95mgへ切替）
スピオルトレスピマット28吸入 1キット
 - スピオルトレスピマット60吸入 1キット
向スピジア点鼻液5mg 0.1mL/瓶
向スピジア点鼻液10mg 0.1mL/瓶
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 150μg1キット
 - スピリーバ吸入用カプセル18μg [冷]

- スピール膏M 25cm²1枚
劇スープレノ吸入麻酔液 240mL/瓶
- スミルテープ35mg・7cm×10cm―【後】―
(【般】フェルビナゲブ 35mg(7×10cm非温感) 14枚/袋へ切替)
- 【セ】
- 精製水オード 単位mL 【院外処方専用】
 - 【般】精製白糖・ポリドノード 配合軟膏 100g/瓶 (イソジンシカバースタ)
生理食塩液(洗浄用:細口開栓) 500mL
生理食塩液(洗浄用:広口開栓) 1L
生理食塩液「ヒカリ」(広口開栓型) 500mL/瓶
セクターローション3% 50mL (販売中止)
セクターローション3% 100mL
 - セタネオ点眼液0.002% 2.5mL/本
 - ゼビアックスローション2% 10g
 - ゼフナート外用液2% 10mL
 - ゼフナートクリーム2% 10g
 - ゼベリン点眼液0.1% 5mL
- 劇セボフルラン吸入麻酔液「ニコ」 250mL 【後】
劇セボアレン吸入麻酔液―250mL―
(セボフルラン吸入麻酔液「ニコ」に切替)
- ゼボラステープ40mg 10cm×14cm (7枚/袋)
 - ゼボラスパップ40mg 10cm×14cm (7枚/袋)
 - セルタッチテープ70 10cm×14cm (7枚/袋)
 - セルタッチパップ70 10cm×14cm (7枚入)
(院内はフェルビナクパップ70mg「NP」)
 - セルタッチパップ140 20cm×14cm (7枚入)
 - セレベント50ディスカス 50μg60プリスター1キット
- 【ソ】
- ソビラックス眼軟膏3% 5g
ソフラチュール貼付剤10cm (10.8mg)10cm×10cm1枚
- 【タ】
- 向ダイアアップ坐剤4 4mg
向ダイアアップ坐剤6 6mg
向ダイアアップ坐剤10 10mg
- 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルゲン配合軟膏 2g/本 (強力ボステリザン)
 - タオン外用液1%―15mL―【後】―
(クロトリマゾール外用液1%「日医王」へ名称変更)
(【般】クロトリマゾール外用液1% 15mL/本へ切替)
 - 【般】タクロリムス軟膏0.1% 5g/本 (プロトピック軟膏)
タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ) 4.8cm×4.8cm [1～30℃]
タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ) 9.5cm×4.8cm [1～30℃]
- 劇タブコム配合点眼液 2.5mL
(【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液へ切替)
 - 【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL (タブコム)
 - 【般】タフルプロスト点眼液0.005%1mL 2.5mL (タブロス)
劇タブロス点眼液0.0015%―2.5mL―
(【般】タフルプロスト点眼液0.005%1mLへ切替)
 - ダラシン干ゲル1%―10g―
(【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% 10g/本へ切替)
 - タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g (院内はオフロキシム眼軟膏0.3%)
タリビッド耳科用液0.3% 5mL
 - 劇タリムス点眼液0.1% 5mL
- 【チ】
- チモブトールX E点眼液0.5%―2.5mL―
- ※ チモロールX E点眼液0.5%「セツ」 2.5mL 【後】 (販売中止)
(2027年3月31日経過措置終了)
- チモロールX E点眼液0.5%「ニト」 2.5mL 【後】
- 【般】チモロール点眼液0.5%(持続性) 2.5mL/瓶 (チモブトールX E)

- 注射用水(洗浄用) 500mL
注射用水(洗浄用) 1L
- 【ツ】
- ツム 紫雲膏 [500g]501
 - 【般】ツロブテロールテープ0.5mg
 - ツロブテロールテープ1mg「QQ」 【後】
 - 【般】ツロブテロールテープ1mg
 - ツロブテロールテープ2mg「QQ」 【後】
 - 【般】ツロブテロールテープ2mg
- 【テ】
- 劇ディスオーパ消毒液0.55%―3.8L―
(フタラール消毒液0.55%「シエ」3.8Lへ切替)
- ディビゲル1mg 1包
 - 劇ディオフェリシゲル0.1%―15g―
(【般】アダパレンゲル0.1% 15g/本へ切替)
 - 【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg (SPトローチ)
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(2g/本)―【後】― (販売中止)
 - デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/本) 【後】
 - 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 5g/本
デスパコーワ口腔用クリーム 5g
劇デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリゲ」
125μg5mL/瓶 [10℃以下]
 - デタントール0.01%点眼液 5mL
 - デュオトラバ配合点眼液―2.5mL―
(【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液2.5mLへ切替)
- 麻劇デュロテップM干パッチ2.1mg―1枚―
―【般】フェンタニルテープ2.1mg (3日用)―へ切替―
麻劇デュロテップM干パッチ4.2mg―1枚―
―【般】フェンタニルテープ4.2mg (3日用)―へ切替―
- 麻劇デュロテップMT干パッチ8.4mg 1枚 (【般】なし)
―【般】フェンタニルテープ8.4mg (3日用)―へ切替―
テラ・コートリル軟膏 5g
テリルジー100エリブタ30吸入用 1キット
テリルジー200エリブタ30吸入用 1キット
 - テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サイ」 10g 【後】
 - 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本 (ラミシール)
テレミンソフト坐薬2mg [2～8℃]
テレミンソフト坐薬10mg
デンターグル含嗽用散20mg 1包
- 【ト】
- 劇トービー吸入液300mg 5mL管 [2～8℃]
劇トブシム軟膏0.05% 5g
(【般】フルオシノニド軟膏0.05% 5g/本へ切替)
- 劇トブシムローション0.05% 10g
劇トラシン点眼液0.3% 5mL
劇ドボネックス軟膏50μg/g―0.005%―10g
 - 劇ドボベツゲル 15g
劇ドボベツ軟膏 15g
 - 劇ドボベツフォーム 60g/本
 - 【般】トラニラスト点眼液0.5% 5mL/瓶 (リザベン点眼液)
 - トラバタンズ点眼液0.004%―2.5mL―[1～25℃]
 - 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液
2.5mL/瓶 (デュオトラバ配合点眼液)
 - 【般】トラボプロスト点眼液0.004% 2.5mL/瓶 (トラバタンズ)
劇トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 10mL[←100mL]
 - トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」
(アフタシール25μgより名称変更)
 - 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% 5g/本 (ケナログ)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- トルソプト点眼液1% 5mL
- 【般】トルソプト点眼液1% 5mL/瓶 (コソト配合点眼液)
劇トレプロスト吸入液1.74mg 2.9mL/管
トロンピン液モチダソフトボトル1万 1万単位10mL1キット [冷]
 - ドンベリドン坐剤10mg「日新」 【後】
 - 【般】ドンベリドン坐剤10mg (ナウゼリン)
【ナ】
 - ナイスピー点鼻液50μg—8.5mg8.5g—【後】
(【般】ナイスピー点鼻液50μg 8.5g/瓶へ切替)
 - ナウゼリン坐剤10mg (院内はドンベリドン坐剤10mg「日新」)
(【般】ドンベリドン坐剤10mgへ切替)
ナウゼリン坐剤60 60mg
 - 【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本 (アクアチム)
 - ナジフロキサシンクリーム1%「ト」 10g 【後】
 - 【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g (アクアチム)
 - ナジフロキサシンローション1%「ト」 【後】
 - ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用—5mg10g1瓶
(【般】モメタゾン点鼻液50μg 10gへ切替)
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 9mg18g1瓶
(【般】モメタゾン点鼻液50μg 18gへ切替)
 - ナナドラーA-Qネーザル50μg—8.5mg8.5g1瓶—【後】
(【般】ナナドラーA-Qネーザル50μg 8.5g/瓶へ切替)
 - 【ニ】
 - ニコチネルT T S 10 17.5mg10cm²1枚
 - ニコチネルT T S 20 35.0mg20cm²1枚
 - ニコチネルT T S 30 52.5mg30cm²1枚
[上記3種については、ニコチン依存症管理料の算定に伴う
処方時のみ保険適用]
ニゾラールクリーム2%—10g
(院内はケトコナゾールクリーム2%「イキ」へ切替)
(【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g/本へ切替)
 - 劇ニトロダームT T S 25mg 10cm²1枚
 - ニトロールスプレー1.25mg 10g瓶
 - 【般】ニブラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶 (ハイバジールコーワ)
 - ニブラジロールP F点眼液0.25%「日点」—5mL/瓶—【後】
 - 劇ニュープロバッチ2.25mg 2.25mg1枚
劇ニュープロバッチ4.5mg 4.5mg1枚
劇ニュープロバッチ9mg 9mg1枚
 - 劇ニュープロバッチ13.5mg 13.5mg1枚
 - 劇ニュープロバッチ18mg 18mg1枚
 - 尿素クリーム20%「SUN」 25g/本 【後】
(アセチロールクリーム20%より名称変更)
 - 【般】尿素クリーム20% 25g/本 (ケラチナミンコーワ)
 - 【ネ】
 - ネオキシテープ73.5mg 1枚
ネオクリナー「セキ」 10%30mL (歯科専用薬)
ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL
ネオメドロールE E軟膏 3g
ネキソブリッド外用ゲル5g [2~8°C]
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL
 - 劇ネリザナタリム0.1%—5g
(【般】ジフルクロン草酸エステル0.1% 5g/本へ切替)
 - 【ノ】
 - 向劇ノルスバンテープ5mg 1枚
 - 向劇ノルスバンテープ10mg 1枚
 - 向劇ノルスバンテープ20mg 1枚

- 【ハ】
- ハイバジールコーワ点眼液0.25%—5mL
(院内はニブラジロールP F点眼液0.25%「日点」)
(【般】ニブラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶へ切替)
ハイポエタノール 8% (=ケンエハイアルコール(健栄)) 500mL
- ハイポライト消毒液10% 有効塩素として10% 500g
[なるべく10°C以下] 【後】
白色ワセリン 500g
- 劇バクスマー点鼻粉末末剤3mg V
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g
- パタノール点眼液0.1%—5mL
(【般】オロパタジン点眼液0.1%へ切替)
- 含嗽用ハチアズレ顆粒—0.1%2g1包
(【般】アズレ酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 2g/包へ切替)
パッチテストパネル (S) 2枚1組 [2~8°C]
- 劇パビロックミニ点眼液0.1% 0.4mL1個
パラオキシ安息香酸エチル (院内製剤原料)
パラマイシン軟膏—10g
パラマイシン軟膏—250g
パルミコート吸入液0.25mg 2mL1管
(【般】ブデソニド吸入液0.25mgへ切替)
- パルミコート吸入液0.5mg—2mL1管
(【般】ブデソニド吸入液0.5mgへ切替)
- パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg1瓶
劇ハルロピテープ8mg 枚
- 劇ハルロピテープ16mg 枚
- 劇ハルロピテープ24mg 枚
- 劇ハルロピテープ32mg 枚
- 劇ハルロピテープ40mg 枚
パンコマイシン眼軟膏1% 5g [2~8°C]
- パンデル軟膏0.1% 5g
- パンデルローション0.1% 10mL
- 【ヒ】
- ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 0.85mL
(オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%より名称変更)
- 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL (ヒアレイン)
- 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL (ヒアレイン)
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL
(【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mLへ切替)
- ヒアレイン点眼液0.3%—5mL
(【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mLへ切替)
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL1個
- ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL1個
P A・ヨード点眼・洗眼液 0.2%20mL1瓶 [冷]
ビーエスエス500眼灌流液0.0184%—0.46%20mL1瓶 (希釈液(瓶)付)
ビーエスエス500眼灌流液0.0184% 0.46%20mL1瓶 (希釈液(袋)付)
ピソノテープ2mg 1枚
ピソノテープ4mg 1枚
- 【般】ビダラビン軟膏3% 5g/本 (アラセナA)
ヒビスコール液A1% 1L
5%ヒビテン液 500mL
(【般】グルコキシゲル酸塩外用液5% 500mL/本へ切替)
- 【般】ピマトプロスト点眼液0.03% (ルミガン)
ピマリシン点眼液5%「セジュ」 5mL
ピュアラビング 250mL
- セルドイドタリム0.3%
(【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%へ切替)

- セルトイドソフト軟膏0.3%—25g
(ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「コロ」へ切替)
- 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本へ切替)
- セルトイドフォーム0.3%—92g
(【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%へ切替)
- セルトイドローション0.3%—25g
(【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 25g/本へ切替)
- ビレーズトリエアロスフィア120吸入 キット
- ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL 筒 [冷]
- 【フ】
- ブイタマーククリーム1%
フィブラストスプレー500 500 μ g1瓶 (溶解液付) [冷]
- 劇液状フェノール「ケン」 500mL
- フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」
- ~~【般】フェルピナクス軟膏3%—40g/本~~
- 【般】フェルピナクス軟膏35mg(7 $\times$ 10cm非温感) 14枚/袋
- ~~フェルピナクスパップ70mg「東光」10cm $\times$ 14cm(7枚入)【後】~~
(販売中止)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ0.84mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ1.7mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ3.4mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ5mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇【般】フェンタニルテープ6.7mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- ~~麻劇【般】フェンタニルテープ2.1mg (3日用) (ワンデュロパッチ)~~
- ~~麻劇【般】フェンタニルテープ4.2mg (3日用) (ワンデュロパッチ)~~
- ~~麻劇【般】フェンタニルテープ8.4mg (3日用) (ワンデュロパッチ)~~
- 麻劇フェントステープ0.5mg 1枚
- 麻劇フェントステープ1mg 1枚
- 麻劇フェントステープ2mg 1枚
- 麻劇フェントステープ4mg 1枚
- 複方ヨード・グリセリン「ザイ・M」 500mL
- フジジンレオ軟膏2% 10g
- 【般】プセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 15.75mg10mL/瓶
- 劇フタラール消毒液0.55%「ソエ」 3.8L (ディスオーバ)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本 (メンタックス)
(2027年3月31日削除予定)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本 (ボレー)
(2027年3月31日削除予定)
- 【般】ブデソニド吸入液0.25mg (パルミコート)
- 【般】ブデソニド吸入液0.5mg (パルミコート)
- 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 (シムコート)
フラジール腔錠250mg
- ラランボルテープ40mg—1枚
(院内は硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」)
- (【般】硝酸イソソルビドテープ40mgへ切替)
- プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 mL/瓶 【後】
- 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% (アイファガン)
- 【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶 (エイゾプト)
- 【般】フルオシノニド軟膏0.05% 5g/本 (トプシム)
- フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 5mL 【後】
- ~~フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 5mL【後】~~
(フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」へ名称変更)
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% 5mL/瓶
- フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 5mL 【後】
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% 5mL/瓶
- フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 8.83mg10.6g1瓶
- フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 11.67mg7.0g1瓶
- フルタイド200ディスカス 200 μ g60 $\times$ リタ—1個
- 【般】フルチカ「ソフ」点鼻液27.5 μ g56噴霧用 (アラミスト)
- 【般】フルチカ「ソフ」点鼻液27.5 μ g120噴霧用 (アラミスト)
- 【般】フルチカ「ソフ」点鼻液50 μ g56噴霧用 8mL (フルナーゼ)
- フルティフォーム50エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム50エアゾール120吸入用 1瓶
- フルティフォーム125エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム125エアゾール120吸入用 1瓶
- 劇フルメタ軟膏 0.1%5g
- 劇プレオS軟膏5mg/g—0.5%5g
- 劇プレグランディン腔坐剤1mg [冷]
- ~~【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%—15g/本~~
~~(リドメックスコーワ)~~
- 劇プロウベス腔用剤10mg 個 [-20℃以下]
- プロタトセディール軟膏—2g
フロジン外用液5% 30mL 【後】
- (【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本へ切替)
- 劇プロスタンディン軟膏0.003% 10g
- 局方プロテイン銀末 25g
- 劇プロトピック軟膏0.1% 5g
(【般】タクロリムス軟膏0.1% 5g/本へ切替)
- 劇プロトピック軟膏0.03%小児用 5g
- プロナック点眼液0.1%—5mL
(院内はプロムフェナクN a点眼液0.1%「日点」)
- (【般】プロムフェナクN a点眼液0.1% 5mL/瓶へ切替)
- プロベト 500g
- ~~プロムフェナクN a点眼液0.1%「日新」 5mL—【後】~~
(プロムフェナクN a点眼液0.1%「日点」へ切替)
- プロムフェナクN a点眼液0.1%「日点」 5mL/瓶 【後】
- 【般】プロムフェナクN a点眼液0.1% 5mL/瓶 (プロナック)
- プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タヨ」 45mL 【後】
- 【般】プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL/瓶 (ピソルボン)
- プロメライン軟膏5万単位/g 20g
- フロリード腔坐剤100mg [冷]
- フロリードDクリーム1% 10g (【般】なし)
- 【へ】
- ベガモックス点眼液0.5%—5mL
(モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」へ切替)
- (【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%へ切替)
- ヘキサックAL1%OR液16mm綿棒セット (物品供給センター取扱い)
- ペキロンクリーム0.5% 10g
- 【般】ベタメタゾン酢酸エステル点鼻液50 μ g 8.5g/瓶 (リノコート)
- 【般】ベタメタゾン酢酸エステル点鼻粉末25 μ g 1.50mg/瓶
(リノコートパウダースプレー)
- ベシカムクリーム5% 10g
- ベストロン耳鼻科用1% 5mL
- ベストロン点眼用0.5% 5mL
- ベセルナクリーム5% 250mg1包
- 【般】ベタキシロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶 (ベトプティック)
- 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5g/本 (リンデロンV)
- 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% 10mL/本 (リンデロンV)
- 劇ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テコ」 5g 【後】
- 【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064% 5g/本
(リンデロンD P軟膏)
- ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」5mL【後】
- ~~【般】ベタメタゾン酪酸エステル酢酸エステル外用液0.05%—10g/本 (アンテベート)~~
劇ベタメタゾン酪酸エステル酢酸エステルクリーム0.05%「MYK」 5g 【後】
- (【般】なし)
- ~~【般】ベタメタゾン酪酸エステル酢酸エステルクリーム0.05%—5g/本 (アンテベート)~~

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

劇ベタメタゾン酪酸エステル[®] 0.05%「MYK」 5g 【後】
（【般】なし）
● ~~【般】ベタメタゾン酪酸エステル[®] 0.05% 5g/本（アテベート）~~
劇ベタメタゾン酪酸エステル[®] 0.05%「JG」 10g 【後】
（【般】なし）
● 【般】ベタメタゾン酪酸エステル[®] Na 注腸剤3.95mg（ステロネマ）
● 【般】ベタメタゾン酪酸エステル[®] Na 点眼点耳点鼻液0.1% 5mL（リデ[®]ロン）
ベネトリン吸入液0.5% 30mL
ペノキシール点眼液0.4% 5mL/瓶
● 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%（乳剤性）25g/本（ヒルドイド）
● 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%（ヒルドイドクリーム）
● 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%（ヒルドイド）
● 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本（ヒルドイド）
○ ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「コ[®]ロ」 25g/本 【後】
○ ヘパリン類似物質ローション0.3%「カ[®]ール」 50g/本 【後】
● ペピオウォッシュジェル5% 20g/本
● ペピオゲル2.5% 15g/本 [25℃以下][禁凍結]
● ペピオローション2.5% 15g/本 [25℃以下][禁凍結]
○ ヘモポリゾン軟膏 2g/本 【後】
ペリオフィール[®] 歯科用軟膏2% 10mg0.5g「冷」【後】
（ミノサイクリン塩酸塩[®] 歯科用軟膏2%「昭和」へ名称変更）
ベリプラスTPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組 「冷」
ベリプラスTPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組 「冷」
ベリプラスTPコンビセット組織接着用 5mL2キット1組 「冷」
ペルペゾロン[®] F 点眼・点鼻液 5mL「冷」【後】
● 【般】ペンタ[®]ルニウム塩化物外用液10% 500mL/本（オスバン）
ペンタサ坐剤1g
ペンタサ注腸1g
劇ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm1枚
（院内はリドカインテープ18mg「YP」）
【ホ】
● ボアラ軟膏0.12% 5g
● ホタナサンテープ1mg 1枚（【般】ツロブテロールテープ 1mgへ切替）
● ホタナサンテープ2mg 1枚（【般】ツロブテロールテープ 2mgへ切替）
強力ポステリザン（軟膏） 2g（ヘモポリゾン軟膏へ切替）
（【般】大腸菌死菌・ヒト[®]ロコ[®]ゾ[®]ン配合軟膏 2g/本へ切替）
● ホスミシンS 耳科用3% 10mL
ボスミン外用液0.1% 500mL
ボビシュガーバスタ軟膏 100g本 【後】
（院外は【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏に切替）
○ ポビドンヨード外用液10%「明治」 250mL 【後】
● 【般】ポビドンヨード外用液10%（イタノ[®]ル非含有）
○ ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 30mL 【後】
● 【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本
● 【般】ポビドンヨードゲル10% 20g/本（イソジンゲル）
ポビヨドンスクラブ7.5% 500mL 【後】
● ボラザG軟膏 2.4g
劇ボルタレンサ[®] 12.5mg「冷」
（院内はジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」）
劇ボルタレンサ[®] 25mg「冷」
（院内はジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」）
劇ボルタレンサ[®] 50mg「冷」
（院内はジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」）
● ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm（7枚入）
● ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm（7枚入）
● ボルタレンローション1% 50g
（【般】ジクロフェナクNa 外用液1% 50g/本へ切替）

特生ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組 「冷」
特生ボルヒール組織接着用 3mL4瓶1組 「冷」
特生ボルヒール組織接着用 5mL4瓶1組 「冷」
劇ホルマリン[®]グアヤコールF G15mL 【歯科専用薬】
● ボレー[®]外用液1% 10mL
（【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本へ切替）
● 劇ボンアルファ軟膏2μg/g 10g
● 劇ボンアルファハイ軟膏20μg/g 10g
● 劇ボンアルファハイローション20μg/g 10g
【マ】
● マイザー軟膏0.05% 5g
（院内はジフルブレドナート軟膏0.05%「イキ」）
（【般】ジフルブレドナート軟膏0.05% 10g/本へ切替）
● マイザークリーム0.05% 5g
（【般】ジフルブレドナートクリーム0.05% 5g/本へ切替）
劇マイトマイシン眼科外用液2mg
● 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10g/本（オキサロール）
● 劇マーデュオックス軟膏 10g
【ミ】
劇ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g1缶
● ミオピン点眼液 5mL
● ミケラン[®] L A 点眼液2% 2.5mL
（院内はカルテオロール塩酸塩 L A 点眼液2%「わかもと」へ切替）
（【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%（持続性） 2.5mL/瓶へ切替）
ミケルナ配合点眼液 2.5mL
ミドリンM点眼液0.4% 5mL
ミドサンP点眼液 10mL（オフミック点眼液へ切替）
ミノサイクリン塩酸塩[®] 歯科用軟膏2%「昭和」 10mg0.5g 「冷」 【後】
（ペリオフィール[®] 歯科用軟膏2%から名称変更）
ミレーナ52mg 1個
【ム】
● ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL
ムコフィリン吸入液20% 17.62%2mL1包
【メ】
● 滅菌精製水 オ[®]ダ 単位mL 【院外処方専用】
メディクスワブ ポビドンヨード 4.5ml（物品供給センター取扱い）
○ メトロニダゾールゲル0.75%「マル[®]シ」 100g（フェ[®]）本 【後】
● 【般】メトロニダゾールゲル0.75%（ロゼックスゲル）
● メノエイドコンビパッチ 1枚 「冷」
メブチンエア[®] 10μg吸入100回 0.0143%5mL1キット
メブチン吸入液0.01% 30mL
● メブチンスイングヘラー10μg吸入100回 1mg1キット
● メンタ[®]タックス[®]クリーム1% 10g
（【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本へ切替）
【モ】
● モイゼルト軟膏0.3% 10g/本
● モイゼルト軟膏1% 10g/本
○ モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 5mL/瓶 【後】
● 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%（ベガモックス）
● ~~【般】モメタゾン[®]点鼻液50μg 56噴霧用~~
● 【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用
● 【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用
● モーラステープ20mg 7cm×10cm（7枚入）
（ケトプロフェンテープ20mg「BMD」へ切替）
（【般】ケト[®]ロ[®]フェンテープ 20mg（7×10cm非温感）7枚/袋へ切替）
● モーラステープL 40mg 10cm×14cm（7枚入）
（【般】ケト[®]ロ[®]フェンテープ 40mg（10×14cm非温感）7枚/袋へ切替）

- モーラスパップ30mg 10cm×14cm (7枚入)
- モーラスパップ60mg 20cm×14cm (7枚入)
- ~~モーラスパップXR120mg 10cm×14cm (7枚入)~~
(【般】~~トブ・ロフェンパップ~~ 120mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)
- モーラスパップXR240mg 20cm×14cm (7枚入)
- 【ヤ】
- ヤクバンテープ60mg 15cm×14cm (7枚入)
(2027年3月31日経過措置終了)
- 【ユ】
- ユベラ軟膏 56g/本 [15℃以下]
~~ユベラ軟膏500g [15℃以下]~~ (ユベラ軟膏 56g/本へ切替)
- 【ラ】
- ラクティオンパップ70mg 10cm×14cm (7枚入)
- ラクリミン点眼液0.05% 5mL瓶
- 【般】~~ラタノプロスト・チロール配合点眼液~~ 2.5mL/瓶 (ザラカム配合)
- ~~ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」~~ 2.5mL/瓶 【後】
- 【般】~~ラタノプロスト点眼液0.005%~~ 2.5mL/瓶 (キサラタン)
- ~~【般】ラノコナゾール軟膏1% 10mg/本 (アスタット)~~
劇ラバリムスゲル0.2% 10g [2~8℃]
ラビジェル 60mL
ラビジェル 250mL
ラビショット 500mL
- ~~ラミシールタリム1% 10g~~
(院内はテルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サリ」)
(【般】~~テルピナフィン塩酸塩クリーム1%~~ 10g/本へ切替)
- 【リ】
- ~~サザベン点眼液0.5% 5mL~~
(【般】~~トラニラスト点眼液0.5%~~ 5mL/瓶へ切替)
リティンパ耳科用250μgセット 1セット(溶解液付) 【冷】
- 劇リドカインテープ18mg「YP」 1枚 【後】
リドメックスコーワ軟膏0.3% 5g
- リドメックスコーワクリーム0.3% 5g
リドメックスコーワローション0.3% 15g (【般】なし)
~~(【般】~~デレドニゾール吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% 15g/本へ切替~~)~~
- 【般】~~リバスチグミンテープ4.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)~~
- 【般】~~リバスチグミンテープ9mg (1日用) (イクセロンパッチ)~~
- 【般】~~リバスチグミンテープ13.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)~~
- 【般】~~リバスチグミンテープ18mg (1日用) (イクセロンパッチ)~~
- 【般】~~リバスチグミンテープ25.92mg (週2回用)~~
(リバルエンL A)
- 【般】~~リバスチグミンテープ51.84mg (週2回用)~~
(リバルエンL A)
- ~~劇リバルエンL Aパッチ25.92mg 1枚 【後】~~
- ~~劇リバルエンL Aパッチ51.84mg 1枚 【後】~~
硫酸サリミキシシンB 散50万単位「ファイバー」1瓶 (販売中止)
リレンザ 5mg17リスター (1枚: 47リスター)
- リンデロン坐剤0.5mg
- リンデロン点眼液0.01% 5mL
- ~~サンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL~~
(【般】~~ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mLへ切替~~)
- 点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL 【冷】
眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g
- 劇サンデロニーD-P軟膏 0.064%5g
(院内は~~ベタメタゾンデロニドリン酸エステル軟膏0.064%「ティコ」~~)
(【般】~~ベタメタゾンデロニドリン酸エステル軟膏0.064% 5g/本へ切替~~)
リンデロン-V軟膏0.12% 5g
(【般】~~ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5g/本へ切替~~)

- リンデロン-Vローション0.12% 10mL
(【般】~~ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% 10mL/本へ切替~~)
- リンデロン-V G軟膏0.12% 5g (院内はルリクールV G軟膏0.12%)
リンデロン-V Gクリーム0.12% 5g
リンデロン-V Gローション 0.12%10mL
- 【ル】
- ル・エストロジェル0.06% 80g
- ルコナック爪外用液5% 3.5g
ルティナス錠100mg [1~30℃]
- ルテウム腔用坐剤400mg [25℃以下]
ルミガン点眼液0.03% 2.5mL
(【般】~~ピマトプロスト点眼液0.03%へ切替~~)
ルリクールV G軟膏0.12% 5g 【後】
- ~~ルリコナゾールクリーム1%「イキ」~~ 【後】
- 【般】~~ルリコナゾールクリーム1% (ルリコン)~~
~~ルリコナゾールクリーム1% 10g (ルリコナゾールクリーム1%「イキ」へ切替)~~
ルリコン液1% 10mL
- 【レ】
- ~~レクタブル2mg注腸フォーム14回 48mg30.8g1瓶~~
- ~~レスキューラ点眼液0.12% 5mL 【冷】~~
(【般】~~イソプロピルウノプロスト点眼液0.12% 5mL/瓶へ切替~~)
レスタミンコーチゾン軟膏[強力] 10g
レスタミンコーワクリーム1% 1kg
- ~~レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 5mL 【後】~~
(【般】~~レバミピド点眼液2%5mLへ切替~~)
- 【般】~~レバミピド点眼液2%5mL (ムコスタ)~~
- 向劇レベタン坐剤0.2mg
- 向劇レベタン坐剤0.4mg
- 【般】~~レボプロノール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶 (ミロル)~~
- ~~レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 5mL/瓶 【後】~~
- 【般】~~レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/瓶 (クラビット)~~
- レルベア100エリブタ14吸入用 1キット
- レルベア100エリブタ30吸入用 1キット
- レルベア200エリブタ14吸入用 1キット
- レルベア200エリブタ30吸入用 1キット
- 【ロ】
- ロキシニンゲル1% 50g
- ロキシニンテープ50mg 7cm×10cm (7枚入)
- ロキシニンテープ100mg 10cm×14cm (7枚入)
- ロキシニンパップ100mg 10cm×14cm (7枚入)
(院内はロキシプロフェンNaパップ100mg「JG」)
- ~~【般】~~ロキシプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感)~~~~
~~7枚/袋 (ロキシニンテープ)~~
- ~~【般】~~ロキシプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温感)~~~~
~~7枚/袋 (ロキシニンテープ)~~
- ~~ロキシプロフェンNaパップ100mg「JG」~~
10cm×14cm 7枚/袋 【後】
劇ロコアテープ 10cm×14cm (7枚入)
ロコイドクリーム0.1% 5g
ロコイド軟膏0.1% 5g
ロゼックスゲル0.75% 15g/本 (皮膚科限定)
(院内はメトロナゾールゲル0.75%「マイシ」へ切替)
(【般】~~メトロナゾールゲル0.75%へ切替~~)
~~ロゼックスゲル0.75% 50g/本 (15g/本へ切替)~~
- 劇ロナセンテープ20mg 枚
- 劇ロナセンテープ40mg 枚

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

【ワ】

向劇ワコピタル坐剤15 15mg [冷]

向劇ワコピタル坐剤50 50mg [冷]

● ワンクリノン腔用ゲル90mg

● 麻劇ワンデューロパッチ0.84mg—1枚

(【般】フェンタニルテープ0.84mg(1日用)へ切替)

● 麻劇ワンデューロパッチ1.7mg—1枚

(【般】フェンタニルテープ1.7mg(1日用)へ切替)

● 麻劇ワンデューロパッチ3.4mg—1枚

(【般】フェンタニルテープ3.4mg(1日用)へ切替)

● 麻劇ワンデューロパッチ5mg—1枚

(【般】フェンタニルテープ5mg(1日用)へ切替)

● 麻劇ワンデューロパッチ6.7mg—1枚

(【般】フェンタニルテープ6.7mg(1日用)へ切替)

注射薬リスト

【ア】

- 劇アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL 2mg1mLV [2～8℃]
アイモビーグ皮下注70mgペン 1mLキット
劇アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
2mg0.05mL筒 [2～8℃] [禁凍結]
~~劇アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL 0.07mLV [2～8℃]~~
劇アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL
0.07mL筒 [2～8℃] [禁凍結]
劇アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 1キット [2～8℃] [禁凍結]
●劇アウィクリ注 フレックスタッチ 総量700単位 1キット [2～8℃] [禁凍結]
劇アーウィナーゼ筋注用10000 10,000単位V [2～8℃]
アエントリベンタート静注1055mg V
劇アガルシダーゼ ペータ B S点滴静注5mg「JCR」 1mLV [2～8℃] 【後】
劇アガルシダーゼ ペータ B S点滴静注35mg「JCR」 7mLV [2～8℃] 【後】
~~劇アキネトン注射液5mg 1mLA (乳酸ビペリデン注5mg「ヨトミ」へ切替)~~
劇アキラルックス点滴静注250mg 50mLV [2～8℃]
劇アクテムラ点滴静注用200mg 10mLV [2～8℃]
●劇アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mLキット [2～8℃]
劇アクテムラ皮下注162mgシリンジ 0.9mL筒 [2～8℃]
劇アクトヒブ 10μgV [冷]
毒アクプラ静注用50mg V
劇アクラシノン注射用20mg V
アコアラシ静注用600 600国際単位V (溶解液付) [冷]
アコアラシ静注用1800 1800国際単位V (溶解液付) [冷]
アザクタム注射用1g V
○劇アザシチジン注射用100mg「サリ」 V 【後】
アシクロビル点滴静注液250mg「トリ」 A 【後】
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター 1.5mLキット [2～8℃]
アスコルビン酸注500mgP B「日新」 A 【後】
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テル」 17.12%10mLキット 【後】
アセテート維持液3G「HK」 500mLP
~~アセトキープ3G注(ソラトバッグ) 500mLP 【後】 (販売中止)~~
(アセテート維持液3G「HK」へ切替)
劇アセリオ静注液1000mgバッグ 100mLP
劇アセレンド注100μg 2mLV
アタラックス-P注射液 (25mg/mL) A
アタラックス-P注射液 (50mg/mL) A
●劇アダリムマブB-S皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」筒 [2～8℃] 【後】
(【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.8mLへ切替)
●【般】アダリムマブ注射用シリンジ20mg0.2mL
●【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.4mL
●【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.8mL
●【般】アダリムマブ注射用シリンジ80mg0.8mL
○劇アダリムマブB-S皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」
キット [2～8℃] 【バイオ後続】
(院外は【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.4mLへ切替)
●劇アダリムマブB-S皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」キット [2～8℃] 【後】
(【般】アダリムマブ注射用ペン型キット80mg0.8mLへ切替)
●劇アダリムマブB-S皮下注40mgペン0.8mL「FKB」キット [2～8℃] 【後】
(【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.8mLへ切替)
●【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.4mL
●【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.8mL
●【般】アダリムマブ注射用ペン型キット80mg0.8mL

- アディノベイト静注用キット1000
1000国際単位キット (溶解液付) [冷]
アディノベイト静注用キット2000
2000国際単位キット (溶解液付) [冷]
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 20mL筒 【後】
~~アデノスキャン注60mg 20mLV~~
アデホス-L コーワ注10mg A [冷]
劇アトガム点滴静注液250mg 5mLA [2～8℃]
劇アドセトリス点滴静注用50mg V [2～8℃]
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL
~~劇アドトラザザ皮下注150mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃] [禁凍結]~~
劇アドトラザザ皮下注300mgペン 2mLキット [2～8℃]
~~アドナ注(静脈用) 50mg 10mLA~~
(カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」へ切替)
アトニン-O注5単位 A [冷]
劇アドレナリン注0.1%シリンジ「テル」 1mL筒 【後】
(エピネフリン注0.1%シリンジ「テル」から名称変更)
劇アトロピン注0.05%シリンジ「テル」 1mL筒 【後】
劇アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニロ」 0.05%1mLA
劇アナフラニール点滴静注液25mg A
※劇アナベイン注2mg/mL 100mLP
(ロビバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テル」へ切替)
~~劇アナベイン注7.5mg/mL 10mLA~~
(ロビバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テル」へ切替)
アネメトロ点滴静注液500mg 100mLV
向アネレム静注用20mg V
向アネレム静注用50mg V
劇アバスチン点滴静注用400mg/16mL V [冷]
劇アービタックス注射液100mg 20mL V [冷]
劇アビドラ注ソロスター 300単位キット [冷]
アブニション静注15mg 3mLA
毒アブラキサ点点滴静注用100mg V
劇アブリスゴ筋注用 V (溶解液付) [2～8℃]
劇アフリベルセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」
2mg0.05mL筒 【後】 [2～8℃] [禁凍結]
※ アブレゾリン注射用20mg A (販売中止) 2026年12月
劇アボカイン皮下注30mg 3mL筒
●劇アボネックス筋注用シリンジ30μg 0.5mL筒 [冷]
●劇アボネックス筋注30μgペン 0.5mLキット [2～8℃]
劇アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 3mLA 【後】
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 2mLA
~~アミササン注100mg 10%1mLA~~
アミノレバン点滴静注 500mLP
アミバレン輸液200mL 1袋
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ 0.5mL筒 [禁凍結]
毒アムビゾーム点滴静注用50mg V [冷]
→ アムベルピスト静注シリンジ10mL 25.79%10mL筒
(ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mLから切替)
アラセナー-A点滴静注用300mg V
劇アラノンジー静注用250mg 50mLV
~~アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL筒~~
~~アリクストラ皮下注7.5mg 0.6mL筒~~
アリナミンF50注 50mg20mLA
(フルスルチアミン注50mg「日新」へ切替)
アリナミン注射液10mg 2mLA (販売中止)
劇アサラムタ注射用100mg V
(ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」へ切替)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

劇アサラムタ注射用500mg—V
(ベメトレキシド点滴静注液500mg「NK」へ切替)
○ アルガトロバンH I 注10mg/2mL「77-」 A 【後】 (スロソノH注)
アルギニン点滴静注30g「AY」—10%300mLP (名称変更)
アルギニン点滴静注30g「YD」 10%300mLP
毒アルケラン静注用50mg V (溶解液付)
アルスロマチック関節手術用灌流液 3L1P
麻劇アルチパ静注用5mg—V
(レミフェタニル静注用5mg「第一三共」に切替)
アルツディスポ関節注25mg 2.5mL筒
劇アルプロスタジル注5 μ g「77I」 1mLA [冷] 【後】
劇アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「効々」 V
劇アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「効々」 V
献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V
献血アルブミン20%静注4g/20mL「効々」 V
献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」—20%50mLV
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV
献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV
劇アレックスビー筋注用 120 μ gV (溶解液付) [2~8℃]
※劇アレビアチン注250mg 5mLA
アレルゲンエキス診断用対照液 1.8mLV
アレルゲンエキス治療用希釈液 1.8mLV
アレルゲンスクラッチエキスを陽性対照液「トリ」
ヒスタミン二塩酸塩 2mLV [冷]
診断用アレルゲンスクラッチエキスを「トリ」 1mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」 $\pm$ 1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」大麦1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」 $\pm$ 花粉1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」 $\pm$ 花粉1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」 $\pm$ 1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」 $\pm$ 花粉1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」 $\pm$ 花粉1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」 $\pm$ 花粉1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキスを「トリ」 $\pm$ 花粉1:1,000 2mLV [冷]
治療用アレルゲンエキスを皮下注「トリ」 $\pm$ 花粉1:100 2mLV [冷]
治療用アレルゲンエキスを皮下注「トリ」
 $\pm$ 花粉1:1,000 2mLV [冷]
治療用アレルゲンエキスを皮下注「トリ」
 $\pm$ 花粉1:100 2mLV [冷]
劇アロカリス点滴静注235mg 10mLV [2~8℃]
劇アロキシン静注0.75mg—5mLV
アロフィセル注 4瓶1組 [専用輸送用容器で15~22℃]
(発注管理は診療科で実施)
劇アンカロン注150—150mg3mLA
(アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」へ切替)
アンサー皮下注20 μ g 1mLA
安息香酸Naカフェイン注200mg「77-」 20%1mLA 【後】
(アンナカ注「77-」—20%より名称変更)
劇アンチレクス静注10mg 1%1mLA
【イ】
イオパーク300注100mL—64.71%—V—【後】—
(イオヘキソール300注100mL「F」へ名称変更)
イオパーク300注シリンジ80mL—64.71%—筒—【後】—
(イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」へ名称変更)

イオパーク350注50mL—75.49%—V—【後】—
(イオヘキソール350注50mL「F」へ名称変更)
イオパーク350注100mL—75.49%—V—【後】—
(イオヘキソール350注100mL「F」へ名称変更)
イオパーク350注シリンジ100mL—75.49%—筒—【後】—
(イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」へ名称変更)
イオバミドール300注20mL「F」 61.24%20mL 【後】
(オイパロミン300注20mLより名称変更)
イオバミドール300注50mL「F」 61.24%50mL 【後】
(オイパロミン300注50mLより名称変更)
イオバミドール300注100mL「F」 61.24%100mL 【後】
(オイパロミン300注100mLより名称変更)
イオバミドール370注20mL「F」 75.52%20mL 【後】
(オイパロミン370注20mLより名称変更)
イオバミドール370注50mL「F」 75.52%50mL 【後】
(オイパロミン370注50mLより名称変更)
イオバミドール370注100mL「F」 75.52%100mL 【後】
(オイパロミン370注100mLより名称変更)
イオバミドール300注シリンジ100mL「F」 61.24%100mL筒 【後】
(オイパロミン300注シリンジ100mLより名称変更)
イオバミドール300注シリンジ150mL「F」 61.24%150mL筒 【後】
(オイパロミン300注シリンジ150mLより名称変更)
イオバミドール370注シリンジ100mL「F」 75.52%100mL筒 【後】
(オイパロミン370注シリンジ100mLより名称変更)
イオバミロン注300シリンジ 61.24%100mL筒
イオバミロン注370 75.52%100mLV
イオバミロン注370シリンジ 75.52%80mL筒
イオバミロン注370シリンジ 75.52%100mL筒
E O B・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL筒
イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」 62.34%50mL筒 【後】
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 62.34%100mL筒 【後】
イオヘキソール300注100mL「F」 64.71%100mLV 【後】
(イオパーク300注100mLより名称変更)
イオヘキソール350注50mL「F」 75.49%50mLV 【後】
(イオパーク350注50mLより名称変更)
イオヘキソール350注100mL「F」 75.49%100mLV 【後】
(イオパーク350注100mLより名称変更)
イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」 64.71%80mL筒 【後】
(イオパーク300注シリンジ80mLより名称変更)
イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」 75.49%100mL筒 【後】
(イオパーク350注シリンジ100mLより名称変更)
イオメロン300注100mL 61.24%V
イオメロン300注シリンジ100mL 61.24%筒
イオメロン350注100mL 71.44%V
イオメロン350注シリンジ100mL 71.44%筒
イオメロン350注シリンジ135mL (CT・尿路用) 71.44%筒
イーケブラ点滴静注500mg—5mLV
(レベチラセタム点滴静注500mg「アル」へ切替)
劇イジュド点滴静注25mg 1.25mLV [2~8℃]
劇イジュド点滴静注300mg 15mLV [2~8℃]
劇イズカーゴ点滴静注用10mg V [2~8℃]「禁凍結」
イスコチン注100mg A
劇イストダックス点滴静注用10mg—10mg—V (溶解液付)—
インビスト注240 51.26%10mLV
インビスト注300 64.08%10mLV
毒イダマイシン静注用5mg 5mgV
イデルピオン静注用1000—1000国際単位V (溶解液付) [2~25℃]
イデルピオン静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [2~25℃]

- イデルピオン静注用3500 3500国際単位V（溶解液付）[2～25℃]
劇イノバン注0.3%シリンジ 50mL筒
劇イノバン注100mg 5mLA
劇イブグリース皮下注250mgオートインジェクター 2mLキット [2～8℃]
イベニティ皮下注105mgシリンジ 1.17mL筒 [2～8℃]
劇注射用イホマイド1g V
- 劇イミグランキット皮下注3mg 0.5mL筒
劇イミフィンジ点滴静注120mg 2.4mLV [2～8℃]
劇イミフィンジ点滴静注500mg 10mLV [2～8℃]
劇イムデトラ点滴静注用1mg V（輸液安定化液付） [2～8℃]
劇イムデトラ点滴静注用10mg V（輸液安定化液付） [2～8℃]
劇イムネース注35 35万国内標準単位V（溶解液付） [冷]
劇イムノマックス-γ注100 100万国内標準単位 V（溶解液付）
[凍結を避け10℃以下]
劇イモパックスボリオ皮下注0.5mL筒 [2～8℃]
劇イラリス皮下注射液150mg 1mLV [2～8℃]
劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト-7」 2mLV 【後】
劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト-7」 5mLV 【後】
劇イルミア皮下注100mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃]
- イロクテイト静注用1000 1000国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
● イロクテイト静注用1500 1500国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
● イロクテイト静注用2000 2000国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
● イロクテイト静注用3000 3000国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
● イロクテイト静注用4000 4000国際単位V（溶解液付） [2～8℃]
インジゴカルミン注20mg「AFP」 0.4%5mLA
- 劇インスリンアスパルトB S注ソロスターNR「サフィ」
300単位キット [2～8℃] 【後】
（院外は【般】インスリンアスパルト注射用ペン型キット300単位:NRへ切替）
- 【般】インスリンアスパルト注射用ペン型キット300単位：NR
- 劇インスリングルラルギンB S注カート「リ-」 300単位キット [2～8℃] 【後】
- 劇インスリングルラルギンB S注キット「FFP」 300単位キット [2～8℃] 【後】
劇インスリングルラルギンB S注ミリオペン「リ-」
300単位キット [2～8℃] 【後】
- 【般】インスリンリスプロ注射液100単位/mL：HU
- 劇インスリンリスプロB S注ソロスターHU「サフィ」
300単位キット [2～8℃] 【後】
（院外は【般】インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位:HUへ切替）
- 【般】インスリンリスプロ注射用ペン型キット300単位：HU
劇インダシン静注用1mg V
劇インデラル注射液2mg 2mLA
イントラリボス輸液20% 100mLP 【後】
劇インフリキシマブB S点滴静注用100mg「NK」 V [2～8℃] 【後】
劇インフルエンザHA774 1mLV [冷]
- 【ウ】
劇ウィフガート点滴静注400mg 20mLV [2～8℃]
ヴィーンD輸液 500mLP（袋）
献血ヴェノグロブリンⅠH10%静注0.5g/5mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンⅠH10%静注2.5g/25mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンⅠH10%静注5g/50mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンⅠH10%静注10g/100mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンⅠH10%静注20g/200mL V [冷]
劇ウゴービ皮下注0.25mg SD 0.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]
- 劇ウゴービ皮下注0.5mg SD 0.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]
- 劇ウゴービ皮下注1.0mg SD 0.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]
- 劇ウゴービ皮下注1.7mg SD 0.75mLキット [2～8℃] [禁凍結]
- 劇ウゴービ皮下注2.4mg SD 0.75mLキット [2～8℃] [禁凍結]
- 劇ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD 1mg1.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]
- 劇ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD 2mg1.5mLキット [2～8℃] [禁凍結]

- 劇ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD 4mg3mLキット [2～8℃] [禁凍結]
- 劇ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD 6.8mg3mLキット [2～8℃] [禁凍結]
- 劇ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD 9.6mg3mLキット [2～8℃] [禁凍結]
ウロデラフィン注60%—20mLA（ビジパーク270注20mLへ切替）
ウロナーゼ静注用6万単位 V
ウロミテキサン注100mg 1mLA
ウロミテキサン注400mg 4mLA
- 【エ】
劇エアウィン皮下注用45mg V [2～8℃]
劇エアウィン皮下注用60mg V [2～8℃]
HMG注用150単位「あすか」 V（溶解液付）[冷]【後】
HMG注射用75IU「フレリグ」 75単位V（溶解液付）【後】
（2023年3月現在 供給停止）
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニヤク」 1mLV（溶解液付）[冷]
劇エキシデンサー皮下注100mgペン 1mLキット [2～8℃]
劇エクザール注射用10mg V [冷]
エクストラニール腹膜透析液（ツインバッグ）1.5LP
エクストラニール腹膜透析液（UVツインバッグ）1.5LP
エクストラニール腹膜透析液（シングルバッグ）2LP
エクストラニール腹膜透析液（シングルバッグ・機器専用）2LP
- エクストラニール腹膜透析液（ツインバッグ）2LP
劇エジャイモ点滴静注1.1g 22mLV [2～8℃] [禁凍結]
劇エスポー注射液750—750国際単位A—[冷]
（エポエチンアルファB S注750「JCR」へ切替）
- 劇エタネルセプトB-S皮下注25mgペン0.5mL「MA」
25mg0.5mLキット [2～8℃]—【後】—
（【般】エタネルセプト注射用ペン型キット25mgへ切替）
- 劇エタネルセプトB-S皮下注50mgペン1.0mL「MA」
50mg1.0mLキット [2～8℃]—【後】—
（【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mgへ切替）
- 劇エタネルセプトB-S皮下注50mgペン1.0mL「FY」
50mg1.0mLキット [2～8℃]—【後】—（販売中止）
（【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mgへ切替）
- 【般】エタネルセプト注射用シリンジ25mg
- 【般】エタネルセプト注射用シリンジ50mg
- 【般】エタネルセプト注射用ペン型キット25mg
- 【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mg
劇エトキシスクレロール1%注射液 30mLV
- ※ 劇エトポシド点滴静注液100mg「サド」 5mLV 【後】（販売中止）
（ラステット注100mg/5mLへ切替）
- エヌジェンラ皮下注60mgペン 1.2mL/キット [2～8℃]
エネフリード輸液 550mLキット
劇エビベン注射液0.15mg 1mg/2mL筒（注射量は0.3mL）
劇エビベン注射液0.3mg 2mg/2mL筒（注射量は0.3mL）
劇エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ 300mgキット
劇エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ 400mgキット
劇エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 V [2～8℃] 【後】
劇エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 V [2～8℃] 【後】
劇エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 V 【後】
劇エフェドリン「ガキ」注射液40mg 1mLA
劇エブキンリ皮下注4mg 0.8mLV [2～8℃]
劇エブキンリ皮下注48mg 0.8mLV [2～8℃]
劇エポエチンアルファB S注750「JCR」
750国際単位0.5mLV [2～8℃] 【後】
劇エボゾン皮下注シリンジ24000—24000国際単位0.5mL筒—[冷]
劇エホチール注10mg 1%1mLA

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

劇エボプロステノール静注用0.5mg「ヤセン」 V 【後】
劇エボプロステノール静注用1.5mg「ヤセン」 V 【後】
エボプロステノール静注用「ヤセン」専用溶解用液—50mL V（販売中止）
（生食50mLへ切替）
劇エボトラ点滴静注20mg 20mLV
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター 1mLキット [2～8℃]
劇エムプரசینティ点滴静注用300mg—V—[2～8℃]
劇エムプரசینティ点滴静注用400mg—V—[2～8℃]
注射用エラスポール100 100mg V
劇エラプレーズ点滴静注液6mg—3mLV—[2～8℃]
劇エリル点滴静注液30mg 2mLA
L H-R H注0.1mg「ニブ」 0.1mgA
エムカルチンF F 静注1000mgシリンジ—5mL筒
（レボカルニチンF F 静注1000mgシリンジ「ト」へ切替）
劇エルシトニン注40単位 1mLA
劇エルゾニス点滴静注1000 μ g 1mLV [-20±5℃]
エルネオバN F 1号輸液 1000mLキット
エルネオバN F 2号輸液 1000mLキット
毒エルブラット点滴静注液100mg—20mLV
（オキサリプラチン点滴静注100mg「ト」へ切替）
劇エルレフィオ皮下注44mg 1.1mLV [2～8℃]
劇エルレフィオ皮下注76mg 1.9mLV [2～8℃]
塩化ナトリウム10% 20mLA
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タタ」—0.5%2mLA 【後】
（プリンペラン注射液10mgへ切替）
劇エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター
1mLキット [2～8℃]
劇エンスプリング皮下注120mgシリンジ—1mL筒—[2～8℃]
（エンスプリング皮下注120mgオートインジェクターへ切替）
劇エンタイビオ点滴静注用300mg V [2～8℃]
劇エンタイビオ皮下注108mgペン 0.68mLキット [2～8℃]
劇注射用エンドキサン500mg V [冷]
劇エンハーツ点滴静注用100mg V [2～8℃]
●劇エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL 1キット [2～8℃]
●劇エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL 1キット [2～8℃]
●劇エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL—筒—[2～8℃]
（【般】エタネルセプト注射用シリンジ25mgへ切替）
●劇エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL—筒—[2～8℃]
（【般】エタネルセプト注射用シリンジ50mgへ切替）
●劇エンブレル皮下注50mgペン1.0mL—キット—[2～8℃]
（【般】エタネルセプト注射用ペン型キット50mgへ切替）
【オ】
オイパロミン300注20mL—61.24%—V—【後】—
（イオパミドール300注20mL「F」へ名称変更）
オイパロミン300注50mL—61.24%—V—【後】—
（イオパミドール300注50mL「F」へ名称変更）
オイパロミン300注100mL—61.24%—V—【後】—
（イオパミドール300注100mL「F」へ名称変更）
オイパロミン300注シリンジ100mL—61.24%—筒—【後】—
（イオパミドール300注シリンジ100mL「F」へ名称変更）
オイパロミン300注シリンジ150mL—61.24%—筒—【後】—
（イオパミドール300注シリンジ150mL「F」へ名称変更）
オイパロミン370注20mL—75.52%—V—【後】—
（イオパミドール370注20mL「F」へ名称変更）
オイパロミン370注50mL—75.52%—V—【後】—
（イオパミドール370注50mL「F」へ名称変更）
オイパロミン370注100mL—75.52%—V—【後】—
（イオパミドール370注100mL「F」へ名称変更）

オイパロミン370注シリンジ100mL—75.52%—筒—【後】—
（イオパミドール370注シリンジ100mL「F」へ名称変更）
大塚生食注2ポート100mL キット 【後】
毒オキサリプラチン点滴静注100mg「ト」 20mLV 【後】
劇オキサロール注5 μ g 1mLA [冷]
麻劇オキファスト注50mg 1%5mLA
劇オクトレオチド酢酸塩皮下注50 μ g「サド」 1mLA [冷] 【後】
オザグレルN a点滴静注80mg「タタ」 4mLV 【後】
オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg 0.75mL筒 [2～8℃]
劇オゼンピック皮下注2mg 1.5mLキット [2～8℃]
劇乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タタ」 1人用V [冷]
オーツカMV注
劇オニバイド点滴静注43mg 10mLV [2～8℃]
劇オノアクト点滴静注用150mg V
オビザー静注用500 500単位V（溶解液付） [2～8℃]
劇オビソート注射用0.1g A（溶解液付）
劇オビドレル皮下注シリンジ250 μ g 0.5mL筒 [2～8℃]
オフサグリーン静注用25mg V（溶解液付）
劇オブジーポ点滴静注20mg 2mLV [2～8℃]
劇オブジーポ点滴静注120mg 12mLV [2～8℃]
劇オブジーポ点滴静注240mg 24mLV [2～8℃]
オブチレイ320注シリンジ100mL 67.8%筒
オブチレイ350注シリンジ100mL 74.1%筒
オムニパーク240注10mL 51.77%V
オムニパーク300注シリンジ80mL 64.71%筒
オムニパーク300注シリンジ150mL 64.71%筒
オムニパーク350注シリンジ45mL 75.49%筒
オムニパーク350注シリンジ100mL 75.49%筒
オメブラゾール注射用20mg「日医工」 V 【後】
劇オルダミン注射用1g 10%10gV
劇オルドレブ点滴静注用150mg V
オルプロサタス静注用3000—3000国際単位V（溶解液付）—[2～8℃]
劇オレンシア点滴静注用250mg V [2～8℃]
●劇オレンシア皮下注125mgオートインジェクター—1mL キット [2～8℃]
●劇オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL 筒 [2～8℃]
劇オンキャスパ点滴静注用3750 3,750国際単位V [2～8℃]
劇オンコピン注射用1mg V [冷]
劇オندانセトロン注4mgシリンジ「マルシ」 2mL筒 【後】
オンデキサ静注用200mg V [2～8℃]
劇オンポー点滴静注300mg 15mLV [2～8℃]
劇オンポー皮下注100mgオートインジェクター 1mLキット [2～8℃]
劇オンポー皮下注200mgオートインジェクター 2mLキット [2～8℃]
【カ】
劇カイトサル注3mg—3mLA
（採用薬はグラニセトロン静注液3mg「ガ」へ切替）
毒カイプロリス点滴静注用10mg V [2～8℃]
毒カイプロリス点滴静注用40mg V [2～8℃]
劇カヨーゲン注100mg—5mLA—【後】—（販売中止）
劇ガザイバ点滴静注1000mg 40mLV [2～8℃]
ガスター注射液20mg—2mLA
（ファモチジン静注20mg「日新」へ切替）
劇カドサイラ点滴静注用100mg V
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」 筒 【後】
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL 60.47%5mL筒
※ ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL 60.47%10mL筒
（アムベルピスト静注シリンジ10mLへ切替）
カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 A
●劇ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ 0.5mL筒

カブリビ注射用10mg V (溶解液付) [2～8℃]
劇ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「ワイ」 V 【後】
劇ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「ワイ」 V 【後】
カーボスター透析剤「エー6L」瓶 (カーボスター透析剤2号・Lへ切替)
カーボスター透析剤2号・L 9L瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)
カーミC A液 [KBS-200CA8L(C)] 200mL採血用
カーミC A液 [KBS-400CA8L(C)] 400mL採血用
カーミC A液 [KBT-400CA8L(C)] 400mL採血用
劇カルセド注射用20mg V
カルチコール注射液8.5%5mL A
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」
0.5%10mLA 【後】
カルペニン点滴用0.5g V
毒カルボプラチン注射液50mg「NK」 5mLV
毒カルボプラチン注射液150mg「NK」 15mLV 【後】
毒カルボプラチン注射液450mg「NK」 45mLV 【後】
劇カンサイダス点滴静注用50mg V [2～8℃]
毒ガンシクロピル点滴静注用500mg「VTRS」 V 【後】 (デノシン)
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニク」 1mLV (溶解液付) [冷]
劇乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タダ」 1人用V [冷]
劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 V (溶解液付) [冷]
劇乾燥弱毒生麻疹ワクチン「タダ」 1人分V (溶解液付) [冷]
劇乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V (溶解液付) [冷]
【キ】
劇キイトルーダ点滴静注100mg 4mLV [2～8℃]
劇キシロカイン注射液1% 100mLV
劇歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mLA [冷]
劇キシロカイン注ボリアンブ1% 10mLA
(リドカイン塩酸塩注1%「日新」へ切替)
劇キシロカイン注ボリアンブ2% 10mLA
(リドカイン塩酸塩注2%「日新」へ切替)
劇キシロカイン注射液「1%」エドレシ (1:100,000) 含有 20mLV [冷]
キドバレン輸液
キドミン輸液 200mLP
劇ギャバロン髄注0.005% 1mLA
劇ギャバロン髄注0.05% 20mLA
劇ギャバロン髄注0.2% 5mLA
劇キャップボックス筋注シリンジ 0.5mL筒 [2～8℃] [禁凍結]
キューピシン静注用350mg V [2～8℃]
(ダブトマイシン静注用350mg「コ」へ切替)
キュービトル20%皮下注4g/20mL V [冷]
劇キロサイド注20mg A
劇キロサイド注100mg A
劇キロサイドN注1g V
(採用薬はシタラピン点滴静注液1g「NIG」へ切替)
キンダリー透析剤A F5号 6LV (炭酸水素ナトリウム液付)
【ク】
劇クダニセトロン静注液3mg「アイム」 3mLA 【後】
劇クダニセトロン静注液3mg「ワイ」 3mLA 【後】
クラピット点滴静注バッグ500mg/100mLキット
(レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」へ切替)
グランシリンジ75 75μg0.3mL筒 [冷]
(【般】フィルグラスチム注射用シリンジ75μgへ切替)
グランシリンジ150 150μg0.6mL筒 [冷]
(【般】フィルグラスチム注射用シリンジ150μgへ切替)
※ グランシリンジM300 300μg0.7mL筒 [冷]
クリアクター静注用80万 80万国際単位V
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mLP 【後】

劇クリスピータ皮下注10mg 1mLV [2～8℃]
劇タリスピータ皮下注20mg 1mLV [2～8℃]
劇クリスピータ皮下注30mg 1mLV [2～8℃]
●劇クリスピータ皮下注20mgシリンジ 0.67mL筒 [2～8℃]
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 4mLA
グルアセト35注 (ソフトバッグ) 500mLP 【後】
劇グルカゴンGノボ注射用1mg (添付溶解液なし) V [15℃以下]
劇グルカゴンGノボ注射用1mg V (溶解液付) [15℃以下]
グルトバ注1200万 1200万国際単位 V (溶解液付)
劇クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL筒
劇クレセンバ点滴静注用200mg V [2～8℃]
● グロウジェクト皮下注12mg 筒 [冷]
● クロスイートMC静注用250単位 V (溶解液付)
● クロスイートMC静注用1000単位 V (溶解液付)
献血グロベニン-I 10%静注2.5g/25mL V [10℃以下] [禁凍結]
献血グロベニン-I 10%静注10g/100mL V [10℃以下] [禁凍結]
献血デロベニン-I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付) (販売中止)
献血デロベニン-I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付) (販売中止)
【ケ】
KCL注20mEqキット「メル」 1mL20mLキット 【後】
ケイセントラ静注用500 500国際単位V (溶解液付) [25℃以下]
ケイセントラ静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [25℃以下]
ケイツーN静注10mg A
劇ケサンラ点滴静注液350mg 20mLV [2～8℃]
劇ケシンプタ皮下注20mgペン 0.4mLキット [2～8℃]
麻劇ケタラル静注用50mg 5mLA
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL V
劇ケブザラ皮下注200mgシリンジ 1.14mL筒 [2～8℃]
●劇ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター 1.14mLキット [2～8℃]
→劇ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター 1.14mLキット [2～8℃]
(ケブザラ皮下注200mgシリンジが無くなり次第切替)
劇ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「サド」 V [2～8℃] 【後】
献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V
献血アルブミン20%静注4g/20mL「タダ」 V
献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」 20%50mLV
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV
献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV
献血ヴェノグロブリンI H 10%静注0.5g/5mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H 10%静注2.5g/25mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H 10%静注5g/50mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H 10%静注10g/100mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H 10%静注20g/200mL V [冷]
献血グロベニン-I 10%静注2.5g/25mL V [10℃以下] [禁凍結]
献血グロベニン-I 10%静注10g/100mL V [10℃以下] [禁凍結]
献血デロベニン-I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付) (販売中止)
献血デロベニン-I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付) (販売中止)
献血ノンスロン500注射用 500単位V (溶解液付)
献血ノンスロン1500注射用 1500単位V (溶解液付)
献血ベニロン-I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)
献血ベニロン-I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)
劇ゲンタシン注40 40mgA
【コ】
コアテック注5mg 5mLA
劇コアベータ静注用12.5mg V
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
(=ローブリン) V (溶解液付) [冷]
劇コスメゲン静注用0.5mg V [冷]

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

劇コセンティクス皮下注150mgペン 1mLキット [2～8℃]
●劇コセンティクス皮下注300mgペン 2mLキット [2～8℃]
コートロシン注射用0.25mg V (溶解液付) [冷]
コートロシンZ筋注0.5mg V [冷]
劇ゴナックス皮下注用80mg V (溶解液付)
劇ゴナックス皮下注用120mg V (溶解液付)
ゴナトロピン注用5000単位 V [冷] (アンプルからバイアルへ切替)
●ゴナールエフ皮下注ベン300 300国際単位0.5mL筒 [冷]
ゴナールエフ皮下注ベン450 450国際単位0.75mL筒 [冷]
●ゴナールエフ皮下注ベン900 900国際単位1.5mL筒 [冷]
コバキソン皮下注20mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃]
コバルトリイ 静注用250 250国際単位V (溶解液付) [冷]
●コバルトリイ 静注用500 500国際単位V (溶解液付) [冷]
●コバルトリイ 静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [冷]
●コバルトリイ 静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [冷]
●コバルトリイ 静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [冷]
劇ゴービック水性懸濁注シリンジ 0.5mL筒 [10℃以下]
劇コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 0.03mg0.3mL1筒 [2～8℃]
劇コントミン筋注25mg 5mLA
コンファクトF 静注用500単位 500単位V (溶解液付) [10℃以下]
【サ】
ザイボックス注射液600mg 300mLP
劇注射用サイメリン50mg V [冷]
劇サイモグロブリン点滴静注用25mg V [冷]
劇サイラムザ点滴静注液100mg 10mLV [冷]
劇サイラムザ点滴静注液500mg 50mLV [冷]
向サイレース静注2mg A
劇サークリサ点滴静注100mg 5mLV [2～8℃]
劇サークリサ点滴静注500mg 25mLV [2～8℃]
劇ザノサー点滴静注用1g V [2～8℃]
ザバクサ配合点滴静注用 V [2～8℃]
劇サーバサックス0.5mL筒 [冷]
(シルガード9水性懸濁筋注シリンジへ切替)
劇サビーン点滴静注用500mg V
劇サフネロー点滴静注300mg 2mLV [2～8℃]
●劇サフネロー皮下注120mgオートインジェクター 0.8mLキット [2～8℃]
サブバック血液ろ過用補充液-B i 2020mLキット 【後】
サブラッド血液ろ過用補充液B-S-G 2020mLキット
劇サムタス点滴静注用8mg V
劇ザルトラップ点滴静注100mg 4mLV [2～8℃]
劇サンディミュン点滴静注用250mg 5%5mLA
劇サンドスタチン皮下注用50 μ g 1mLA [冷]
(採用薬はオクトレオチド酢酸塩皮下注50 μ g「サド」へ切替)
劇サンドスタチンLAR筋注用キット20mg 筒 (溶解液付) [2～8℃]
劇サンラベリン点滴静注用250mg V [冷]
劇サンリズム注射液50 50mg5mLA
【シ】
ジアグノグリーン注射用25mg V (溶解液付)
向ジアゼパム注射液10mg「NIG」 A 【後】
シアンキット注射用5gセット 5gV (溶解液付)
注射用GHRP 科研100 100 μ gV [10℃以下] [禁凍結]
(注射用GHRP 科研100 (溶解液付) より切替)
注射用GHRP 科研100 100 μ gV (溶解液付) [冷]
●ジェノトロピンゴクイック注用5.3mg キット [冷]
●ジェノトロピンゴクイック注用12mg キット [冷]
(院内はソマトロピンB-S皮下注10mg「サド」シュアバルへ切替)
●ジェノトロピンTC注用5.3mg 5.33mg筒 (溶解液付) [冷]
●ジェノトロピンTC注用12mg 筒 (溶解液付) [冷]

劇ジェービックV (=乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン) V (溶解液付) [冷]
毒ジェブタナ点滴静注60mg 1.5mLV (溶解液付) [15～30℃]
劇ジオン注無痛化剤付 10mLV (希釈液付)
劇ジギラノゲン注0.4mg 2mLA (販売中止)
劇シグニフォーL A R筋注用キット40mg 1キット (溶解液付) [2～8℃]
シグマート注2mg V [冷]
シグマート注48mg V [冷]
(ニコランジル点滴静注用48mg「サイ」へ切替)
シザナリン配合点滴静注液 2mLA 【後】
毒シスプラチン点滴静注10mg「マル」 20mLV 【後】
毒シスプラチン点滴静注50mg「マル」 100mLV 【後】
ジスロマック点滴静注用500mg V
劇歯科用シタネスト-オクタプレシナートリッジ 3%1.8mLA [冷]
○劇シタラビン点滴静注液1g「NIG」 50mLV 【後】
ジトリペンタートカル静注1000mg V
シナジス筋注液50mg 0.5mLV [2～8℃]
シナジス筋注液100mg 1mLV [2～8℃]
●ジビイ 静注用3000 3,000国際単位V (溶解液付) [2～8℃]
劇ジフォルタ注射液20mg 1mLV [2～8℃]
劇洗降ジフテリア破傷風混合トキソイド「サダ」 1mLV [冷]
劇ジブレキサ筋注用10mg V
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「エフ」 200mLP 【後】
シベクトロ点滴静注用200mg V
劇シベノール静注70mg 5mL筒
劇シムジア皮下注200mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃]
劇シムジア皮下注200mgオートクリックス 1mLキット [2～8℃]
劇シムレクト 静注用20mg V (溶解液付) [冷]
シメチジン注200mg「NP」 2mLA 【後】
ジョイタル関節注30mg 3mL筒 [2～8℃]
ジールスタ皮下注3.6mg 0.36mL筒 [2～8℃]
ジールスタ皮下注3.6mgボディーポッド 0.36mLキット [2～8℃]
劇シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]
劇ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ 0.574mL筒 [2～8℃]
劇シングリックス筋注用 一人分V (溶解液付) [2～8℃]
劇シンビット 静注用50mg V
劇シンボニー皮下注50mgシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]
劇シンボニー皮下注50mgオートインジェクター 0.5mLキット [2～8℃]
【ス】
劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 V (溶解液付) [冷]
水溶性プレドニン20mg A
スガマデクス 静注液200mgシリンジ「マル」 2mL筒 【後】
劇スキャンドネストカートリッジ3% 1.8mLA
劇スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL 筒 [2～8℃]
劇スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL 筒 [2～8℃]
劇スキリージ皮下注360mgオートドーズ 2.4mLキット [2～8℃]
劇スキリージ点滴静注600mg 10mLV [2～8℃]
ステミラック注 1回分 [-80℃以下]
(輸血免疫移植部でのみ取扱い)
劇ステラール点滴静注130mg 26mLV [2～8℃]
劇ステラール皮下注45mgシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ 筒 [2～8℃]
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 V
スピラザ髄注12mg 5mLV [2～8℃]
劇ズファジラン筋注5mg 0.5%1mLA
劇スミフェロン注D-S300万IU 筒 (注射針同梱) [冷]
劇スミフェロン注D-S600万IU 筒 (注射針同梱) [冷]
スルバシサン 静注用1.5g V
スルバシリン 静注用3g V

スロノンナＨ＋注10mg/2mL—A
(アルガトロバンＨ＋注10mg/2mL「ﾌｵｰ」へ切替)

【セ】

劇一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25μgV (溶解液付) [冷]

生食注シリンジ「NP」10mL 筒 【後】

● 生食注シリンジ「オツカ」10mL 筒 【後】

生食注シリンジ50mL「ﾌｵｰ」 筒 【後】

生理食塩液 20mLA

生理食塩液 50mLV

生理食塩液 100mLV

生理食塩液 250mLV

生理食塩液 500mLV (プラボトルからバッグへ切替)

生理食塩液「ﾏﾃ」 1000mLV

生理食塩液 P L「ﾌｵｰ」 2LP

※毒ゼオマイン筋注用100単位 V [25℃以下]
(ゼオマイン注用100単位へ名称変更)

→毒ゼオマイン注用100単位 V

●劇ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]

●劇ゼップバウンド皮下注5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]

●劇ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]

●劇ゼップバウンド皮下注10mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]

●劇ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]

●劇ゼップバウンド皮下注15mgアテオス 0.5mLキット [2～8℃]

劇セトロタイド注射用0.25mg V (溶解液付) [2～8℃]

セパセルインテグラ C A 400mL採血用 [ABD-400CA8FL]

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 V 【後】

劇セファランチン注10mg 2mLA

セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 V 【後】

セフォタックス注射用1g V

セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 V 【後】

セフトアジジム 静注用1g「VTRS」 V

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 V

セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 V 【後】

※劇ゼブリオン水懸筋注25mgシリンジ 25mg1キット

劇ゼブリオン水懸筋注50mgシリンジ 50mg1キット

劇ゼブリオン水懸筋注75mgシリンジ 75mg1キット

劇ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ 100mg1キット

劇ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ 150mg1キット

劇ゼブリオン T R I 水懸筋注525mgシリンジ 525mg1キット

劇セレネース注5mg 1mLA

【ソ】

● ソグルーヤ皮下注5mg 1.5mLキット [2～8℃]

● ソグルーヤ皮下注10mg 1.5mLキット [2～8℃]

● ソグルーヤ皮下注15mg 1.5mLキット [2～8℃]

ゾシン静注用4.5—4.5gV (タゾピペ配合静注用4.5「ﾌｵｰ」へ切替)

向劇ソセゴン注射液15mg A

ゾピラックス点滴静注用—250mgV
(アシクロビル点滴静注液250mg「ﾄｰ」へ切替)

ソナゾイド注射用16μL V (溶解液付)

劇ソマチュリン皮下注90mg 筒 [冷]

劇ソマチュリン皮下注120mg 筒 [冷]

● ソマトロピン B S 皮下注5mg「サﾄﾞ」シュアパル
5mg筒 [2～8℃] 【後】

ソマトロピン B S 皮下注10mg「サﾄﾞ」シュアパル
10mg筒 [2～8℃] 【後】

劇ゾメタ点滴静注4mg/100mL—V
(ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ﾄｰ」へ切替)

劇ゾラデックス3.6mgデボ 筒 [冷]

劇ゾラデックス L A 10.8mgデボ 筒 [冷]

劇ソリクア配合注ソロスター キット [2～8℃]

劇ソリリス点滴静注300mg 30mLV [冷]

ソルアセト F 輸液 500mLV 【後】

ソル・コーテフ注射用100mg V (溶解液付)

ソル・コーテフ静注用500mg V (溶解液付)

劇ソルダクトン静注用100mg A

ソルデム1輸液 200mLV 【後】

ソルデム1輸液 500mLV 【後】

ソルデム3 A 輸液 200mLV 【後】

ソルデム3 A 輸液 500mLV 【後】

劇ゾルトファイ配合注フレックスタッチ キット [2～8℃]

ソル・メドロール静注用40mg 40mgV (溶解液付)

ソル・メドロール静注用125mg 125mgV (溶解液付)

ソル・メドロール静注用500mg 500mgV (溶解液付)

ソルラクト輸液 500mLV 【後】

劇ゾレア皮下注150mgペン 1mL1キット [2～8℃]

劇ゾレア皮下注300mgペン 2mL1キット [2～8℃]

劇ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ﾄｰ」 P 【後】

【タ】

~~ダイアニール-N-P-D-2 1.5腹膜透析液(ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ) 2LP (販売中止)~~

~~ダイアニール-N-P-D-2 2.5腹膜透析液(ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ) 2LP (販売中止)~~

● ~~ダイアニール-N-P-D-4 1.5腹膜透析液(ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ) 1LP~~

~~ダイアニール-N-P-D-4 1.5腹膜透析液(ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ) 2LP (販売中止)~~

● ~~ダイアニール-N-P-D-4 1.5腹膜透析液(ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ) 5LP~~

● ~~ダイアニール-N-P-D-4 2.5腹膜透析液(ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ) 1LP~~

~~ダイアニール-N-P-D-4 2.5腹膜透析液(ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ) 2LP (販売中止)~~

● ~~ダイアニール-N-P-D-4 2.5腹膜透析液(ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ) 5LP~~

~~ダイアニール-P-D-2 4.25腹膜透析液(ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ) 2LP~~

ダイアモックス注射用500mg V

劇タイガシル点滴静注用50mg V

劇タイサブリ点滴静注300mg 15mLV [2～8℃]

タイロゲン筋注用0.9mg V [冷]

劇ダウノマイシン静注用20mg V

~~タガメット注射液200mg—2mLA (シメチジン注200mg「NP」へ切替)~~

劇ダカルバジン注用100 100mgV [冷]

タケブロン静注用30mg V

劇注射用タゴシッド200mg—V
(テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」へ切替)

タゾピペ配合静注用4.5「ﾌｵｰ」 4.5gV

タチオン注射用100mg A

劇ダトロウェイ点滴静注用100mg V [2～8℃]

ダブトマイシン静注用350mg「ﾌｵｰ」 V 【後】 (キューピシン)

劇ダラキューロ配合皮下注 15mLV [2～8℃]

~~劇ダラザレックス点滴静注100mg—5mLV—[2～8℃]~~

~~劇ダラザレックス点滴静注400mg—20mLV—[2～8℃]~~

ダルテパリン N a 静注5000単位/5mL「日新」
5,000低分子ヘパリン国際単位A 【後】 (フラグミン)

劇ダルビアス点滴静注用135mg V [2～8℃]

○劇ダルベゴエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」
0.5mL筒 【後】 [2～8℃] (ネスブ)

○劇ダルベゴエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」
0.5mL筒 【後】 [2～8℃] (ネスブ)

○劇ダルベゴエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」
0.5mL筒 【後】 [2～8℃] (ネスブ)

ダントリウム静注用20mg V

劇タンボコール静注50mg 5mLA

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

【チ】

チエナム点滴静注用0.5g V
注射用水 20mLA
注射用水（＝大塚蒸留水） 100mLV
注射用水（＝大塚蒸留水） 500mLV（PET専用・物流のみ）
注射用水（洗浄用） 500mLV
注射用水（洗浄用） 1000mLV
注射用水バッグ「フー」 1LP
劇チラーゼンS 静注液200 μ g 1mLA
劇沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mLV [冷]
劇沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「サダ」 1mLA [冷]
（DTピックへ切替）

【ツ】

劇一般診断用精製ツベルクリン（PPD）
1人用 0.25 μ g V（溶解液付） [冷]

【テ】

TRH注0.5mg「フロ」 A [冷]
劇テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」 V 【後】（出荷停止）
劇テイコプラニン点滴静注用200mg「ト」 V 【後】
劇DTピック（＝沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド） 0.1mLV [冷]
劇1%ディプリバン注-キット 500mg50mL筒
低分子デキストラン糖注 500mLP 【後】
デカドロン注射液1.65mg-0.5mL [冷]
（院内はデキサート注射液1.65mg）
デカドロン注射液6.6mg-2mL [冷]
（院内はデキサート注射液6.6mg）
○ デキサート注射液1.65mg 0.5mLA 【後】
○ デキサート注射液6.6mg 2mLV 【後】
劇デクスメドミジン静注液200 μ g「フロ」 2mLV 【後】
劇テクベイリ皮下注30mg 3mLV [2～8℃]
劇テクベイリ皮下注153mg 1.7mLV [2～8℃]
テストノンデポー筋注用125mg 1mLA
劇テゼスパイア皮下注210mgペン 1.91mLキット [2～8℃]
劇テセントリク点滴静注840mg 14mLV [2～8℃]
劇テセントリク点滴静注1200mg 20mLV [2～8℃]
テタノプリンIH 静注250単位 V [冷]
テタノプリンIH 静注1500単位 V [冷]
劇テッペーザ点滴静注用500mg V [2～8℃]
デトキソール静注液2g 20mLV
劇テトラベック皮下注シリンジ-0.5mL筒 [冷]（販売中止）
毒デノシン点滴静注用500mg V
（ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」へ切替）
劇テビムプラ点滴静注100mg 10mLV [2～8℃] [禁凍結]
デファイテリオ静注200mg 2.5mLV
劇テブダック点滴静注用40mg V [2～8℃]
テムセルHS 注 10.8mL1P [液体室素（気相中）]
（輸血移植免疫部でのみ取扱い）
毒テモダール点滴静注用100mg V [2～8℃]
※劇デュビクセント皮下注200mgシリンジ 1.14mL筒 [2～8℃] [禁凍結]
（デュビクセント皮下注200mgペンへ切替）
劇デュビクセント皮下注200mgペン 1.14mLキット [2～8℃] [禁凍結]
劇デュビクセント皮下注300mgペン 2mLキット [2～8℃] [禁凍結]
劇テラルピシン注射用10mg V [冷]
劇テラルピシン注射用20mg V [冷]
○ テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モダ」 キット [2～8℃] 【後】
（院外は【般】テリバラチド注射用キット600 μ g:FOへ切替）
● 【般】テリバラチド注射用キット600 μ g:FO

テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター キット [2～8℃]
テルモ血液バッグCPDA 200mL採血用セット [BB-SCD200J8A]

【ト】

劇ドキシル注20mg 10mLV [冷]
劇ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サド」 5mLV [冷] 【後】
（販売中止）（2027年3月31日経過措置終了（予定））
劇ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」 V 【後】
劇ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サド」 25mLV [冷] 【後】
（販売中止）（ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」へ切替）
（2027年3月31日経過措置終了（予定））
○劇トシリズマブBS点滴静注200mg「CT」 10mLV [2～8℃] 【後】
（アクテムラ点滴静注用200mgより一部切替）
毒ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「フロ」 V 【後】
毒ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「フロ」 V 【後】
ドバストン静注50mg 0.25%20mLA
→劇ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 0.3%200mL袋 【後】
（ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」が無くなり次第切替）
※劇ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」 0.3%200mL袋 【後】
（ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」へ切替予定）
劇ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サウ」 5mLA 【後】
劇ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 50mL筒 【後】
（ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テル」へ名称変更）
劇ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テル」 0.3%50mL筒 【後】
（ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」より名称変更）
劇ドブトレックス注射液100mg-A
（ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サウ」へ切替）
劇ドブポン注0.3%シリンジ 50mL 【後】
（ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」へ名称変更）
（ドブトレックスK注600mgより切替）
劇トブランシ注60mg-A
劇ドブラム注射液400mg 20mLV
劇トボテシン点滴静注40mg-2mLV
（院内はイリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト」）
劇トボテシン点滴静注100mg-5mLV
（院内はイリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト」）
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 V [2～8℃] 【後】
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 V [2～8℃] 【後】
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 10%10mLA 【後】
劇トラマール注100 100mgA
トランサミン注10% 10mLA
毒トリセノックス点滴静注12mg 6mLV
劇トリピック（＝沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン）
0.5mLV [10℃以下] [禁凍結]
劇トルツ皮下注80mgオートインジェクター 1mLキット [2～8℃]
向ドルミカム注射液10mg 2mLA（ミダゾラム注10mg「サド」へ切替）
劇トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL1キット [2～8℃]
●劇トルリシティ皮下注1.5mgアテオス 0.5mL1キット [2～8℃]
劇トレアキシ点点滴静注液100mg/4mL V [2～8℃]
劇トレシーバ注フレックスタッチ 300単位キット [2～8℃]
劇トレプロスト注射液200mg 20mLV
劇トレムフィア点滴静注200mg 20mLV [2～8℃]
劇トレムフィア皮下注100mgシリンジ 100mg1mL筒 [2～8℃]
劇トレムフィア皮下注200mgペン 2mLキット [2～8℃]
劇トロデルビ点滴静注用200mg V [2～8℃]
劇ドロレブタン注射液25mg 10mLV

【ナ】

- 劇ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター 0.375mLキット [2～8℃]
劇ナノゾラ皮下注30mgシリンジ 0.375mL筒 [2～8℃]
劇ナファモスタット注射用10mg「SW」 V 【後】
毒ナベルピン注40 4mLV [冷] (ロゼウス静注液40mgへ切替)
麻劇ナルベイン注2mg 1mLA
劇ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mLA

【ニ】

- 劇ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 2mLA 【後】
(サリベックス注0.1% 2mg2mLより名称変更)
劇ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 10mLA 【後】
(サリベックス注0.1% 10mg10mLより名称変更)
●ニコペリック腹膜透析液1.5L 袋(排液用バッグ付) 【後】
ニコランジル点滴静注用48mg「サイ」 V [冷] 【後】
ニヨサン注射液500mg—10mLA
毒ニトロプロ持続静注液6mg 2mLA [冷]
劇ニドラン注射用50mg—V
劇ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 A 【後】
劇ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テル」 筒 【後】
ニトロール注5mgシリンジ 10mL筒
ニトロール持続静注25mgシリンジ 50mL筒
劇乳酸ビペリデン注5mg「ヨシ」 0.5%1mLA 【後】
劇ニューモバックスN Pシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]

【ヌ】

- 劇ヌーカラ皮下注100mgペン 1mLキット [2～8℃]
劇小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL筒 [2～8℃]

【ネ】

- ネオアミュー輸液—200mLP
劇ネオシネジンコーワ注1mg 1mLA
劇ネオピタカイン注シリンジ5mL 筒
ネオファーゲン静注20mL A
ネオフィリン注250mg 10mLA
劇ネスズ注射液30μgプラシランジ—0.5mL筒—[2～8℃]
(ダルベゴエチンアルファ注30μgシリンジへ切替)
劇ネスズ注射液60μgプラシランジ—0.5mL筒—[2～8℃]
(ダルベゴエチンアルファ注60μgシリンジへ切替)
劇ネスズ注射液120μgプラシランジ—0.5mL筒—[2～8℃]
(ダルベゴエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」へ切替)

【ノ】

- ノイアート静注用1500単位—V—(溶解液付)—
(献血ノンスロン1500注射用へ切替)
ノイトロジン注50μg V (溶解液なし)
ノイトロジン注100μg V (溶解液なし)
ノイトロジン注250μg V (溶解液なし)
ノイトロピン注射液3.6単位 3mLA
劇ノクサフィル点滴静注300mg 16.7mLV [2～8℃]
ノバミン筋注5mg—1mLA (販売中止)
(2027年3月31日経過措置終了)
毒ノバントロン注10mg 5mLV
向劇ノーベルバル静注用250mg V
●ノボエイト静注用1500 1500国際単位V (溶解液付) [2～8℃]
ノボセブンH I 静注用5mgシリンジ 5mLV (溶解液付) [冷]
劇ノボラピッド注100単位/mL 10mLV [冷]
●劇ノボラピッド注フレックスタッチ—300単位キット—[冷]
(院内はインスリンアスパルトB S注「サノ」へ切替予定)
(【般】インスリンアスパルト注射用ペン型キット300単位:NRへ切替)
●劇ノボラピッド注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]

- 劇ノボラピッド50ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]

- 劇ノボリンR注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボリンN注フレックスペン 300単位キット [2～8℃]

- 劇ノルアドリナリン注1mg 0.1% 1mLA
●ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg キット [冷]
●ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg キット [冷]
献血ノンスロン500注射用 500単位V (溶解液付)
献血ノンスロン1500注射用 1500単位V (溶解液付)

【ハ】

- 劇ハイカムチン注射用1.1mg—V (販売中止)
劇ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL V [2～8℃]
ハイカリックR F 輸液 500mLP
特生ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL 1セット [2～8℃]
バイクロット配合静注用—V—(溶解液付)—[10℃以下]
(バイクロット配合静注用2.5mLへ名称変更)
特生バイクロット配合静注用2.5mL V (2.5mL溶解液付)
特生ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL—V—[2～25℃] (販売中止)
特生ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ 筒 [2～25℃]
水溶性ハイドロコートン注射液100mg 2mLV
バクトラミン注 5mLA
毒バクリタキセル注100mg/16.7 mL「NK」 V 【後】
毒パタリタキセル注射液100mg「NP」—16.7mLV—【後】—(販売中止)
(2027年3月31日経過措置終了)
劇パーサビブ静注透析用シリンジ5mg 2mL筒 [2～8℃]
劇パージェタ点滴静注420mg/14mL V [2～8℃]
劇沈降破傷風トキシイド「生研」 0.5mLV [冷]
ハーセプチン注射用150 150mgV (溶解液なし) [2～8℃]
劇パドセブ点滴静注用30mg V [2～8℃]
パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」 1mLA
劇パビースモ硝子体内注射液120mg/mL—0.05mLV—[2～8℃]
劇パビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg0.05mL筒 [2～8℃]
ハプトグロピン静注2000単位「JB」 100mLV [冷]
劇ハベカシン注射液200mg 4mLA
劇バベンチオ点滴静注200mg 10mLV [2～8℃]
パム静注500mg 20mLA
毒ハラヴェン静注1mg 2mLV
毒パラプラチン注射液50mg—5mLV
(カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」へ切替)
毒パラプラチン注射液150mg—15mLV
(カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」へ切替)
毒パラプラチン注射液450mg—45mLV
(カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」へ切替)
バル筋注100mg「AFP」 10%1mLA [冷]
劇パルタス注5μg—1mLA[冷]
(採用薬はアルプロスタジル注5μg「サイ」へ切替)
劇パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タリ」 P 【後】
劇ハロマンズ注100mg 1mLA
バンコマイシン点滴静注用0.5g「トー」 V 【後】
パントール注射液500mg—A
劇ハンブ注射用1000 1000μgV

【ヒ】

- 劇ピアスカイ注340mg 2mLV [2～8℃]
劇ビグラッツ点滴静注液150mg 6mLV
ピカネイト輸液 500mLP (ピカーボン輸液から切替)
ピカネイト輸液 1000mLP
ピカーボン輸液—500mLP (ピカネイト輸液 500mLへ切替)
劇ビキセオス配合静注用 (144mg) V [2～8℃]

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

ピクシリン注射用2g V
※ 注射用ピクシリンS 500 500mgV 【後】
劇ピクトーザ皮下注18mg 3mLキット [冷]
(2027年3月31日経過措置終了)
劇BCGワクチン(デイス) 乾燥 12mg 1人用V [冷]
ビジパーク270注20mL 54.97%V
劇ビシバニール注射用1KE V (溶解液なし) [10℃以下]
劇ビシバニール注射用5KE V (溶解液なし) [10℃以下]
劇ビスタイン静注用15mg V
セスタゲロビン皮下注用V (溶解液付) [冷]
劇ビダーザ注射用100mgV
(アザシチジン注射用100mgワチンへ切替)
ゼタンミン注射液500mgA [冷]
(アスコルビン酸注500mgPB「日新」へ切替)
ビタメジン静注用 V
→ ビリドキサル注10mg「バロ」 A
ヒトCRH静注用100μg「コト」 V (溶解液付)
ビトレシン注射液20 20単位1mLA [冷]
劇セフデューラ配合皮下注5.6mLV [2～8℃]
(ヒフデューラ配合皮下注シリンジへ切替)
劇ヒフデューラ配合皮下注シリンジ 5mL筒 [2～8℃]
ビーフリード輸液 500mLキット
ビベラシリンNa注射用1g「NIG」 V 【後】
(ペントシリン注射用1gVから切替)
ヒベルナ注25mg 2.5%1mLA
劇ビームゲン注[HBワクチン] 5μg0.25mLV [冷]
劇ビームゲン注[HBワクチン] 10μg0.5mLV [冷]
(ヘプタバックス-IIへ切替)
劇ビムパット点滴静注100mg 10mLV
劇ビムパット点滴静注200mg20mLV
劇ヒューマリンR注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]
●劇ヒューマリンR注カート 300単位筒 [冷]
劇ヒューマリンR注ミリオペン 300単位キット [冷]
劇ヒューマリンN注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]
劇ヒューマリンN注ミリオペン300単位キット [冷]
●劇ヒューマリン3/7注ミリオペン [冷]
●劇ヒューマログ注100単位/mL1000単位10mLV [冷]
(【般】インスリンリスプロ注射液100単位/mL:HUへ切替)
●劇ヒューマログ注カート 300単位筒 [冷]
●劇ヒューマログ注ミリオペン300単位キット [冷]
(【般】インスリンアズナ注用ペン型キット300単位:HUへ切替)
●劇ヒューマログ注ミリオペンHD300単位キット [冷]
(【般】インスリンアズナ注用ペン型キット300単位:HUへ切替)
●劇ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位キット [冷]
●劇ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位キット [冷]
●劇ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL一筒 [冷]
(【般】アダリムマブ注射用シリンジ20mg0.2mLへ切替)
●劇ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL一筒 [冷]
(【般】アダリムマブ注射用シリンジ40mg0.4mLへ切替)
劇ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL キット [冷]
(【般】アダリムマブ注射用ペン型キット40mg0.4mLへ切替)
○劇ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL 筒 [冷]
(院外は【般】アダリムマブ注射用シリンジ80mg0.8mLへ切替)
劇ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL キット [冷]
(【般】アダリムマブ注射用ペン型キット80mg0.8mLへ切替)
ビリヴィジェン10%静注2.5g/25mL V [2～25℃] [禁凍結]
ビリヴィジェン10%静注5g/50mL V [2～25℃] [禁凍結]
ビリヴィジェン10%静注10g/100mL V [2～25℃] [禁凍結]

ピリスコピン点滴静注50 10.55% 100mLV
劇ビーリンサイト点滴静注用35μg V [2～8℃]
ビルテプソ点滴静注250mg 5mL V [冷]
ヒルトニン0.5mg注射液 A
劇ピロイ点滴静注用100mg V [2～8℃]
劇ピロイ点滴静注用300mg V [2～8℃]
劇ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター 1mLキット [2～8℃]
●劇ピンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター 2mLキット [2～8℃]
【フ】
ファイバ静注用1000 20mLV [2～8℃]
劇5-FU注250mgV [2～8℃]
(フルオロウラシル注250mg「トク」へ切替)
ファーストシン静注用1g V
劇ファセンラ皮下注30mgシリンジ1mL筒 [2～8℃]
劇ファセンラ皮下注30mgペン 1mLキット [2～8℃]
劇ファブラザイム点滴静注用5mg V [冷]
劇ファブラザイム点滴静注用35mg V [冷]
ファモチジン静注20mg「日新」 20mLA 【後】
劇ファンガード点滴用50mgV
(ミカファンギンNa点滴静注用50mg「コト」へ切替)
フィコンパ点滴静注用2mg V
ライゾオ35輸液500mLP (グルアセト35注 500mLへ切替)
フィジオ140輸液 500mLP
フィニックス点滴静注用0.5g V
劇ブイフェンド200mg静注用 V
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 V (溶解液付) [冷]
フィプロガミンP静注用 V [冷]
●フィラジル皮下注30mgシリンジ 3mL筒 [冷]
○フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」
0.3mL/筒 [2～8℃] 【後】
(院外は【般】フィルグラスチム注射用シリンジ75μgへ切替)
○フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」
0.6mL/筒 [2～8℃] 【後】
(院外は【般】フィルグラスチム注射用シリンジ150μgへ切替)
○フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」
0.7mL/筒 [10℃以下 禁凍結] 【後】
(院外は【般】フィルグラスチム注射用シリンジ300μgへ切替)
●【般】フィルグラスチム注射用シリンジ75μg
●【般】フィルグラスチム注射用シリンジ150μg
●【般】フィルグラスチム注射用シリンジ300μg
劇注射用フィルデシン1mg V [冷]
フェインジェクト静注500mg 10mLV
フェジン静注40mg 2mLA
劇フェスゴ配合皮下注MA 10mLV [2～8℃]
劇フェスゴ配合皮下注IN 15mLV [2～8℃]
劇フェソロデックス筋注250mg 5mL筒 [冷]
フェトロージャ点滴静注用1g V [2～8℃]
向劇フェノバール注射液100mg1mLA
○麻劇フェンタニル注射液0.1mg「テル」 0.005%2mLA 【後】
○麻劇フェンタニル注射液0.5mg「テル」 0.005%10mLA 【後】
●フォリスチム注300IUカートリッジ
300国際単位0.36mL筒 [2～8℃] [遮光]
●フォリスチム注600IUカートリッジ
600国際単位0.72mL筒 [2～8℃] [遮光]
●フォリスチム注900IUカートリッジ
900国際単位1.08mL筒 [2～8℃] [遮光]
●ラオルテオ皮下注キット600μg0.005%10mLA
(【般】テリパラチド注射用キット600μg:FOへ切替)

劇注射用フサン10—10mgV
(ナファモスタット注射用10mg「SW」へ切替)
劇注射用フサン50 50mgV
劇ブスコパン注20mg 2%1mLA
劇ブスルフェクス点滴静注用60mg V [冷]
ブドウ糖 5% 20mLA
ブドウ糖 5% 50mLV
ブドウ糖 5% 100mLV
ブドウ糖 5% 250mLP (ﾌﾟﾛﾄﾞﾙからﾊﾞｯｸへ切替)
ブドウ糖 5% 500mLP (ﾌﾟﾛﾄﾞﾙからﾊﾞｯｸへ切替)
ブドウ糖 10% 20mLA
ブドウ糖 20% 20mLA
ブドウ糖—50%-20mLA— (50%ブドウ糖注射液「ニッソ」へ切替)
ブドウ糖 50% 500mLP
ブドウ糖—70%-350mLP
50%ブドウ糖注射液「ニッソ」 20mLA
劇デラリア皮下注60mgシリンジ—1mL筒—[2～8℃]
劇ブラリアH I 皮下注60mgシリンジ0.5mL 筒 [2～8℃] [禁凍結]
ブリビアクト 静注25mg 2.5mLV
ブリズバインド 静注液2.5g 50mLV [2～8℃]
ブシディオン 静注200mg—2mLV
(スガマデクス 静注液200mgシリンジ「マルシ」へ切替)
プリンペラン注射液10mg 0.5%2mLA
(塩酸メトクロプラミド注射液10mg「効効」が無くなり次第切替)
フルオレサイト 静注500mg 5mLV 【後】
劇フルオロウラシル注250mg「ト7」 V [2～8℃] 【後】
劇フルオロウラシル注1000mg「ト7」 V [2～8℃] 【後】
フルカリック1号輸液 903mLキット
フルカリック2号輸液 1003mLキット
フルカリック3号輸液 1103mLキット
フルコナゾール 静注液50mg「ザイ」 0.1%50mLV 【後】
フルスルチアミン注50mg「日新」 20mLA 【後】
劇フルダラ 静注用50mg V
劇フルデカシン筋注25mg 1mLV
劇フルマゼニル 静注0.5mgシリンジ「テル」 5mL筒 【後】
フルマリン 静注用1g V
ブレアミン-P 注射液 200mLP
劇ブレオ注射用15mg V
劇ブレセデックス 静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」 筒
水溶性ブレドニン20mg A
劇ブレバイミス点滴静注240mg 12mLV
劇ブレビブロック注100mg 10mLV
劇ブレベナー20水性懸濁注 0.5mLキット [2～8℃]
劇ブーレンレップ点滴静注用100mg V [2～8℃]
プロギノン・デポー筋注10mg 1mLA
劇プログラフ注射液2mg 0.4mLA
デロゲデポー筋注125mg—1mLA (販売中止)
(2027年3月31日経過措置終了)
デロゲホルモン筋注用25mg—1mLA (販売中止)
(2027年3月31日経過措置終了)
プロジフ 静注液200 8%2.5mLV [冷]
劇プロスタルモン・F 注射液1000 1mg1mLA
劇デロスタンディオン注射用20μg—V
(アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「効効」へ切替)
劇デロスタンディオン500μg—V
(アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「効効」へ切替)

○ フロセミド注20mg「NIG」 A 【後】
~~フロセミド注20mg「ト7」 A—【後】—~~
(フロセミド注20mg「NIG」へ切替)
劇プロタノールL 注0.2mg 0.02%1mLA
プロタミン硫酸塩 静注100mg「モダ」 1%10mLV
(ノボ・硫酸プロタミン 静注用100mgから名称変更)
プロハンス 静注シリンジ13mL 筒
劇プロボフォール 静注1%20mL「マルシ」 200mg20mLA 【後】
劇プロボフォール 静注1%100mL「マルシ」 1g100mLV 【後】
プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨ」 0.2%2mLA 【後】
劇静注用フローラン0.5mg V (溶解液無)
劇静注用フローラン1.5mg V (溶解液無)
静注用フローラン専用溶解液 50mLV
【へ】
ペイフォータス筋注50mgシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃]
ペイフォータス筋注100mgシリンジ 1mL筒 [2～8℃]
劇ペオピュ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg0.05mL筒 [2～8℃]
劇ペガシス皮下注180μg—1mLV—[冷]
劇ベクティビックス点滴静注100mg 5mLV [冷]
ペグフィルグラスチムB S 皮下注3.6mg「ニッ」
0.36mL筒 [バイオ後続] [2～8℃]
ベクルリー点滴静注用100mg V
毒ベスボンサ点滴静注用1mg V [2～8℃]
劇ベスレミ皮下注250μgシリンジ 0.5mL筒 [2～8℃] [禁凍結]
●劇ベタフェロン皮下注用960万国単位 V (溶解液付)
麻ベチロルファン配合注H D 1mLA
劇ベナンボックス注用300mg V
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 V
献血ペニロン-I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)
献血ペニロン-I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)
ペネフィクス 静注用1000—1000万国単位V (溶解液付)—[1～30℃]
●ペネフィクス 静注用3000 3000万国単位V (溶解液付) [1～30℃]
劇ペバシズマブB S 点滴静注100mg「CTNK」4mLV—[2～8℃]—【後】—
劇ペバシズマブB S 点滴静注100mg「第一三共」
4mLV—[2～8℃]—【後】— (販売中止)
劇ペバシズマブB S 点滴静注400mg「CTNK」16mLV [2～8℃] 【後】
劇ペバシズマブB S 点滴静注400mg「第一三共」
16mLV—[2～8℃]—【後】— (販売中止)
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モダ」 筒 【後】
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ
「オツカ」10mL (ルアースリップタイプ) 筒 【後】
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ
「オツカ」5mL (ルアロックタイプ) 筒 【後】
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ
「オツカ」10mL (ルアースリップタイプ) 筒 【後】
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」—A
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」—V (名称変更)
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「YD」 V
劇ベデンド注100mg—5mLV
(エトボシド点滴静注液100mg「サト」へ切替)
ヘブスプリンIH 静注1000単位 5mLV [冷]
劇ヘブタックス-II 水溶性懸濁シリンジ0.5mL 筒 [2～8℃]
●ヘムライブラ皮下注30mg 1mLV [2～8℃]
ヘムライブラ皮下注60mg 0.4mLV [2～8℃]
ヘムライブラ皮下注90mg 0.6mLV [2～8℃]
ヘムライブラ皮下注105mg 0.7mLV [2～8℃]
ヘムライブラ皮下注150mg 1mLV [2～8℃]

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

劇ペメトレキシド点滴静注液100mg「NK」 4mLV 【後】
劇ペメトレキシド点滴静注液500mg「NK」 20mLV 【後】
● ペリセート360N腹膜透析液 1.5LP（排液用ﾊﾞｯｸﾞ付）
● ペリセート400N腹膜透析液 1.5LP
（排液用ﾊﾞｯｸﾞ付）【セフキャップシステム用】
ペリナートP静注用500
（正常人血漿1mL中含有量の500倍（溶解液付）） V 【冷】
毒ベルケイド注射用3mg V
ヘルニコア椎間板注用1.25単位 V 【冷】
劇ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ﾄｰﾌﾞ」 V 【2～8℃】 【後】
ペントシリン注射用1g—V
（ピペラシリンN a注射用1g「NIG」V 【後】へ切替）
劇ペンリスタ点滴静注用120mg V 【2～8℃】
劇ペンリスタ点滴静注用400mg V 【2～8℃】
劇ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター 1mLキット 【2～8℃】
【ホ】
ボカブリア水懸筋注600mg 3mLV
ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」 V 【2～8℃】 【後】
毒点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 6g250mLV
劇ホストイン静注750mg 10mLV 【冷】
ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」 V 【後】
劇ボスミン注1mg 0.1%1mLA
● ボックスゾゴ皮下注用0.4mg V（溶解液付） 【2～8℃】
● ボックスゾゴ皮下注用0.56mg V（溶解液付） 【2～8℃】
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg V（溶解液付） 【2～8℃】
劇ボテリジオ点滴静注20mg 5mLV 【2～8℃】
毒ボトックス注用50単位 V 【冷】
劇ボートラザ点滴静注液800mg 50mLV 【2～8℃】
劇ボナロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ900μg 100mLP
劇ボプスカイン0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ250mg/100mL P
劇ボプスカイン0.5%注50mg/10mL A
劇ボプスカイン0.75%注75mg/10mL A
ホメピゾール点滴静注1.5g「効ﾀﾞ」 V
劇ボライビー点滴静注用30mg V 【2～8℃】
劇ボライビー点滴静注用140mg—V—【2～8℃】
ボラミン注5mg 1mLA
劇ボリドカステレオール0.5%注2mL—A
劇ボリドカステレオール1%注2mL—A
劇ボリドカステレオール3%注2mL A
毒ボルテゾミブ注射用3mg「ﾄｰﾌﾞ」 V 【後】
ボルベン輸液6% 500mLP
劇ボンビバ静注1mgシリンジ—1mL筒
ボンベンディ静注用1300 1300国際単位V（溶解液付）
【マ】
劇マイトマイシン注用2mg V
毒マイロタージュ点滴静注用5mg V 【2～8℃】
劇マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mLA
劇マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mLA
マキューイド眼注用40mg V
マグセント注100mL V
マグネスコープ静注38%シリンジ13mL 筒
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 筒
劇乾燥弱毒生麻しんワクチン「効ﾀﾞ」 1人分V（溶解液付） 【冷】
劇乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（＝ミールビックⅡ皮下注用）
1人分V（溶解液付） 【8℃以下】
劇乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V（溶解液付） 【冷】
劇マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット 【2～8℃】
劇マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mLキット 【2～8℃】

● 劇マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット 【2～8℃】
● 劇マンジャロ皮下注10mgアテオス 0.5mLキット 【2～8℃】
● 劇マンジャロ皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット 【2～8℃】
● 劇マンジャロ皮下注15mgアテオス 0.5mLキット 【2～8℃】
20%マンニトール注射液「YD」（袋） 300mL袋
【ミ】
ミオテクター冠血管注 A液 495mLV
ミオテクター冠血管注 B液 5mLA
劇ミカファンギンN a点滴静注用50mg「ﾌﾟﾛ」 V 【後】
（ファンガード点滴用50mgから切替）
向ミダゾラム注射液10mg「NIG」 2mLA 【後】
向ミダゾラム注10mg「サトニー」2mLA—【後】—（出荷停止）
（ミダゾラム注射液10mg「NIG」へ切替）
向ミダフレッサ静注0.1% 10mg10mLV
劇ミチーガ皮下注用30mgバイアル V 【2～8℃】
劇ミチーガ皮下注用60mgシリンジ 筒
ミッドペリック135腹膜透析液 1.5LP（排液用ﾊﾞｯｸﾞ付）
● ミッドペリック135腹膜透析液 2LP（排液用ﾊﾞｯｸﾞ付）
ミッドペリック135腹膜透析液—2LP—（排液用ﾊﾞｯｸﾞ無し）
● ミッドペリック250腹膜透析液 1.5LP（排液用ﾊﾞｯｸﾞ付）
ミッドペリック250腹膜透析液—2LP—（排液用ﾊﾞｯｸﾞ無し）
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」 V 【後】
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイニー」V—【後】—
（ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」へ名称変更）
ミラクリッド注射液5万単位 1mLA
ミラクリッド注射液10万単位 2mLA
劇ミリブラ動注用70mg V 【冷】
ミリブラ用懸濁用液4mL A
劇ミルセラ注シリンジ25μg 0.3mL筒 【冷】
劇ミルセラ注シリンジ50μg 0.3mL筒 【冷】
劇ミルセラ注シリンジ75μg 0.3mL筒 【冷】
劇ミルセラ注シリンジ100μg 0.3mL筒 【冷】
劇ミルセラ注シリンジ150μg 0.3mL筒 【冷】
劇ミールビックⅡ皮下注用（＝乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン）
1人分V（溶解液付） 【8℃以下】
劇ミリリノン注10mg「効ﾀﾞ」 10mLA 【後】
劇ミルサーラ注射液10mg—10mLA（ミリリノン注10mg「効ﾀﾞ」へ切替）
【ム】
無水エタノール注「ﾌｧｰ」 5mLA
【メ】
メイロン静注7% 20mLA
メイロン静注7% 250mLP
メイロン静注8.4% 20mLA
劇メグルダーゼ静注用1000 1000単位V 【2～8℃】
○ メコバラミン注500μg「NP」 0.5mgA 【後】
劇注射用メソトレキセート50mg V
劇メソトレキセート点滴静注液200mg 8mLV
劇メソトレキセート点滴静注液1000mg 40mLV
メチコパール注射液500μg—A
（院内はメコバラミン注500μg「NP」）
劇メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 0.02%1mLA 【冷】 【後】
劇メチレンブルー静注50mg「第一三共」 10mLA
● 劇メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL 筒 【25℃以下】【禁凍結】
（院内はメトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL切替）
● 劇メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL 筒 【25℃以下】【禁凍結】
（院内はメトジェクト皮下注10mgペン0.20mL切替）
● 劇メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL 筒 【25℃以下】【禁凍結】
（院内はメトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL切替）

●劇メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL 筒 [25℃以下][禁凍結]
(院内はメトジェクト皮下注15mgペン0.30mL切替)
劇メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL キット [25℃以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mLが無くなり次第切替)
劇メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL キット [25℃以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mLが無くなり次第切替)
劇メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL キット [25℃以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mLが無くなり次第切替)
劇メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL キット [25℃以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mLが無くなり次第切替)
劇メナクトラ筋注—0.5mLV—[2～8℃]
(メンクアッドフィ筋注へ切替)
メルカゾール注10mg A
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 V 【後】
~~メロペネム点滴用バイアル0.5g—V~~
(メロペネム点滴静注用0.5g「明治」へ切替)
劇メンクアッドフィ筋注 0.5mLV [2～8℃]
(メナクトラ筋注から切替)
【モ】
劇モゾビル皮下注24mg 1.2mLV
モノヴァー静注1000mg 10mLV
モリヘパミン点滴静注—500mLV
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1%1mLA
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タダ」 1%5mLA
【ヤ】
劇ヤーボイ点滴静注液50mg 10mLV [2～8℃]
【ユ】
ユナシネ—S 静注用1.5g—V (スルバシリン静注用1.5gへ切替)
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g V
劇ユニツキシム点滴静注17.5mg/5mL V [2～8℃]
劇ユプリズナ点滴静注100mg 10mLV [2～8℃]
劇ユルトミリスH I 点滴静注300mg/3mL V [2～8℃]
【ヨ】
毒ヨンデリス点滴静注用0.25mg V [2～8℃]
毒ヨンデリス点滴静注用1mg V [2～8℃]
【ラ】
ライザケア輸液 1L袋 (ルタテラ静注専用)
劇ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位キット [2～8℃]
※劇ライブリバント点滴静注350mg 7mLV [2～8℃]
(リプロファズ配合皮下注へ切替)
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mLキット
ラシタタス注20mg—A (フロセミド注20mg「トリ」へ切替)
劇ラストット注100mg/5mL V
(エトポシド点滴静注液100mg「サド」(販売中止) から切替)
劇ラスピック点滴静注キット150mg キット (希釈液付) [冷]
劇ラスリテック点滴静注用1.5mg V (溶解液付) [冷]
劇ラニビズマブB S 硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
0.5mg0.05mL筒 [2～8℃] 【後】
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg 60mLV
劇ラボナール注射用0.5g A
毒ラランダ注—10mg20mLV
(シスプラチン注「マルコ」10mg20mLへ切替)
毒ラランダ注—50mg100mLV
(シスプラチン注「マルコ」50mg100mLへ切替)
●劇ランタス注ソロスター 300単位キット [冷]
劇ランタスX R注ソロスター 450単位キット [冷]
劇ランマーマーク皮下注120mg 1.7mLV [2～8℃]
劇ランマーマークH I 皮下注120mgシリンジ1.0mL 1mLV筒 [2～8℃][禁凍結]

【リ】
劇リカムビス水懸筋注900mg 3mLV [2～8℃]
劇リクラスト点滴静注液5mg(バッグ) 100mLV
リコモジュリン点滴静注用12800 12800単位 V
劇リサイオ点滴静注液100mg 2.5mLV [2～8℃]
劇リスティ—ゴ皮下注280mg 2mLV [2～8℃]
劇リサパダールコンスタ筋注用25mg—キット(懸濁用液付)—[冷]
リツキサン点滴静注100mg 10mLV [2～8℃]
リツキサン点滴静注500mg 50mLV [2～8℃]
リツキシマブB S点滴静注100mg「KHK」 10mLV [2～8℃] 【後】
リツキシマブB S点滴静注500mg「KHK」 50mLV [2～8℃] 【後】
劇リドカイン点滴静注液1%「効タ」 200mLV 【後】(出荷停止)
劇リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mLA 【後】
劇リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mLA 【後】
劇リドカイン静注用2%シリンジ「アルモ」 5mL筒 【後】
劇リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」—1%5mLA
[2～8℃]—【後】—(販売中止)(2027年3月31日経過措置終了(予定))
劇リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 1%5mLA
[5℃以下] 【後】
リビオドール480注10mL A
劇リプタヨ点滴静注350mg 7mLV [2～8℃]
劇リブレガル点滴静注用3.5mg V [冷]
劇リプロファズ配合皮下注 10mLV [2～8℃]
(ライブリバント点滴静注350mgから切替)
劇リメタゾン静注2.5mg 1mLA
硫酸M g 補正液1mEq/mL 0.5%#20mLA
劇リユー—プリン注射用キット1.88mg—筒
(リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」へ切替)
劇リユー—プリン注射用キット3.75mg—筒
(リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」へ切替)
劇リユープリンP R O注射用キット22.5mg 筒
劇リユープリンS R注射用キット11.25mg 筒
劇リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 筒 【後】
劇リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 筒 【後】
○劇リユープロレリン酢酸塩S R注射用キット11.25mg「NP」 筒 【後】
リン酸N a 補正液0.5mmol/mL 0.5%#20mLA
リンデロン注2mg(0.4%) A [冷]
【ル】
劇ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL 0.5mg0.05mLV [2～8℃]
劇ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL
0.5mg0.05mL筒—[2～8℃]
※劇ルミセフ皮下注210mgシリンジ 1.5mL筒 [2～8℃]
(ルミセフ皮下注210mgペンへ切替予定)
→劇ルミセフ皮下注210mgペン 1.5mLキット [2～8℃]
(ルミセフ皮下注210mgシリンジが無くなり次第切替)
劇ルムジェブ注ミリオペン 300単位キット [冷]
劇ルンスミオ皮下注5mg 0.5mLV [2～8℃]
劇ルンスミオ皮下注45mg 1mLV [2～8℃]
【レ】
レギチーン注射液5mg 0.5%1mLV [冷]
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(ツインバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(UVツインバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(ツインバッグ) 2LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(UVツインバッグ) 2LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(シングルバッグ・機器専用) 2.5LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(シングルバッグ・機器専用) 5LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(ツインバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(UVツインバッグ) 1.5LP

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- レギュニールHC a 2.5腹膜透析液(ツインバッグ) 2LP
レギュニールHC a 2.5腹膜透析液(シングルバッグ・機器専用) 2.5LP
レギュニールHC a 2.5腹膜透析液(シングルバッグ・機器専用) 5LP
レギュニールHC a 4.25腹膜透析液(シングルバッグ) 2LP
レギュニールLC a 4.25腹膜透析液(ツインバッグ・排液用バッグ付) 2LP
レギュニールLC a 4.25腹膜透析液(UVツインバッグ・排液用バッグ付) 2LP
レクピオ皮下注300mgシリンジ 1.5mL筒
劇レケンピ点滴静注200mg 2mLV [2～8℃]
劇レケンピ点滴静注500mg 5mLV [2～8℃]
● レコベル皮下注12μgペン 0.36mLキット [2～8℃]
● レコベル皮下注36μgペン 1.08mLキット [2～8℃]
● レコベル皮下注72μgペン 2.16mLキット [2～8℃]
劇注射用レザフィリン100mg V [冷]
レスピア静注・経口液60mg 3mLV
レパーサ皮下注140mgペン 1mLキット [2～8℃]
劇レプロジル皮下注用25mg V [2～8℃]
劇レプロジル皮下注用75mg V [2～8℃]
劇レベスティブ皮下注用0.95mg V (溶解液付) [2～8℃][禁凍結]
向劇レペタン注0.2mg A
○ レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」 5mLA 【後】 (イーケプラ)
劇レベミル注フレックスペン 300単位キット [冷]
● 劇レベミル注ベンフィル 300単位筒 [冷]
○ レボカルニチンFF 静注1000mgシリンジ「トーワ」5mL/筒(ルア-ロック) 【後】
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 キット 【後】
(クラビット点滴静注バッグ500mg/100mLから切替)
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤルト」 V 【後】
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤルト」 V 【後】
劇レミケード点滴静注用100 100mgV [冷]
劇レミトロ点滴静注用300μg V [2～8℃]
麻劇レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 V 【後】
麻劇レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 V 【後】
【ロ】
ロイコボリン注3mg 1mLA
劇ロイナーゼ注用10000 10000K単位V [冷]
劇ロカイン注1% 5mLA
毒ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 V 【後】
毒ロゼウス静注液40mg 4mLV 【後】 (ナベルピン注より切替)
ロゼバラミン筋注用25mg V
ロセファオン静注用1g—V
(セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」へ切替)
劇ロピオン静注50mg 5mLA
劇ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テルモ」 1袋 【後】
劇ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」 A 【後】
ローブリン (=抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」)
250μg V [冷]
ロミプレート皮下注250μg調製用 V [2～8℃]
向ロラピタ静注2mg 1mLV [2～8℃]
【ワ】
ワイスタール配合静注用1g V 【後】
劇ワソラン静注5mg 2mLA
毒ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL—V
(ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」へ切替)
毒ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL—V
(ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」へ切替)

生薬

- ウチダのウイキョウM（茴香）
- 劇ウチダの烏頭（ウズ）
- ウチダのエンゴサクM（延胡索）
ウチダのオウギ末M（黄耆）
- ウチダのオウヒM（桜皮）
- ウチダのオンジM（遠志）
- ウチダのガイヨウM（艾葉）
- ウチダのキンギンカM（金銀花）
- ウチダのクコシM（枸杞子）
- ウチダのコウイM（膠飴）
- ウチダのコウカM（紅花）
- ウチダのゴシュユM（呉茱萸）
- ウチダのゴマM（胡麻）
- ウチダのゴミシM（五味子）
- ウチダのシコンM（紫根）
- ウチダのシソシM（紫蘇子）
- ウチダのゼンコM（前胡）
- ウチダのセンコツM（川骨）
- ウチダのソウハクヒM（桑白皮）
- ウチダのテンナンショウM（天南星）
- ウチダのテンマM（天麻）
- ウチダのテンモンドウM（天門冬）
- ウチダのトウドクカツM（唐独活）
- ウチダのニンドウM（忍冬）
- ウチダのビャクゴウM（百合）
- ウチダのビワヨウM（枇杷葉）
- 劇ウチダの附子（ブシ）
- ウチダのポウコンM（茅根）
- 劇ウチダの炮附子（ホウブシ）
- ウチダのマンケイシM（蔓荊子）
- ウチダのモッカM（木瓜）
- ウチダのヤクモソウM（益母草）
- ウチダのリュウガンニクM（竜眼肉）
- ウチダのリュウタンM（竜胆）
- ウチダのレンニクM（蓮肉）
- トチモトのアキョウ（阿膠）
- トチモトのイレイセン（威靈仙）
- トチモトのインチンコウ（茵陳蒿）
- トチモトのウバイ（烏梅）
- トチモトのウヤク（烏藥）
- トチモトのオウギ（黄耆）
- トチモトのオウゴン（黄芩）
- トチモトのオウバク（黄柏）
- トチモトのオウレン（黄連）
- トチモトのカシュウ（何首烏）
- トチモトのガジュツ（莪朮）
- トチモトのカッコウ（藹藹）
- トチモトのカッココン（葛根）
- トチモトのカッセキ（滑石）
- トチモトのカロコン（栝楼根）
- トチモトのカロニン（栝楼仁）
- トチモトのカンキョウ（乾姜）
- トチモトのカンゾウ（甘草）
- トチモトのキキョウ（桔梗）
- トチモトのキクカ（菊花）
- トチモトのキジツ（枳殼・キコク）
- トチモトのキジツ（枳実）
- トチモトのキッピ（橘皮）
- トチモトのキョウカツ（羌活）
- トチモトのキョウニン（杏仁）
- トチモトのクジン（苦参）
- トチモトのケイガイ（荊芥）
- トチモトのケイヒ（桂皮）
- トチモトのケイヒ末（桂皮）
- トチモトのケツメイシ（決明子）
- トチモトのゲンジン（玄参）
- トチモトのコウジン（紅参）
トチモトのコウジン末AM（紅参）
- トチモトのコウブシ（香附子）
- トチモトのコウベイ（粳米）
- トチモトのコウボク（厚朴）
- トチモトのゴシツ（牛膝）
- トチモトのゴボウシ（牛蒡子）
- トチモトのサイコ（柴胡）
- トチモトのサイシン（細辛）
- トチモトのサイチャ（細茶）
- トチモトのサフラン
- トチモトのサンザシ（山査子）
- トチモトのサンシシ（山梔子）
- トチモトのサンシュユ（山茱萸）
- トチモトのサンショウ（山椒）
- トチモトのサンソウニン（酸棗仁）
- トチモトのサンヤク（山藥）
- トチモトのジオウ（乾地黄）
- トチモトのジオウ（熟地黄）
- トチモトのジオウ（生地黄）
- トチモトのシオン（紫苑）
- トチモトのジコッピ（地骨皮）
- トチモトのシツリシ（蒺藜子）
- トチモトのシテイ（柿蒂）

- トチモトのシャクヤク（芍薬）
- トチモトのシャクヤク末（芍薬）
- トチモトのジャショウシ（蛇床子）
- トチモトのシャゼンシ（車前子）
- トチモトのジュウヤク（十薬）
- トチモトのシュクシャ（縮砂）
- トチモトのショウキョウ（生姜）
- トチモトのショウバク（小麦）
- トチモトのショウマ（升麻）
- トチモトのシンイ（辛夷）
- トチモトのセッコウ（石膏）
- トチモトのセンキュウ（川芎）
- トチモトのセンキュウ末（川芎）
- トチモトのセンタイ（蟬退）
- トチモトのソウジュツ（蒼朮）
- トチモトのソボク（蘇木）
- トチモトのソヨウ（蘇葉）
- トチモトのダイオウ（大黄）
- トチモトのダイオウ末（大黄）
- トチモトのタイソウ（大棗）
- トチモトのタクシャ（沢瀉）
- トチモトのタクシャ末（沢瀉）
- トチモトのチクジョ（竹茹）
- トチモトのチクセツニンジン（竹節人参）
- トチモトのチモ（知母）
- トチモトのチョウジ（丁字）
- トチモトのチョウトウコウ（釣藤鉤）
- トチモトのチョレイ（猪苓）
- トチモトのチンピ（陳皮）
- トチモトのトウガシ（冬瓜子）
- トチモトのトウキ（当帰）
- トチモトのトウキ末（当帰）
- トチモトのトウニン（桃仁・原形）
- トチモトのトウニン（桃仁・刻み）
- トチモトのトチュウ（杜仲）
- トチモトのニンジン（人参）
- トチモトのバイモ（貝母）
- トチモトのバクガ（麦芽）
- トチモトのバクモンドウ（麦門冬）
- トチモトのハッカ（薄荷）
- トチモトのハンゲ（半夏）
- トチモトのビャクシ（白芷）
- トチモトのビャクジュツ（白朮）
- トチモトのビャクジュツ末（白朮）
- トチモトのビンロウジ（檳榔子）
- トチモトのブクリョウ（茯苓）
- トチモトのブクリョウ末（茯苓）
- トチモトのベッコウ（土別甲）
- トチモトのボウイ（防已）
- トチモトのボウフウ（防風）
- トチモトのボクソク（樸椒）
- トチモトのボタンピ（牡丹皮）
- トチモトのボタンピ末（牡丹皮）
- トチモトのボレイ（牡蠣）
- トチモトのマオウ（麻黄）
- トチモトのマシニン（麻子仁）
- トチモトのモクツウ（木通）
- トチモトのモッコウ（木香）
- トチモトのヨクイニン（薏苡仁）
- トチモトのリュウコツ（竜骨）
- トチモトのリョウキョウ（良姜）
- トチモトのレンギョウ（連翹）

人工鼻

- エクストラフローHME 30個/箱
- エクストラモイストHME 30個/箱
- アドヒーシブ ナイト用シール 15枚/箱
- アドヒーシブ 円形敏感肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 円形普通肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 強化型シール 15枚/箱
- アドヒーシブ 楕円形敏感肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 楕円形普通肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 大型敏感肌用シール 30枚/箱
- アドヒーシブ 大型普通肌用シール 30枚/箱
- プロヴォックス ライフ エナジー HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ ゴー HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ ナイト HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ フリーハンズ用 HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ ホーム HME 30個/箱
- プロヴォックス ライフ 細菌・ウイルスフィルター付 HME 15個/箱

再生医療等製品（管轄；輸血部）

アロフィセル注
イエスカルタ点滴静注
ステミラック注
テムセルHS注
ブレヤンジ静注

再生医療等製品（管轄；薬剤部）

* ウイルスベクター製品

ゾルゲンスマ点滴静注
バイジュベックゲル