

当院採用薬等一覧 2025. 10

〈採用薬・院外処方専用薬〉

(2025(令和7)年10月1日より適用開始)

目 次

内用薬リスト	1
外用薬リスト	30
注射薬リスト	39
生 薬	52
緊急限定期申請薬	54

一覧中の記号注釈

本資料	オーダーリング
マーク	表示マーク
↓	↓
記号無：採用薬	：◎
(院内・院外処方可)	
※：削除予定薬	：◎
●：院外処方専用薬	：●
☆：院外処方専用予定薬	：◎
○：院内専用後発品である薬	：○
→：使用開始日に特に注意を要する採用薬	

注意点

- 「削除予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、院内・院外とも全面削除になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
- 「院外処方専用予定薬」は、院内在庫がなくなり次第、「院外処方専用薬」になります。それまでは「採用薬」として院内・院外使用可能となります。
- 2019(平成31)年2月1日より院外処方で一般名処方を開始しました。

内用薬リスト

【ア】

劇アイクルシグ錠15mg

劇アイセントレス錠400mg

● テイトロール錠20mg (院内は一硝酸イソソルビド錠20mg「サイ」)
 (【般】一硝酸イソソルビド錠20mgへ切替)

● アイビーディカプセル100 100mg

● アイビーディドライシロップ5%

●劇アイミタヌ配合錠H-D

(【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替)

劇アイミクス配合錠H-D

(【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠へ切替)

○ テガメイト20%ゼリ 25g【後】

(ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」へ
 名称変更)

(【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25gへ切替)

● 【般】アカルボース錠50mg (グルコバイ)

● 【般】アカルボース錠100mg (グルコバイ)

● アキネトナ細粒1% (【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%へ切替)

アキネトナ錠1mg (院内はビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」)

(【般】ビペリデン塩酸塩錠1mgへ切替)

● 【般】アクタリット錠100mg (モーバー)

● アクトスO-D錠15mg (院内はピオグリタゾンO-D錠15mg「VTRS」)

(【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mgへ切替)

● アクトスO-D錠30mg (【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mgへ切替)

●劇アクトネル錠2.5mg (【般】リセドロン酸Na錠2.5mgへ切替)

●劇アクトネル錠17.5mg (【般】リセドロン酸Na錠17.5mgへ切替)

劇アクトネル錠75mg (リセドロン酸Na錠75mg「トワ」へ切替)

●劇アグリリンカプセル0.5mg

● アコニンサン錠 166.67mg ST-01

アコファイド錠100mg

● アサヨール錠400mg (院内はメサラジン腸溶錠400mg「サイ」)

(【般】メサラジン腸溶錠400mgへ切替)

アザルフィジンE N錠500mg

(【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mgへ切替)

● 【般】アシクロビル顆粒40% (ゾビラックス)

アシクロビル錠200mg「サイ」【後】 (【般】なし)

● 【般】アシクロビル錠200mg (ゾビラックス)

○ アジスロマイシン錠250mg「トワ」【後】

アシテアダニ舌下錠100単位 (IR)

● アシテアダニ舌下錠300単位 (IR)

アシノン錠75mg

● 【般】アジスロマイシン細粒10% (ジスロマック)

● 【般】アジスロマイシン錠250mg (ジスロマック)

● 【般】アジルサルタン錠10mg (アジルバ)

● 【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠10mg (アジルバ)

● 【般】アジルサルタン錠20mg (アジルバ)

● 【般】アジルサルタン錠40mg (アジルバ)

●劇【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 (ザクラス配合錠H-D)

○ アジルサルタンO-D錠10mg「DSEP」【後】

● アジルバ顆粒1%

アジルバ錠10mg (【般】アジルサルタン錠10mgへ切替)

アジルバ錠20mg (【般】アジルサルタン錠20mgへ切替)

アジルバ錠40mg (【般】アジルサルタン錠40mgへ切替)

●劇アジレクト錠0.5mg

劇アジレクト錠1mg

- 【般】アスコビン酸・バント酸Ca配合顆粒 1g/包 (シナール)
 アストミン錠10mg
 アストミンシロップ0.25%
 アスパラカリウム錠300mg
- アスパラ配合錠
 アスピリン原末「マルイ」
- 【般】アスピリン腸溶錠100mg (バイアスピリン)
- 劇アスペーヌンカプセル10mg (院内はアスピリン塩酸塩カプセル10mg「NPJ」)
 (【般】アブリイン塩酸塩カプセル10mgへ切替)
 アスペリ恩散10%
 アスペリ恩シロップ0.5%
- 【般】アズレヌルホ酸Na a-L-グルタミン配合顆粒0.67g (マーズレンS)
- アズロキサ錠15mg
- 【般】アセトアミノフェン細粒50% (カロナール)
- 【般】アセトアミノフェン錠200mg (カロナール)
- 【般】アセトアミノフェン錠300mg (カロナール)
- アセトアミノフェン錠300mg「マルイ」【後】
- 劇アセトアミノフェン錠500mg「マルイ」【後】
 (アセトアミノフェン錠300mg「マルイ」へ切替)
- 【般】アセトアミノフェン錠500mg (カロナール)
- 【般】アセトアミノフェンシロップ2% (カロナール)
- 【般】アセトアミノフェンシロップ用40% (カロナール)
 アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」 20mL/瓶
 アセノベル徐放錠500mg
- アゼブチン錠1mg
- 【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg (アゼブチン)
- アゼルニジビン錠16mg「トワ」【後】
- 【般】アゼルニジビン錠16mg (カルプロック)
- アゾセミド錠30mg「JG」【後】
- 【般】アゾセミド錠30mg (ダイアート)
- アゾセミド錠60mg「JG」【後】
- 【般】アゾセミド錠60mg (ダイアート)
- アダブチノール錠5mg
- アタラクス錠10mg
- 劇アダラートL錠10mg
 (【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続) へ切替)
- 劇アダラートL錠20mg (院内はニフェジピンL錠20mg「サイ」)
 (【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続) へ切替)
- 劇アダラートC-R錠20mg
 (【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続) へ切替)
- 劇アダラートC-R錠40mg
 (【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続) へ切替)
- アチス錠2.5mg (院内はカルベジロール錠2.5mg「トワ」)
 (【般】カルベジロール錠2.5mgへ切替)
- アチス錠10mg (院内はカルベジロール錠10mg「トワ」)
 (【般】カルベジロール錠10mgへ切替)
- アデカット15mg錠
- アデカット30mg錠
- アテディオ配合錠
- アテノロール錠50mg「NikP」【後】
- 【般】アテノロール錠50mg (テノーミン)
 アデホスコーウ顆粒10% [1g/P]
- アデホスコーウ腸溶錠20 20mg (【般】なし)
 劇アデムバス錠0.5mg
 劇アデムバス錠1.0mg
- アテレック錠10-10mg (【般】シルニジピン錠10mgへ切替)
- アテレック錠20-20mg (【般】シルニジピン錠20mgへ切替)

- ~~アーテン散1% (【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%へ切替)~~
アーテン錠(2mg) (【般】加算なし)
~~アドシルカジン20mg (タダラフィル錠20mg A D「TE」へ切替)~~
- ~~アトーゼット配合錠7-D~~
(【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠へ切替)
~~アドソルビン原末 (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了予定)~~
- ~~アドナ散10% (【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%へ切替)~~
~~アドナ錠30mg (カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」へ切替)~~
(【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mgへ切替)
- 【般】アトモキセチンカプセル5mg (ストラテラ)
- 【般】アトモキセチンカプセル10mg (ストラテラ)
- 【般】アトモキセチンカプセル25mg (ストラテラ)
- 【般】アトモキセチンカプセル40mg (ストラテラ)
- 【般】アトモキセチン経口液0.4% (ストラテラ)
- ~~アトルバスタチン錠10mg「日医工」【後】~~
- 【般】アトルバスタチン錠10mg (リピトール)
- アトルバスタチンOD錠5mg「トワ」 【後】
- 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg (リピトールOD)
毒アトロピン硫酸塩水和物「ロイ」原末
○劇アナストロゾール錠1mg「トワ」 【後】
- 【般】アナストロゾール錠1mg (アリミデックス)
●劇アナストロゾール錠1mg「明治」 【後】
アナフラニール錠10mg
- アナフラニール錠25mg
- ~~アバズロ錠50mg (【般】イルベサルタン錠50mgへ切替)~~
~~アバズロ錠100mg (イルベサルタン錠100mg「DSPB」へ切替)~~
(【般】イルベサルタン錠100mgへ切替)
- ~~アバズロ錠200mg (【般】イルベサルタン錠200mgへ切替)~~
●劇アフィニートール錠2.5mg
劇アフィニートール錠5mg
麻劇アブストラル舌下錠100μg
麻劇アブストラル舌下錠200μg
麻劇アブストラル舌下錠400μg
○劇アブリソジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 【後】
- 【般】アブリソジン塩酸塩カプセル10mg (アスペノン)
アブレゾリン錠10mg
- アブレピタントカプセル80mg「NK」 【後】
- 【般】アブレピタントカプセル80mg (イメント)
○ アブレピタントカプセル125mg「NK」 【後】
- 【般】アブレピタントカプセル125mg (イメント)
●劇アベロックス錠400mg
- 劇アボルブカプセル0.5mg
(【般】デュタステリドカプセル0.5mg: A Vへ切替)
- 劇アマージ錠2.5mg (【般】ナラトリプタン錠2.5mgへ切替)
- 劇アマリール0.5mg錠 (【般】グリメビリド錠0.5mgへ切替)
- 劇アマリール1mg錠 (院内はグリメビリド錠1mg「トワ」)
- 劇アマリール3mg錠 (【般】グリメビリド錠3mgへ切替)
- アマンタジン塩酸塩錠50mg「ロイ」 【後】
- ~~アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」【後】~~
- 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10% (シンメトレル)
- 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg (シンメトレル)
○毒アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 【後】
(【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg)
- 【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg (アンカロン)
アミティーザカプセル12μg
- アミティーザカプセル24μg
アミノレバソE N配合散 (フルーツ味) [50g/P]
- アミノレバソE N配合散 (コーヒー味) [50g/P]
- アミュー配合顆粒 [2.5g/P]
劇アムノレイク錠2mg
- 劇アムバロ配合OD錠「トワ」 【後】
(エックスフォージ配合OD錠から切替)
- 【般】アムロジビン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠 (カデュエット2番)
- 【般】アムロジビン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠 (カデュエット4番)
- 劇アムロジビンOD錠2.5mg「EMEC」 【後】
○劇アムロジビンOD錠2.5mg「ロイ」 【後】
- 劇アムロジビンOD錠5mg「ロイ」 【後】
- 劇アムロジビンOD錠5mg「QQ」 【後】
- 【般】アムロジビン口腔内崩壊錠2.5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 【般】アムロジビン口腔内崩壊錠5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 【般】アムロジビン錠2.5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 【般】アムロジビン錠5mg (アムロジン, ノルバスク)
- 劇アムロジン錠2.5mg
- 劇アムロジンOD錠2.5mg
- 劇アムロジンOD錠5mg
- アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg (リズミック)
アメナリーフ錠200mg
- アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 【後】 (【般】なし)
- 【般】アモキシシリンカプセル250mg (サワシサン)
- 【般】アモキシシリン細粒20% (ワイドシリントン細粒)
- 向アモバシ錠7.5-7.5mg
(【般】ゾビクロン錠7.5mgへ切替 2027年3月31日経過措置終了)
- 【般】アラセプリル錠25mg (セタプリル)
アラベル内用剤1.5g [1.5g/瓶]
- アリッサ配合錠
劇アリセプトドライシロップ1%
- 劇アリセプト錠3mg (【般】ドネベジル塩酸塩錠3mgへ切替)
- 劇アリセプト錠5mg (【般】ドネベジル塩酸塩錠5mgへ切替)
- 劇アリセプトOD錠3mg
(【般】ドベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mgへ切替)
劇アリセプトOD錠5mg (院内はドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」)
(【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 劇アリセプトOD錠10mg
(【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替)
劇アーリーダ錠60mg
25mgアリナミンF糖衣錠 (院内はフルスルチアミン錠25mg「トワ」)
(【般】フルスルチアミン錠25mgへ切替)
- 劇アリビラゾール錠1mg「ロイ」 【後】
(エビリファイ錠1mgから切替)
- 【般】アリビラゾール散1% (エビリファイ)
- 【般】アリビラゾール口腔内崩壊錠24mg (エビリファイ)
- 【般】アリビラゾール錠1mg (エビリファイ)
- 【般】アリビラゾール錠3mg (エビリファイ)
- 【般】アリビラゾール錠6mg (エビリファイ)
- 【般】アリビラゾール錠12mg (エビリファイ)
- 【般】アリビラゾール経口液0.1%1mL (エビリファイ)
- 【般】アリビラゾール経口液0.1%3mL (エビリファイ)
- 【般】アリビラゾール経口液0.1%6mL (エビリファイ)
- 【般】アリビラゾール経口液0.1%12mL (エビリファイ)
劇アリミデックタス錠1mg (アナストロゾール錠1mg「トワ」へ切替)
(【般】アナストロゾール錠1mgへ切替)
- アリメジンシロップ0.05%
アルギU配合顆粒
毒アルケラン錠2mg [冷]

- アルサルニン内用液10% [10mL/P]
 (院内はスクラルファート内用液10%「NIG」)
 (【般】スクラルファート経口液10%へ切替)
- 劇アルシオドーカプセル1μg 【後】
 (【般】アルファカルシドールカプセル1μgへ切替)
 アルダクトンA細粒10%
 アルダクトンA錠25mg (スピロノラクトン錠25mg「トワ」へ切替)
 (【般】スピロノラクトン錠25mgへ切替)
- アルタットカプセル75mg
 (【般】キサジン酢酸エスカル塩酸塩徐放カプセル75mgへ切替)
 アルドメット錠250 250mg
- 劇アルファカルシドールカプセル0.25μg「トワ」 【後】
 ● 【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg (アルファロール)
- 劇アルファカルシドールカプセル1μg「トワ」 【後】
 ● 【般】アルファカルシドールカプセル1μg (アルファロール)
- 劇アルファカルシドール錠0.25μg「アル」 【後】
- 劇アルファカルシドール錠0.5μg「アル」 【後】
 (アルファカルシドール錠0.25μg「アル」へ切替)
- 【般】アルファカルシドール錠0.25μg (ワンアルファ)
- 【般】アルファカルシドール錠0.5μg (ワンアルファ)
- 劇アルファロールカプセル0.25μg
 (【般】アルファカルシドールカプセル0.25μgへ切替)
 劇アルファロールカプセル1μg
 (【般】アルファカルシドールカプセル1μgへ切替)
 劇アルファロール内用液0.5μg/mL [10mL/瓶]
- 向アルプラゾラム錠0.4mg「トワ」 【後】
 ● 【般】アルプラゾラム錠0.4mg (ソラナックス)
 アルロイドG内用液5% [200mL/瓶]
- 劇アルンブリグ錠30mg
- 劇アルンブリグ錠90mg
- アレギサール錠10mg (【般】ペミロラストK錠10mgへ切替)
 ● アレギサールドライシロップ0.5%
 (【般】ペミロラストKシロップ用0.5%へ切替)
- アレグラ錠30mg (【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mgへ切替)
 ● アレグラ錠60mg (院内はフェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トワ」)
 (【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mgへ切替)
 アレジオンドライシロップ1%
 (院内はエビナスチン塩酸塩D-S小児用1%「トワ」)
 (【般】エビナスチン塩酸塩シロップ用1%へ切替)
 アレジオンドライシロップ20mg (【般】エビナスチン塩酸塩錠20mgへ切替)
 (エビナスチン塩酸塩錠20mg「ケミア」へ切替)
- 劇アレセンサカプセル150mg
 劇アレビアチン散10%
 アレビアチン錠100mg
- アレロック顆粒0.5% [0.5g/P]
 (【般】オバタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g (包) へ切替)
- アレロックO-D錠5mg
 (院内はオロバタジン塩酸塩O-D錠5mg「トワ」)
 (【般】オロバタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 【般】アレンドロン酸錠5mg (ボナロン)
 ○ 劇アレンドロン酸錠35mg「トワ」 【後】
- 【般】アレンドロン酸錠35mg (ボナロン)
 アローゼン顆粒 [0.5g/P]
 (【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包へ切替)
- アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
 (アルマール錠10より名称変更)
- 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg (アルマール)
- アロブリノール錠100mg「カベ」 【後】
 (アロシトール錠100mgから名称変更)
 (アロブリノール錠100mg「ニワ」へ名称変更)
- アロブリノール錠100mg「ニワ」 【後】
- 【般】アロブリノール錠100 (アロシトール)
- アロマジン錠25mg (【般】エキセメスタン錠25mgへ切替)
- 毒アンカロン錠100mg (アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」へ切替)
 (【般】アミオダロン塩酸塩錠100mgへ切替)
- 劇アンコチル錠500mg
- アンジュ28 (保険適用外)
- アンブロダ錠50mg
 (院内はサルボグレラート塩酸塩錠50mg「トワ」)
 (【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mgへ切替)
- アンブロダ錠100mg
 (【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mgへ切替)
- 【般】アンブリセンタン錠2.5mg (ヴォリブリス)
- アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トワ」 【後】
- 【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg (ムコソルバン)
- 【般】アンプロキソール塩酸塩徐放錠45mg (ムコソルバン)
- 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3% (ムコソルバン)
- 【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用1.5% (ムコソルバン)
- 【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用3% (ムコソルバン)
- 【イ】
- イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg
 イグザレルト錠2.5mg
 イグザレルトO-D錠10mg
 (【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
 イグザレルトO-D錠15mg
 (【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mgへ切替)
- 劇イクスタンジ錠40mg
- 劇イクスタンジ錠80mg
 劇イグラチモド錠25mg「あゆみ」
- 【般】イグラチモド錠25mg (ケアラム)
 イーケプラドライシロップ50%
 (レベチラセタムD-S 50%「トワ」へ切替)
 (【般】レベチラセタムシロップ用50%へ切替)
 イーケプラ錠500mg (レベチラセタム錠500mg「カイ」へ切替)
- 【般】レベチラセタム錠500mgへ切替)
- 【般】イコサベント酸エチルカプセル300mg (エバデール)
- イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 【後】
- 【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg (エバデール)
 イスコチン原末
 イスコチン錠100mg
- 劇イスツリサ錠1mg [25°C以下]
- イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 【後】
- イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」
 (メニレット70%ゼリー20gから名称変更)
- イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」
 (メニレット70%ゼリー30gから名称変更)
- 【般】イソソルビド経口液70%40mL (イソバイト)
- イソバイトシロップ70%分包20mL
 イソバイトシロップ70%分包30mL
- イソブリノシン錠400mg
- 【般】イモジン・ロジン・バカル配合顆粒4.74g/包 (リックル)
- 一硝酸イソソルビド錠20mg「カイ」 【後】
 (アイトロール錠20mgより切替)
- 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg (アイトロール)

- イトブリド塩酸塩錠50mg「サリ」 【後】
- 【般】 イトブリド塩酸塩錠50mg (ガナトン)
- イトラコナゾール錠50mg「科研」 【後】
- 【般】 イトラコナゾールカプセル50mg (イトリゾール)
- イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 【後】
 - (【般】 イトラコナゾール経口液1%)
- イトリゾールカプセル50mg
 - (【般】 イトラコナゾールカプセル50mg)
 - イトリゾール内用液1%
 - (イトラコナゾール内用液1%「VTRS」へ切替)
- 【般】 イトラコナゾール経口液1% (イトリゾール)
 - 劇イニシント配合錠
 - イノソリッド配合経腸用半固形剤
- イノベロン錠200mg
 - イノラス配合経腸用液(紅茶フレーバー) [125mL/袋]
 - イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) [125mL/袋]
 - イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー) [187.5mL/袋]
 - イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー) [187.5mL/袋]
 - イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー) [187.5mL/袋]
- E-Pヒカブセル250mg【後】
 - (【般】 ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mgへ切替)
 - 劇イフェクサーS Rカプセル37.5mg
 - 劇イフェクサーS Rカプセル75mg
 - 麻劇イーフェンバッカル錠50μg
 - 麻劇イーフェンバッカル錠400μg
 - 麻劇イーフェンバッカル錠600μg
 - 麻劇イーフェンバッカル錠800μg
- イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医王」【後】
- 【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg (セロクラール)
 - イブプロフェン錠100mg「NIG」 【後】 (【般】 なし)
 - 劇イブランス錠25mg
 - 劇イブランス錠125mg
- 劇イマチニブ錠100mg「サリ」 【後】
- 【般】 イマチニブ錠100mg (グリベック)
- 劇イマチニブ錠200mg「明治」【後】
- 【般】 イマチニブ錠200mg (グリベック)
- 劇イミグラン錠50-50mg (【般】 スマトリプタン錠50mgへ切替)
- 【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg (ステーブラOD)
- イミダブリル塩酸塩錠5mg「オーハ」 【後】
- 【般】 イミダブリル塩酸塩錠5mg (タナトリル)
 - 劇イムセラカプセル0.5mg
 - 劇イムブルビカカプセル140mg
 - イムラン錠50mg
 - イメンドカプセル80mg
 - (アブレピタントカプセル80mg「NK」へ切替)
 - (【般】 アブレピタントカプセル80mgへ切替)
 - イメンドカプセル125mg
 - (アブレピタントカプセル125mg「NK」へ切替)
 - (【般】 アブレピタントカプセル125mgへ切替)
- 劇イリボ-OD錠2.5μg
- 劇イリボ-OD錠5μg
- 【般】 イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠4mg (ガスロンN)
- イルトラ配合錠L D
- イルトラ配合錠H D
- 【般】 イルベサルタン・アムロジビン5mg配合錠 (アイミクスL D)
- 【般】 イルベサルタン・アムロジン10mg配合錠 (アイミクスH D)
- イルベサルタン錠100mg「DSPB」 【後】
- 【般】 イルベサルタン錠50mg (アバプロ)
- 【般】 イルベサルタン錠100mg (アバプロ)
- 【般】 イルベサルタン錠200mg (アバプロ)
 - 劇イレッサ錠250-250mg (ゲフィチニブ錠250mg「NK」へ切替)
 - (【般】 ゲフィチニブ錠250mgへ切替)
- 劇インヴェガ錠3mg
- インクレミンシロップ5% 【後】
 - (【般】 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%へ切替)
- 劇インチニブ錠1mg
- 劇インチニブ錠3mg
 - 劇インデラル錠10mg (【般】 プロプラノロール塩酸塩錠10mgへ切替)
- インヒペース錠0.5-0.5mg (【般】 シラザブリル錠0.5mgへ切替)
- 劇インフリーSカプセル200mg
- 劇インプロメン錠1% (【般】 プロムペリドール細粒1%へ切替)
- 劇インプロメン錠1mg (【般】 プロムペリドール錠1mgへ切替)
- 劇インプロメン錠3mg (【般】 プロムペリドール錠3mgへ切替)
 - 劇インライタ錠1mg
 - 劇インライタ錠5mg
- 【ウ】
- 劇ヴァイトラックビカブセル25mg
- 劇ヴァイトラックビカブセル100mg
 - 劇ヴァンフリタ錠17.7mg
 - 劇ヴァンフリタ錠26.5mg
- 劇ウイントミン細粒(10%)
 - 劇ヴォトリエント錠200mg
 - ヴォリプリス錠2.5mg (【般】 アンブリセンタン錠2.5mgへ切替)
 - ウチダのオウギ末M
 - ウチダの八味丸M [20丸/P]
 - ウテメリン錠5mg (【般】 リトドリン塩酸塩錠5mgへ切替)
 - (院内はリトドリン塩酸塩錠5mg「日新」)
 - ウプトライビ錠0.2mg
 - ウプトライビ錠0.4mg
 - 毒ウブレチド錠5mg
 - ウラリット-U配合散 [1g/P]
 - (【般】 ケン酸カリウム・ケン酸ナトリウム配合散 1g/包へ切替)
 - ウラリット配合錠
 - (【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠へ切替)
 - ウリアデック錠40mg
 - ウルグートカプセル200mg
 - ウルソ顆粒5%
 - ウルソ錠100mg (ウルソデオキシコール酸錠100mg「ト-7」へ切替)
 - 【般】 ウルソデオキシコール酸錠100mg
 - ウルソデオキシコール酸錠50mg「ト-7」 【後】
 - 【般】 ウルソデオキシコール酸錠50mg
 - ウルソデオキシコール酸錠100mg「ト-7」 【後】
 - ウロカルン錠225mg
 - 【エ】
 - エカード配合錠L D
 - (【般】 カンデサルタン4mg・ヒドロチアジド配合錠へ切替)
 - エカード配合錠H D
 - (【般】 カンデサルタン8mg・ヒドロチアジド配合錠へ切替)
 - 【般】 エカベトナ-カ-顆粒66.7%-1.5g/包 (ガストロ-ム)
 - 【般】 エキセメスタン錠25mg (アロマシン)
 - エタカ錠50mg (【般】 ピルダグリブチジン錠50mgへ切替)
 - (ピルダグリブチジン錠50mg「ト-7」へ切替)
 - 劇エタセグラン散20% (【般】 ゾニサミド散20%へ切替)
 - 劇エタセグラン錠100mg (【般】 ゾニサミド錠100mgへ切替)

- 劇エクフィナ錠50mg
 劇エクメット配合錠L D
 (院外は【般】ビタミンC 500mg・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠へ切替)
- 劇エクメット配合錠HD
 (院外は【般】ビタミンC 500mg・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠へ切替)
- 劇エサンプトール錠250mg
 劇エジュラント錠25mg
- エヌヨール錠2mg (院内はテモカブリル塩酸塩錠2mg「サリ」)
 (【般】テモカブリル塩酸塩錠2mgへ切替)
- 【般】エスシタロプラム錠10mg (レクサプロ)
- SG配合顆粒 [1g/P]
- エスゾピクロン錠1mg「日新」 【後】
- 【般】エスゾピクロン錠1mg (ルネスタ)
- 【般】エスゾピクロン錠2mg (ルネスタ)
- 向エスタゾラム錠2mg「アリラ」 【後】
- 【般】エスタゾラム錠2mg (ユーロジン)
- 劇エストラサイトカプセル156.7mg 140mg [冷]
- 【般】エストラジオール錠0.5mg (ジュリナ)
- エストリール錠1mg
- 劇エスワンタイホウ配合OD錠T20 【後】 (20mgテガフル相当量)
 (【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠へ切替)
- 劇エスワンタイホウ配合OD錠T25 【後】 (25mgテガフル相当量)
 (【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠へ切替)
- エゼチミブ錠10mg「JG」 【後】
- 【般】エゼチミブ錠10mg (ゼチーア)
- 【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠 (アトゼットLD)
- エソメプラゾールカプセル10mg「トワ」 【後】
- 【般】エソメプラゾールカプセル10mg (ネキシウム)
- エソメプラゾールカプセル20mg「トワ」 【後】
- 【般】エソメプラゾールカプセル20mg (ネキシウム)
- 【般】エチゾラム細粒1% (デパス)
- 向エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 【後】
- 【般】エチゾラム錠0.5mg (デパス)
- 劇エカクスフォージ配合錠
 (【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠へ切替)
- 劇エカクスフォージ配合OD錠
 (院内はアムバロ配合OD錠「トワ」へ切替)
 (【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠へ切替)
- 劇エディヨールカプセル0.75μg
 (【般】エルデカルシトールカプセル0.75μgへ切替)
 (エルデカルシトールカプセル0.75μg「トワ」へ切替)
- 劇エトドラク錠200mg「SW」 【後】
- 【般】エトドラク錠200mg (ハイベン)
- 劇エドルミズ錠50mg
- エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「トワ」 【後】
- 【般】エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg (レニベース)
- エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「トワ」 【後】
- 【般】エナラブリルマレイン酸塩錠5mg (レニベース)
- 劇エナロイ錠2mg
- 劇エナロイ錠4mg
 エネーボ配合経腸用液 [250mL/缶]
- 【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg (エバステル)
- 【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg (エバステル)
- 【般】エバスチン錠10mg (エバステル)
- エバスステル錠10mg (【般】エバスチン錠10mgへ切替)
- エバスステルOD錠5mg (【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- エバスステルOD錠10mg
 (【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- エパデールEMカプセル2g
 ● エパデールカプセル 300mg
 (【般】イコサベント酸エチルカプセル300mgへ切替)
- エパデールS-900 900mg
 (【般】イコサベント酸エチル粒状カプセル900mgへ切替)
- 向エバミール錠1.0 1mg
- エパルレstatt錠50「EK」 50mg 【後】
- エパルレstatt錠50mg「VTRS」 【後】
- 【般】エパルレstatt錠50mg (キネダック)
- エビスタ錠60mg
 (【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mgへ切替)
- エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 【後】
- 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
 劇エピビル錠150 150mg
- エビプロスマット配合錠SG
 (【般】オカゲサウエキ1.0mg・ハコヤキエキ等配合錠へ切替)
- 劇エビリファイ散1% (【般】アリビプラゾール散1%へ切替)
- 劇エビリファイ錠1mg (院内はアリビプラゾール錠1mg「サリ」へ切替)
 (【般】アリビプラゾール錠1mgへ切替)
- 劇エビリファイ錠3mg (【般】アリビプラゾール錠3mgへ切替)
- 劇エビリファイ錠6mg (【般】アリビプラゾール錠6mgへ切替)
- 劇エビリファイ錠12mg (【般】アリビプラゾール錠12mgへ切替)
- 劇エビリファイOD錠24mg
 (【般】アリビプラゾール口腔内崩壊錠24mgへ切替)
- 劇エビリファイ内用液0.1% [1mL/包]
 (【般】アリビプラゾール経口液0.1%1mLへ切替)
- 劇エビリファイ内用液0.1% [3mL/包]
 (【般】アリビプラゾール経口液0.1%3mLへ切替)
- 劇エビリファイ内用液0.1% [6mL/包]
 (【般】アリビプラゾール経口液0.1%6mLへ切替)
- 劇エビリファイ内用液0.1% [12mL/包]
 (【般】アリビプラゾール経口液0.1%12mLへ切替)
- エフィエント錠2.5mg
 エフィエント錠3.75mg
 エフィエントOD錠20mg
- エプロカルーサ配合錠
 覚劇エフピーOD錠2.5 2.5mg
 (【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mgへ切替)
- エフメノカプセル100mg
 エブランチルカプセル15mg
 劇エブリスディドライシロップ60mg [25°C以下]
- 【般】エブレレノン錠25mg (セララ)
- エブレレノン錠50mg「杏林」 【後】
- 【般】エブレレノン錠50mg (セララ)
- エペリゾン塩酸塩錠50mg「トワ」 【後】
- 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg (ミオナール)
- 劇エベレンゾ錠20mg
 劇エベレンゾ錠50mg
- エボザックカプセル30mg
 劇エミレース錠3mg
- 麻劇MSコンチン錠10mg
 ● 麻劇MSコンチン錠60mg
 エリキュース錠2.5mg
 エリキュース錠5mg
 エリスロシンドライシロップW20%
 エリスロシン錠100mg

- エルカルチン F F 錠250mg
(レボカルニチン F F 錠250mg「ト-7」へ切替)
【般】レボカルニチン F F 錠250mgへ切替)
エルカルチン F F 内用液10%
(レボカルニチン F F 内用液10%「ト-7」へ切替)
【般】レボカルニチン F F 経口液10%へ切替)
L-ケフレックス顆粒 [1g/包]
○ エルデカルシトールカプセル0.75 μg「ト-7」 【後】
● 【般】エルデカルシトールカプセル0.75 μg (エディロールカプセル)
● 【般】エルロチニブ錠25mg (タルセバ)
● 【般】エルロチニブ錠100mg (タルセバ)
● 【般】エルロチニブ錠150mg (タルセバ)
エレンタール配合内用剤 [80g/P]
● エレンタール配合内用剤 [80g/グラム容器] (販売中止)
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 [80g/P]
劇塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」
● エンシア・H (バニラ) [250mL/缶]
● エンシア・H (バナナ) [250mL/缶]
エンシア・H (コーヒー) [250mL/缶]
● エンシア・H (黒糖) [250mL/缶]
● エンシア・H (メロン) [250mL/缶]
● エンシア・リキッド [250mL/缶]
○ エンタカボン錠100mg「JG」 【後】
● 【般】エンタカボン錠100mg (コムタン)
● 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg (バラクルード)
○ 劇エンテカビル O D錠0.5mg「サイ」 【後】
劇エンドキサン錠50mg
● エンレスト錠50mg
エンレスト錠100mg
エンレスト錠200mg
【才】
● 【般】オウガ・サウキ1.0mg・ハコヤギ・エキス等配合錠 (エビプロスタット)
● 【般】オキサトミド錠30mg-(セルテクト)-
● 【般】オキサトミドシロップ用2%-(セルテクト)-
○ 麻劇オキシコドン錠2.5mg N X「第一三共」 【後】
(【般】オキシコドン錠2.5mg (乱用防止製剤) へ切替)
○ 麻劇オキシコドン錠5mg N X「第一三共」 【後】
(【般】オキシコドン錠5mg (乱用防止製剤) へ切替)
○ 麻劇オキシコドン錠10mg N X「第一三共」 【後】
(【般】オキシコドン錠10mg (乱用防止製剤) へ切替)
○ 麻劇オキシコドン錠20mg N X「第一三共」 【後】
(【般】オキシコドン錠20mg (乱用防止製剤) へ切替)
● 麻劇 【般】オキシコドン錠2.5mg (乱用防止製剤)
● 麻劇 【般】オキシコドン錠5mg (乱用防止製剤)
● 麻劇 【般】オキシコドン錠10mg (乱用防止製剤)
● 麻劇 【般】オキシコドン錠20mg (乱用防止製剤)
※ 麻劇オキシコドン徐放錠5mg N X「第一三共」 【後】 (【般】なし)
(オキシコンチン T R錠5mgへ切替予定)
※ 麻劇オキシコドン徐放錠10mg N X「第一三共」 【後】 (【般】なし)
(オキシコンチン T R錠10mgへ切替予定)
※ 麻劇オキシコドン徐放錠20mg N X「第一三共」 【後】 (【般】なし)
(オキシコンチン T R錠20mgへ切替予定)
※ 麻劇オキシコドン徐放錠40mg N X「第一三共」 【後】 (【般】なし)
(オキシコンチン T R錠40mgへ切替予定)
● 麻劇 【般】オキシコドン経口液2.5mg (オキシコドン内服液)
● 麻劇 【般】オキシコドン経口液5mg (オキシコドン内服液)
● 麻劇 【般】オキシコドン経口液10mg (オキシコドン内服液)
● 麻劇 【般】オキシコドン経口液20mg (オキシコドン内服液)
○ 麻劇オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」 2.5mL/包 【後】
(【般】オキシコドン経口液2.5mgへ切替)
● 麻劇オキシコドン内服液5mg「日本臓器」 2.5mL/包 【後】
(【般】オキシコドン経口液5mgへ切替)
● 麻劇オキシコドン内服液10mg「日本臓器」 5mL/包 【後】
(【般】オキシコドン経口液10mgへ切替)
● 麻劇オキシコドン内服液20mg「日本臓器」 5mL/包 【後】
(【般】オキシコドン経口液20mgへ切替)
→ 麻劇オキシコンチン T R錠5mg (【般】なし)
(オキシコドン徐放錠5mg NX「第一三共」が無くなり次第切替)
→ 麻劇オキシコンチン T R錠10mg (【般】なし)
(オキシコドン徐放錠10mg NX「第一三共」が無くなり次第切替)
→ 麻劇オキシコンチン T R錠20mg (【般】なし)
(オキシコドン徐放錠20mg NX「第一三共」が無くなり次第切替)
→ 麻劇オキシコンチン T R錠40mg (【般】なし)
(オキシコドン徐放錠40mg NX「第一三共」が無くなり次第切替)
● 【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg (ポラキス)
● 【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg (ポラキス)
● 麻劇オキノーム散2.5mg (院内はオキシドン錠2.5mg N X「第一三共」)
● 麻劇オキノーム散5mg (院内はオキシドン錠5mg N X「第一三共」)
● 麻劇オキノーム散10mg (院内はオキシドン錠10mg N X「第一三共」)
● 麻劇オキノーム散20mg (院内はオキシドン錠20mg N X「第一三共」)
オーゲメンチン配合錠250RS
● オ-ズギ 桂枝加苓朮湯エキス G [3.0g]SG-18R
オ-ズギ 小半夏加茯苓湯エキス G [1.0g]SG-21
オ-ズギ 大黃甘草湯エキス T錠 [2錠/P]SG-84T
● オスピロット錠50mg
● オゼックス細粒小児用15% 150mg/g
(【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%へ切替)
● オゼックス錠150 150mg
(【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mgへ切替)
○ オセルタミビルカプセル75mg「サイ」 【後】
● 【般】オセルタミビルカプセル75mg (タミフル)
● 【般】オセルタミビルシロップ用3% (タミフル)
● 劇オダイン錠125mg (【般】フルタミド錠125mgへ切替)
● 劇オテズラ錠10mg
● 劇オテズラ錠20mg
● 劇オテズラ錠30mg
劇オデフシ配合錠
オノンドライシロップ10%
(プランルカスト ドライシロップ10%「AFP」へ切替)
(【般】プランルカストシロップ用10%へ切替)
● オノンカプセル112.5mg
(院内はプランルカストカプセル112.5mg「サイ」)
(【般】プランルカストカプセル112.5mgへ切替)
● オペルモジ錠5μg
(【般】リマプロストアルファデクス錠5μgへ切替)
劇オフェブカプセル100mg
劇オフェブカプセル150mg
劇オプスマット錠10mg
● 麻劇オブソ内服液5mg [2.5mL/P]
● 麻劇オブソ内服液10mg [5mL/P]
劇オペブリム 1カプセル500mg
○ オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ト-7」 【後】
● 【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g (ロトリガ)
● 【般】オメブロゾール錠10mg (オメブロール)
● オメブロゾール腸溶錠20mg「武田ガル」 【後】
● 【般】オメブロゾール錠20mg (オメブロール)

- オメプラゾン錠10mg（【般】オメプラゾール錠10mgへ切替）
- オメプラゾン錠20mg（【般】オメプラゾール錠20mgへ切替）
オラベネム小児用細粒10% 100mg/g
- 【般】オランザピン細粒1%（ジプレキサ）
○劇オランザピン錠2.5mg「アエル」 【後】
- 【般】オランザピン錠2.5mg
○劇オランザピンOD錠5mg「ト-7」 【後】
- 【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg
- 【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mg（ジプレキサ）
劇オルケディア錠1mg
- 劇オルケディア錠4mg
- 劇オルミエント錠2mg
劇オルミエント錠4mg
- オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 【後】
- 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg（オルメテック）
- 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg（オルメテック）
- 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg（オルメテック）
- 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg（オルメテック）
- オルメテックOD錠5mg
- オルメテックOD錠10mg
- オルメテックOD錠20mg
(院内はオルメサルタンOD錠20mg「DSEP」)
- オルメテックOD錠40mg
- 【般】オバタジン塩酸塩顆粒0.5% 2.5mg/0.5g（包）（アレロック）
- オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「ト-7」 【後】
- 【般】オロバタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg（アレロック）
- オンダリザ錠2.5mg（【般】サキサグリブチン錠2.5mgへ切替）
- オンダリザ錠5mg（【般】サキサグリブチン錠5mgへ切替）
劇オンジエンティス錠25mg
- 【カ】
劇カイトリル錠1mg
ガスヨン錠40mg（ジメチコン錠40mg「YD」へ切替）
(【般】ジメチコン錠40mgへ切替)
ガスコンドロップ内用液2%
(【般】ジメチコンシロップ2%へ切替)
- ガスター散2% [10mg/0.5g]（院内はファモチジン散2%「ト-7」）
(【般】ファモチジン散2% 0.5g/包へ切替)
- ガスターOD錠10mg（院内はファモチジンOD錠10mg「ト-7」）
(【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- ガスターOD錠20mg（院内はファモチジンOD錠20mg「ト-7」）
(【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mgへ切替)
ガストログラフイン経口・注腸用 [100mL]
- ガストロゼビン錠25mg
(【般】ピレンゼビン塩酸塩錠25mgへ切替)
ガストロ-ム顆粒66.7% [1.5g/P]
(【般】エカベトN-a顆粒66.7% 1.5g/包へ切替)
- ガスマチン錠5mg（院内はモサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」）
- ガスロノンOD錠4mg
(【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠4mgへ切替)
劇カソデックスOD錠80mg（ピカルタミドOD錠80mg「ト-7」へ切替）
(【般】ピカルタミド口腔内崩壊錠80mgへ切替)
カタプレス錠75μg
カチーフN散10mg/g
- 劇カデュエット配合錠2番
(【般】アロジビン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：2へ切替)
劇カデュエット配合錠4番
(【般】アロジビン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：4へ切替)

- カナダル錠100mg
カナグロOD錠100mg
- ガナトナ錠50mg（院内はイトブリド塩酸塩錠50mg「サイ」）
(【般】イトブリド塩酸塩錠50mgへ切替)
カナマイシンカプセル250mg「明治」
 - ※ カナリア配合錠（カナリア配合OD錠へ切替予定）
→ カナリア配合OD錠（カナリア配合錠が無くなり次第切替）
カーバゲル分散錠200mg
 - 劇カバサール錠0.25mg（【般】なし）
 - 劇カバサール錠1.0mg（院内はカベレゴリン錠1.0mg「サイ」）
ガバベン錠200mg
 - ガバベン錠300mg
カプセル（0号）
カプセル（1号）
カプセル（2号）
カプセル（3号）
カプセル（5号）
カプトリル錠12.5mg
 - カプトリル-Rカプセル18.75mg
劇カブレラ錠100mg
 - 劇カペシタビン錠300mg「サイ」 【後】
 - 【般】カペシタビン錠300mg（ゼローダ）
 - 【般】カベレゴリン錠0.25mg（カバサール）
劇カベレゴリン錠1.0mg「サイ」 【後】（【般】なし）
 - 【般】カベレゴリン錠1mg（カバサール）
劇カボメティクス錠20mg
劇カボメティクス錠60mg
 - 劇カムザイオスカプセル1mg
劇カムザイオスカプセル2.5mg
 - 劇カムザイオスカプセル5mg
○ カモスタットメシル酸塩錠100mg「ト-7」 【後】
 - 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg（フオイパン）
 - ガランターゼ散50% [0.5g/P]
● 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg（レミニールOD）
 - 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg（レミニールOD）
 - 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg（レミニールOD）
 - 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位（カルナクリン）
カリメート散 [5g/P]
 - カリメートドライシロップ92.59% [5.4g/P]
 - カリメート経口液20% [25g/P]（【般】なし）
カルダート錠10-10mg（【般】デノパミン錠10mgへ切替）
(院内はデノパミン錠10mg「日医工」)
- ※劇カルケンスカプセル100mg（カルケンス錠100mgへ切替予定）
→劇カルケンス錠100mg
(カルケンスカプセル100mgが無くなり次第切替)
- 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg（ロカルトロール）
 - 劇カルスロット錠10-10mg（【般】マニジビン塩酸塩錠10mgへ切替）
 - 【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg（ミケラン）
 - カルデナリンOD錠1mg（院内はドキサゾシン錠1mg「サベ」）
 - カルデナリンOD錠4mg（院内はドキサゾシン錠4mg「サベ」）
カルナクリン錠50-50単位
(【般】カリジノゲナーゼ錠50単位へ切替)
 - 【般】カルバゾクロムスルホン酸N-a散10%（アドナ）
 - カルバゾクロムスルホン酸N-a錠30mg「YD」 【後】
 - 【般】カルバゾクロムスルホン酸N-a錠30mg（アドナ）
→ カルバマゼビン細粒50%「アエル」
(テグレトール細粒50%（供給停止）が無くなり次第使用開始)
 - 【般】カルバマゼビン細粒50%（テグレトール）

- 【般】カルバマゼピン錠100mg（テグレトール）
- 【般】カルバマゼピン錠200mg（テグレトール）
- カルプロツカ錠16mg（院内はアゼルニジピン錠16mg「トワ」）
(【般】アゼルニジピン錠16mgへ切替)
- カルベジロール錠2.5mg「トワ」【後】
- 【般】カルベジロール錠2.5mg（アーチスト）
- カルベジロール錠10mg「トワ」【後】
- 【般】カルベジロール錠10mg（アーチスト）
- カルボシスティンD S 50%「トワ」【後】
- 【般】カルボシスティンシロップ用50%（ムコダイン）
- カルボシスティン錠250mg「トワ」【後】
- 【般】カルボシスティン錠250mg（ムコダイン）
- カルボシスティンシロップ小児用5%「トワ」【後】
- 【般】カルボシスティンシロップ5%
カルメロースナトリウム原末「マルイ」（院内製剤原料）
- 劇カレトラ配合錠
劇カログラ錠120mg
劇カロナール細粒50%【後】（【般】なし）
- 劇カロナール錠300-300mg【後】
(【般】アセトアミノフェン錠300mgへ切替)
- 劇カロナールシロップ2%【後】
(【般】アセトアミノフェンシロップ2%へ切替)
- カロリールゼリ-40.496%-16.05g[ラクトースとして6.5g含有]【後】
- 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒
- 【般】カンデサルタン錠2mg（プロプレス）
- カンデサルタン錠4mg「あすか」【後】
- 【般】カンデサルタン錠4mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン錠8mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン錠12mg（プロプレス）
- 【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠（ユニシアLD）
- 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠（ユニシアHD）
- 【般】カンデサルタン4mg・ヒドロキシアルギド配合錠（エカードLD）
- 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロキシアルギド配合錠（エカードHD）
- 【キ】
キシロカインビスカス2% [100mL]
キックリン顆粒86.2%
- キックリンカプセル250mg
- キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」
キプレス細粒4mg [4mg/P]
(【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包へ切替)
- キプレスチアブル錠5mg
(院内はモンテルカストチアブル錠5mg「トワ」へ切替)
(【般】モンテルカストチアブル錠5mgへ切替)
- キプレス錠5mg（【般】モンテルカスト錠5mgへ切替）
- キプレス錠10mg（【般】モンテルカスト錠10mgへ切替）
- キプレスO-D錠10mg（院内はモンテルカストO D錠10mg「カロ」）
(【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mgへ切替)
- ギボンズ錠1mg【後】（【般】チザニジン錠1mgへ切替）
劇ギャバロン錠10mg
キャブピリン配合錠
- 【般】球形吸着炭カプセル200mg（タレメジン）
- 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 [2g/P]【後】
- 【般】球形吸着炭細粒 2g/包（クレメジン）
- 【ク】
● 【般】クアゼバム錠15mg（ドラール）
- 【般】クエチアピン細粒50%（セロクエル）
- 劇クエチアピン錠12.5mg「アメル」【後】
- 【般】クエチアピン錠12.5mg（セロクエル）

- 劇クエチアピン錠25mg「アメル」【後】
- 【般】クエチアピン錠25mg（セロクエル）
- 劇クエチアピン錠100mg「アメル」【後】
- 【般】クエチアピン錠100mg（セロクエル）
- 【般】クエチアピン錠200mg（セロクエル）
- 【般】ケン酸カリウム・ケン酸ナトリウム配合散 1g/包（ウラリットU）
- 【般】ケン酸カリウム・ケン酸ナトリウム配合錠（ウラリット）
- ケン酸第一鉄N-α錠50mg「カロ」【後】
- 【般】ケン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）（フェロミア）
ケン酸ナトリウム末
ケーピビック錠25mg
- ケーピビック錠50mg
グーフィス錠5mg
グラクティブ錠12.5mg
- グラクティブ錠25mg
グラクティブ錠50mg
- グラクティブ錠100mg
グラケーカプセル15mg
(【般】メナテトレノンカプセル15mgへ切替)
- クラシ加味帰脾湯エキス細粒 [2.5g] EK-49
クラシ桂枝茯苓丸料エキス細粒 [2.0g] EK-25
クラシ神秘湯エキス細粒 [2.0g] EK-85
- クラシ大柴胡湯エキス細粒 [2.0g] EK-8
クラシ人參養榮湯エキス細粒 [2.5g] EK-108
- 劇グラセプターカプセル0.5mg
- 劇グラセプターカプセル1mg
- クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg/g
- クラビット錠250mg（【般】レボフロキサシン錠250mgへ切替）
- クラビット錠500mg（院内はレボフロキサシン錠500mg「カロ」）
(【般】レボフロキサシン錠500mgへ切替)
- グラマリール細粒10%（【般】チアブリド塩酸塩細粒10%へ切替）
- グラマリール錠25mg（【般】チアブリド塩酸塩錠25mgへ切替）
グラマリール錠50mg（チアブリド錠50mg「カロ」へ切替）
(【般】チアブリド塩酸塩錠50mgへ切替)
グラリシッド錠50mg小児用
(グラリシッド錠50mg小児用「大正」へ切替)
- 【般】グラリシッド錠50mg（グラリシッド、グラリス）
- クラリシッド錠200mg（院内はクラリスロマイシン錠200mg「トワ」）
- クラリス錠200-200mg
クラリスロマイシンD S 小児用10%「カロ」【後】（【般】なし）
- クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」【後】
(【般】なし)
- クラリスロマイシン錠200mg「トワ」【後】（【般】なし）
- クラリチンドライシロップ1%-[5mg/0.5g/P]
(【般】ロラタジンシロップ用1% 0.5g (包)へ切替)
- クラリチジン錠10mg（【般】ロラタジン錠10mgへ切替）
- グランダキシン錠50-50mg（【般】トフィソバム錠50mgへ切替）
- 劇クリアミン配合錠 S 0.5
- クリナール錠200mg
- 【般】グリクラジド錠20mg（グリミクロン）
- 【般】グリクラジド錠40mg（グリミクロン）
グリチロン配合錠
- クリノリル錠100 100mg
劇ダリベック錠100mg（イマチニブ錠100mg「カロ」へ切替）
(【般】イマチニブ錠100mgへ切替)
- 【般】グリベンクラミド錠1.25mg（ダオニール）
- 【般】グリベンクラミド錠2.5mg（ダオニール）
- 劇ダリミクロンH A錠20mg（【般】グリクラジド錠20mgへ切替）
- 劇ダリミクロン錠40mg（【般】グリクラジド錠40mgへ切替）

○劇グリメピリド錠1mg「トワ」 【後】 (【般】なし)

- 【般】グリメピリド錠0.5mg (アマリール)
- 【般】グリメピリド錠3mg (アマリール)
- デルコバイ錠50mg (【般】アカルボース錠50mgへ切替)
- デルコバイ錠100mg (【般】アカルボース錠100mgへ切替)
- グルコンサンK細粒4mEq/g [1g/P]
- 【般】グルタチオン錠100mg (タチオン)
- デルフテスト錠10mg (【般】ミチグリニドC a錠10mgへ切替)
- グルベス配合錠

グルベス配合OD錠

タレスナルOD錠2.5mg (販売中止)

(2026年3月31日経過措置終了)

(院内はロスバスタチンOD錠2.5mg「サウイ」)

(【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mgへ切替)

- タレスナル錠5mg (【般】ロスバスタチン錠5mgへ切替)
グレースピット錠50mg (シタフロキサシン錠50mg「サウイ」へ切替)

●劇クレセンバカブセル40mg

劇クレセンバカブセル100mg

- 【般】クレマスチンシロップ用0.1% (テルギンG)

○劇クレマスチンDS 0.1%「タタ」 【後】

(テルギンGドライシロップ0.1%より名称変更)

●劇クレミン錠25mg

- クレメジン細粒分包2g (院内は球形吸着炭細粒分包2g「日医工」)
(【般】球形吸着炭細粒 2g/包へ切替)

● クレメジン速崩錠500mg

- 【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg (スピロベント)

劇クロザリル錠25mg

劇クロザリル錠100mg

○向クロチアゼパム錠5mg「サウイ」 【後】

- 【般】クロチアゼパム錠5mg

● 【般】クロビドグレル・アスピリン配合錠 (コンプラビン配合錠)

- 【般】クロビドグレル錠25mg (プラビックス)

○クロビドグレル錠75mg「トワ」 【後】

- 【般】クロビドグレル錠75mg (プラビックス)

●クロフェクトン顆粒10%

●クロフェクトン錠10mg

●クロフェクトン錠25mg

クロミッド錠50mg

○d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 【後】

- 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg (ポララミン)

○クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 【後】

(プロスター錠25から切替)

- 【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg (プロスター)

【ケ】

- 劇ケアラム錠25mg (【般】イグラチモド錠25mgへ切替)

劇ケアロードLA錠60μg

ケイキサレートドライシロップ76% [3.27g/P]

- ケイツーカブセル5mg

ケイツーシロップ0.2% [1mL/P]

ケタスカブセル10mg

- 【般】ケトチフェンカブセル1mg (ザジテン)

○ケトチフェンDS 小児用0.1%「サウイ」 【後】

- 【般】ケトチフェンシロップ用0.1% (ザジテン)

○劇ゲフィチニブ錠250mg「NK」 【後】

- 【般】ゲフィチニブ錠250mg (イレッサ)

ケフラー細粒小児用100mg

- ケルロング錠10mg (【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mgへ切替)

ケレンディア錠10mg

ケレンディア錠20mg

- ケーワン錠5mg (【般】フィトナジオン錠5mgへ切替)

劇ゲンボイヤ配合錠

【コ】

- コスパノンカブセル40mg

●劇コセルゴカブセル10mg

- 劇コセルゴカブセル25mg

コロ-葛根湯加辛夷川芎エキス細粒 [3.0g]N2

コロ-桔梗石膏エキス細粒 [2.0g]N324

コロ-九味欒榔湯エキス細粒 [2.0g]N311

コロ-柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 [2.5g]N12

コロ-柴胡清肝湯エキス細粒 [3.0g]N80

- コロ-梔子柏皮湯エキス細粒 [2.0g]N314

コロ-大柴胡湯去大黃エキス細粒 [3.0g]N319

コロ-腸癰湯エキス細粒 [2.0g]N320

コロ-半夏白朮天麻湯エキス細粒 [3.0g]N37

- コディオ配合錠E-X

(【般】バルサルタム・ヒドロキシアルド 12.5mg配合錠へ切替)

劇コデインリン酸塩散1%「エイ」

麻劇コデインリン酸塩散10%「タタ」

コートリル錠10mg

- コートン錠25mg

●劇コニール錠4mg (院内はベニジピン塩酸塩錠4mg「トワ」)

(【般】ベニジピン塩酸塩錠4mgへ切替)

- ※ コバシル錠4mg (販売中止)

(【般】ペリンドブリエルブミン錠4mgへ切替)

ヨムタム錠100mg (エンタカボン錠100mg「JG」へ切替)

ヨメリアンコーワ錠 50mg (ジラゼブ塩酸塩錠50mg「トワ」へ切替)

- ヨメリアンコーワ錠 100mg (ジラゼブ塩酸塩錠100mg「トワ」へ切替)

劇コララン錠2.5mg

- 劇コララン錠5mg

- 劇コララン錠7.5mg

劇コルヒチン錠0.5mg「タタ」

- コレチメント錠9mg

- コレバイン錠500mg

- コレバインミニ83% [1.81g/P]

向劇コンサータ錠18mg

- 向劇コンサータ錠27mg

コントミン糖衣錠12.5mg

- コンプラビン配合錠 (【般】なし)

(【般】クロビドグレル・アスピリン配合錠へ切替)

【サ】

サアミオニ錠5mg (院内はニセルゴリン錠5mg「トワ」へ切替)

(【般】ニセルゴリン錠5mgへ切替)

劇ザイアジエン錠300mg

サイクロセリンカブセル250mg「明治」

サイザル錠5mg (レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」へ切替)

(【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mgへ切替)

サイザルシロップ0.05%

(レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トワ」へ切替)

(【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%へ切替)

劇ザイティガ錠250mg

- 劇ザイティガ錠500mg

劇サイトテック錠100 100μg

- 劇サイバインコ錠50mg
- 劇サイバインコ錠100mg
- 劇サイバインコ錠200mg
ザイボックス錠600mg (【般】リネゾリド錠600mgへ切替)
- 向サイレース錠1mg (フルニトラゼパム錠1mg「アル」へ切替)
(【般】フルニトラゼパム錠1mgへ切替)
劇サインバルタカプセル20mg
(院内はデュロキセチンOD錠20mg「エ」へ切替)
(【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mgへ切替)
- 【般】サキサグリピチン錠2.5mg (オングリザ)
- 【般】サキサグリピチン錠5mg (オングリザ)
- 劇酢酸亜鉛顆粒5%「サイ」 【後】
- 劇【般】酢酸亜鉛顆粒5% (ノベルジン)
- 劇酢酸亜鉛錠25mg「サイ」 【後】
- 劇【般】酢酸亜鉛錠25mg (ノベルジン)
- 劇【般】酢酸亜鉛錠50mg (ノベルジン)
劇ザクラス配合錠H-D
劇ザクラス配合錠H-D (院内はジルムロ配合錠HD「武田テ」へ切替)
- 劇ザーコリカプセル200mg
劇ザーコリカプセル250mg
ザジテンドライシロップ0.1%
(ケトチフェンDS小児用0.1%「サイ」へ切替)
- ザジテンカプセル1mg (【般】ケトチフェンカプセル1mgへ切替)
劇サーティカン錠0.25mg
- 劇サーティカン錠0.5mg
- 向劇サノレックス錠0.5mg
ザファテック錠100mg
劇サブリル散分包500mg [500mg/P]
劇サムスカ顆粒1% (【般】トルバプタン顆粒1%へ切替)
- ※劇サムスカOD錠7.5mg
(トルバプタンOD錠7.5mg「オツカ」へ切替予定 (適応が揃い次第))
(【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mgへ切替)
- 劇サムスカOD錠15mg
(【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mgへ切替)
劇サムスカOD錠30mg
サムチレール内用懸濁液15% [5mL/P]
- 劇サラジエン顆粒0.5% [5mg/1g/P]
劇サラジエン錠5mg
●【般】サラゾスルファビリジン錠500mg (サラゾビリン)
●サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」 【後】
●【般】サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg (アザルフィジンEN)
●サラゾビリン錠500mg
●ザルティア錠2.5mg (【般】タダラフィル錠2.5mg: Z Aへ切替)
ザルティア錠5mg (【般】タダラフィル錠5mg: Z Aへ切替)
●【般】ザルトプロフェン錠80mg (ペオン錠80mg)
サルプレップ配合内用液 480mLV
○サルボグレート塩酸塩錠50mg「トワ」 【後】
●【般】サルボグレート塩酸塩錠50mg (アンプラーグ)
●【般】サルボグレート塩酸塩錠100mg (アンプラーグ)
毒サレドカプセル25 25mg
毒サレドカプセル100 100mg
●ザロンチンシロップ5%
●サワシリソカプセル250-250mg
(院内はアモキシシリソカプセル250mg「日医工」)
(【般】アモキシシリソカプセル250mgへ切替)
酸化マグネシウム原末「マルイ」
●【般】酸化マグネシウム錠250mg
- 酸化マグネシウム錠330mg「ケイ-」 【後】
●【般】酸化マグネシウム錠330mg
●【般】酸化マグネシウム錠500mg
●サンバゼン錠50mg 【後】
(【般】エペリゾン塩酸塩錠50mgへ切替)
- 劇サンリズムカプセル50mg
(院内はピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トワ」)
(【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mgへ切替)
三和 黄芩湯エキス細粒 [2.5g]S-35
三和 葛根加朮附湯エキス細粒 [2.5g]S-10
劇三和 桂芍知母湯エキス細粒 [3.0g]S-10
劇三和 附子理中湯エキス細粒 [1.5g]S-09
- 【シ】
- 向ジアゼパム錠2mg「アル」 【後】
●【般】ジアゼパム錠2mg (セルシン)
●【般】ジアゼパム錠5mg (セルシン)
劇シアナマイド内用液1%「タベ」 [100mL] 【冷】
●シアリス錠10mg
[男性不妊の治療目的で処方された場合のみ保険適用]
劇ジエイゾロフト錠25mg (院内はセルトラリン錠25mg「アル」)
(【般】セルトラリン錠25mgへ切替)
- 劇ジエイゾロフト錠50mg (【般】セルトラリン錠50mgへ切替)
- 劇ジエセリ錠40mg
ジェニナック錠200mg
- ジエノゲスト錠0.5mg「モチ」 【後】
●【般】ジエノゲスト錠0.5mg (ディナゲスト)
●【般】ジエノゲスト錠1mg (ディナゲスト)
●ジェミーナ配合錠
- 劇ジオトリフ錠20mg
劇ジオトリフ錠30mg
劇ジオトリフ錠40mg
劇ジカディア錠150mg
●シグマト錠5mg (院内はニコランジル錠5mg「サイ」)
(【般】ニコランジル錠5mgへ切替)
- 劇シクレスト舌下錠5mg
劇シクレスト舌下錠10mg
- 劇シクロスボリン細粒17%「タバ」 【後】
●【般】シクロスボリン細粒17%
- 劇シクロスボリンカプセル10mg「トワ」 【後】
●【般】シクロスボリンカプセル10mg: N E (ネオーラル)
○劇シクロスボリンカプセル25mg「トワ」 【後】
●【般】シクロスボリンカプセル25mg: N E (ネオーラル)
○劇シクロスボリンカプセル50mg「トワ」 【後】
●【般】シクロスボリンカプセル50mg: N E (ネオーラル)
●【般】ジクロフェナクN a徐放カプセル37.5mg (ポルタレンSR)
○劇ジクロフェナクN a錠25mg「トワ」 【後】
●【般】ジクロフェナクN a錠25mg (ポルタレン)
劇ジゴシン散0.1%
劇ジゴシン錠0.25mg
劇ジゴシンエリキシル0.05mg/mL
- 劇ジスバルカプセル40mg
ジスロマック細粒小児用10%
(【般】アジスロマイシン細粒10%へ切替)
●ジスロマック錠250mg (【般】アジスロマイシン錠250mgへ切替)
- 劇ジセレカ錠100mg
●劇ジセレカ錠200mg
●【般】ジソビラミドカプセル50mg (リスモダン)
●【般】ジソビラミドリン酸塩徐放錠150mg (リスモダンR)

- シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
- シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
- シタフロキサシン錠50mg「サリ」 【後】 (【般】なし)
- 【般】シタフロキサシン錠50mg (グレースピット)
シナール配合顆粒 [1g/P]
(【般】アコビン酸・バントン酸C a配合顆粒 1g/包へ切替)
- ジビリダモール散12.5%「JG」 【後】
- 【般】ジビリダモール散12.5% (アンギナール)
- ジビリダモール錠25mg「トワ」 【後】
- 【般】ジビリダモール錠25mg (ペルサンチン)
- ジビリダモール錠100mg「トワ」 【後】
- 【般】ジビリダモール錠100mg (ペルサンチン)
- ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」 【後】
- ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ナメ」 【後】
(ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」へ名称変更)
- 【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg (セファドール)
- ジフルカンカプセル100mg
(【般】フルコナゾールカプセル100mgへ切替)
- 劇ジプレキサ細粒1%
(【般】オランザピン細粒1%へ切替)
- 劇ジプレキサザイディス錠5mg (院内はオランザピンOD錠5mg「トワ」)
(【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- 劇ジプレキサザイディス錠10mg
(【般】オランザピン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
シベクトロ錠200mg
- 劇シベノール錠50mg (院内はシベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トワ」)
- 劇シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トワ」 【後】
(販売中止) (2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg (シベノール)
- 【般】ジメチコンシロップ2% (ガスコン)
- ジメチコン錠40mg「YD」 【後】
- 【般】ジメチコン錠40mg (ガスコン)
- 【般】ジメチジン錠200mg (タガメット)
- 【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25% (アストミシロップ)
劇ジャカビ錠5mg
劇ジャカビ錠10mg
劇ジャカビ内用液小児用0.5% [2~8°C]
ジャディアنس錠10mg
- ジャディアنس錠25mg
劇ジャドニユ顆粒分包90mg (【般】デフェラシロックス顆粒90mgへ切替)
劇ジャドニユ顆粒分包360mg (【般】デフェラシロックス顆粒360mgへ切替)
ジャスビア錠12.5mg (グラクティブ錠12.5mgへ切替)
- ジャスピア錠25mg
ジャスビア錠50mg (グラクティブ錠50mgへ切替)
- 劇ジャルカ配合錠
臭化カリウム「ヤマゼン」
ジュリナ錠0.5mg (【般】エストラジオール錠0.5mgへ切替)
- ジュコウ四物湯FCエキス細粒医療用 [2.5g]FC71
- 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg (ニトロールR)
- 【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg (フランドル錠)
- 小児用ムコソルバシシロップ0.3%
(【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3%へ切替)
- 【般】シラザブリル錠0.5mg (インヒベース)
- 【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg (コメリアンコーワ)
- 【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mg (コメリアンコーワ)
- ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サリ」 【後】
- 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg (ヘルベッサーR)

- ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トワ」 【後】
- 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg (ヘルベッサー)
- ジルテック錠10~10mg (販売中止)
(【般】セチリジン塩酸塩錠10mgへ切替)
- 【般】シルデナフィル錠20mg : R E (レバチオ)
- シルニジピン錠10mg「JG」 【後】
(【般】シルニジピン錠10mgへ切替)
- 【般】シルニジピン錠10mg (アテレック錠)
- 【般】シルニジピン錠20mg (アテレック錠)
- 劇ジルムロ配合錠HD「武田ガバ」 【後】
(ザクラス配合錠HDから切替)
- 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg (プレタール)
- シロスタゾールOD錠50mg「サリ」 【後】
- シロスタゾールOD錠100mg「サリ」 【後】
(シロスタゾールOD錠50mg「サリ」へ切替)
- 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg (プレタール)
- 【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg (ユリーフOD)
- 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg (ユリーフOD)
- シングレア細粒4mg [4mg/P]
(【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包へ切替)
- シングレアチアブル錠5mg
(【般】モンテルカストチアブル錠5mgへ切替)
- シングレア錠10mg (【般】モンテルカスト錠10mgへ切替)
- 劇ジンタス錠50mg
- シンバスタチン錠5mg「アメ」 【後】
- 【般】シンバスタチン錠5mg (リボバス)
- シンメト렐細粒10% (【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%へ切替)
シンメト렐錠50mg (アマンタジン塩酸塩錠50mg「サリ」へ切替)
(【般】アマンタジン塩酸塩錠50mgへ切替)
- 【ス】
膀外分泌機能検査用P-F-D内服液500mg 5% [10mL/瓶]
- スイニー錠100mg
スインプロイク錠0.2mg
- スオード錠100 100mg
スーグラ錠50mg
- スクランファート内用液10%「NIG」 [10mL/P] 【後】
- 【般】スクランファート経口液10%
スージャヌ配合錠
- スターシス錠30mg (【般】なし) (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了)
- スターシス錠90mg (【般】ナテグリニド錠90mgへ切替) (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了)
- 劇スタラシドカプセル50 50mg
- スタレボ配合錠L 50
- スタレボ配合錠L 100
- 劇スチバーガ錠40mg
- ステーブラOD錠0.1mg
(【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mgへ切替)
- 劇スチートカプセル12.5mg (【般】スニチニブカプセル12.5mgへ切替)
劇ストックリン錠200mg
ストミンA配合錠
- 劇ストラテラカプセル5mg (【般】アトモキセチンカプセル5mgへ切替)
- 劇ストラテラカプセル10mg (【般】アトモキセチンカプセル10mgへ切替)
劇ストラテラカプセル25mg (【般】アトモキセチンカプセル25mgへ切替)
- 劇ストラテラカプセル40mg (【般】アトモキセチンカプセル40mgへ切替)
- 劇ストラテラ内用液0.4% (【般】アトモキセチン経口液0.4%へ切替)
ストロカイン錠5mg
- 劇ストロメクトール錠3mg

- 【般】スニチニブカプセル12.5mg (ステント)
スピラマイシン錠150万単位「サノワイ」
- スピロノラクトン錠25mg「トワ」 【後】
- 【般】スピロノラクトン錠25mg (アルダクトン)
スピロペント錠10μg (【般】クレソ⁺テロール塩酸塩錠10μgへ切替)
- ズファジラン錠10mg
- 【般】スプラタストリル酸塩カプセル100mg (I-P-D)
劇スプリセル錠20mg (ダサチニブ錠20mg「NK」へ切替予定)
(【般】ダサチニブ錠20mgへ切替)
劇スプリセル錠50mg (ダサチニブ錠50mg「NK」へ切替予定)
(【般】ダサチニブ錠50mgへ切替)
- 劇スマイラフ錠50mg
- 劇スマイラフ錠100mg
- 【般】スマトリプタン錠50mg (イミグラン)
○ 劇スルピリド細粒50%「アメル」 【後】 (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】スルピリド細粒50% (ドグマチール)
- スルピリド錠50mg「アメル」 【後】
- 【般】スルピリド錠50mg (ドグマチール)
- 【般】スルピリド錠100mg (ドグマチール)
- 【般】スルピリド錠200mg (ドグマチール)
【セ】
セイブル錠50mg (院内はミグリトール錠50mg「トワ」)
(【般】ミグリトール錠50mgへ切替)
- セキソビット錠100mg
劇ゼジュー錠100mg
- ゼスラン小児用シロップ0.03%
- セタブリル錠25mg (【般】アラセブリル錠25mgへ切替)
ゼチ⁺ア錠10mg (エゼチミブ錠10mg「JG」へ切替)
(【般】エゼチミブ錠10mgへ切替)
- 【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mg (テシプール錠)
- 【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%
- 【般】セチリジン塩酸塩錠10mg (ジルテック)
劇セディール錠10mg (院内はタンドスピロキシ⁺酸塩錠10mg「トワ」)
(【般】タンドスピロロンクエン酸塩錠10mgへ切替)
- 劇セディール錠20mg (【般】タンドスピロキシ⁺酸塩錠20mgへ切替)
向セニラン錠2mg 【後】 (プロマゼバム錠2mg「サド」へ名称変更)
(【般】プロマゼバム錠2mgへ切替)
- 向セバゾン錠1 1mg
○ 劇セバミット細粒1% [10mg/1g/P] 【後】
(2023年3月現在,出荷停止)
(【般】ニフェジビン細粒1% 10mg/1g (包) へ切替)
- セファドール錠25mg (院内はジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」)
(【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mgへ切替)
- セファランチン末1%
劇ゼフィックス錠100 100mg
- セフカベン⁺ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 【後】 (【般】なし)
- 【般】セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg (フロモックス)
- 【般】セフジニル細粒10% (セフゾン)
セフゾン細粒小児用10%—100mg/g
- セフゾンカプセル100mg (【般】加算なし)
- 【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5% (バナンD.S.)
- 劇ゼボジアカプセル0.92mg
劇ゼボジアカプセルラスター⁺パック
劇セムブリックス錠20mg [25°C以下]
劇セムブリックス錠40mg [25°C以下]
- セララ錠25mg (【般】エプレレノン錠25mgへ切替)
セララ錠50mg (エプレレノン錠50mg「杏林」へ切替)
(【般】エプレレノン錠50mgへ切替)
- 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg (セレクトール)
- 劇セリンクロ錠10mg
向セルシン散1%
向2mgセルシン錠 (院内はジアゼバム錠2mg「アメル」)
(【般】ジアゼバム錠2mgへ切替)
向5mgセルシン錠 (【般】ジアゼバム錠5mgへ切替)
劇セルセプトカプセル250 250mg
- セルテクトドライシロップ2%—20mg/g
(【般】オキサトミドシロップ用2%へ切替)
- セルテクト錠30 30mg (【般】オキサトミド錠30mgへ切替)
○ 劇セルトラリン錠25mg「アメル」 【後】
- 【般】セルトラリン錠25mg (ジェイゾロフト)
- 【般】セルトラリン錠50mg (ジェイゾロフト)
- セルニルトン錠 63mg
- セルベックス細粒10% [0.5g/P]
- セルベックスカプセル50mg (院内はテプレノンカプセル50mg「トワ」)
(【般】テプレノンカプセル50mgへ切替)
劇ゼルヤンツ錠5mg
- セレキノン錠100mg
(【般】トリメブチニンマレイン酸塩錠100mgへ切替)
- 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg (エフピー)
- 劇セレクト⁺錠100mg
(【般】セリプロロール塩酸塩錠100mgへ切替)
- 【般】セレコキシブ錠100mg (セレコックス)
○ 劇セレコキシブ錠100mg「JG」 【後】
劇セレコックス錠100mg (セレコキシブ錠100mg「JG」へ切替)
セレジストO-D錠5mg (院内はタルチレリンO D錠5mg「サリ」)
(【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mgへ切替)
- セレスタミン配合錠 (院内はベタセレミン配合錠)
(【般】ベタメタゾン・d-クロロフェニラミン配合錠へ切替)
セレニカR顆粒40% (【般】バルプロ酸N a徐放顆粒40%へ切替)
セレニカR錠200mg
- 劇セレネース細粒1% (院内はハロベリドール細粒1%「ヨシミ」)
(【般】ハロベリドール細粒1%へ切替)
- 劇セレネース錠0.75mg (院内はハロベリドール錠0.75mg「ヨシミ」)
(【般】ハロベリドール錠0.75mgへ切替)
- 劇セレネース錠1mg (【般】ハロベリドール錠1mgへ切替)
- 劇セレネース錠1.5mg (院内はハロベリドール錠1.5mg「ヨシミ」)
(【般】ハロベリドール錠1.5mgへ切替)
- 劇セレネース錠3mg (【般】ハロベリドール錠3mgへ切替)
- 劇セレネース内服液0.2%
- 劇セロタエル細粒50% (【般】クエチアピッジン細粒50%へ切替)
- 劇セロタエル25mg錠 (院内はクエチアピッジン錠25mg「アメル」)
(【般】クエチアピッジン錠25mgへ切替)
- 劇セロタエル100mg錠 (院内はクエチアピッジン錠100mg「アメル」)
(【般】クエチアピッジン錠100mgへ切替)
- 劇セロタエル200mg錠
(【般】クエチアピッジン錠200mgへ切替)
- セロタエル錠20mg
(【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mgへ切替)
劇ゼロ⁺ダ錠300 300mg (カペシタビン錠300mg「サリ」へ切替)
(【般】カペシタビン錠300mgへ切替)
ゼンタコートカプセル3mg
- 【般】センナ・センナ実配合顆粒 0.5g/包 (アローゼン)

- センノシド錠12mg「ト-7」 【後】
- 【般】 センノシド錠12mg (ブルゼニド)
- 【ソ】
 劇ゾコーバ錠125mg
 劇ゾスバタ錠40mg
- 向劇ソセゴン錠25mg
 ソタコール錠40mg (【般】ソタロール塩酸塩錠40mgへ切替)
 (ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」へ切替)
- ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 【後】
- 【般】 ソタロール塩酸塩錠40mg (ソタコール)
- 劇ソーティクツ錠6mg
 ○ 劇ゾテビン錠25mg「カカ」 【後】 (販売中止)
 (2026年3月31日経過措置終了 (予定))
- 【般】 ゾテビン錠25mg (ロドビン)
- 【般】 ゾニサミド散20% (エクセグラン)
- 劇ゾニサミド錠100mg「アル」 【後】
- 劇【般】 ゾニサミド錠100mg (エクセグラン)
- 劇【般】 ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg : T R E (トレリーフO D)
- 劇【般】 ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg : T R E (トレリーフO D)
- 【般】 ゾビクロン錠7.5mg (アモバシ) (2027年3月31日経過措置終了)
 ゾビラックス顆粒40% (【般】アシクロビル顆粒40%へ切替)
- ゾビラックス錠200-200mg (【般】アシクロビル錠200mgへ切替)
- 【般】 ソファルコン錠50mg (ソロン錠)
 ゾフルーザ錠20mg
- 劇ゾーミックR M錠2.5mg
 (【般】ゾルミトリップタノ口腔内崩壈錠2.5mgへ切替)
- 向ソラナックス0.4mg錠 (院内はアルプラゾラム錠0.4mg「ト-7」)
 (【般】アルプラゾラム錠0.4mgへ切替)
 ソランタール錠100mg
- ソリフェナシンコハク酸塩O D錠5mg「ト-7」 【後】
- 【般】 ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壈錠5mg (ベシケア)
 劇ゾリンザカブセル100mg
 ○ 向ゾルビデム酒石酸塩O D錠5mg「カカ」 【後】
- 【般】 ゾルビデム酒石酸塩口腔内崩壈錠5mg (マイスリー)
- 【般】 ゾルビデム酒石酸塩錠5mg (マイスリー)
- 【般】 ゾルビデム酒石酸塩錠10mg (マイスリー)
- 【般】 ゾルミトリップタノ口腔内崩壈錠2.5mg (ゾーミックR M)
- ゾロン錠50-50mg (【般】 ソファルコン錠50mgへ切替)
- 【タ】
- ダイアト錠60mg
 (【般】アゾセミド錠60mgへ切替)
 ダイアモックス錠250mg
- ダイオウ末
- 劇タイケルブ錠250mg
 太虎堂の芎帰調血飲エキス顆粒 [2.0g]EK-230
- 【般】 耐性乳酸菌散0.6% (ビオフェルミンR)
- 劇ダイドロネル錠200 200mg
 ダイフェン配合顆粒
 タウリン散98%「大正」
- 劇ダオニール錠1.25mg
 (【般】グリベンクラミド錠1.25mgへ切替)
- 劇ダオニール錠2.5mg
 (【般】グリベンクラミド錠2.5mgへ切替)
- タガメット錠200mg
 (【般】シメチジン錠200mgへ切替)
 劇ダクチル錠50mg
 (【般】ピベリドレート塩酸塩錠50mgへ切替)
- 劇タグリッソ錠40mg
 劇タグリッソ錠80mg
- 【般】 タクロリムスカブセル0.5mg (プログラフ)
- 【般】 タクロリムスカブセル1mg (プログラフ)
- 劇タクロリムス錠0.5mg「ト-7」 【後】
- 【般】 タクロリムス錠0.5mg
 ○ 劇タクロリムス錠1mg「ト-7」 【後】
- 【般】 タクロリムス錠1mg
 タケキヤブO D錠10mg
 タケキヤブO D錠20mg
- タケブロノO D錠15mg
 (院内はランソプラゾールO D錠15mg「カカ」)
 (【般】ランソプラゾール口腔内崩壈錠15mgへ切替)
- タケブロノO D錠30-30mg
 (【般】ランソプラゾール口腔内崩壈錠30mgへ切替)
- タケルダ配合錠
- 劇ダサチニブ錠20mg「NK」 【後】
- 【般】 ダサチニブ錠20mg (スプリセル)
- 劇ダサチニブ錠50mg「NK」 【後】
- 【般】 ダサチニブ錠50mg (スプリセル)
- 劇タシグナカブセル150mg
 劇タシグナカブセル200mg
- 劇ターゼナカブセル0.25mg
- 劇ターゼナカブセル1mg
- 【般】 タダラフィル錠2.5mg : Z A (ザルティア)
- 【般】 タダラフィル錠5mg : Z A (ザルティア)
- タダラフィル錠20mg A D「TE」 【後】
- 【般】 タダラフィル錠20mg : A D (アドシリカ)
 タチオン錠100mg (【般】グルタチオン錠100mgへ切替)
 劇タナドーバ顆粒75% [750mg/1g/P]
- タナトリル錠5mg (院内はイミダブリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」)
 (【般】イミダブリル塩酸塩錠5mgへ切替)
- 劇タバリス錠100mg
- 劇タフィンラーカブセル50mg
- 劇タフィンラーカブセル75mg
 ダフクリア錠200mg
 タブネオスカブセル10mg
- 劇タブレクタ錠150mg
- 劇タブレクタ錠200mg
 劇ダーブロック錠2mg
 劇ダーブロック錠4mg
 タベジール錠1mg
 タミフルドライシロップ3%
 (【般】オセルタミビルシロップ用3%へ切替)
 タミフルカブセル75-75mg (オセタミビルカブセル75mg「カカ」へ切替)
- タムスロシン塩酸塩O D錠0.2mg「VTRS」 【後】
- 【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壈錠0.2mg (ハルナール)
- 【般】 タモキシフェン錠10mg (ノルバデックス)
- 【般】 タモキシフェン錠20mg (ノルバデックス)
- タモキシフェン錠20mg「カカ」 【後】
 ダラシンカブセル150mg
- タリオジ錠10mg (【般】ベポタスチニベシル酸塩錠10mgへ切替)
- タリオジO D錠5mg
 (【般】ベポタスチニベシル酸塩O D錠10mg「ト-7」へ切替)
 (ベポタスチニベシル酸塩O D錠10mg「カカ」へ切替)

- タリージェ錠2.5mg
- タリージェ錠15mg
- タリージェOD錠2.5mg
タリージェOD錠5mg
タリージェOD錠10mg
- タリージェOD錠15mg
劇タルグレチンカプセル75mg
- 劇タルセバ錠25mg（【般】エルロチニブ錠25mgへ切替）
※劇タルセバ錠100mg（【般】エルロチニブ錠100mgへ切替）
劇タルセバ錠150mg（【般】エルロチニブ錠150mgへ切替）
- タルチレリンOD錠5mg「サイ」【後】
- 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg（セレジスト）
炭酸水素ナトリウム末
- 【般】炭酸ランタン顆粒250mg（ホスレノール）
劇炭酸リチウム錠100mg「大正」100mg【後】
- 【般】炭酸リチウム錠100mg（リーマス）
○ 劇炭酸リチウム錠200mg「大正」200mg【後】
- 【般】炭酸リチウム錠200mg（リーマス）
単シロップ（丸石）
○ 劇タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アエル」【後】
- 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg（セディール）
- 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠20mg（セディール）
ダントリウムカプセル25mg
タンニン酸アルブミン末
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末（タンニン酸アルブミンより切替）
- 劇タンポコール細粒10%
劇タンポコール錠50mg（フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」へ切替）
（【般】フレカイニド酢酸塩錠50mgへ切替）
- 【チ】
- 【般】チアブリド塩酸塩細粒10%（グラマリール）
- チアブリド錠25mg「サイ」【後】
- 【般】チアブリド塩酸塩錠25mg（グラマリール）
- チアブリド錠50mg「サイ」【後】
- 【般】チアブリド塩酸塩錠50mg（グラマリール）
- 劇チオデロンカプセル5mg【冷】
劇チガソンカプセル10 10mg
- チクロピジン塩酸塩錠100mg「トワ」【後】（バナルジン）
- 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg（バナルジン）
- チザニジン錠1mg「トワ」【後】
- 【般】チザニジン錠1mg（テルネリン）
- 【般】チミベロン細粒1%（トロペン）
- 劇チャンピックス錠0.5mg（2023年9月現在、出荷停止）
- 劇チャンピックス錠1mg（2023年9月現在、出荷停止）
(0.5mg×11錠,1mg×14錠を「服用のしかた」が記載された
台紙にセットした「チャンピックス スタート用パック」もある。
処方に「スタート用パック」とコメントを記載する)
調剤用パンピタン末
- チョコラA末1万単位/g
- 劇チラーデンS錠12.5μg
劇チラーデンS錠25μg
劇チラーデンS錠50μg
5mcgチロナミン錠 5μg
沈降炭酸カルシウム末
沈降炭酸カルシウム「セイ-」
- 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」【後】
- 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（高リン血症用）

- 【ツ】
- ツイミーグ錠500mg
ツインラインNF配合経腸用液 [A液200mL,B液200mL]
つくしA・M配合散 [1.3g/P]
劇ツートラム錠25mg
劇ツートラム錠50mg
劇ツートラム錠100mg
 - 劇ツートラム錠150mg
ツベルミン錠100mg
ツムラ安中散エキス顆粒 [2.5g]5
ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒 [2.5g]135
ツムラ茵陳五苓散エキス顆粒 [2.5g]117
ツムラ温経湯エキス顆粒 [2.5g]106
ツムラ温清飲エキス顆粒 [2.5g]57
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 [2.5g]28
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 [3.0g]98
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 [2.5g]15
● ツムラ黄連湯エキス顆粒 [2.5g]120
ツムラ乙字湯エキス顆粒 [2.5g]3
ツムラ葛根湯エキス顆粒 [2.5g]1
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 [2.5g]137
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 [2.5g]24
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 [2.5g]72
ツムラ桔梗湯エキス顆粒 [2.5g]138
ツムラ芎帰膠艾湯エキス顆粒 [3.0g]77
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 [2.5g]50
ツムラ桂枝加芍藥大黃湯エキス顆粒 [2.5g]134
ツムラ桂枝加芍藥湯エキス顆粒 [2.5g]60
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 [2.5g]18
ツムラ桂枝加鴟骨牡蠣湯エキス顆粒 [2.5g]26
ツムラ桂枝湯エキス顆粒 [2.5g]45
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒 [2.5g]82
ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒 [2.5g]125
ツムラ啓脾湯エキス顆粒 [2.5g]128
ツムラ香蘇散エキス顆粒 [2.5g]70
ツムラ五虎湯エキス顆粒 [2.5g]95
ツムラ五積散エキス顆粒 [2.5g]63
ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒 [2.5g]107
ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒 [2.5g]31
ツムラ五苓散エキス顆粒 [2.5g]17
ツムラ柴陷湯エキス顆粒 [2.5g]73
ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 [2.5g]12
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 [2.5g]11
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 [2.5g]10
ツムラ柴朴湯エキス顆粒 [2.5g]96
ツムラ柴芩湯エキス顆粒 [3.0g]114
ツムラ三黃瀉心湯エキス顆粒 [2.5g]113
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 [2.5g]103
ツムラ三物黃芩湯エキス顆粒 [2.5g]121
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 [2.5g]93
ツムラ滋陰至寶湯エキス顆粒 [3.0g]92
ツムラ四逆散エキス顆粒 [2.5g]35
ツムラ七物降下湯エキス顆粒 [2.5g]46
ツムラ四物湯エキス顆粒 [2.5g]71
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒 [3.0g]64
ツムラ芍藥甘草湯エキス顆粒 [2.5g]68
ツムラ十全大補湯エキス顆粒 [2.5g]48
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 [2.5g]6

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

ムラ 潤腸湯エキス顆粒 [2.5g]51
ムラ 小建中湯エキス顆粒 [2.5g]99
ムラ 小柴胡湯エキス顆粒 [2.5g]9
ムラ 小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 [2.5g]109
ムラ 小青竜湯エキス顆粒 [3.0g]19
ムラ 消風散エキス顆粒 [2.5g]22
ムラ 辛夷清肺湯エキス顆粒 [2.5g]104
ムラ 真武湯エキス顆粒 [2.5g]30
ムラ 清上防風湯エキス顆粒 [2.5g]58
ムラ 清暑益氣湯エキス顆粒 [2.5g]136
ムラ 清心蓮子飲エキス顆粒 [2.5g]111
ムラ 清肺湯エキス顆粒 [3.0g]90
ムラ 川芎茶調散エキス顆粒 [2.5g]124
ムラ 疎経活血湯エキス顆粒 [2.5g]53
● ムラ 大黄甘草湯エキス顆粒 [2.5g]84
ムラ 大黄牡丹皮湯エキス顆粒 [2.5g]33
ムラ 大建中湯エキス顆粒 [2.5g]100
ムラ 大柴胡湯エキス顆粒 [2.5g]8
ムラ 大承気湯エキス顆粒 [2.5g]133
ムラ 竹茹温胆湯エキス顆粒 [2.5g]91
ムラ 治打撲一方エキス顆粒 [2.5g]89
ムラ 調胃承気湯エキス顆粒 [2.5g]74
ムラ 釣藤散エキス顆粒 [2.5g]47
ムラ 猪苓湯エキス顆粒 [2.5g]40
ムラ 通導散エキス顆粒 [2.5g]105
ムラ 桃核承気湯エキス顆粒 [2.5g]61
ムラ 当帰飲子エキス顆粒 [2.5g]86
ムラ 当帰建中湯エキス顆粒 [2.5g]123
ムラ 当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒 [2.5g]38
ムラ 当帰芍薬散エキス顆粒 [2.5g]23
ムラ 当帰湯エキス顆粒 [2.5g]102
ムラ 二朮湯エキス顆粒 [2.5g]88
ムラ 神女散エキス顆粒 [2.5g]67
ムラ 人參湯エキス顆粒 [2.5g]32
● ムラ 人參養榮湯エキス顆粒 [3.0g]108
ムラ 排膿散及湯エキス顆粒 [2.5g]122
ムラ 麦門冬湯エキス顆粒 [3.0g]29
ムラ 八味地黃丸エキス顆粒 [2.5g]7
ムラ 半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]16
ムラ 半夏瀉心湯エキス顆粒 [2.5g]14
● ムラ 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 [2.5g]37
ムラ 白虎加人參湯エキス顆粒 [3.0g]34
ムラ 茯苓飲エキス顆粒 [2.5g]69
ムラ 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 [2.5g]116
● ムラ 平胃散エキス顆粒 [2.5g]79
ムラ 防已黃耆湯エキス顆粒 [2.5g]20
ムラ 防風通聖散エキス顆粒 [2.5g]62
ムラ 補中益氣湯エキス顆粒 [2.5g]41
ムラ 麻黃湯エキス顆粒 [2.5g]27
ムラ 麻黃附子細辛湯エキス顆粒 [2.5g]127
ムラ 麻杏甘石湯エキス顆粒 [2.5g]55
ムラ 麻杏薏甘湯エキス顆粒 [2.5g]78
ムラ 麻子仁丸エキス顆粒 [2.5g]126
ムラ 木防已湯エキス顆粒 [2.5g]36
ムラ 蕙苡仁湯エキス顆粒 [2.5g]52
ムラ 抑肝散エキス顆粒 [2.5g]54
ムラ 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 [2.5g]83
ムラ 六君子湯エキス顆粒 [2.5g]43

ムラ 立効散エキス顆粒 [2.5g]110
ムラ 竜胆瀉肝湯エキス顆粒 [2.5g]76
ムラ 苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 [2.5g]119
ムラ 苓姜朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]118
ムラ 苓桂朮甘湯エキス顆粒 [2.5g]39
ムラ 六味丸エキス顆粒 [2.5g]87
劇ツルバダ配合錠
● 【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1% (ペラチン)
【テ】
劇デイアコミットドライシロップ分包250mg
劇ティーエスワン配合顆粒T20 [20mg/P]
劇ティーエスワン配合顆粒T25 [25mg/P]
● 劇ティーエスワン配合OD錠T20 (20mgテガフル相当量)
(院内はエスワンタイホウ配合OD錠T20)
(【般】カガフル20mg・ギメラル・オテラル配口腔内崩壊錠へ切替)
● 劇ティーエスワン配合OD錠T25 (25mgテガフル相当量)
(院内はエスワンタイホウ配合OD錠T25)
(【般】カガフル25mg・ギメラル・オテラル配口腔内崩壊錠へ切替)
● デイオバシ錠40mg (院内はバルサルタン錠40mg「カイ」)
(【般】バルサルタン錠40mgへ切替)
デイオバシ錠80mg
(【般】バルサルタン錠80mgへ切替)
● デイオバシ錠160mg
(【般】バルサルタン錠160mgへ切替)
● デイオバシOD錠40mg
(【般】バルサルタン口腔内崩壈錠40mgへ切替)
● デイオバシOD錠80mg
(【般】バルサルタン口腔内崩壈錠80mgへ切替)
● デイオバシOD錠160mg
(【般】バルサルタン口腔内崩壈錠160mgへ切替)
デイナゲスト錠0.5mg (ジエノゲスト錠0.5mg「モダ」へ切替)
(【般】ジエノゲスト錠0.5mgへ切替)
● デイナゲスト錠1mg (【般】ジエノゲスト錠1mgへ切替)
劇ティゾボ錠250mg
● デイレグラ配合錠
(【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠へ切替)
デエビゴ錠2.5mg
デエビゴ錠5mg
● デエビゴ錠10mg
● テオドール錠100mg (院内はテオフィリン徐放錠100mg「カイ」)
(【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) へ切替)
○ 劇テオフィリンドライシロップ20%「カイ」 【後】
劇テオフィリン錠200mg「TYK」
(【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) へ切替)
○ テオフィリン徐放錠100mg「カイ」 【後】
● 【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続) (テオドール)
● 劇【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続) (テオドール)
○ 劇テオフィリン徐放錠200mg「トワ」 【後】
● 【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) (ユニフィルL A)
● 【般】テオフィリンシロップ用20% (テオドールドライシロップ)
デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
● 【般】カガフル20mg・ギメラル・オテラルカリウム配合顆粒 (ティーエスワン)
● 【般】カガフル25mg・ギメラル・オテラルカリウム配合顆粒 (ティーエスワン)
● 【般】カガフル20mg・ギメラル・オテラルカリウム配合口腔内崩壈錠 (ティーエスワン)
● 【般】カガフル25mg・ギメラル・オテラルカリウム配合口腔内崩壈錠 (ティーエスワン)
● 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% (メジコン)

- テクフィデラカプセル120mg
- テクフィデラカプセル240mg
 - ※ テグレトール細粒50%（【般】なし）（供給停止）
(カルバマゼピン細粒50%「アメル」へ切替予定)
テグレトール錠100mg（【般】カルバマゼピン錠100mgへ切替）
テグレトール錠200mg（【般】カルバマゼピン錠200mgへ切替）
 - デザレックス錠5mg
劇デシコビ配合錠L T
劇デシコビ配合錠H T
 - 劇テシペール錠1mg（【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mgへ切替）
 - 劇デジレル錠25-25mg（【般】トラゾドン塩酸塩錠25mgへ切替）
デソバン錠60mg
 - デタントール錠1mg
 - デタントールR錠3mg
テトラミド錠10mg
 - テトラミド錠30mg
 - テネリア錠40mg
テネリアO D錠20mg
 - テネリアO D錠40mg
劇テノゼット錠300mg
デノタスチアブル配合錠
 - デノバミン錠10mg「日医工」【後】
 - 【般】デノバミン錠10mg（カルグート）
テノーミン錠50-50mg（【般】アテノロール錠50mgへ切替）
 - デパケン細粒40%（【般】なし）
 - デパケン錠200mg（【般】なし）
デパケンR錠100mg
(バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg「ト-7」へ切替)
デパケンR錠200mg
(バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「ト-7」へ切替)
(【般】バルプロ酸N a徐放錠200mgへ切替)
 - デパケンシロップ5%（院内はバ ルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」）
(【般】バルプロ酸N aシロップ5%へ切替)
向デパス細粒1%
(【般】エチゾラム細粒1%へ切替)
 - 向デパス錠0.5mg（院内はエチゾラム錠0.5mg「EMEC」）
(【般】エチゾラム錠0.5mgへ切替)
劇テビケイ錠50mg
 - 【般】デフェラシロックス顆粒90mg（ジャドニュ）
 - 【般】デフェラシロックス顆粒360mg（ジャドニュ）
 - 劇テブミトコ錠250mg
 - 【般】テブレノン細粒10%-0.5g/包（セルベックス）
○ テブレノンカプセル50mg「ト-7」【後】
 - 【般】テブレノンカプセル50mg（セルベックス）
 - デプロメル錠25-25mg
(院内はフルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」)
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替)
 - デプロメル錠50-50mg
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替)
 - デプロメル錠75-75mg
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替)
デベルザ錠20mg
 - 劇デムサーカプセル250mg
 - テモカプリル塩酸塩錠2mg「サリ」【後】
 - 【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg（エースコール）
 - 毒テモゾロミド錠20mg「NK」【後】
 - 毒【般】テモゾロミド錠20mg（テモダール）
 - 毒テモゾロミド錠100mg「NK」【後】
 - 毒【般】テモゾロミド錠100mg（テモダール）
毒テモダールカプセル20mg（テモゾロミド錠20mg「NK」へ切替）
毒テモダールカプセル100mg（テモゾロミド錠100mg「NK」へ切替）
デュオドーバ配合経腸用液 [100mL/カセット] [2~8°C]
 - 【般】デュタステリドカプセル0.5mg : A V (アボルブカプセル)
 - デュファストン錠5mg
 - 劇【般】デュロキセチンカプセル20mg（サインバルタ）
 - 劇デュロキセチンO D錠20mg「ニ ロ」【後】
(サインバルタカプセル20mgから切替)
(【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mgへ切替)
 - 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg（サインバルタ）
 - 劇テラムロ配合錠A P「ニ ロ」【後】
(【般】テルミサルタン40mg・アムロジビン配合錠へ切替)
 - 劇テルギンGドライシロップ0.1%【後】
(クレマスチンD S 0.1%「タタ」へ名称変更)
(【般】クレマスチンシロップ用0.1%へ切替)
 - テルチア配合錠A P「ト-7」【後】
 - 劇デルティバ錠50mg
テルネリジン錠1mg（チザニジン錠1mg「ト-7」へ切替）
(【般】チザニジン錠1mgへ切替)
 - 劇テルバニスD S 20%【後】
(【般】テオフィリンシロップ用20%へ切替)
 - テルビナフィン錠125mg「VTRS」【後】
 - 【般】テルビナフィン錠125mg（ラミシール）
 - テルミサルタン錠40mg「ニ ロ」【後】
 - 【般】テルミサルタン錠40mg（ミカルディス）
 - 【般】テルミサルタン40mg・アムロジビン配合錠（ミカムロA P）
 - 【般】テルミサルタン40mg・ヒト 口腔チアンド配合錠（ミコンビA P）
 - 【般】テルミサルタン錠80mg（ミカルディス）
 - 【般】テルミサルタン80mg・アムロジビン配合錠（ミカムロB P）
 - 【般】テルミサルタン80mg・ヒト 口腔チアンド配合錠（ミコンビB P）
 - 【ト】
 - 劇トアラセット配合錠「日新」【後】
(【般】トラマドール・アセトアミノフェンへ切替)
劇ドウベイト配合錠
トウモロコシデンプン末
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒 [2.0g] TY-026
 - [東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒 [2.0g] TY-027
 - [東洋]四君子湯エキス細粒 [2.0g] TY-054
 - ドキサゾシン錠1mg「タベ」【後】
(院内はドキサゾシン錠1mg「テバ」へ切替)
 - ドキサゾシン錠1mg「テバ」【後】
 - 【般】ドキサゾシンメシリ酸塩口腔内崩壊錠1mg（カルデナリン）
 - 【般】ドキサゾシンメシリ酸塩錠1mg（カルデナリン）
 - ドキサゾシン錠4mg「テバ」【後】
 - 【般】ドキサゾシンメシリ酸塩口腔内崩壊錠4mg（カルデナリン）
 - 【般】ドキサゾシンメシリ酸塩錠4mg（カルデナリン）
 - 劇ドグマチール細粒50%（院内はスルビリド細粒50%「アメル」）
(【般】スルビリド細粒50%へ切替)
 - ドグマチール錠50mg（【般】スルピリド錠50mgへ切替）
 - 劇ドグマチール錠100mg（【般】スルピリド錠100mgへ切替）
 - 劇ドグマチール錠200mg（【般】スルピリド錠200mgへ切替）
 - トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハ」【後】
 - 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒20%（ユベラ）
 - トコフェロール酢酸エステル錠50mg「ト-7」【後】
 - 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg（ユベラ）
 - 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg（ユベラN）

- 【般】 トスフロキサシントシル酸塩細粒15%（オゼックス）
- 【般】 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg（オゼックス）
トチモトのコウジン末 A M
トチモトのダイオウ末
○劇ドネペジル塩酸塩 O D錠5mg「明治」 【後】
- 【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg（アリセプト）
- 【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg（アリセプト）
- 【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg（アリセプト）
- 【般】 ドネペジル塩酸塩錠3mg（アリセプト）
- 【般】 ドネペジル塩酸塩錠5mg（アリセプト）
- ドバコール配合錠 L 100 【後】
ドバストン散98.5%
トビエース錠4mg
- トビエース錠8mg
- トビナ細粒10%
トビナ錠50mg（【般】 トビラマート錠50mgへ切替）
- ナビナ錠100mg
- 【般】 トビラマート錠50mg（トビナ）
- 【般】 トビラマート錠100mg（トビナ）
- 【般】 トフィソバム錠50mg（グランダキシン）
ドブス O D錠100mg（【般】 なし）
- ドブテレット錠20mg
- トフラニール錠10mg
トフラニール錠25mg
- ナイコア錠80mg（【般】 フェノフィラート錠80mgへ切替）
劇トラクリア錠62.5mg（【般】 ボセンタン錠62.5mgへ切替）
- トラセミド O D錠8mg「TE」 【後】
- 【般】 トラセミド口腔内崩壊錠8mg（ルブラック）
トラゼンタ錠5mg
○劇トラゾドン塩酸塩錠25mg「アル」 【後】
- 【般】 トラゾドン塩酸塩錠25mg（デジレル、 レスリン）
劇トラゾドン塩酸塩錠50mg「アル」 【後】
- 【般】 トラゾドン塩酸塩錠50mg（デジレル、 レスリン）
● トライアヌ配合錠 A P
● トライアヌ配合錠 B P
○ トランニラストカプセル100mg「トワ」 【後】
- 【般】 トランニラストカプセル100mg（リザベン）
○ トランニサム酸カプセル250mg「トワ」 【後】
- 【般】 トランニサム酸カプセル250mg（トランサミン）
● 【般】 トランニサム酸シロップ5%（トランサミン）
● 【般】 トラビジル錠100mg（ロコルナール）
トラベルミン配合錠
● 【般】 トラマドール・アセトアミノフェン配合錠（トラムセット）
● 【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg（トラマール）
● 【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg（トラマール）
○劇トラマドール塩酸塩 O D錠25mg「KO」 【後】
劇トラマール O D錠25mg
(トラマドール塩酸塩 O D錠25mg「KO」へ切替)
(【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mgへ切替)
- 剥離トラマール O D錠50mg
(【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mgへ切替)
劇トラムセット配合錠（院内はトアラセット配合錠「日新」）
● 向ドラール錠15-15mg（【般】 クアゼバム錠15mgへ切替）
● ナランサミンカプセル250mg
(院内はトランニサム酸カプセル250mg「トワ」)
(【般】 トランニサム酸カプセル250mgへ切替)
トランニサミンシロップ5%
(【般】 トランニサム酸シロップ5%へ切替)

- 劇トランデート錠50mg（【般】 ラベタロール塩酸塩錠50mgへ切替）
- 【般】 トリアゾラム錠0.25mg（ハルシオン）
劇トリクロリールシロップ10% 【冷】
 - トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 【後】
 - 【般】 トリクロルメチアジド錠2mg（フルイトラン）
 - トリテレン・カプセル50mg
トリブタノール錠10 10mg
 - トリブタノール錠25 25mg
 - 【般】 トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%（アーテン）
劇トリーメク配合錠
 - ナリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ナリ」 【後】
 - 【般】 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg（セレキノン）
劇トリンテリックス錠10mg
 - 剥離トルカブ錠160mg
 - 剥離トルカブ錠200mg
→○劇トルバブタノ D錠7.5mg「オーツカ」 【後】
(サムスカ O D錠7.5mgと適応が揃うまで切替を保留)
 - 【般】 トルバブタノ顆粒1%（サムスカ）
 - 【般】 トルバブタノ口腔内崩壊錠7.5mg（サムスカ）
 - 【般】 トルバブタノ口腔内崩壊錠15mg（サムスカ）
● 剥離トレイドミン錠15mg（【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠15mgへ切替）
● 剥離トレイドミン錠25mg（【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠25mgへ切替）
● 剥離トレイドミン錠50mg（【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠50mgへ切替）
● 【般】 トレミフェン錠40mg（フェアストン）
トレーラン G液50g [150mL/瓶]（産婦人科外来専用派出し）
トレーラン G液75g [225mL/瓶]
劇トレリーフ O D錠25mg
(【般】 ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg : TREへ切替)
 - 剥離トレリーフ O D錠50mg
(【般】 ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg : TREへ切替)
 - 【般】 ドロキシドバ口腔内崩壊錠100mg（ドブス）
 - 【般】 トロキシピド錠100mg（アブレース）
 - 【般】 ドロスピレン・エニルエストラジオール配合錠・ブセボ錠（ヤーズ配合錠）
 - 剥離トロペロノ細粒1%（【般】 チミペロン細粒1%へ切替）
● 【般】 ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg（ナウゼリン）
● 【般】 ドンペリドン錠5mg（ナウゼリン）
● 【般】 ドンペリドンシロップ用1%（ナウゼリン）
○ ドンペリドン錠10mg「ナリ」 【後】
 - 【般】 ドンペリドン錠10mg（ナウゼリン）
【ナ】
ナイキサン錠100mg
ナウゼリンドライシロップ1%
(【般】 ドンペリドンシロップ用1%へ切替)
 - ナウゼリン錠5 5mg
 - ナウゼリン O D錠10mg（院内はドンペリドン錠10mg「ナリ」）
(【般】 ドンペリドン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
 - 剥離ナゼア O D錠0.1mg
 - ナディック錠30mg
 - 【般】 ナテグリニド錠30mg（スターシス）
 - 【般】 ナテグリニド錠90mg（スターシス）
 - ナトリックス錠1 1mg
 - 剥離ナフトジル錠2-2mg 【後】 (【般】 ニルバジピン錠2mgへ切替)
 - ナフトビジル O D錠25mg「ナリ」 【後】
 - 【般】 ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg（フリバス）
 - 【般】 ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg（フリバス）
● 剥離ナボルS-Rカプセル37.5-37.5mg
(【般】 ジクロフェナク N a徐放カプセル37.5mgへ切替)
 - 【般】 ナラトリップタン錠2.5mg（アマージ）

- 麻劇ナルサス錠2mg
麻劇ナルサス錠6mg
麻劇ナルサス錠12mg
麻劇ナルサス錠24mg
- 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg (レミッチ)
● 【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg (レミッチ)
麻劇ナルラビド錠1mg
麻劇ナルラビド錠2mg
麻劇ナルラビド錠4mg
- 【ニ】
- 【般】ニカルジビン塩酸塩徐放カプセル20mg (ペルジビンL A)
● 【般】ニカルジビン塩酸塩徐放カプセル40mg (ペルジビンL A)
○ ニコランジル錠5mg「サリ」 【後】
● 【般】ニコランジル錠5mg (シグマート)
● ニザチジンカプセル75mg「サリ」 【後】
● 【般】ニザチジンカプセル75mg (アシノン)
● ニザチジンカプセル150mg「サリ」 【後】
● 【般】ニザチジンカプセル150mg (アシノン)
● 【般】ニザチジン錠75mg (アシノン)
○ ニセルゴリン錠5mg「トワ」 【後】 (サアミオン錠5mgから切替)
● 【般】ニセルゴリン錠5mg (サアミオン)
ニッパスカルシウム顆粒100%
● 【般】ニトラゼパム細粒1% (ベンザリン)
● 【般】ニトラゼパム錠5mg (ベンザリン)
● 【般】ニトレンジビン錠10mg (バイロテンシン)
○ 劇ニトロベン舌下錠0.3mg 【後】
● 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg
● ニトロールRカプセル20mg
(【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mgへ切替)
● 劇ニバジール錠4mg (【般】ニルバジビン錠4mgへ切替)
● 【般】ニフェジビン塩放錠10mg (12時間持続) (アダラートL)
○ 劇ニフェジビンL錠20mg「サリ」 【後】
● 【般】ニフェジビン塩放錠20mg (12時間持続) (アダラートL)
○ 劇ニフェジビンC R錠10mg「サリ」 【後】
○ 劇ニフェジビンC R錠20mg「サリ」 【後】 (ニフェジビンC R錠10mg「サリ」へ切替)
● 【般】ニフェジビン塩放錠10mg (24時間持続) (アダラートC R)
● 【般】ニフェジビン塩放錠20mg (24時間持続) (アダラートC R)
● 【般】ニフェジビン塩放錠40mg (24時間持続) (アダラートC R)
● 【般】ニフェジビン細粒1% 10mg/1g (包) (セパミット)
ニフレック配合内用剤 [137.155g/プラスチックバッグ]
乳酸カルシウム水和物「ケイ」 [1g/P]
(乳酸カルシウム水和物「ケイ」原末へ名称変更)
乳酸カルシウム水和物「ケイ」原末
(乳酸カルシウム「ケイ」より名称変更)
乳糖水和物「シオ」
乳糖水和物(粉末) (院内製剤原料)
劇ニュベクオ錠300mg
- 劇ニューレブチル細粒10%
● ニューロタン錠25mg (院内はロサルタンK錠25mg「トワ」)
(【般】ロサルタンK錠25mgへ切替)
● ニューロタン錠50mg (【般】ロサルタンK錠50mgへ切替)
● 【般】ニルバジビン錠2mg (ニバジール)
● 【般】ニルバジビン錠4mg (ニバジール)
毒ニンラーロカプセル2.3mg
毒ニンラーロカプセル3mg
毒ニンラーロカプセル4mg

- 【ネ】
- ネイリンカプセル100mg
● ネオドバストン配合錠L100 (院内はドバコール配合錠L100)
(【般】レボドバ100mg・カルビドバ配合錠へ切替)
○ ネオマレルミンT R錠6mg 【後】
(d-クロルフェニラミン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」へ名称変更)
(【般】d-クロルフェニラミン酸塩徐放錠6mgへ切替)
● 劇ネオーラル10mgカプセル (院内はシクロスボリンカプセル10mg「トワ」)
(【般】シクロスボリンカプセル10mg: N Eへ切替)
劇ネオーラル25mgカプセル (院内はシクロスボリンカプセル25mg「トワ」)
(【般】シクロスボリンカプセル25mg: N Eへ切替)
● 劇ネオーラル50mgカプセル (院内はシクロスボリンカプセル50mg「トワ」)
(【般】シクロスボリンカプセル50mg: N Eへ切替)
劇ネオーラル内用液10% [50mL]
ネキシウムカプセル10mg
(エソメプラゾールカプセル10mg「トワ」へ切替)
(【般】エソメプラゾールカプセル10mgへ切替)
ネキシウムカプセル20mg
(【般】エソメプラゾールカプセル20mgへ切替)
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
劇ネクサバール錠200mg
● ネシーナ錠6.25mg
● ネシーナ錠12.5mg
ネシーナ錠25mg
- 【ノ】
- マイキノン錠10mg (院内はユビデカレノン錠10mg「トワ」)
(【般】ユビデカレノン錠10mgへ切替)
ノイロトロビン錠4単位
ノウリアスト錠20mg
劇ノクサフィル錠100mg
ノバミン錠5mg
劇ノービア錠100mg
劇ノペルジン錠25mg (酢酸亜鉛錠25mg「サリ」へ切替)
(【般】酢酸亜鉛錠25mgへ切替)
● 劇ノペルジン錠50mg (【般】酢酸亜鉛錠50mgへ切替)
● 【般】ルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠 (ルナベルULD)
● 【般】ルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠 (ルナベルLD)
● 劇ノルバスク錠2.5mg (【般】アムロジビン錠2.5mgへ切替)
● 劇ノルバスク錠5mg (【般】アムロジビン錠5mgへ切替)
● 劇ノルバスクOD錠2.5mg
(【般】アムロジビン口腔内崩壊錠2.5mgへ切替)
● 劇ノルバスクOD錠5mg
(【般】アムロジビン口腔内崩壊錠5mgへ切替)
● ノルバデックス錠10mg (【般】タモキシフェン錠10mgへ切替)
ノルバデックス錠20mg (タモキシフェン錠20mg「サリ」へ切替)
(【般】タモキシフェン錠20mgへ切替)
ノルレボ錠1.5mg
- 【ハ】
- バイアグラ錠50mg
[男性不妊の治療目的で処方された場合のみ保険適用]
○ バイアスピリン錠100mg 【後】
(【般】アスピリン腸溶錠100mgへ切替)
ハイシーピー25% [250mg/1g/P]
劇ハイドレアカプセル500mg
● 劇ハイペン錠200mg (院内はエトドラク錠200mg「SWJ」)
(【般】エトドラク錠200mgへ切替)
● ハイボン錠20mg (【般】リボラビン酪酸エステル錠20mgへ切替)

劇ハイヤスタ錠10mg

- パイロテンシン錠10mg（【般】ニトレンジピン錠10mgへ切替）
- 劇パキシル錠5mg（【般】パロキセチニン錠5mgへ切替）
- 劇パキシル錠10mg（【般】パロキセチニン錠10mgへ切替）
- 劇パキシル錠20mg（【般】パロキセチニン錠20mgへ切替）

劇パキシルC R錠12.5mg

- 劇パキシルC R錠25mg

劇パキロビッドパック300 1シート

劇パキロビッドパック600 1シート

小児用バクシダール錠50mg

- バクタ配合錠（院内はダイフェン配合錠）

● 麻劇バシーフカプセル30mg

● 麻劇バシーフカプセル60mg

● 麻劇バシーフカプセル120mg

- 【般】バゼドキシフェン錠20mg（ビビアント）

ペセトシン細粒10%—100mg/g（ワイドシリソウ細粒20%へ切替）

- 日本薬局方ハチミツ

ハッカ水「ケンエー」

ハッカ油「ニッコー」（製剤原料）

ペップフォー錠10—10mg

（【般】プロピペリン塩酸塩錠10mgへ切替）

- ペナルジン錠100mg（院内はチクロビジン塩酸塩錠100mg「トワ」）
 （【般】チクロビジン塩酸塩錠100mgへ切替）

- バナンドライシロップ5%—50mg/g

（【般】セフポドキシムプロキセチルシロップ用5%へ切替）

劇ハーフジゴキシンK Y錠0.125 0.125mg

- 劇バフセオ錠150mg

- 劇バフセオ錠300mg

- ハーボニー配合錠

劇バラクルード錠0.5mg（エンテカビルOD錠0.5mg「カイ」へ切替）

（【般】エンテカビル錠0.5mgへ切替）

- 【般】バラシクロビル顆粒50%（バルトレックス）

- バラシクロビル錠500mg「トワ」 【後】

- 【般】バラシクロビル錠500mg（バルトレックス）

- 劇バラミヂンカプセル300mg

ペリエット錠5mg（ラベプラゾールN a錠5mg「YD」へ切替）

（【般】ラベプラゾールN a錠5mgへ切替）

- ペリエット錠10mg（院内はラベプラゾールN a錠10mg「トワ」）
 （【般】ラベプラゾールN a錠10mgへ切替）

- ペリエット錠20mg（【般】ラベプラゾールN a錠20mgへ切替）

- 毒バリキサドライシロップ5000mg

毒バリキサド450mg

- 劇ハリゾンシロップ100mg/mL 【後】

バリトップHD [400g/本]

- 【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠（エクスフォージ）

- 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠（エクスフォージ）

- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg（ディオバン）

- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg（ディオバン）

- 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠160mg（ディオバン）

- バルサルタン錠40mg「カイ」 【後】

- バルサルタン錠40mg「日新」 【後】

（バルサルタン錠40mg「カイ」へ切替）

- 【般】バルサルタン錠40mg（ディオバン）

- バルサルタン錠80mg「日新」 【後】

- 【般】バルサルタン錠80mg（ディオバン）

- 【般】バルサルタン錠160mg（ディオバン）

- 【般】バルサルタン・ヒドロクロロアジド 12.5mg配合錠（コディオEX）

- 向ハルシオン0.125mg錠

- 向ハルシオン0.25mg錠（【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替）
 バルトレックス顆粒50%（【般】バラシクロビル顆粒50%へ切替）

- バルトレックタ錠500mg（院内はバラシクロビル錠500mg「トワ」）
 （【般】バラシクロビル錠500mgへ切替）

- ハルナールD錠0.2mg

（院内はタムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」）

（【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mgへ切替）

- バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 500mL瓶 【後】

- 【般】バルプロ酸N a細粒40%（デバケン）

- 【般】バルプロ酸N a錠200mg（デバケン）

- 【般】バルプロ酸N a徐放顆粒40%（デバケンR, セレニカR）
 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg「トワ」 【後】

- 【般】バルプロ酸N a徐放錠100mg（デバケンR, セレニカR）

- バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トワ」 【後】

- 【般】バルプロ酸N a徐放錠200mg（デバケンR, セレニカR）

- 【般】バルプロ酸N aシロップ5%（デバケン）

- バルモディア錠0.1mg

バルモディアX R錠0.2mg

- バルモディアX R錠0.4mg

- 向ハルラタ錠0.25mg 【後】（【般】トリアゾラム錠0.25mgへ切替）

- バレリナシロップ5% 【後】

（【般】バルプロ酸N aシロップ5%へ切替）

（バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」へ名称変更）

- 【般】パロキセチニン錠5mg（パキシル）

- 【般】パロキセチニン錠10mg（パキシル）

- 【般】パロキセチニン錠20mg（パキシル）

劇バーロデル錠2.5mg

（【般】プロモクリブチニンメシル酸塩錠2.5mgへ切替）

- 劇ハロベリドール細粒1%「ヨトミ」 【後】

- 【般】ハロベリドール細粒1%（セレニース）

- 劇ハロベリドール錠0.75mg「ヨトミ」 【後】

- 【般】ハロベリドール錠0.75mg（セレニース）

- 【般】ハロベリドール錠1mg（セレニース）

- 劇ハロベリドール錠1.5mg「ヨトミ」 【後】

- 【般】ハロベリドール錠1.5mg（セレニース）

- 【般】ハロベリドール錠3mg（セレニース）

パンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」

- 【般】パンテチン散20%（パントシン）

- パントシン散20%（パントシン）

【ヒ】

- ピアーレシロップ65% 500mL 【後】

（ラクツロースシロップ65%「カタ」へ名称変更）

（【般】ラクツロースシロップ65%へ切替）

脾外分泌機能検査用P-F-D内服液500mg 5% [10mL/瓶]

P L配合顆粒 [1g/P]

（【般】プロタキシソルビット1.35%等配合非ピリ系感冒剤 1g/包へ切替）

幼児用P L配合顆粒 [1g/P]

- ピオグリタゾンOD錠15mg「トワ」 【後】

- 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg（アクトス）

- 【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg（アクトス）

ピオスリー配合OD錠

ピオチン散0.2%「カイ」

- ピオフェルミン散剤 【後】

- ピオフェルミンR散 【後】（【般】耐性乳酸菌散0.6%へ切替）

- ピオフェルミン錠剤 【後】（【般】ビフィズス菌錠12mgへ切替）

- 劇ビカルタミドOD錠80mg「トワ」 【後】

- 【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg（カソデックス）

劇ピクタルビ配合錠

- ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 [10mL/瓶] 【後】
 - 【般】 ピコスルファートN a 経口液0.75% 10mL (ラキソペロン)
 - 【般】 ピコスルファートN a錠2.5mg (ラキソペロン)

劇ビ・シフロール錠0.125mg

(【般】 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mgへ切替)

劇ビ・シフロール錠0.5mg

(【般】 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mgへ切替)

ビジクリア配合錠 [50錠/瓶]

- ピスロシット錠200mg

(【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mgへ切替)

ビソプロロールフルマ酸塩錠0.625mg「サウ」 【後】 (【般】 なし)

- ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トワ」 【後】

- 【般】 ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg (メインテート)

- 【般】 ピタバスタチンC a・O D錠2mg「トワ」 【後】

- 【般】 ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠1mg (リバロ)

- 【般】 ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠2mg (リバロ)

- 【般】 ピタバスタチンC a口腔内崩壊錠4mg (リバロ)

- ピタメジン配合カプセルB25-25mg (B1として)

(【般】 ペンオチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセルへ切替)

- ヒダントール錠25mg

ゼドキサール錠10mg (ゼドキサール錠10mg「ツルハ」へ切替)

(【般】 ピリドキサールリン酸エステル錠10mgへ切替)

- ピートル顆粒分包250mg

- ピートルチュアブル錠250mg

- 毒ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サウ」 【後】

(【般】 ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg (院外は) へ切替)

- 毒 【般】 ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg (プラケニル)

覚劇ビパンセカカプセル20mg

覚劇ビパンセカカプセル30mg

- ベビアント錠20mg (【般】 バゼドキシフェン錠20mgへ切替)

- 【般】 ピフィズス菌錠12mg (ピオフェルミン)

ピフェルトロ錠100mg

- ピプラマイシン錠100mg

劇ビプレッソ徐放錠50mg

- 劇ビプレッソ徐放錠150mg

- ベペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」 【後】

- 【般】 ベペリデン塩酸塩細粒1% (アキネトン)

- ベペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 【後】

- 【般】 ベペリデン塩酸塩錠1mg (アキネトン)

- 【般】 ベペリドレート塩酸塩錠50mg (ダクチル)

- 劇ヒボカ5mgカプセル

- 劇ヒボカ15mgカプセル

- 劇ビムパットドライシロップ10% g

劇ビムパット錠50mg

- 劇ビムパット錠100mg

劇ビムパットドライシロップ10%

- ピモベンダン錠1.25mg「TE」 【後】

- 【般】 ピモベンダン錠1.25mg (アカルディ)

ピラノアO D錠20mg

劇ビラフトビカカプセル50mg

ピラマイド原末

劇ビリアード錠300mg

ゼドキサール錠10mg「サウ」 【後】

- ゼドキサール錠10mg「ツルハ」 【後】 (供給停止)

(ゼドキサール錠10mg「サウ」へ切替)

- 【般】 ピリドキサールリン酸エステル錠10mg (ゼドキサール)

○ 劇ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トワ」 【後】

- 【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg (サンリズム)

- ピルダグリブチン錠50mg「トワ」

- 【般】 ピルダグリブチン錠50mg (エクア)

- 【般】 ピルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠 (エクメット配合錠L D)

- 【般】 ピルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠 (エクメット配合錠H D)

- ピルタサ懸濁用散分包8.4g [2~8°C]
ゼルトリシド錠600mg

- 劇ヒルナミン細粒10%

ヒルナミン錠(5mg)

ヒルナミン錠(25mg)

(【般】 レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mgへ切替)

- ピルフェニドン錠200mg「日医工」 【後】

- 【般】 ピルフェニドン錠200mg (ピレスバ)

劇ピレスバ錠200mg (ピルフェニドン錠200mg「日医工」へ切替)

(【般】 ピルフェニドン錠200mgに切替)

- 劇ピレチア細粒10%

ピレチア錠(25mg)

- 【般】 ピレンゼビン塩酸塩錠25mg (ガストロゼビン)

劇ビンダケルカプセル20mg

- 劇ビンマックカプセル61mg

【フ】

劇ファダブス錠10mg

劇ファビハルタカカプセル200mg

- 【般】 ファムシクロビル錠250mg (ファムビル)

- ファムゼル錠250mg (【般】 ファムシクロビル錠250mgへ切替)

- ファモチジン散2%「トワ」 [0.5g/P] 【後】

- 【般】 ファモチジン散2% 0.5g/包 (ガスター)

- ファモチジンO D錠10mg「トワ」 【後】

- 【般】 ファモチジンO D錠20mg「トワ」 【後】

- 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠10mg (ガスター)

- 【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg (ガスター)

- ファロムドライシロップ小児用10% 100mg/g

ファロム錠200mg

- フィコンバ細粒1%

フィコンバ錠2mg

フィコンバ錠4mg

- 【般】 フィトナジオン錠5mg (ケーワン)

劇ブイフェンドドライシロップ2800mg [2~8°C]

劇ブイフェンド錠50mg (ボリコナゾール錠50mg「トワ」へ切替)

劇ブイフェンド錠200mg (ボリコナゾール錠200mg「トワ」へ切替)

劇フィンテプラ内用液2.2mg/mL

- 劇フェアストン錠40~40mg (【般】 トレミフェン錠40mgへ切替)

- 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg (アレグラ)

- フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トワ」 【後】

- 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg (アレグラ)

- 【般】 フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠 (ディレグラ)

向劇フェノバール散10%

向劇フェノバールエリキシル0.4%

- フェノフィラート錠80mg「武田テ」 【後】

(リピディル錠80mgから切替)

- フェキソスタット錠10mg「JG」 【後】

- 【般】 フェキソスタット錠10mg (フェブリク)

- 【般】 フェノフィラート錠80mg (リピディル)

- フェキソスタット錠20mg「JG」 【後】

- フェブリタ錠20mg（フェブキソスタット錠20mg「JG」へ切替）
 （【般】フェブキソスタット錠20mgへ切替）
- 【般】フェブキソスタット錠20mg（フェブリク）
 - 劇フェマーラ錠2.5mg（【般】レトロゾール錠2.5mgへ切替）
 フエロミア顆粒8.3%
 フエロミア錠50mg
 （【般】ケン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）へ切替）
 - フオイパン錠100mg
 （院内はカモスタットメシル酸塩錠100mg「ト-7」）
 （【般】カモスタットメシル酸塩錠100mgへ切替）
 - 劇フォサマツタ錠35mg（【般】アレンドロン酸錠35mgへ切替）
 フォシーガ錠5mg
 フォシーガ錠10mg
 フオスプロック錠250mg
 フオゼベル錠5mg
 フオゼベル錠10mg
 フォリアミン錠 5mg
 向ブコラム口腔用液2.5mg 0.5mL
 向ブコラム口腔用液5mg 1mL
 向ブコラム口腔用液7.5mg 1.5mL
 - 向ブコラム口腔用液10mg 2mL
 劇ブシ末（調剤用）「ツム」 3023
 - 【般】ブシラミン錠100mg（リマチル）
 ブスコパン錠10mg
 - 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg（ブスコパン）
 - デライアン錠500mg【後】
 （【般】エデト酸カルシウムニナトリウム錠500mgへ切替）
 毒プラケニル錠200mg
 （ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サイ」へ切替）
 （【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mgへ切替）
 プラザキサカプセル75mg
 プラザキサカプセル110mg
 フラジール内服錠250mg
 - プラダロン錠200mg（院内はフラボキサート塩酸塩錠200mg「サイ」）
 プラノバール配合錠
 - プラバスタチンN a錠5mg「ケニア」【後】
 - 【般】プラバスタチンN a錠5mg（メバロチン）
 - プラバスタチンN a錠10mg「ト-7」【後】
 - 【般】プラバスタチンN a錠10mg（メバロチン）
 - プラビタシシロップ0.3%（【般】F A Dシロップ0.3%へ切替）
 - プラビックス錠25mg（【般】クロピドグレル錠25mgへ切替）
 - プラビックス錠75mg（院内はクロピドグレル錠75mg「アメル」）
 （【般】クロピドグレル錠75mgへ切替）
 - フラボキサート塩酸塩錠200mg「サイ」【後】
 - 【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg（プラダロン）
 - 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg（ビ・シフロール）
 - 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg（ビ・シフロール）
 - 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg（ミラベックスL A）
 - 【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg（ミラベックスL A）
 - フランドル錠20mg（【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mgへ切替）
 - プランルカストドライシロップ10%「AFP」【後】
 - 【般】プランルカストシロップ用10%（オノン）
 - プランルカストカプセル112.5mg「サイ」【後】
 - 【般】プランルカストカプセル112.5mg（オノン）
 - 【般】プランルカスト錠112.5mg（オノン）
 - 【般】プランルカスト錠225mg（オノン）
 ブリビアクト錠25mg
 - ブリビアクト錠50mg

- フリウェル配合錠L D「モダ」【後】
 （【般】ノルチステロ・エチニエストラジ・オール0.035配合錠へ切替）
 劇ブリジスタ錠600mg
- ナリバースO D錠25mg（院内はナフトビジルO D錠25mg「あすか」）
 （【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠25mgへ切替）
 - ナリバースO D錠75mg
 （【般】ナフトビジル口腔内崩壊錠75mgへ切替）
 - ブリミドン細粒99.5%「日医工」
 - ※ ブリモボラン錠5mg
 劇フリュザクラカプセル1mg
 劇フリュザクラカプセル5mg
 - ブリリンタ錠60mg
 ブリリンタ錠90mg
 - ブリンペラン錠5-5mg（院内はメトクロプラミド錠5mg「NIG」）
 （【般】メトクロプラミド錠5mgへ切替）
 プリンペランシロップ0.1%
 （【般】メトクロプラミドシロップ0.1%へ切替）
 - ブライトラン錠2mg（院内はトリクロルメチアジド錠2mg「NP」）
 （【般】トリクロルメチアジド錠2mgへ切替）
 フルコナゾールカプセル100mg「サイ」【後】（【般】なし）
 - 【般】フルヨナゾールカプセル100mg（ジフルカン）
 - フルスルチアミン錠25mg「ト-7」【後】
 - 【般】フルスルチアミン錠25mg（アリナミンF）
 - 【般】フルタミド錠125mg（オダイイン錠）
 - 劇フルダラ錠10mg
 - 劇フルツロンカプセル200 200mg
 ○ 向フルニトラゼパム錠1mg「アメル」【後】
 - 【般】フルニトラゼパム錠1mg（サイレース）
 - 【般】フルバスタチン錠30mg（ローコール）
 - デルフェン錠100mg（院内はイブプロフェン錠100mg「タヨ-」）
 （【般】イブプロフェン錠100mgへ切替）
 - フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」【後】
 （販売中止）（2026年3月31日経過措置終了（予定））
 - 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg（デプロメール）
 - 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg（デプロメール）
 - 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg（デプロメール）
 - 劇フルメジン散0.2%
 - フルメジン糖衣錠(0.25) 0.25mg
 ○ 劇フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」【後】
 - 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg（タンボコール）
 - プレガバリンO D錠25mg「明治」【後】
 - プレガバリンO D錠75mg「明治」【後】
 - 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg（リリカ）
 - 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg（リリカ）
 - 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg（リリカ）
 劇ブレジコビックス配合錠
 - プレタールO D錠50mg
 （【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mgへ切替）
 - プレタールO D錠100mg（院内はシロスタゾールOD錠100mg「サイ」）
 （【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mgへ切替）
 プレディニン錠25 25mg
 - プレディニン錠50-50mg
 プレディニンO D錠50 50mg
 プレドニゾロン散「タダ」1%
 プレドニゾロン錠1mg（旭化成）
 プレドニン錠5mg
 劇ブレバイミス錠240mg
 - プレマリン錠0.625mg

- プレミネント配合錠7.0
(【般】 ルタジン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠へ切替)
- プレミネント配合錠11.0
(【般】 ルタジン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠へ切替)
- 【般】 プロカルセトール塩酸塩錠0.025mg (メブチン)
- 【般】 プロカルセトール塩酸塩錠0.05mg (メブチン)
- プロカルセトール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」 【後】
- 【般】 プロカルセトール塩酸塩シロップ 0.0005% 5μg/mL (メブチン)
- 効能プログラフ顆粒0.2mg [0.2mg/包]
- 効能プログラフカプセル0.5mg (タクロリムス錠0.5mg「トワ」へ切替)
(【般】 タクロリムスカプセル0.5mgへ切替)
- 効能プログラフカプセル1mg (タクロリムス錠0.5mg「トワ」へ切替)
(【般】 タクロリムスカプセル1mgへ切替)
- プロゲストン錠2.5mg 【後】
(メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」へ名称変更)
(【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mgへ切替)
- 効能プロゲストン錠20μg (院内はペラプロストNa錠20μg「サワ」)
(【般】 ペラプロストNa錠20μgへ切替)
- 効能プロゲストン錠E₂錠0.5mg「科研」
プロゲストール錠25-25mg
(院内はクロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」へ切替)
(【般】 クロルマジノン酢酸エステル錠25mgへ切替)
- プロセキソール錠0.5mg
プロセミド細粒4%「EMEC」 【後】 (【般】 なし)
- 【般】 プロセミド細粒4%
○ プロセミド錠20mg「NIG」 【後】
● 【般】 プロセミド錠20mg (ラシックス)
● 【般】 プロセミド錠40mg (ラシックス)
● プロチアデン錠25-25mg (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了 (予定))
○ 向能プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 【後】
● 【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg (レンドルミン)
プロテカジンOD錠10-10mg (ラチジン錠10mg「トワ」へ切替)
(【般】 ラチジン口腔内崩壊錠10mgへ切替)
プロナーゼMS 20000単位 [0.5g/P]
● 【般】 プロナーゼセリン錠4mg (ロナゼン)
● 【般】 プロナーゼセリン錠8mg (ロナゼン)
● 効能プロナーゼ錠150mg (【般】 プロバフェノン塩酸塩錠150mgへ切替)
プロバジール錠50mg
○ 効能プロバフェノン塩酸塩錠150mg「オハラ」 【後】
● 【般】 プロバフェノン塩酸塩錠150mg (プロノン)
● プロ・バンサイン錠15mg [2~8°C]
● 【般】 プロピベリン塩酸塩錠10mg (バップフォー)
● 【般】 プロプラノロール塩酸塩錠10mg (インデラル)
● プロブレース錠2mg (【般】 カンデサルタン錠2mgへ切替)
● プロブレース錠4mg (院内はカンデサルタン錠4mg「あすか」)
(【般】 カンデサルタン錠4mgへ切替)
● プロブレース錠8mg (【般】 カンデサルタン錠8mgへ切替)
● プロブレース錠12mg (【般】 カンデサルタン錠12mgへ切替)
● 効能プロベシア錠0.2mg (保険適用外)
● 効能プロベシア錠1mg (保険適用外)
プロベラ錠2.5mg (プロゲストン錠2.5mgへ切替)
○ 向能プロマゼバム錠2mg「サンド」 【後】 (セニラン錠2mgより名称変更)
● 【般】 プロマゼバム錠2mg (レキソタン)
● プロマック顆粒15% [75mg/0.5g/P]
(【般】 ポラプレジンク顆粒15% 75mg/0.5g (包) へ切替)
● プロマックD錠75mg (院内はポラプレジンクOD錠75mg「サワ」)
(【般】 ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mgへ切替)
- 【般】 プロムベリドール細粒1% (インプロメン)
- 【般】 プロムベリドール錠1mg (インプロメン)
- 【般】 プロムベリドール錠3mg (インプロメン)
- 【般】 プロモタジン1.35%等配合非ピリ系感冒剤 1g/包 (PL)
- 【般】 プロモクリプチンメシル塩酸塩錠2.5mg (パーロデル)
- プロモックス小児用細粒100mg (【般】 なし)
(【般】 セカベーピボキシル塩酸塩細粒10%へ切替)
- プロモックス錠100mg
(院内はセカベーピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」)
プロリードゲル経口用2% 5g
効能プロリネフ錠0.1mg
- プロレナール錠5μg
(院内はリマプロストアルファデクス錠5μg「サワ」)
(【般】 リマプロストアルファデクス錠5μgへ切替)
- 【ヘ】
- ベイステオD錠0.2mg
(【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mgへ切替)
- ベイステオD錠0.3mg (院内はボグリボースOD錠0.3mg「トワ」)
(【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mgへ切替)
ペオーバ錠50mg
- 効能ペオノ錠80-80mg (【般】 ザルトプロフェン錠80mgへ切替)
- ベザトールS-R錠200mg (院内はベザフィラート徐放錠200mg「トワ」)
効能ベサノイドカプセル10mg
- ベザフィラート徐放錠200mg「トワ」 【後】
- 【般】 ベザフィラート徐放錠200mg (ベザトール)
ペシケアOD錠5mg
(ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トワ」へ切替)
効能ベージニオ錠50mg
効能ベージニオ錠150mg
- 【般】 β-ガラクトシダーゼ (アスペルギルス) 散50% (ガラターゼ)
- 【般】 ベタキソロール塩酸塩錠10mg (ケルロング)
- ベタセレミン配合錠 【後】
(【般】 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠へ切替)
- 向能ベタナミン錠50mg 【後】 (【般】 ベモリン錠50mgへ切替)
効能ベタニス錠50mg
- ベタヒスチジンメシル酸塩錠6mg「トワ」 【後】
- 【般】 ベタヒスチジンメシル酸塩錠6mg (メリスロン)
- 【般】 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠 (セレスタミン)
- 【般】 ベタメタゾン錠0.5mg (リンデロン)
- 効能ベニジン塩酸塩錠4mg「トワ」 【後】
- 【般】 ベニジン塩酸塩錠4mg (コニール)
効能ベネクレクスタ錠10mg
効能ベネクレクスタ錠50mg
効能ベネクレクスタ錠100mg
- 効能ベネット錠2.5mg
(【般】 リセドロン酸Na錠2.5mgへ切替)
- 効能ベネット錠17.5mg
(【般】 リセドロン酸Na錠17.5mgへ切替)
- ヘパンED配合内用剤 [80g/P]
- 効能ペセラ錠10-10mg
効能ペリヨール錠50mg (ペリジル塩酸塩錠50mg「TE」へ切替)
(【般】 ペリジル塩酸塩錠50mgへ切替)
- 効能ペリジル塩酸塩錠50mg「TE」 【後】
- 効能ペリジル塩酸塩錠50mg (ペリコール)
- ベボタスチジンベシル酸塩OD錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】 ベボタスチジンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg (タリオン)
- 【般】 ベボタスチジンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg (タリオン)
- 【般】 ベボタスチジンベシル酸塩錠10mg (タリオン)

- 劇ペマジール錠4.5mg
 効ヘマンジオルシロップ小兒用0.375%
- 【般】ペミロラストK錠10mg（アレギサール）
 - 【般】ペミロラストKシロップ用0.5%（アレギサール）
- 劇ペムリディ錠25mg
 ● 【般】ペモリン錠50mg（ペタナミン錠）
 効ペラサスL-A錠60 μ g（ケアロードL-A錠60 μ gへ切替）
 ● 【般】ペラパミル塩酸塩錠40mg（ワソラン）
 ○劇ペラプロストN a錠20 μ g「サイ」【後】
 ● 【般】ペラプロストN a錠20 μ g（プロサイリン）
 ペリアクチチ錠4mg
 ペリアクチチシロップ0.04%
 ペリキュー β 錠2.5mg
- ペリキュー β 錠5mg
 ペリキュー β 錠10mg
 ペリチーム配合顆粒 [1g/P]
- 【般】ペリンドブリルエルブミン錠4mg（コバシル）
 ● 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50 μ g（ペルマックス）
 ● 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250 μ g（ペルマックス）
 ● ペルサンチ錠25mg（院内はジビリダモール錠25mg「トワ」）
 （【般】ジビリダモール錠25mgへ切替）
 ● ペルサンチ錠100mg（院内はジビリダモール錠100mg「トワ」）
 （【般】ジビリダモール錠100mgへ切替）
 ● ペルジピシL-Aカプセル20mg
 （【般】ニカルジビン塩酸塩徐放カプセル20mgへ切替）
 ● ペルジピシL-Aカプセル40mg
 （【般】ニカルジビン塩酸塩徐放カプセル40mgへ切替）
 ペルソムラ錠15mg
 ペルソムラ錠20mg
 ペルペッサ錠30-30mg
 （ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トワ」へ切替）
 ペルペッサRカプセル100mg
 （ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サイ」へ切替）
 （【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mgへ切替）
 ● 効ペルマックス錠50 μ g（【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50 μ gへ切替）
 ● 効ペルマックス錠250 μ g（【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250 μ gへ切替）
 効ベレキシブル錠80mg
 ○劇ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アル」【後】
- 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg（ルーラン）
 ● ペングッド錠250mg
 ● 向ベンザリン細粒1%（【般】ニトラゼバム細粒1%へ切替）
 ● 向ベンザリン錠5-5mg（【般】ニトラゼバム錠5mgへ切替）
 ○劇ベンズプロマロン錠50mg「NIG」【後】
 ● 【般】ベンズプロマロン錠50mg（ユリノーム）
 ● ペンタサ顆粒94% [250mg/P]
 ● ペンタサ顆粒94% [1000mg/P]
 ペンタサ顆粒94% [2000mg/P]
 ペンタサ錠500mg（【般】メサラジン錠500mgへ切替）
 ● 【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル(ビタミン)
 【示】
 効ボイデヤ錠50mg
 ボカブリア錠30mg
 ホクナリンドライシロップ0.1%小兒用
 ○ ボグリボースOD錠0.3mg「トワ」【後】
 ● ボグリボースODフィルム0.2[QQ] 0.2mg【後】
 ● ボグリボースODフィルム0.3[QQ] 0.3mg【後】
 ● 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg（ペイシン）
 ● 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg（ペイシン）
- 効ボシュリフ錠100mg
 ボースデル内用液10 [250mL/袋]
 ホスミシンドライシロップ400 400mg/g
- ホスミシン錠500 500mg
 ホスリボン配合顆粒
 ● ホスレノール顆粒分包250mg（【般】炭酸ランタン顆粒250mgへ切替）
 ● ホスレノールチュアブル錠250mg
 ● ホスレノールチュアブル錠500mg
 ● 【般】ボセンタン錠62.5mg（トラクリア）
 ● 効ボナロン錠5mg（【般】アレンドロン酸錠5mgへ切替）
 ● 効ボナロン錠35mg（院内はアレンドロン酸錠35mg「トワ」）
 （【般】アレンドロン酸錠35mgへ切替）
 効ボナロン経口ゼリー35mg
- ボノサップパック400 1シート
 ● ボノピオンパック 1シート
 毒ボマリストカプセル1mg
 毒ボマリストカプセル2mg
 毒ボマリストカプセル3mg
 毒ボマリストカプセル4mg
 ● ボラキス錠2-2mg（【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mgへ切替）
 ● ボラキス錠3-3mg（【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mgへ切替）
 ○ ボラブレジンクOD錠75mg「サイ」【後】
- 【般】ボラブレジンク顆粒15% 75mg/0.5g（包）（プロマック）
 ● 【般】ボラブレジンク口腔内崩壊錠75mg（プロマック）
 ● 【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg（EPLカプセル）
 ポリカルボフィルC a細粒83.3%「日医工」 [1.2g/P] 【後】
 ○劇ボリコナゾール錠50mg「トワ」【後】
 ○劇ボリコナゾール錠200mg「トワ」【後】
- 【般】ボリコナゾール錠50mg（ブイフェンド）
 ● 【般】ボリコナゾール錠200mg（ブイフェンド）
 ○ ボリスチレンスルホン酸C a経口ゼリー20%分包25g「三和」【後】
 （アーガメイト20%ゼリー25gより名称変更）
 ● 【般】ボリスチレンスルホン酸C a経口液20% 25g/包（カリメート）
 ● 【般】ホリナート錠25mg（ロイコボリン）
 効ボルタレジ錠25mg（【般】ジクロフェナクN a錠25mgへ切替）
 （院内はジクロフェナクN a錠25mg「トワ」）
 ポルトラック原末 [6g/P]
- ボンゾール錠100mg
 ボンタールシロップ3.25%
 ● 効ボンビバ錠100mg
 【マ】
 向マイスタン錠5mg
 ● 向マイスタン錠10mg
 ● 向マイスリー錠5mg（院内はゾルビデム酒石酸塩OD錠5mg「サイ」）
 （【般】ゾルビデム酒石酸塩錠5mgへ切替）
 ● 向マイスリー錠10mg（【般】ゾルビデム酒石酸塩錠10mgへ切替）
 ● マヴィレット配合錠
 マグコロール散68%分包50g
 効マクサルトR-PD錠10mg
 （リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」へ切替）
 （【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mgへ切替）
 ● マグニット錠500mg【後】（【般】酸化マグネシウム錠500mgへ切替）
 ● 効マスレッド錠5mg
 ● 効マスレッド錠12.5mg
 ● 効マスレッド錠25mg
 ● マーズレンS配合顆粒 [0.67g/P]
 （【般】アズレンスルホン酸N a・L-グルタミン配合顆粒 0.67g/包へ切替）
 ● マーズレン配合錠1.0E S

- マドパー配合錠（マドパー配合錠L 100へ名称変更）
- マドパー配合錠L 50
マドパー配合錠L 100
 - 劇マニジビン塩酸塩錠10mg「サリ」【後】
 - 【般】マニジビン塩酸塩錠10mg（カルスロット）
 - 劇マニジビン塩酸塩錠20mg「サリ」【後】
 - 【般】マニジビン塩酸塩錠20mg（カルスロット）
 - 【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg（ルジオミール）
 - 【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg（ルジオミール）
 - マーベロン21（保険適用外）
 - マリゼブ錠12.5mg
 - マリゼブ錠25mg
- 【ミ】
- ミオカーム内服液33.3% [125mL/瓶]
 - ニオナール錠50mg（院内はエペリゾン塩酸塩錠50mg「トワ」）
(【般】エペリゾン塩酸塩錠50mgへ切替)
- 劇ミカトロ配合錠
- 劇ミカムロ配合錠A-P（テラムロ配合錠A-P「ニワロ」へ切替）
- 劇ミカムロ配合錠B-P
- (【般】テルミサルタン80mg・アムロジビン配合錠へ切替)
ニカルデイス錠40mg（院内はテルミサルタン錠40mg「ニワロ」）
(【般】テルミサルタン錠40mgへ切替)
- ニカルデイス錠80mg（【般】テルミサルタン錠80mgへ切替）
ミグシス錠5mg
 - ミグリトール錠50mg「トワ」【後】
 - 【般】ミグリトール錠50mg（セイブル）
小児用ミケラン細粒0.2%
 - ニケラン錠5mg（【般】カルテオロール塩酸塩錠5mgへ切替）
 - ミケランL A カプセル15mg
 - ミコブティンカプセル150mg
ニコンビ配合錠A-P（院内はテルチア配合錠A-P「日医工」）
(【般】テルミサルタン40mg・ヒドロキシジド配合錠へ切替)
 - ニコンビ配合錠B-P
(【般】テルミサルタン80mg・ヒドロキシジド配合錠へ切替)
 - 【般】ミチグリニドC a錠10mg（グルファスト）
 - ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
 - ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
- ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」【後】
- 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg（メトリジン）
劇ミニリンメルトOD錠25μg
劇ミニリンメルトOD錠60μg
- 劇ミニリンメルトOD錠120μg
- ミネプロOD錠1.25mg
ミネプロOD錠2.5mg
ミネプロOD錠5mg
 - 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg（ミノマイシン）
 - ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トワ」【後】
 - 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg（ミノマイシン）
 - 【般】ミノドロン酸錠1mg（ボノテオ）
 - 【般】ミノドロン酸錠50mg（ボノテオ）
ミノマイシン顆粒2% 20mg/g
 - ミノマイシン錠50mg
 - ミノマイシンカプセル100mg
(院内はミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トワ」)
(【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mgへ切替)
ミヤB M細粒 [1g/P]
 - 劇ミラベックスL A錠0.375mg
(【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mgへ切替)
- 劇ミラベックスL A錠1.5mg
(【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mgへ切替)
- 劇ミルタザピン錠15mg「トワ」【後】
- 【般】ミルタザピン錠15mg（リフレックス）
 - 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg（トレドミン）
 - 劇ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」【後】
 - 【般】ミルナシプラン塩酸塩25mg（トレドミン）
 - 【般】ミルナシプラン塩酸塩50mg（トレドミン）
ミンクリア内用散布液0.8%
- 【ム】
- ムコサールドライシロップ1.5%（【般】なし）
(【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用1.5%へ切替)
 - ムコスタ錠100mg（院内はレバミピド錠100mg「トワ」）
(【般】レバミピド錠100mgへ切替)
 - ムコソルバントS 3% [0.5g/P]
(【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ用3%へ切替)
 - ムコソルバント錠15mg
(【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mgへ切替)
 - ムコソルバント錠45mg
(【般】アンプロキソール塩酸塩徐放錠45mgへ切替)
 - 小児用ムコソルバントシロップ0.3%
(【般】アンプロキソール塩酸塩シロップ0.3%へ切替)
 - ムコダイントS 50%（院内はカルボシスティンD S 50%「トワ」）
(【般】カルボシスティンシロップ用50%へ切替)
 - ムコダイント錠250mg（院内はカルボシスティン錠250mg「トワ」）
 - ムコダイントシロップ5%
(院内はカルボシスティンシロップ小児用5%「トワ」)
(【般】カルボシスティンシロップ5%へ切替)
ムコデサン錠15mg【後】
(院内はアンプロキソール塩酸塩錠15mg「トワ」へ切替)
(【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mgへ切替)
 - ムルブレタ錠3mg
劇ムンデシンカプセル100mg
- 【メ】
- メイアクトM S 小児用細粒10% 100mg/g
 - メイアクトM S錠100mg
 - 向メイラクタス錠1mg（院内はロフラゼブ酸エチル錠1mg「サリ」）
(【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mgへ切替)
 - メインテート錠2.5mg
(院内はビソプロロルフマル酸塩錠2.5mg「トワ」)
(【般】ビンプロロルフマル酸塩錠2.5mgへ切替)
 - メインテート錠5mg
(【般】ビンプロロルフマル酸塩錠5mgへ切替)
 - 劇メキシチールカプセル50mg
 - 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg（メキシチール）
劇メキシチールカプセル100mg
(【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mgへ切替)
 - 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg（メキシチール）
劇メキニスト錠0.5mg [冷]
劇メキニスト錠2mg [冷]
劇メクトビ錠15mg
 - 【般】メコバラミン細粒0.1% 500mg 500μg/0.5g包（メチコバール）
 - 【般】メコバラミン錠0.5mg（メチコバール）
麻劇メサペイン錠5mg
麻劇メサペイン錠10mg
 - 【般】メサラジン錠500mg（ベンタサ）
 - メサラジン腸溶錠400mg「サリ」【後】
 - 【般】メサラジン腸溶錠400mg（アサコール）

劇メジコン散10%
劇メスチノン錠60mg
劇メーゼント錠0.25mg [冷]
劇メーゼント錠2mg [冷]
劇メソトレキセート錠2.5mg
●劇メタクト配合錠L D
●劇メタクト配合錠H D
劇メタライト250カプセル 250mg [冷]
メタルカプターゼカプセル50mg
メチコバール細粒0.1% 500μg/0.5g包 【後】
(【般】メコバラミン細粒0.1%500mg 500μg/0.5g包へ切替)
○ メチコバール錠500μg 【後】
(【般】メコバラミン錠0.5mgへ切替)
劇メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」
●劇メトアナ配合錠L D
●劇メトアナ配合錠H D
劇メトグルコ錠250mg
●劇メトグルコ錠500mg (【般】なし)
○ メトクロラミド錠5mg「NIG」 【後】
● 【般】メトクロラミド錠5mg (プリンベラン)
●劇【般】メトトレキサートカプセル2mg (リウマトレックス)
(【般】メトトレキサート錠2mgへ切替)
○劇メトトレキサート錠2mg「JG」 【後】
●劇【般】メトトレキサート錠2mg
メトピロンカプセル250mg
● 【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg (ロプレソール)
● 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mgMT (メトグルヨ)
● メトリジン錠2mg (【般】ミドドリン塩酸塩錠2mgへ切替)
○ メドロキシプログステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 【後】
(プロゲストン錠2.5mgより名称変更)
● 【般】メドロキシプログステロン酢酸エステル錠2.5mg (フロロラ)
● 【般】メドロキシプログステロン酢酸エステル錠200mg (ヒスロH)
メドロール錠2mg
メドロール錠4mg
● 【般】メナテトレノンカプセル15mg (グラケー)
● メニレット70%ゼリー20g/個
(イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」へ名称変更)
● メニレット70%ゼリー30g/個
(イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」へ名称変更)
メネシット配合錠250—250mg
(【般】レボドバ250mg・カルビドバ配合錠へ切替)
● メバロチン錠5—5mg
(【般】プラバスタチンNa錠5mgへ切替)
● メバロチン錠10—10mg (院内はプラバスタチンNa錠10mg「トワ」)
(【般】プラバスタチンNa錠10mgへ切替)
● メブチンドライシロップ0.005%
メブチニミニ錠25μg
(【般】プロカテロール塩酸塩錠0.025mgへ切替)
● メブチン錠50μg
(【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mgへ切替)
● メブチンシロップ5μg/mL
(院内はプロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」)
(【般】フロロラ塩酸塩シロップ 0.0005% 5μg/mLへ切替)
● 【般】メベンゾラート臭化物錠7.5mg (トランコロン)
●劇メマリー錠5mg (【般】メマンチン塩酸塩錠5mgへ切替)
●劇メマリー錠10mg (【般】メマンチン塩酸塩錠10mgへ切替)
●劇メマリー錠20mg (【般】メマンチン塩酸塩錠20mgへ切替)

劇メマリーOD錠5mg (メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」へ切替)
(【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mgへ切替)
●劇メマリーOD錠10mg
(【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mgへ切替)
●劇メマリーOD錠20mg
(【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mgへ切替)
○劇メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 【後】
● 【般】メマンチン塩酸塩錠5mg (メマリー)
● 【般】メマンチン塩酸塩錠10mg (メマリー)
● 【般】メマンチン塩酸塩錠20mg (メマリー)
● 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg (メマリーOD)
● 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg (メマリーOD)
● 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg (メマリーOD)
メラトペル顆粒小兒用0.2% g
● メリスロジ錠6mg (院内はベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トワ」)
(【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mgへ切替)
● メルカゾール錠2.5mg
メルカゾール錠5mg
● メレックス錠0.5mg (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了)
○ メロキシカム錠10mg「トワ」 【後】
● 【般】メロキシカム錠10mg (モービック)
【モ】
○ モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」 【後】
● 【般】モサブリドクエン酸塩散1% (ガスモチン)
○ モサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」 【後】
● 【般】モサブリドクエン酸塩錠5mg (ガスモチン)
● 向劇モディオダール錠100mg
● モニラックシロップ65% [600mL]
(院内はラクツロースシロップ65%「カタ」)
● モニラックシロップ65% [10mL/包]
● モバ錠100mg (【般】アクタリット錠100mgへ切替)
● モビコール配合内用剤HD
モビコール配合内用剤LD (モビコール配合内用剤より名称変更)
劇モビック錠10mg (院内はメロキシカム錠10mg「トワ」)
(【般】メロキシカム錠10mgへ切替)
モビブレップ配合内用剤
麻毒モルヒネ塩酸塩水和物「カタ」原末 g
麻劇モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 0.5g/包 【後】
(モルペス細粒2%から名称変更)
●麻劇【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg (12時間持続) (モルペス)
●麻劇モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
麻劇モルペス細粒2% [0.5g/包] 【後】
(モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」へ名称変更)
○ モンテルカストOD錠10mg「カタ」 【後】
● 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg (キプレス, シングレア)
● 【般】モンテルカスト細粒4mg 4mg/包 (キプレス, シングレア)
● 【般】モンテルカスト錠5mg (キプレス, シングレア)
● 【般】モンテルカスト錠10mg (キプレス, シングレア)
○ モンテルカストチュアブル錠5mg「トワ」 【後】
(キプレスチュアブル錠5mgから切替)
● 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg (キプレス, シングレア)
【ヤ】
薬用炭「日医工」 (50g)
● ヤーズ配合錠 1シート
(【般】ドロスピノン・エチルエストラジオール配合錠・フロセモ錠へ切替)
● ヤーズフレックス配合錠 1シート

【ユ】

- 効ユーエフティ E 配合顆粒 T 100 [100mg/0.5g/P]
- 効ユーエフティ E 配合顆粒 T 150 [150mg/0.75g/P]
- 効ユーエフティ E 配合顆粒 T 200 [200mg/1g/P]
- 効ユーエフティ 配合カプセル T 100
 - ユーゼル錠25mg (【般】ホリナート錠25mgへ切替)
ユナシン細粒小児用10% 100mg/g
 - ユナシン錠375mg
- 効ユニシア配合錠レ D
 - (【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠へ切替)
- 効ユニシア配合錠レ D
 - (【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠へ切替)
- 効ユニフィルレ A 錠200mg
 - (院内はテオフィリン徐放U錠200mg「トワ」)
 - (【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続) へ切替)
- 効ユバンシ配合錠
 - ユーピット錠100mg
- ユビデカレノン錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】ユビデカレノン錠10mg (ノイキノン)
ヨペラ顆粒20% (販売中止)
 - (トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハ」へ切替)
 - ヨペラ錠50mg (トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トワ」へ切替)
 - (【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mgへ切替)
- ヨペラ N カプセル100mg
 - (【般】トコフェロールニコチニン酸エステルカプセル100mgへ切替)
 - ユリス錠1mg
- ユリス錠2mg
- 効ユリノーム錠50mg (院内はベンズプロマロン錠50mg「NIG」)
 - (【般】ベンズプロマロン錠50mgへ切替)
- 効ユリーフォレ D 錠2mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mgへ切替)
- 効ユリーフォレ D 錠4mg (【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mgへ切替)
- 向ユーロジン2mg錠 (【般】エスタゾラム錠2mgへ切替)

【ヨ】

- 劇ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 (院内製剤原料)
 - ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
 - ヨウ化カリウム内服ゼリ-16.3mg「日医工」 (備蓄用) [1g/P]
 - 幼児用Pレ 配合顆粒 [1g/P]
- 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5% (インクレミン)
- ヨクイニンエキス錠「コロ-」 T72
- 【ラ】
- ラキソペロン錠2.5mg (【般】なし)
 - (【般】ピヨスルファ-トN-a錠2.5mgへ切替)
- ラキソペロン内用液0.75% [75mg/10mL/瓶]
 - (【般】ピヨスルファ-トN-a経口液0.75% 10mLへ切替)
- ラクソロースシロップ65%「効外」 【後】
 - (ピアーレシロップ65%より名称変更)
- 【般】ラクソロースシロップ65% (モニラック)
- 【般】ラクロス経口ゼリ-54.167% 12g/包 (ラグノスN Fゼリー)
- ラグノスN F 経口ゼリー一分包12g 【後】
 - (【般】ラクロス経口ゼリ-54.167% 12g/包へ切替)
- ※ 効ラグブリオカプセル200mg (ラグブリオ錠400mgへ切替予定)
 - 効ラグブリオ錠400mg (ラグブリオカプセル200mgが無くなり次第切替)
ラコールN F 配合経腸用半固形剤 [300g/袋]
(イソソリッド配合経腸用半固形剤へ切替)
ラコールN F 配合経腸用液(ミルクフレーバー) [200mL/袋]
 - ラコールN F 配合経腸用液(コーンフレーバー) [200mL/袋]
ラコールN F 配合経腸用液 [400mL/袋]

- ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL/瓶 [2~8°C]
- ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL/瓶 [2~8°C]
- ラシックス細粒4% (院内はフロセミド細粒4%「EMEC」)
 - (【般】フロセミド細粒4%へ切替)
 - ラシックス錠20mg (フロセミド錠20mg「NIG」へ切替)
 - (【般】フロセミド錠20mgへ切替)
- ラシックス錠40mg (【般】フロセミド錠40mgへ切替)
 - ラジレス錠150mg
 - 劇ラズクルーズ錠80mg
 - 劇ラステットS カプセル25mg
 - ラスピック錠75mg
 - ラックビー微粒N 1% [1g/P]
- 劇ラツーダ錠20mg
- 効ラツーダ錠40mg
- 効ラツーダ錠80mg
 - ラディオガルダーゼカプセル500mg
 - 劇ラニラピッド錠0.05mg (【般】なし)
 - 劇ラニラピッド錠0.1mg (【般】メチルジゴキシン錠0.1mgへ切替)
 - 劇ラパリムス顆粒0.2%
 - 劇ラパリムス錠1mg
 - ラフチジン錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg (プロテカジン)
- ラベキュアパック400 1シート
 - (販売終了) (2026年3月31日経過措置終了)
- 【般】ラベタロール塩酸塩錠50mg (トランデート)
- ラペファインパック 1シート
- ラベプラゾールN a錠5mg「YD」 【後】
- ラベプラゾールN a錠10mg「トワ」 【後】
- 【般】ラベプラゾールN a錠5mg (バリエット)
- 【般】ラベプラゾールN a錠10mg (バリエット)
- 【般】ラベプラゾールN a錠20mg (バリエット)
 - 向劇ラボナ錠50mg
- 【般】ラマトロバン錠75mg (バイナス)
- ラミアン錠5mg 【後】 (【般】シンバスタチン錠5mgへ切替)
- 効ラミクタール錠小児用2mg
- 効ラミクタール錠小児用5mg (【般】ラモトリギン錠5mgへ切替)
- 劇ラミクタール錠25mg (院内はラモトリギン錠25mg「アメル」)
 - (【般】ラモトリギン錠25mgへ切替)
- 効ラミクタール錠100mg (【般】ラモトリギン錠100mgへ切替)
 - ラミシール錠125mg (テルビナフィン錠125mg「VTRS」へ切替)
- ラメルテオニ錠8mg「JG」 【後】
- 【般】ラメルテオニ錠8mg (ロゼレム)
- 【般】ラモトリギン錠2mg (ラミクタール)
- 【般】ラモトリギン錠5mg (ラミクタール)
- 効ラモトリギン錠25mg「アメル」 【後】
- 【般】ラモトリギン錠25mg (ラミクタール)
- 効ラモトリギン錠100mg「アメル」 【後】
- 【般】ラモトリギン錠100mg (ラミクタール)
- 効ラモトリギン錠小児用5mg「トワ」 【後】
- 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg (エビスタ)
- ランソプラゾールO D錠15mg「サリ」 【後】
- 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg (タケプロン)
- 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg (タケプロン)
- 効ランデル錠20 20mg
 - ランブレンカプセル50mg [35°C以上禁]

【リ】

- リアルダ錠1200mg [冷]

- 劇リウマトーネックスカプセル2mg
 (メトトレキサート錠2mg「JG」へ切替)
 (【般】メトトレキサート錠2mgへ切替)
 リオナ錠250mg
 リオベル配合錠L D
 ● リオベル配合錠H D
 ● 劇リカルボン錠1mg (【般】ミノドロン酸錠1mgへ切替)
 ● 劇リカルボン錠50mg (【般】ミノドロン酸錠50mgへ切替)
 リクシアナOD錠15mg
 リクシアナOD錠30mg
 リクシアナOD錠60mg
 ○劇リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 【後】
 ● 【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg (マクサルトR P D)
 ● サザベンカプセル100mg
 (【般】トランニラストカプセル100mgへ切替)
 ● 劇リスパダール細粒1%
 ● 劇リスパダールOD錠1mg
 ● 劇リスパダール内用液1mg/mL [30mL/瓶]
 ● 劇リスパダール内用液1mg/mL [0.5mL/包]
 ● 劇リスパダール内用液1mg/mL [1mL/包]
 ● 劇リスパダール内用液1mg/mL [2mL/包]
 ○劇リスペリドン細粒1%「トワ」 【後】
 ● 【般】リスペリドン細粒1% (リスパダール)
 ● リスペリドン錠0.5mg「ヨドミ」 【後】 (【般】なし)
 ● 【般】リスペリドン錠0.5mg (リスパダール)
 ● 【般】リスペリドン錠1mg (リスパダール)
 ○劇リスペリドンOD錠1mg「アメル」 【後】
 ● 【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg (リスパダール)
 ○劇リスペリドン内用液1mg/mL「カタ」 【後】
 ○劇リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 [0.1%0.5mL/包] 【後】
 ● 【般】リスペリドン経口液0.1% 0.5mL (リスパダール)
 ● 【般】リスペリドン経口液0.1% 1mL (リスパダール)
 ● 【般】リスペリドン経口液0.1% 2mL (リスパダール)
 ● 【般】リスペリドン経口液0.1% 3mL (リスパダール)
 ● リスミー錠1mg (【後】なし)
 ● リスミー錠2mg (【般】なし)
 ● サズミック錠10mg
 (院内はアメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トワ」)
 (【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mgへ切替)
 ● 劇リスモダンカプセル50mg
 (院内はジンピラミドカプセル50mg「ファイー」)
 (【般】ジンピラミドカプセル50mgへ切替)
 劇リスモダンR錠150mg
 (【般】ジンピラミドリン酸塩徐放錠150mgへ切替)
 ● 向リーゼ錠5mg (院内はクロチアゼパム錠5mg「カイ」)
 (【般】クロチアゼパム錠5mgへ切替)
 ● 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg (アクトネル)
 ● 【般】リセドロン酸Na錠17.5mg (アクトネル)
 ● 【般】リセドロン酸Na錠75mg (アクトネル)
 ○劇リセドロン酸Na錠75mg「トワ」 【後】
 ● 向劇リタリン錠10mg
 ○ サックル配合顆粒 [4.74g/P] 【後】 (販売中止)
 (リーバクト配合顆粒へ切替)
 (【般】イロイシ・ロイシ・バリン配合顆粒 4.74g/包へ切替)
 ● 劇リットフーロカプセル50mg
 ● 劇リトゴビ錠4mg
 ○ リトドリン塩酸塩錠5mg「日新」 【後】
 ● 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg (ウテメリソ)
- リーバクト配合顆粒 [4.15g/P]
 ● リーバクト配合経口ゼリー [20g/個]
 ● リパクレオン顆粒300mg分包
 リパクレオンカプセル150mg
 ● リバゼブ配合錠L D
 ● リバゼブ配合錠H D
 ● サバロOD錠1mg
 (【般】ピタバスタチンC a 口腔内崩壊錠1mgへ切替)
 ● サバロOD錠2mg (院内はピタバスタチンC a · OD錠2mg「トワ」)
 (【般】ピタバスタチンC a 口腔内崩壊錠2mgへ切替)
 ● サバロOD錠4mg
 (【般】ピタバスタチンC a 口腔内崩壊錠4mgへ切替)
 ● 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg (イグザレルト)
 ● 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg (イグザレルト)
 サビデイル錠80mg
 (院内はフェノフィラート錠80mg「武田テバ」へ切替)
 (【般】フェノフィラート錠80mgへ切替)
 ● サビトール錠10mg (【般】アトルバスタチン錠10mgへ切替)
 ● サフアジンカプセル150mg
 (院内はリファンピシンカプセル150mg「サンド」)
 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 【後】 (【般】なし)
 ● 【般】サフアジンカプセル150mg (リファジン)
 リフキシマ錠200mg
 劇リブテンシティ錠200mg
 ● リフヌア錠45mg
 劇リフレーネックス錠15mg (ミルタザビン錠15mg「トワ」へ切替)
 (【般】ミルタザビン錠15mgへ切替)
 劇リベルサス錠3mg
 劇リベルサス錠7mg
 ● 劇リベルサス錠14mg
 向リポトリール細粒0.5%
 向リポトリール錠0.5mg
 ● サポバース錠5-5mg (【般】シンバスタチン錠5mgへ切替)
 ● 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg (ハイポン)
 劇リーマス錠100-100mg (炭酸リチウム錠100「大正」へ切替)
 ● 劇リーマス錠200-200mg (院内は炭酸リチウム錠200「大正」)
 (【般】炭酸リチウム錠200mgへ切替)
 劇リマチル錠100mg (【般】ブシラミン錠100mgへ切替)
 ○ リマプロストアルファデクス錠5μg「カイ」 【後】
 ● 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg (オルモン, ブロナール)
 劇リムバーザ錠100mg
 劇リムバーザ錠150mg
 硫酸アトロピシン「ホイ」
 (アトロピシン硫酸塩水和物「ホイ」原末へ名称変更)
 硫酸マグネシウム「東海」 (院内製剤原料) (販売中止)
 サリカOD錠25mg (プレガバリンOD錠25mg「明治」へ切替)
 (【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mgへ切替)
 サリカOD錠75mg (プレガバリンOD錠75mg「明治」へ切替)
 (【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mgへ切替)
 ● サリカOD錠150mg
 (【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mgへ切替)
 ○ リルゾール錠50mg「ゴロ」 【後】
 ● 【般】リルゾール錠50mg (リルテック)
 サルテック錠50-50mg (リルゾール錠50mg「ゴロ」へ切替)
 (【般】リルゾール錠50mgへ切替)
 ● 劇リンヴォック錠7.5mg
 ● 劇リンヴォック錠15mg

- 効リンヴォック錠30mg
効リンヴォック錠45mg
効リン酸コデイン散1%「カイ」
- リン酸水素カルシウム水和物「エピス」
(リン酸水素カルシウム水和物「ヨウ」から切替)
リンゼス錠0.25mg
リンデロン錠0.5mg (【般】ベタメタゾン錠0.5mgへ切替)
リンデロンシロップ0.01%
- 【ル】
 - ルジオミール錠10mg
 - ルゾオミール錠25mg (【般】マプロチリン塩酸塩錠25mgへ切替)
ルセフィ錠2.5mg
 - ルセフィODフィルム2.5mg
ルトラール錠2mg
 - ルナペル配合錠U-L-D
(【般】ルチステロン・エチニルエストラジオール0.02mg配合錠)
 - ルナペル配合錠U-L-D
(【般】ルチステロン・エチニルエストラジオール0.035mg配合錠へ切替)
ルネスタ錠1mg (エスゾビクロン錠1mg「日新」へ切替)
 - ルネスタ錠2mg
ルパフィン錠10mg
劇ルブキネスカプセル7.9mg
ルブタック錠8mg (トラセミドOD錠8mg「TE」へ切替)
 - ルボックス錠25-25mg
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mgへ切替)
 - ルボックス錠50-50mg
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mgへ切替)
 - ルボックス錠75-75mg
(【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mgへ切替)
劇ルマケラス錠120mg
 - 効ルーラン錠4mg (院内はペロスピロン塩酸塩錠4mg「アル」)
(【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mgへ切替)
 - 【レ】
 - 効レイポー錠50mg
 - 効レイポー錠100mg
劇レキサルティOD錠0.5mg
劇レキサルティOD錠1mg
 - 効レキサルティOD錠2mg
 - 向レキソタシ錠2-2mg (採用薬はプロマゼパム錠2mg「サンド」へ切替)
(【般】プロマゼパム錠2mgへ切替)
 - 効レキップ錠0.25mg (【般】ロビニロール錠0.25mgへ切替)
劇レキップ錠1mg (院内はロビニロールOD錠1mg「アル」)
(【般】ロビニロール口腔内崩壊錠1mgへ切替)
 - 効レキップ錠2mg (【般】ロビニロール錠2mgへ切替)
劇レキップC-R錠2mg (院内はロビニロール徐放錠2mg「トワ」)
(【般】ロビニロール徐放錠2mgへ切替)
 - 効レキップC-R錠8mg (【般】ロビニロール徐放錠8mgへ切替)
劇レクサプロ錠10mg (【般】エスシタロプラム錠10mgへ切替)
レクチゾール錠25mg
レグテクト錠333mg
 - レグナイト錠300mg
 - レグバラ錠12.5mg
レグバラ錠25mg
 - レザルタス配合錠L-D
レザルタス配合錠H-D
レスタミンコーワ錠10mg
レスビア静注・経口液60mg 3mL瓶
レスプレン錠20mg
- 効レスサン錠50-50mg (【般】トラゾドン塩酸塩錠50mgへ切替)
劇レズロック錠200mg
- 効レットヴィモカプセル40mg
- 効レットヴィモカプセル80mg
- 効レトロゾール錠2.5mg「カイ」 【後】
- 【般】レトロゾール錠2.5mg (フェマーラ)
劇レトロビルカプセル100mg
レナデックス錠4mg
- 毒ナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」 【後】
- 毒【般】レナリドミドカプセル2.5mg (レブラミド)
- 毒ナリドミドカプセル5mg「BMSH」 【後】
- 毒【般】レナリドミドカプセル5mg (レブラミド)
- レニペース錠2.5-2.5mg
(【般】エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mgへ切替)
- レニペース錠5mg (院内はエナラブリルマレイン酸塩錠5mg「トワ」)
(【般】エナラブリルマレイン酸塩錠5mgへ切替)
- 効レバグリニド錠0.25mg「カイ」 【後】
- 【般】レバグリニド錠0.25mg (シュアポスト)
- 効レバグリニド錠0.5mg「カイ」 【後】
- 【般】レバグリニド錠0.5mg (シュアポスト)
レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg
レバチオ錠20mg (【般】シルデナフィル錠20mg: R-Eへ切替)
- レバミピド錠100mg「トワ」 (【般】加算なし)
- 【般】レバミピド錠100mg (ムコスタ)
毒レブラミドカプセル2.5mg
(【般】レナリドミドカプセル2.5mgへ切替)
- レバチラセタムD S 50%「トワ」 【後】
- レバチラセタム錠500mg「カイ」 【後】
- 【般】レバチラセタム錠500mg (イーケプラ)
● 【般】レバチラセタムシロップ用50% (イーケプラドライシロップ)
- レボカルニチンF錠250mg「トワ」 【後】
- 【般】レボカルニチンF錠250mg (エルカルチン)
- レボカルニチンF錠内用液10%「トワ」 【後】
- 【般】レボカルニチンF錠経口液10% (エルカルチン)
- レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」 【後】
- レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トワ」 【後】
- 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg (ザイザル)
- 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% (ザイザルシロップ)
- 効レボチロキシンNa錠25μg「サンド」
- 効レボチロキシンNa錠50μg「サンド」
- 【般】レボドバ100mg・カルビドバ配合錠 (ネオドバストンL)
- 【般】レボドバ250mg・カルビドバ配合錠 (メネシット)
- 【般】レボフロキサシン錠250mg
レボフロキサシン錠500mg「カイ」 【後】
- 【般】レボフロキサシン錠500mg (クラビット)
- 【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg (ヒルナミン)
劇レボレード錠12.5mg
- 効レミッヂカプセル2.5μg (販売中止)
(【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μgへ切替)
- 劇レミッヂOD錠2.5μg
(【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μgへ切替)
- 劇レミニールOD錠4mg
(【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mgへ切替)
- 劇レミニールOD錠8mg
(【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mgへ切替)

- 劇レミニールOD錠12mg
 (【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mgへ切替)
- レリフェン錠400mg
 劇レルミナ錠40mg
- 向レンドルミニンD錠0.25mg
 (【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mgへ切替)
 劇レンビマカプセル4mg
 劇レンビマカプセル10mg
- 【口】
 劇ロイケリン散10%
 ロイコボリン錠5mg
 ロイコン錠10mg
- 劇ロカルトロルカプセル0.25-0.25μg
 (【般】カルシトリオールカプセル0.25μgへ切替)
 ● ローガン錠10mg
- 【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg (アルタット)
 ● ヨキソニン錠60mg (院内はロキソプロフェンNa錠60mg「トワ」)
 (【般】ロキソプロフェンNa錠60mgへ切替)
- 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg (ロキソニン)
 ○ ロキソプロフェンNa錠60mg「トワ」 【後】
 ロケルマ懸濁用散分包5g 1包
 ● ロケルマ懸濁用散分包10g 1包
- ヨーコール錠30mg (【般】フルバスタチン錠30mgへ切替)
 ● ヨヨルナール錠100mg (【般】トラピジル錠100mgへ切替)
 ○ ロサルタンK錠25mg「トワ」 【後】
- 【般】ロサルタンK錠25mg (ニューロタン)
 ● 【般】ロサルタンK錠50mg (ニューロタン)
 ● 【般】カルタ100mg・ヒドロキシチアジド配合錠 (プレミネットHD)
 ● 【般】カルタ50mg・ヒドロキシチアジド配合錠 (プレミネットLD)
 ロスーゼット配合錠HD
- ロスバスタチンOD錠2.5mg「トワ」 【後】
 ● 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg (クレストール)
 ● 【般】ロスバスタチン錠5mg (クレストール)
 劇ロズリートレクカプセル100mg
 劇ロズリートレクカプセル200mg
 ヨゼレム錠8mg (ラメルテオン錠8mg「JG」へ切替)
 (【般】ラメルテオン錠8mgへ切替)
- 劇ロタリックス内用液 1.5mL/本 [冷]
- 劇ロートエキス散 10%
- 劇ロドビン錠25mg (院内はゾテビン錠25mg「カタ」)
 (【般】ゾテビン錠25mgへ切替)
 ヨトリガ粒状カプセル2g [2g/包]
 (オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トワ」へ切替)
 (【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2gへ切替)
- 劇ロナセン錠4mg (【般】プロナセンゼリン錠4mgへ切替)
- 劇ロナセン錠8mg (【般】プロナセンゼリン錠8mgへ切替)
 ○劇ロビニロールOD錠1mg「アメル」 【後】
- 【般】ロビニロール口腔内崩壊錠1mg (レキップ)
 ● 【般】ロビニロール錠0.25mg (レキップ)
 ● 【般】ロビニロール錠1mg (レキップ)
 ● 【般】ロビニロール錠2mg (レキップ)
- 劇ロビニロール徐放錠2mg「トワ」 【後】
 ● 【般】ロビニロール徐放錠2mg (レキップCR)
 ● 【般】ロビニロール徐放錠8mg (レキップCR)
 ○向ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トワ」 【後】
 ● 【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg (メイラックス)
- 劇ロプレソール錠20mg (【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mgへ切替)

外用薬リスト

【ア】

- 劇アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL1個
- アイドロイシン1%点眼液 5mL 【後】
(【般】コドロイシン硫酸エチルNa点眼液1% 5mLへ切替)
劇アイノフロー吸入用800ppm (N I C Uの限定使用)
 アフターガン点眼液0.1%—5mL
(プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」へ切替)
(【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%へ切替)
- アイベータ配合点眼液 5mL/瓶
- アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/瓶
- 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ 【後】
- 【般】亜鉛華単軟膏10% (サトウザルベ)
 アクアチムタリーム1%—10g(院内はナジフロキサシンクリーム1%「トワ」)
(【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g/本へ切替)
 アクアチムローション1%—20mL
(ナジフロキサシンローション1%「トワ」へ切替)
(【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本へ切替)
 アクトシン軟膏3% 30g [冷]
 アクトシン軟膏3% 200g [冷]
 アジマイシン点眼液1% 2.5mL/瓶 [冷]
劇亜硝酸アミル「AFP」 0.25mL1管 [冷]
- アスタット軟膏1% 10g (【般】なし)
(【般】ラノノナゾール軟膏1%—10mg/本へ切替)
 アズノール軟膏0.033% 20g
 アズノール軟膏0.033%—500g (供給停止)
(アズノール軟膏0.033% 20gへ切替)
 アズノールST錠口腔用5mg
 アヌスル液(0.5%)—50mL/瓶
- アズマネックスツツイストヘラー100μg60吸入 6mg1キット
(販売中止) (2026年3月31日経過措置終了(予定))
- アズレングウがい液4%「ケンエー」 5mL 【後】
- 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% 5mL/瓶
- 【般】アズレングル酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤2g/包(バザンレ)
劇アセサイド6%消毒液(第一剤、第二剤とも800mLセット) [1~25°C]
[内視鏡洗浄消毒装置OER-4専用]
- 劇アセサイド6%消毒液(第一剤、第二剤とも875mLセット) [1~25°C]
[内視鏡洗浄消毒装置OER-3専用]
- アセチヨールクリーム20%—25g 【後】
(尿素クリーム20%「SUN」へ名称変更)
(【般】尿素クリーム20% 25g/本へ切替)
- 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg (アンヒバ)
- アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL
- 【般】アダパレンゲル0.1% 15g/本 (ディフェリンゲル)
- アテキュラ吸入用カプセル低用量
 アテキュラ吸入用カプセル中用量
 アテキュラ吸入用カプセル高用量
 アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g1瓶
 アドエア100ディスカス60吸入用 60gリスター1キット
- アドエア250ディスカス60吸入用 60gリスター1キット
- アドエア500ディスカス60吸入用 60gリスター1キット
- アドフィードパップ40mg 10cm×14cm(7枚入)
劇日点アトロビン点眼液1% 5mL
- アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 1キット
- アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 1キット
- アノーロエリプタ7吸入用 1キット
 アノーロエリプタ30吸入用 1キット
- デフタシール25μg—1枚(10枚入) 【後】
(トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」へ名称変更)
 アボコート軟膏0.1%—5g 【後】
- アポハイドローション20% 4.32g/本
 アラセナ-A軟膏3% 5g (【般】ビダラビン軟膏3% 5g/本へ切替)
 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g1キット
(【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用へ切替)
- アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 5mg10g1キット
(【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用へ切替)
 アリケイス吸入液590mg 8.4mL瓶 [2~8°C]
- 劇アリドネパチ27.5mg 1枚
- 劇アリドネパチ55mg 1枚
- 【般】アルカメタゾンロビン酸エチル軟膏0.1%—5g/本 (アルメタ軟膏)
 アルト原末 500mg1管
- アルメタ軟膏 0.1%5g (【般】なし)
(【般】アルカメタゾンロビン酸エチル軟膏0.1%—5g/本へ切替)
- アレサガテープ4mg 1枚
- アレサガテープ8mg 1枚
 アレジオンL X点眼液0.1% 5mL/瓶
(【般】エピナステチン塩酸塩点眼液0.1%へ切替)
 アレジオン眼瞼クリーム0.5% 2g/本
 アロノアルファA「三共」—0.5g1管 [冷] (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了(予定))
- 劇アンテベート軟膏0.05%—5g
(院内はバタゾン酸エチルロビン酸エチル軟膏0.05%「MYK」)
- 劇アンテベートクリーム0.05%—5g
(院内はバタゾン酸エチルロビン酸エチルクリーム0.05%「MYK」)
- 劇アンテベートローション0.05%—10g
(院内はバタゾン酸エチルロビン酸エチルローション0.05%「JG」)
 アンヒバ坐剤小児用100mg [冷]
 アンヒバ坐剤小児用200mg [冷]
(【般】アセトアミノフェン坐剤200mgへ切替)
- 麻劇アンペック坐剤10mg
- 【イ】
- イオウ・カンフルローション「東豊」 500mL [冷]
劇イクセロンパッチ4.5mg 1枚
(【般】リバスチグミンテープ4.5mgへ切替)
- 劇イクセロンパッチ9mg 1枚
(【般】リバスチグミンテープ9mgへ切替)
- 劇イクセロンパッチ13.5mg 1枚
(【般】リバスチグミンテープ13.5mgへ切替)
- 劇イクセロンパッチ18mg 1枚
(【般】リバスチグミンテープ18mgへ切替)
 産婦人科用イソジンクリーム5% 250g
 イソジンガーガル液7%—30mL
(ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mLへ切替)
(【般】ポビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本へ切替)
 イソジンゲル10% 90g
- イソジンシエガーパスタ軟膏100g 【後】 (販売中止)
(【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 100g/瓶へ切替)
- イソジンシエガーパスタ軟膏500g 【後】
- 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL/瓶 (レスキュラ)
 イナビル吸入粉末剤20mg 1キット
- 劇イミグラン点鼻液20 20mg0.1mL1個
 劇イムノブラダー膀胱用80mg 1瓶 (溶解液付) [冷]
- インタール吸入液1%—2mL1管 (クロモリカ酸Na吸入液1%「サウイ」)

- インテバンクリーム1% 50g
- インテバン外用液1%—50mL
 - (【般】 インドメタシン外用液1% 50mL/本へ切替)
- 【般】 インドメタシン外用液1% 50mL/本 (インテバン)
- 【ウ】
 - ※ ウエルアップハンドローション0.5% 1L
 (ヒビスコール液A 1% 1Lへ切替)
 - ウトロゲスタン塗用カプセル200mg
 - ウルティプロ吸入用カプセル
 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3L
- 【エ】
 - エイゾープト懸濁性点眼液1%—5mL
 - (【般】 プリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶へ切替)
 - 劇エイベリス点眼液0.002% 2.5mL [2~8°C]
 エキザルベ軟膏 5g
 エキザルベ軟膏 500g
 エクラーブラスター20 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ (1.5mg)7.5cm × 10cm
 - エクリラ400 μg ジェヌエア30吸入用
 - エクリラ400 μg ジェヌエア60吸入用
 - エクロックゲル5%
 - エコリシン眼軟膏 3.5g
 A C D-A液 500mL1袋
 エスクレ坐剤「250」 250mg [冷]
 - エストラーナテープ0.09mg 1.125cm²1枚
 - エストラーナテープ0.18mg 2.25cm²1枚
 - エストラーナテープ0.36mg 4.5cm²1枚
 エストラーナテープ0.72mg 9cm²1枚
 エストリール腔錠0.5mg
 - 【般】 エストリオール腔錠0.5mg
 - S Pトローチ0.25mg「明治」 【後】
 - (【般】 デカリニウム塩化物トローチ0.25mgへ切替)
 - エタノール[局] 500mL
 - 【般】 エタノール外用液
 エタノール[無水] 500mL
 エナジア吸入用カプセル中用量
 エナジア吸入用カプセル高用量
 - 効エビデュオゲル 15g
 - 【般】 エビナステン塩酸塩点眼液0.1% (アレジオンL X)
 - 【般】 エフィナコナゾール外用液10% (クレナフィン爪外用液)
 効エムラクリーム 5g [凍結を避け30°C以下]
 効エムラバッチ 1枚 [禁凍結]
 - エリザスカブセル外用400 μg
 - エリザス点鼻粉末200 μg 28噴霧用 5.6mg1瓶
 エルエイジー10液—10%500mL【後】 (販売中止)
 (サテニジン液10へ切替) (2026年3月31日経過措置終了)
 塩化アルミニウム(6水和物) 500g
 塩化ナトリウム 500g
 塩化ベンザルコニウム液 (=逆性石ケン液0.025「ヨシダ」) 0.025%5L
 - エンクラッセ62.5 μg エリプタ30吸入用
 エンペシド外用液1%—10mL
 (クロトリマゾール外用液1%「日医工」へ切替)
 - エンペシドタリム1%—10g
 - (【般】 クロトリマゾールクリーム1% 10g/本へ切替)
 - 【オ】
 - オイラックスクリーム10% 500g
 オイラックスHクリーム 5g
 オオサキCHG消毒綿0.2% [2枚/包] (物品供給センターで取扱い)

- 劇オキサロール軟膏25 $\mu\text{g}/\text{g}$ 10g
 (【般】 マキサカルシートル軟膏0.0025% 10g/本へ切替)
- 効オキサロールローション25 $\mu\text{g}/\text{g}$ 10g
- オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」 【後】
- 【般】 オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg (オキナゾール)
 オーキシス9 μg タービュヘイラ-28吸入 252 μg 1キット
 オキシドール「ケンエ-」 500mL
 オキナゾール腔錠600mg (オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」)
 オタソラレン軟膏0.3%—10g
 オタソラレンローション0.3%—60mL
 オスバン消毒液10% 500mL
 (【般】 ベンザルコニウム塩化物外用液10% 500mL/本へ切替)
 オフミック点眼液 5mL/瓶 【後】
- オフロキサシングル化点眼液0.3%「わかもと」 5mL [冷] 【後】
 オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 3.5g
 (オフロキシン眼軟膏0.3%より名称変更)
 オフロキシン眼軟膏0.3%—3.5g
 (オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」へ名称変更)
 オペガードMA眼灌流液 20mL
 オペガシナハイ0.85眼粘弾剤1%—0.85mL筒 [冷] 【後】
 (ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」へ名称変更)
 オラネジン液1.5%OR消毒用アプロテカ10mL
 オラネジン液1.5%OR消毒用アプロテカ25mL
 オラビ錠口腔用50mg
 オリブ油 (丸石) 500mL
 オリブ油「ヨシダ」 (滅菌済) 100mL
- オルテクサーオ口腔用軟膏0.1% 5g 【後】
 (【般】 トリアルゴニアセトド口腔用軟膏0.1% 5gへ切替)
- オルベスコ100 μg インヘラ-112吸入用 11.2mg6.6g 1キット
 オルベスコ200 μg インヘラ-56吸入用 11.2mg3.3g 1キット
- 【般】 オロバタジン点眼液0.1% (バタノール)
- オンプレス吸入用カプセル150 μg
- 【カ】
 - カタリンK点眼用0.005% 15mL
 - ガチフロ点眼液0.3% 5mL
 カデックス軟膏0.9% 40g
 - カトレップテープ35mg 7cm × 10cm(7枚入)
 (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了)
 - カルテオロール塩酸塩L A点眼液2%「わかもと」 2.5mL 【後】
 - 【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL/瓶 (ミケランL A)
 - 【般】 カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本 (フロジン外用液)
- 【キ】
 - キサラタン点眼液0.005%—2.5mL [冷]
 (院内はラタノプロスト点眼液0.005%「ヤハ」)
 - (【般】 ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/瓶へ切替)
 キシロカイン液「4%」 100mL
 キシロカイン点眼液4% 20mL/瓶 [冷]
 - 劇キシロカインポンプスプレー8% 80g 【後】
 キシロカインゼリー2% 30mL
 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 (=塩化ベンザルコニウム液 0.025%)—5L
 (販売中止) (500mL/瓶へ切替)
 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」
 (=塩化ベンザルコニウム液 0.025%) 500mL/瓶
 - キュバール50エアゾール 7mg8.7g
 ● キュバール100エアゾール 15mg8.7g
 効ギアリデル脳内留置用剤7.7mg 1箱 (8枚入) [-15°C以下]
 キンダベート軟膏0.05% 5g
 (【般】 クロヘンゾラゾラム酸エチル軟膏0.05% 5g/本へ切替)

【ク】

- クエン酸ナトリウム 500g
● グラアルファ配合点眼液 5mL/瓶
グラナテック点眼液0.4% 5mL
● クラビット点眼液1.5%—5mL
(レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」へ切替)
(【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/瓶へ切替)
グリセリン 500mL
グリセリン「ケンエー」(滅菌済) 25mL
グリセリン「ヨウダ」(滅菌済) 100mL (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了)
グリセリンB C液「ヨウダ」 100mL (ボリ)
グリセリン浣腸「オタ」小児用30 50%30mL 【後】
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 120mL
● 【般】クリンダマシンリン酸エステルゲル1% 10g/本 (ダラシンTゲル)
グルコン酸クロルヘキシジン液(=スリクソンW液0.05) 0.05%500mL
● クレナフィン爪外用液10%—3.56g
(院外は【般】エフィナコナゾール外用液10%へ切替)
● 【般】クロトリマゾール外用液1% 15mL/本 (エンペシド外用液)
○劇クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イキ」 5g/本【後】
● 【般】ケバタゾルロビン酸エスル外用液0.05% 10g/本 (デルモバート)
● 【般】ケバタゾルロビン酸エスル軟膏0.05% 5g/本
● 【般】ケバタゾン酸エスル軟膏0.05% 5g/本 (キンダベート軟膏)
● 【般】クロトリマゾールクリーム1% 10g/本 (エンペシドクリーム)
クロマイ錠100mg
クロモグリク酸Na吸入液1%「サウ」 2mL1管 【後】
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 250mL
● 【般】ケルベキシジンルコン酸塩外用液0.05% 500mL/本 (ヒビテン)
【ケ】
○ ケトコナゾールクリーム2%「イキ」 10g/本 【後】
(ニゾラールクリーム2%から切替)
● 【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g/本 (ニゾラールクリーム)
○ ケトプロフェンテープ20mg「BMD」 7cm×10cm (7枚入) 【後】
● 【般】ケトロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) 7枚/袋 (モーラステープ)
● 【般】ケトロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (モーラステープ)
○ ケトプロフェンパック30mg「日医工」 10cm×14cm (7枚入) 【後】
● 【般】ケトロフェンパック30mg(10×14cm非温感) 7枚/袋 (モーラスパック)
● 【般】ケトロフェンパック120mg(10×14cm非温感)
7枚/袋 (モーラスパックXR)
ケナログ口腔用軟膏0.1%—5g (院内はオルテクサ-口腔用軟膏0.1%)
(【般】トリアミン/ロニアセトド-口腔用軟膏0.1% 5g/本へ切替)
ゲーベンクリーム1% 500g
● ケラチナミンコ-ワタリ-ム20%—25g (院内は尿素クリム20%「SUN」)
(【般】尿素クリム20% 25g/本へ切替)
ケンエーハイポアルコール(=ハイポタノール) 8% 500mL
● ゲンタシン軟膏0.1% 10g
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イキ」 10g/本
【コ】
麻劇コカイン塩酸塩「タダ」原末 (販売中止)
● ヨソプト配合点眼液—5mL
(【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5mL/瓶へ切替)
● 劇コムクロシャンプー0.05% [125g/本]
● コムレクス耳科用液1.5% 5mL/瓶
● コレクチム軟膏0.25% 5g/本
コレクチム軟膏0.5% 5g/本
● 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1% 5mL (コンドロン)

【サ】

- サイプレジン1%点眼液 10mL
○ サージセルアブソバブルヘムスターガゼ型 5.1cm×7.6cm 【後】
○ サージセルアブソバブルヘムスターニュニット 15.2cm×22.9cm 【後】
○ サージセルアブソバブルヘムスター綿型II (シ) 5.1cm×2.5cm 【後】
[上記3種(サージセル)は医療機器扱いとなり、薬剤部での取り扱いは終了]
サテニジン液10 500mL 【後】
ザ-ネ軟膏0.5% 500g
サーファクテン気管注入用120mg 1瓶 [冷]
劇サホライド液歯科用38% 5g
● ザラカム配合点眼液—2.5mL [冷]
(【般】ラタノプロト・チモール配合点眼液 2.5mL/瓶へ切替)
● サラゾビリソウム坐剤500mg
サリチル酸ワセリン軟膏5% (東豊) 500g 【後】
● 【般】サリチル酸軟膏5%
● サリベートエアゾール 50g
サルグマリン吸入用250μg 1瓶 [2~8°C]
● サンコバ点眼液0.02%—5mL
(【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL/瓶へ切替)
劇サンピロ点眼液3% 5mL
【シ】
● 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL/瓶 (サンコバ点眼液)
○ シェルガン0.5眼粘弾剤 [1~30°C] 【後】
ジオキチルソウムスルホカシネット耳科用液5%「CEO」 10mL/瓶 【後】
● 【般】ジオキチルソウムスルホカシネット点耳液5% 10mL/瓶
● ジクアス点眼液3% 5mL/瓶
(【般】ジクアホソルNa点眼液3%5mLへ切替)
ジクアスL X点眼液3% 5mL/瓶
● 【般】ジクアホソルNa点眼液3%5mL (ジクアス)
ジクトルテープ75mg 7cm×10cm 1枚/袋
● ジクロード点眼液0.1% 5mL [冷]
(院内はジクロフェナック点眼液0.1%)
(【般】ジクロフェナックNa点眼液0.1% 5mL/瓶へ切替)
○劇ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 [冷] 【後】
○劇ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 [冷] 【後】
○劇ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 [冷] 【後】
● 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg (ポルタレン)
● 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg (ポルタレン)
● 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg (ポルタレン)
● 【般】ジクロフェナクNa外用液1% 50g/本 (ポルタレンローション)
● 【般】ジクロフェナクNaテープ15mg(7×10cm非温感)
7枚/袋 (ポルタレンテープ)
● 【般】ジクロフェナクNaテープ30mg(10×14cm非温感)
7枚/袋 (ポルタレンテープ)
○ ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニット」 5mL [冷] 【後】
● 【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶
● 【般】ジフルコルトロ吉草酸エステルクリム0.1% 5g/本 (ネリゾナ)
● 【般】ジフルコルトロ・リドカイン配合坐剤 (ネリプロクト)
● 【般】ジフルコルトロ・リドカイン配合軟膏 2g/本 (ネリプロクト)
● 【般】ジフルプレドナートクリム0.05% 5g/本 (マイザー)
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イキ」10g/本【後】 (【般】なし)
● 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% 10g/本 (マイザー)
ジムソ膀胱内注入液50% 50mL/瓶
シムビコートタービュヘイラー60吸入 1キット
(【般】ブテソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入へ切替)
笑気ガス
○ 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 1枚 【後】
● 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg (フランドルテープ)

劇硝酸銀「VTRS」原末（院内製剤原料）

消毒用エタノール「セイ」 500mL/瓶

消毒用エタプロコール 500mL 【後】

親水ワセサン 500g

新レシカルポン坐剤 [冷]

【ス】

スクラビイン S 4% 液 500mL

スタデルム軟膏 5% 10g

ステリクロン W 液 0.05 (= グルコン酸クロルヘキシン液 0.05%)

0.05% 500mL 【後】

(【般】 クロヘキシジン 5% グルコン酸塩外用液 0.05% 500mLへ切替)

劇ステリハイド 20w/v% 500mL

スピオルトレスピマット 28 吸入 1キット

● スピオルトレスピマット 60 吸入 1キット

スピリーバ 2.5 μg レスピマット 60 吸入 150 μg 1キット

● スピリーバ 吸入用カプセル 18 μg [冷]

スピール膏 M 25cm² 1枚

● スプレキュー点鼻液 0.15% 10mL

(【般】 ブセレリン酢酸塩点鼻液 0.15% 15.75mg 10mL/瓶へ切替)

劇スープレン吸入麻醉液 240mL/瓶

※ スポンゼル 5cm × 2.5cm (販売中止)

(2026年3月31日経過措置終了)

● ネミルヌチク 3% 40g 【後】 (販売中止)

(【般】 フェルビナク軟膏 3% 40g/本へ切替)

● ネミルテープ 35mg 7cm × 10cm 【後】

(【般】 フェルビナケーブ 35mg (7 × 10cm 非温感) 14枚/袋へ切替)

【セ】

● 精製水 オダ 単位mL [院外処方専用]

● 【般】 精製白糖・ボビドンヨード配合軟膏 100g/瓶 (イソジンシガーバスター)

生理食塩液 (洗浄用: 細口開栓) 500mL

生理食塩液 (洗浄用: 広口開栓) 1L

生理食塩液「ヒカリ」 (広口開栓型) 500mL/瓶

セクターローション 3% 50mL

● ゼビアックスローション 2% 10g

● ゼフナート外用液 2% 10mL

● ゼフナートクリーム 2% 10g

● ゼペリン点眼液 0.1% 5mL

劇セボフルラン吸入麻醉液「ニコ」 250mL 【後】

劇セボフレン吸入麻醉液 250mL

(セボフルラン吸入麻醉液「ニコ」に切替)

● ゼボラステープ 40mg 10cm × 14cm (7枚/袋)

(【般】 フェルビナケーブテープ 40mg (10 × 14cm 非温感) 7枚/袋へ切替)

● ゼボラスバップ 40mg 10cm × 14cm (7枚/袋)

● セルタッヂテープ 70 10cm × 14cm (7枚/袋)

(【般】 フェルビナケーブ 70mg (10 × 14cm 非温感) 7枚/袋へ切替)

● セルタッヂバップ 70 10cm × 14cm (7枚/袋)

(院内はフェルビナクバップ 70mg 「NP」)

(【般】 フェルビナケーブ 70mg (10 × 14cm 非温感) 7枚/袋へ切替)

● セルタッヂバップ 140 20cm × 14cm (7枚/袋)

(【般】 フェルビナケーブ 140mg (20 × 14cm 非温感) 7枚/袋へ切替)

● セレベント 50ディスカス 50 μg 60 リスター 1キット

【ソ】

ゾビラックス眼軟膏 3% 5g

ソフラチュール貼付剤 10cm (10.8mg) 10cm × 10cm 1枚

【タ】

向ダイアップ坐剤 4 4mg

向ダイアップ坐剤 6 6mg

向ダイアップ坐剤 10 10mg

● 【般】 大腸菌死菌・ヒドロコルゾン配合軟膏 2g/本 (強力ポステリザン)

○ タオシ外用液 1% 15mL 【後】

(クロトリマゾール外用液 1% 「日医工」へ名称変更)

(【般】 クロトリマゾール外用液 1% 15mL/本へ切替)

● 【般】 タクロリムス軟膏 0.1% 5g/本 (プロトピック軟膏)

タコシール組織接着用シート (ハーサイズ) 4.8cm × 4.8cm [1~30°C]

タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ) 9.5cm × 4.8cm [1~30°C]

● 劇タブコム配合点眼液 2.5mL

(【般】 タフルプロスト・チモロール配合点眼液へ切替)

● 【般】 タフルプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mL (タブコム)

● 【般】 タフルプロスト点眼液 0.005% 1mL 2.5mL (タプロス)

劇タブロス点眼液 0.0015% 2.5mL

(【般】 タフルプロスト点眼液 0.005% 1mLへ切替)

● ダラシントゲル 1% 10g

(【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 10g/本へ切替)

● タリビッド眼軟膏 0.3% 3.5g (院内はオフロキシン眼軟膏 0.3%)

タリビッド耳科用液 0.3% 5mL

● 劇タリムス点眼液 0.1% 5mL

【チ】

チモブトール X E 点眼液 0.5% 2.5mL

(チモロール X E 点眼液 0.5% 「セゾン」へ切替)

○ チモロール X E 点眼液 0.5% 「セゾン」 2.5mL 【後】

● 【般】 チモロール点眼液 0.5% (持続性) 2.5mL/瓶 (チモブトール X E)

注射用水 (洗浄用) 500mL

注射用水 (洗浄用) 1L

【ツ】

● ゾムラ紫雲膏 [500g] 501

● 【般】 ツロブテロールテープ 0.5mg

○ ツロブテロールテープ 1mg 「QQ」 【後】

● 【般】 ツロブテロールテープ 1mg

○ ツロブテロールテープ 2mg 「QQ」 【後】

● 【般】 ツロブテロールテープ 2mg

【テ】

劇ディオスオバ消毒液 0.55% 3.8L

(フタラール消毒液 0.55% 「オエ」 3.8Lへ切替)

● ディビゲル 1mg 1包

● 劇ディフェリンゲル 0.1% 15g

(【般】 アダパレンゲル 0.1% 15g/本へ切替)

● 【般】 デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg (S P トローチ)

デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「NK」 (2g/本) 【後】 (販売中止)

○ デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「NK」 (5g/本) 【後】

● 【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 5g/本

テゴ-51消毒液 10% 3L (サテニジン液 10へ切替)

デスパコーア口腔用クリーム 5g

劇デスマプレシン点鼻スプレー 2.5 μg 「フェリング」

125 μg 5mL/瓶 [10°C以下]

● 【般】 デスマプレシン点鼻スプレー 0.01% 500 μg 5mL/瓶

● デタントール 0.01% 点眼液 5mL

● デュオトラバ配合点眼液 2.5mL

(【般】 トラボプロスト・チモロール配合点眼液 2.5mLへ切替)

麻劇デュロテップ M T パッチ 2.1mg 1枚

(【般】 フェンタニルテープ 2.1mg (3日用) へ切替)

麻劇デュロテップ M T パッチ 4.2mg 1枚

(【般】 フェンタニルテープ 4.2mg (3日用) へ切替)

● 麻劇デュロテップ M T パッチ 8.4mg 1枚 (【般】 なし)

(【般】 フェンタニルテープ 8.4mg (3日用) へ切替)

テラ・コートリル軟膏 5g

- テリルジー100エリプタ30吸入用 1キット
テリルジー200エリプタ30吸入用 1キット
○ テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サリ」 10g 【後】
● 【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本 (ラミシール)
● 劇デルモベート軟膏0.05%—5g
(院内はケバ・タ・ルフ・ビ・オ・酸エチル軟膏0.05%「イキ」)
(【般】 ケバ・タ・ルフ・ビ・オ・酸エチル軟膏0.05% 5g/本へ切替)
劇デルモベートスカルプローション0.05% 10g
(【般】 ケバ・タ・ルフ・ビ・オ・酸エチル外用液0.05% 10g/本へ切替)
テレミンソフト坐薬2mg [2~8°C]
テレミンソフト坐薬10mg
デンターグル含嗽用散20mg 1包
【ト】
劇トービイ吸入液300mg 5mL管 [2~8°C]
劇ト・シム軟膏0.05% 5g (【般】 フルシニド 軟膏0.05% 5g/本へ切替)
● 劇ト・シムローション0.05% 10g
劇ト・ラシン点眼液0.3% 5mL
劇ド・ボネツクス軟膏50μg/g—0.005%—10g
● 劇ド・ボベットゲル 15g
劇ド・ボベット軟膏 15g
● 劇ド・ボベットフォーム 60g/本
● 【般】 トランニスト点眼液0.5% 5mL/瓶 (リザベント点眼液)
● ラバターンズ点眼液0.004%—2.5mL [1~25°C]
● 【般】 トラボプロスト・チモロール配合点眼液
2.5mL/瓶 (デュオトラバ配合点眼液)
● 【般】 トラボプロスト点眼液0.004% 2.5mL/瓶 (トランニズム)
劇トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 10mL[~100mL]
● トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」
(アフターシール25μgより名称変更)
● 【般】 トリアムシノロンアセトニド 口腔用軟膏0.1% 5g/本 (ケナログ)
トルソプト点眼液1% 5mL
● 【般】 ドル・ラミド・チモロール配合点眼液 5mL/瓶 (コソフト配合点眼液)
劇トレプロスト吸入液1.74mg 2.9mL/管
トロンビン液モチダソフトボトル1万 1万単位10mL1キット [冷]
○ ドンペリドン坐剤10mg「日新」 【後】
● 【般】 ドンペリドン坐剤10mg (ナウゼリン)
【ナ】
● ナイスピ・点鼻液50μg—8.5mg—8.5g—【後】
(【般】 ベ・クロメタゾン・ビ・オ・酸エチル点鼻液50μg 8.5g/瓶へ切替)
● ナウゼリン坐剤10mg (院内はドンペリドン坐剤10mg「日新」)
(【般】 ドンペリドン坐剤10mgへ切替)
ナウゼリン坐剤60 60mg
● 【般】 ナジフロキサシン外用液1% 20mL/本 (アクアチム)
○ ナジフロキサシンクリーム1%「トワ」 10g 【後】
● 【般】 ナジフロキサシンクリーム1% 10g (アクアチム)
○ ナジフロキサシンローション1%「トワ」 【後】
● ナゾネツクス点鼻液50μg56噴霧用—5mg—10g—1瓶
(【般】 モメタゾン点鼻液50μg 10gへ切替)
ナゾネツクス点鼻液50μg112噴霧用 9mg18g1瓶
(【般】 モメタゾン点鼻液50μg 18gへ切替)
● ナナドラーA-Qネ・ザル50μg—8.5mg—8.5g—1瓶—【後】
(【般】 ベ・クロメタゾン・ビ・オ・酸エチル点鼻液50μg 8.5g/瓶へ切替)
【ニ】
● ニコチネルTT S10 17.5mg10cm²1枚
● ニコチネルTT S20 35.0mg20cm²1枚
● ニコチネルTT S30 52.5mg30cm²1枚
[上記3種については、ニコチン依存症管理料の算定に伴う
処方時のみ保険適用]
ニゾラールクリー—ム2%—10g
(院内はケトコナゾールクリーム2%「イキ」へ切替)
(【般】 ケトコナゾールクリーム2% 10g/本へ切替)
● 劇ニトロダームTT S25mg 10cm²1枚
● 【般】 ニプラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶 (ハイパジールコーウ)
○ ニプラジロールP-F点眼液0.25%「日点」—5mL/瓶—【後】
● 劇ニュープロバッチ2.25mg 2.25mg1枚
劇ニュープロバッチ4.5mg 4.5mg1枚
劇ニュープロバッチ9mg 9mg1枚
● 劇ニュープロバッチ13.5mg 13.5mg1枚
● 劇ニュープロバッチ18mg 18mg1枚
○ 尿素クリーム20%「SUN」 25g/本 【後】
(アセチロールクリーム20%より名称変更)
● 【般】 尿素クリーム20% 25g/本 (ケラチナミンコーウ)
【ネ】
● ネオキシテープ73.5mg 1枚
ネオクリーナー「セネ」 10%30mL (歯科専用薬)
ネオシネジンコーウ5%点眼液 10mL
ネオメドロールE E軟膏 3g
ネキソブリッド外用ゲル5g [2~8°C]
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL
※劇ネリザ軟膏 2g 【後】 (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了予定)
(【般】 ジ・フルコロトロン・リド・カイン配合軟膏 2g/本へ切替)
● 劇ネリザ・ナタリ—ム0.1%—5g
(【般】 ジ・フルコロトロン吉草酸エチルクリー—ム0.1% 5g/本へ切替)
● 劇ネリプロタト坐剤
(【般】 ジ・フルコロトロン・リド・カイン配合坐剤へ切替)
● 劇ネリプロタト軟膏—2g (院内はネリザ軟膏)
(【般】 ジ・フルコロトロン・リド・カイン配合軟膏 2g/本へ切替)
【ノ】
向劇ノルスパンテープ5mg 1枚
● 向劇ノルスパンテープ10mg 1枚
● 向劇ノルスパンテープ20mg 1枚
【ハ】
ハイパジールコーウ点眼液0.25%—5mL—
(院内はニプラジロールP-F点眼液0.25%「日点」)
(【般】 ニプラジロール点眼液0.25% 5mL/瓶へ切替)
ハイエタノール 8% (=ケンエーハイアルコール (健栄)) 500mL
○ ハイポライト消毒液10% 有効塩素として10% 500g
[なるべく10°C以下] 【後】
白色ワセリン 500g
● 劇バクスミー点鼻粉末剤3mg V
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g
● パタノール点眼液0.1%—5mL—
(【般】 オロバタジン点眼液0.1%へ切替)
● 含嗽用ハチアズレ顆粒—0.1%—2g—1包—
(【般】 アズレ・ソルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 2g/包へ切替)
パッティストバネル (S) 2枚1組 [2~8°C]
● 劇バピロックミニ点眼液0.1% 0.4mL1個
バラオキシ安息香酸エチル (院内製剤原料)
バラマイシン軟膏—10g—
バラマイシン軟膏—250g—
パルミコート吸入液0.25mg 2mL1管
(【般】 ブデソニド吸入液0.25mgへ切替)
● パルミコート吸入液0.5mg 2mL1管
(【般】 ブデソニド吸入液0.5mgへ切替)
● パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg1瓶

- 劇ハルロピテープ8mg 枚
- 劇ハルロピテープ16mg 枚
- 劇ハルロピテープ24mg 枚
- 劇ハルロピテープ32mg 枚
- 劇ハルロピテープ40mg 枚
- パンコマイシン眼軟膏1% 5g [2~8°C]
- パンデル軟膏0.1% 5g
- パンデルローション0.1% 10mL

【ヒ】

- ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 0.85mL
 (オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%より名称変更)
- 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL (ヒアレイン)
 - 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL (ヒアレイン)
 ヒアレイン点眼液0.1% 5mL
 (【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mLへ切替)
 - ヒアレイン点眼液0.3% 5mL
 (【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mLへ切替)
 ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL1個
 - ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL1個
 PA・ヨード点眼・洗眼液 0.2%20mL1瓶 [冷]
 ビーエスエスブーツ500眼灌流液0.0184% 0.46%20mL1瓶(希釈液(瓶)付)
 ビーエスエスブーツ500眼灌流液0.0184% 0.46%20mL1瓶(希釈液(袋)付)
 ビソノテープ2mg 1枚
 ビソノテープ4mg 1枚
 - 【般】ビダラビン軟膏3% 5g/本 (アラセナA)
 - 【般】ヒドロコルチゾン・フルママイシン等配合軟膏 2g/本 (アロトセイル)
 ヒビスコール液A 1% 1L
 5%ヒビテン液 500mL
 (【般】ケルベキシングルコ酸塩外用液5% 500mL/本へ切替)
 - 【般】ピマトプロスト点眼液0.03% (ルミガン)
 ピマリシン点眼液5%「セシュ」 5mL
 ピュアラビング 250mL
 - ヒルドイドタリーム0.3%
 (【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%へ切替)
 ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g
 (ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ヒド」へ切替)
 (【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本へ切替)
 - ヒルドイドフォーム0.3% 92g
 (【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%へ切替)
 - ヒルドイドローション0.3% 25g
 (【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 25g/本へ切替)
 ピレーズトリエアロスフィア120吸入 キット
 ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL 筒 [冷]

【フ】

- プイタマークリーム1%
 フィプラスストスプレー500 500μg1瓶 (溶解液付) [冷]
 効液状フェノール「ケンエー」 500mL
- フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
- 【般】フェルビナク軟膏3% 40g/本
- 【般】フェルビナケテープ35mg(7×10cm非温感) 14枚/袋
- 【般】フェルビナケテープ70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋
- フェルビナクバップ70mg「東光」 10cm×14cm(7枚入) 【後】
- 【般】フェルビナケバップ70mg(10×14cm非温感) 7枚/袋
- 【般】フェルビナケバップ140mg(20×14cm非温感) 7枚/袋
- 麻劇 【般】フェンタニルケン酸塩テープ 0.5mg (1日用) 1枚 (フェントステープ)
- 麻劇 【般】フェンタニルケン酸塩テープ 1mg (1日用) 1枚 (フェントステープ)
- 麻劇 【般】フェンタニルケン酸塩テープ 2mg (1日用) 1枚 (フェントステープ)
- 麻劇 【般】フェンタニルケン酸塩テープ 4mg (1日用) 1枚 (フェントステープ)

- 麻劇 【般】フェンタニルテープ0.84mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇 【般】フェンタニルテープ1.7mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇 【般】フェンタニルテープ3.4mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇 【般】フェンタニルテープ5mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇 【般】フェンタニルテープ6.7mg (1日用) (ワンデュロパッチ)
- 麻劇 【般】フェンタニルテープ2.1mg (3日用) (デュオテップ M-Tパック)
- 麻劇 【般】フェンタニルテープ4.2mg (3日用) (デュオテップ M-Tパック)
- 麻劇 【般】フェンタニルテープ8.4mg (3日用) (デュオテップ M-Tパック)
 麻劇フェントステープ0.5mg 1枚
- 麻劇フェントステープ1mg 1枚
- 麻劇フェントステープ2mg 1枚
- 麻劇フェントステープ4mg 1枚
 複方ヨード・グリセリン「ヨウ・グリセリン」 500mL
 フシジンレオ軟膏2% 10g
- 【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 15.75mg10mL/瓶
 効タラール消毒液0.55%「シエ」 3.8L (ディスオーバ)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本 (メントタックス)
- 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本 (ボレー)
- 【般】ブデソニド吸入液0.25mg (バルミコート)
- 【般】ブデソニド吸入液0.5mg (バルミコート)
- 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合粉末剤60吸入 (シムピコート)
 フラジール腔錠250mg
- フラシドルテープ40mg 1枚
 (院内は硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」)
 (【般】硝酸イソソルビドテープ40mgへ切替)
- ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 mL/瓶 【後】
- 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% (アイファガン)
- 【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL/瓶 (エイゾプト)
- 【般】フルオシノニド軟膏0.05% 5g/本 (トブシム)
- フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」 5mL 【後】
- フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 5mL 【後】
 (フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」へ名称変更)
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% 5mL/瓶
- フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 5mL 【後】
- 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% 5mL/瓶
 フルタイド50μgエアゾール120吸入用 8.83mg10.6g1瓶
- フルタイド100μgエアゾール60吸入用 11.67mg7.0g1瓶
- フルタイド200ディスカス 200μg60アリスター1個
- 【般】フルカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用 (アラミスト)
- 【般】フルカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg120噴霧用 (アラミスト)
- 【般】フルカゾンロビン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 8mL
 (フルナーゼ)
- フルティフォーム50エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム50エアゾール120吸入用 1瓶
- フルティフォーム125エアゾール56吸入用 1瓶
- フルティフォーム125エアゾール120吸入用 1瓶
- フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL1瓶
 (【般】フルカゾンロビン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 8mLへ切替)
- 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 2.04mg4mL1瓶
 効フルメタ軟膏 0.1%5g
- 【般】フルビプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)
 (ゼボラステープ)
- 劇ブレオ S軟膏5mg/g 0.5%5g
 効ブレグランディン腔坐剤1mg [冷]
- 【般】ブレドミゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% 15g/本
 (リドメックスヨーウ)

- 【般】アレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3% 5g/本 (リドメックスコーア)
- 【般】アレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% 5g/本 (リドメックスコーア)
- プレドネマ注腸20mg 【後】
- 【般】プレドニゾロンリニ酸エステルNa注腸剤20mg (プレドネマ) 効プロウペス腫用剤10mg 個 [-20°C以下]
- プロクナセディル軟膏 2g
(【般】ヒドロコルチゾン・フルオマシン等配合軟膏 2g/本へ切替)
フロジン外用液5% 30mL 【後】
(【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30mL/本へ切替)
劇プロスタンディン軟膏0.003% 10g
局方プロテイン銀末 25g
劇プロトピック軟膏0.1% 5g
(【般】タクロリムス軟膏0.1% 5g/本へ切替)
- 効プロトピック軟膏0.03% 小児用 5g
- プロナック点眼液0.1% 5mL
(院内はプロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」)
(【般】プロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶へ切替)
プロペト 500g
- プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 5mL 【後】
(プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」へ切替)
- プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」 5mL/瓶 【後】
- 【般】プロムフェナクNa点眼液0.1% 5mL/瓶 (プロナック)
- プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タヨー」 45mL 【後】
- 【般】プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL/瓶 (ビソルボン)
プロメライン軟膏5万単位/g 20g
- フロリード腔坐剤100mg [冷]
フロリードDクリーム1% 10g (【般】なし)
- 【ヘ】
ペガモックス点眼液0.5% 5mL
(モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」へ切替)
(【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%へ切替)
ヘキザックAL1%OR液16mm綿棒セット (物品供給セタ-取扱い)
- ペキロンクリーム0.5% 10g
- 【般】ベタメタゾン・ヒドロコルチゾン酸エステル点鼻液50μg 8.5g/瓶 (リノコート)
- 【般】ベタメタゾン・ヒドロコルチゾン酸エステル点鼻粉末25μg 1.50mg/瓶
(リノコートパウダースプレー)
- ベシカムクリーム5% 10g
ベストロン耳鼻科用1% 5mL
ベストロン点眼用0.5% 5mL
ベセルナクリーム5% 250mg1包
- 【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶 (ベトブティック)
- 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5g/本 (リンデロンV)
- 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% 10mL/本 (リンデロンV)
劇ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイク」 5g 【後】
- 【般】ベタメタゾン・ヒドロコルチゾン酸エステル軟膏0.064% 5g/本 (リンデロンD P軟膏)
- ベタメタゾンリニ酸エステルNa・P・F眼耳鼻科用液0.1%「日点」 5mL 【後】
- 【般】ベタメタゾン酸酸アミド・ヒドロコルチゾン酸エステル外用液0.05% 10g/本 (アシベット)
劇ベタメタゾン酸酸エステル・ヒドロコルチゾン酸エステルクリム0.05%「MYK」 5g 【後】
(【般】なし)
- 【般】ベタメタゾン酸酸アミド・ヒドロコルチゾン酸エステルクリム0.05% 5g/本 (アシベット)
劇ベタメタゾン酸酸エステル・ヒドロコルチゾン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 5g 【後】
(【般】なし)
- 【般】ベタメタゾン酸酸アミド・ヒドロコルチゾン酸エステル軟膏0.05% 5g/本 (アシベット)
劇ベタメタゾン酸酸エステル・ヒドロコルチゾン酸エステルローション0.05%「JG」 10g 【後】
(【般】なし)
- 【般】ベタメタゾン酸酸アミド・ヒドロコルチゾン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mL (リンデロン)
- ベトブティック点眼液0.5% 5mL
(【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)
ベネトリン吸入液0.5% 30mL
ペノキシール点眼液0.4% 5mL/瓶
- 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (乳剤性) 25g/本 (ヒルドイド)
- 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% (ヒルドイドクリーム)
- 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% (ヒルドイド)
- 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本 (ヒルドイド)
- ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニフロ」 25g/本 【後】
- ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクル」 50g/本 【後】
- ベピオウォッシュゲル5% 20g/本
- ベピオゲル2.5% 15g/本 [25°C以下][禁凍結]
- ベピオローション2.5% 15g/本 [25°C以下][禁凍結]
- ヘモポリゾン軟膏 2g/本 【後】
ペリオフィール歯科用軟膏2% 10mg/0.5g [冷] 【後】
(ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」へ名称変更)
ペリプラストPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組 [冷]
ペリプラストPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組 [冷]
ペリプラストPコンビセット組織接着用 5mL2キット1組 [冷]
ペルベゼヨンF点眼・点鼻液 5mL [冷] 【後】
- 【般】ベタルコニウム塩化物外用液10% 500mL/本 (オスバン)
ベンタサ坐剤1g
ベンタサ注腸1g (【般】メサラジン注腸剤1g)
劇ペシレステープ18mg 30.5mm×50.0mm1枚
(院内はリドカインテープ18mg「YP」)
- 【ホ】
 - ボアラ軟膏0.12% 5g
 - ホタナリントープ1mg 1枚 (【般】ツロブテロールテープ 1mgへ切替)
 - ホタナリントープ2mg 1枚 (【般】ツロブテロールテープ 2mgへ切替)
強力ボステリザン (軟膏) 2g (ヘモポリゾン軟膏へ切替)
(【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 2g/本へ切替)
 - ホスミシンS耳科用3% 10mL
ボスミン外用液0.1% 500mL
 - ボビドンヨード外用液10%「明治」 250mL 【後】
 - 【般】ボビドンヨード外用液10% (エタノール非含有)
 - ボビドンヨードガーゲル液7%「明治」 30mL 【後】
 - 【般】ボビドンヨード含嗽用液7% 30mL/本
 - 【般】ボビドンヨードゲル10% 20g/本 (イソジンゲル)
ボピヨドンスクラブ7.5% 500mL 【後】
 - ボラザG軟膏 2.4g
劇ボルタレンサボ12.5mg [冷]
(院内はジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」)
(【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mgへ切替)
 - 劇ボルタレンサボ25mg [冷]
(院内はジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」)
(【般】ジクロフェナクNa坐剤25mgへ切替)
 - 劇ボルタレンサボ50mg [冷]
(院内はジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」)
(【般】ジクロフェナクNa坐剤50mgへ切替)
 - ボルタレンテープ15mg 7cm×10cm (7枚入)
(【般】ジクロフェナクNaテープ 15mg(7×10cm非温感) 7枚/袋へ切替)
 - ボルタレンテープ30mg 10cm×14cm (7枚入)
 - ボルタレンローション1% 50g
(【般】ジクロフェナクNa外用液1% 50g/本へ切替)
特生ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組 [冷]
特生ボルヒール組織接着用 3mL4瓶1組 [冷]
特生ボルヒール組織接着用 5mL4瓶1組 [冷]

劇ホルマリングアヤコールF G 15mL [歯科専用薬]

- ポレ—外用液1% 10mL

(【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本へ切替)

- 劇ポンアルファ軟膏2 μ g/g 10g

- 劇ポンアルファハイ軟膏20 μ g/g 10g

- 劇ポンアルファハイローション20 μ g/g 10g

【マ】

- マイザ—軟膏0.05% 5g

(院内はジフルプレドナート軟膏0.05%「イキ」)

(【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% 10g/本へ切替)

- マイザ—タリ—ム0.05% 5g

(【般】ジフルプレドナートクリーム0.05% 5g/本へ切替)

劇マイトイシン眼科外用液用2mg

- 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10g/本 (オキサロール)

- 劇マーデュオックス軟膏 10g

【ミ】

劇ミオコールスプレー0.3mg 0.65% 7.2g1缶

- ミオビン点眼液 5mL

- ニケラントA点眼液2% 2.5mL

(院内はカルテオロール塩酸塩L A点眼液2%「わかもと」へ切替)

(【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続性) 2.5mL/瓶へ切替)

ミケルナ配合点眼液 2.5mL

ミドリンM点眼液0.4% 5mL

ミドリンP点眼液 10mL (オフミック点眼液へ切替)

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 10mg0.5g [冷] 【後】

(ペリオフィール歯科用軟膏2%から名称変更)

- ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm (6枚入)

(2026年3月31日経過措置終了)

ミレーナ52mg 1個

- ニロル点眼液0.5% 5mL

(【般】レボブノロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)

【ム】

- ムコスタ点眼液U D 2% 0.35mL

ムコフィリン吸入液20% 17.62% 2mL1包

【メ】

- 【般】メサラジン注腸剤1g (ペンタサ)

- 減菌精製水 オーダー単位mL [院外処方専用]

メディクスワブ ポビドンヨード4.5ml (物品供給センター取扱い)

- 【般】メトロニダゾールゲル0.75% (ロゼックスゲル)

- メノエイドコンビパッチ 1枚 [冷]

メブチンエアー10 μ g吸入100回 0.0143% 5mL1キット

メブチン吸入液0.01% 30mL

- メブチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 1mg1キット

- メンタックスクリー—ム1% 10g

(【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本へ切替)

【モ】

- モイゼルト軟膏0.3% 10g/本

- モイゼルト軟膏1% 10g/本

- モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 5mL/瓶 【後】

- 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (ベガモックス)

- 【般】メタゾンラシカルボン酸エチル軟膏0.1% 5g/本 (フルメタ)

- 【般】モメタゾン点鼻液50 μ g 56噴霧用

- 【般】モメタゾン点鼻液50 μ g 112噴霧用

- モ—ラステ— μ 20mg 7cm×10cm (7枚入)

(ケトプロフェンテープ20mg「BMD」へ切替)

(【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) 7枚/袋へ切替)

- モ—ラステ— μ 40mg 10cm×14cm (7枚入)

(【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)

- モ—ラスパップ30mg 10cm×14cm (7枚入)

(【般】ケトプロフェンパップ 30mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)

- モ—ラスパップ60mg 20cm×14cm (7枚入)

- モ—ラスパップX-R 120mg 10cm×14cm (7枚入)

(【般】ケトプロフェンパップ 120mg(10×14cm非温感) 7枚/袋へ切替)

- モ—ラスパップX R 240mg 20cm×14cm (7枚入)

【ヤ】

- ヤクバンテープ60mg 15cm×14cm (7枚入)

【ユ】

→ ユペラ軟膏 56g/本 [15°C以下]

(ユペラ軟膏 500gが無くなり次第切替)

※ ユペラ軟膏 500g [15°C以下] (ユペラ軟膏 56g/本へ切替)

【ラ】

- ラクティオンパップ70mg 10cm×14cm (7枚入)

- ラクリミン点眼液0.05% 5mL瓶

- 【般】ラタノプロスト・チモール配合点眼液 2.5mL/瓶 (ザラカム配合)

- ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッサン」 2.5mL/瓶 【後】

- 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/瓶 (キサラタン)

- 【般】ラノコナゾール軟膏1% 10mg/本 (アスタット)

劇ラバリムスゲル0.2% 10g [2~8°C]

ラビジェル 60mL

ラビジェル 250mL

ラビショット 500mL

- ラミンルタリ—ム1% 10g

(院内はテルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サイ」)

(【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本へ切替)

【リ】

- サザベン点眼液0.5% 5mL

(【般】トラニラスト点眼液0.5% 5mL/瓶へ切替)

リティンバ耳科用250 μ gセット 1セット (溶解液付) [冷]

- 劇リドカインテープ18mg「YP」 1枚 【後】

リドメックスコーア軟膏0.3% 5g

(【般】ブレドニン[®] リン草酸エチル酢酸エチル軟膏0.3% 5g/本へ切替)

- サドメックスヨーカリ—ム0.3% 5g

(【般】ブレドニン[®] リン草酸エチル酢酸エチルクリーム0.3% 5g/本へ切替)

リドメックスコーアローション0.3% 15g (【般】なし)

(【般】ブレドニン[®] リン草酸エチル酢酸エチル外用液0.3% 15g/本へ切替)

- サノコトパウダースプレー 鼻用25 μ g 1.50mg 0.9087g1瓶

(【般】ベクロメタゾン[®] リン酸エチル点鼻粉末25 μ g 1.50mg/瓶へ切替)

- 【般】リバストチグミンテープ4.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)

- 【般】リバストチグミンテープ9mg (1日用) (イクセロンパッチ)

- 【般】リバストチグミンテープ13.5mg (1日用) (イクセロンパッチ)

- 【般】リバストチグミンテープ18mg (1日用) (イクセロンパッチ)

硫酸ボリミキシンB散50万単位「マイ」 1瓶

リレンザ 5mg47リスター (1枚: 47リスター)

- リンデロン坐剤0.5mg

- リンデロン点眼液0.01% 5mL

- サンデロソ点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL

(【般】ベタメタゾンリソリン酸エチルNa点眼点耳点鼻液0.1% 5mLへ切替)

- 点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL [冷]

眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g

- 劇リンドロントD-P軟膏 0.064% 5g

(院内はベタメタゾンジブロピオリン酸エチル軟膏0.064%「テイコク」)

(【般】ベタメタゾンジブロピオリン酸エチル軟膏0.064% 5g/本へ切替)

リンデロンV軟膏0.12% 5g

(【般】ベタメタゾン吉草酸エチル軟膏0.12% 5g/本へ切替)

リンデロンVローション0.12% 10mL

(【般】ベタメタゾン吉草酸エチル外用液0.12% 10mL/本へ切替)

- リンデロン-VG軟膏0.12% 5g (院内はルリケールVG軟膏0.12%)
リンデロン-VGクリーム0.12% 5g
リンデロン-VGローション 0.12%10mL

【ル】

- ル・エストロジェル0.06% 80g
- ルコナック爪外用液5% 3.5g
ルティナス腫錠100mg [1~30°C]
- ルテウム腔用坐剤400mg [25°C以下]
ルミガン点眼液0.03% 2.5mL
(【般】ビマトプロスト点眼液0.03%へ切替)
ルリケールVG軟膏0.12% 5g 【後】
- ルリコナゾールクリーム1%「イキ」 【後】
- 【般】ルリコナゾールクリーム1% (ルリコン)
ルリコンタリム1% 10g (ルリコナゾールクリーム1%「イキ」へ切替)
ルリコン液1% 10mL

【レ】

- レクタブル2mg注腸フォーム14回 48mg30.8g1瓶
- レスクューラ点眼液0.12% 5mL [冷]
(【般】イソプロビルウノプロストン点眼液0.12% 5mL/瓶へ切替)
レスタミンコーチゾン軟膏[強力] 10g
レスタミンコーウクリーム1% 1kg
- レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 5mL 【後】
(【般】レバミピド点眼液2%5mLへ切替)
- 【般】レバミピド点眼液2%5mL (ムコスタ)
●向劇レペタノン坐剤0.2mg
●向劇レペタノン坐剤0.4mg
- 【般】レボプロロール塩酸塩点眼液0.5% 5mL/瓶 (ミロル)
○ レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 5mL/瓶 【後】
- 【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/瓶 (クラビット)
- レルペア100エリプタ14吸入用 1キット
● レルペア100エリプタ30吸入用 1キット
● レルペア200エリプタ14吸入用 1キット
レルペア200エリプタ30吸入用 1キット

【口】

- ロキソニンゲル1% 50g
(【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 50g/本へ切替)
- ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm (7枚入)
- ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm (7枚入)
- ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm (7枚入)
(院内はロキソプロフェンNaパップ100mg「JG」)
- 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 50g/本 (ロキソニンゲル)
- 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm非温感)
7枚/袋 (ロキソニンテープ)
- 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温感)
7枚/袋 (ロキソニンテープ)
- ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」
10cm×14cm (7枚入) 【後】 (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了予定)
- ロキソプロフェンNaパップ100mg「JG」
10cm×14cm 7枚/袋 【後】
劇ロコアテープ 10cm×14cm (7枚入)
ロコイドクリーム0.1% 5g
ロコイド軟膏0.1% 5g
ロゼックスゲル0.75% 15g/本 (50g/本から切替)
(【般】メトロニダゾールゲル0.75%へ切替)
ロゼックスゲル0.75% 50g/本 (15g/本へ切替)
- 劇ロナセンテープ20mg 枚
劇ロナセンテープ40mg 枚

【ワ】

- 向劇ワコビタール坐剤15 15mg [冷]
- 向劇ワコビタール坐剤50 50mg [冷]
- ワンクリノン腔用ゲル90mg
- 麻劇ワンデュロパッチ0.84mg 1枚
(【般】フェンタニルテープ0.84mg (1日用) へ切替)
- 麻劇ワンデュロパッチ1.7mg 1枚
(【般】フェンタニルテープ1.7mg (1日用) へ切替)
- 麻劇ワンデュロパッチ3.4mg 1枚
(【般】フェンタニルテープ3.4mg (1日用) へ切替)
- 麻劇ワンデュロパッチ5mg 1枚
(【般】フェンタニルテープ5mg (1日用) へ切替)
- 麻劇ワンデュロパッチ6.7mg 1枚
(【般】フェンタニルテープ6.7mg (1日用) へ切替)

注射薬リスト

【ア】

アイモビーグ皮下注70mgペン 1mLキット [2~8°C]
劇アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
2mg0.05mL筒 [2~8°C] [禁凍結]
劇アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL 0.07mLV [2~8°C]
劇アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL
0.07mL筒 [2~8°C] [禁凍結]
劇アウクリ注 フレックスタッフ 総量300単位 1キット [2~8°C]
劇アーウィナーゼ筋注用10000 10,000単位V [2~8°C]
アエントリベンタート静注1055mg V
劇アガルシダーゼ ベータ B S点滴静注5mg「JCR」 1mLV [2~8°C] 【後】
劇アガルシダーゼ ベータ B S点滴静注35mg「JCR」 7mLV [2~8°C] 【後】
劇アキネトシ注射液5mg 1mLA (乳酸ビペリデン注5mg「ヨシミ」へ切替)
劇アキヤルックス点滴静注250mg 50mLV [2~8°C]
劇アクテムラ点滴静注用200mg 10mLV [2~8°C]
●劇アクテムラ皮下注162mgオトイシジ エクタ- 0.9mLキット [2~8°C]
劇アクテムラ皮下注162mgシリソジ 0.9mL筒 [2~8°C]
劇アクトヒブ 10 μgV [冷]
毒アクプラ静注用50mg V
劇アクラシノン注射用20mg V
アコアラン静注用600 600国際単位V (溶解液付) [冷]
アコアラン静注用1800 1800国際単位V (溶解液付) [冷]
アザクタム注射用1g V
○劇アザシチジン注射用100mg「サワイ」 V 【後】
アシクロビル点滴静注液250mg「トワ」 A 【後】
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター 1.5mLキット [2~8°C]
アスコルビン酸注500mgP B「日新」 A 【後】
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 17.12%10mLキット 【後】
アセテート維持液3G「HK」 500mLP
アセトキ-3G注(ソフトパッケージ) 500mLP 【後】 (販売中止)
(アセテート維持液3G「HK」へ切替)
劇アセリオ静注液1000mgパッケージ 100mLP
劇アセレンド注100 μg 2mLV
アタラックス-P注射液 (25mg/mL) A
アタラックス-P注射液 (50mg/mL) A
●劇アダリムマブB S皮下注40mgシリソジ0.8mL「FKB」筒 [2~8°C] 【後】
●劇アダリムマブB S皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」キット [2~8°C] 【後】
●劇アダリムマブB S皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」キット [2~8°C] 【後】
●劇アダリムマブB S皮下注40mgペン0.8mL「FKB」キット [2~8°C] 【後】
アディノベイト静注用キット1000
1000国際単位キット (溶解液付) [冷]
アディノベイト静注用キット2000
2000国際単位キット (溶解液付) [冷]
アデノシン負荷用静注60mgシリソジ「FRI」 20mL筒 【後】
アデノスキャッタ注60mg 20mLV
アデホス-L コーワ注10mg A [冷]
アデラビン9号注2mL-A (販売中止) (2025年9月31日経過措置終了)
劇アトガム点滴静注液250mg 5mLA [2~8°C]
劇アドセト里斯点滴静注用50mg V [2~8°C]
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL
劇アドトラーザ皮下注150mgシリソジ 1mL筒 [2~8°C] [禁凍結]
劇アドトラーザ皮下注300mgペン 2mLキット [2~8°C]
アドナ注 (静脈用) 50mg 10mLA
(カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」へ切替)
アトニン-O注5単位 A [冷]

無印：採用薬

※：削除予定薬

●：院外処方専用薬

☆：院外処方専用予定薬

【後】：後発医薬品

○：院内専用後発品である薬

劇アドレナリン注0.1%シリソジ「テルモ」 1mL筒 【後】

(エピネフリン注0.1%シリソジ「テルモ」から名称変更)

劇アトロビン注0.05%シリソジ「テルモ」 1mL筒 【後】

劇アトロビン硫酸塩注0.5mg「ニフロ」 0.05%1mLA

劇アナフランニール点滴静注液25mg A

劇アナペイン注2mg/mL 100mLP

劇アナペイン注7.5mg/mL 10mLA

(ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」へ切替)

アネメトロ点滴静注液500mg 100mLV

向アネレム静注用50mg V

劇アバスチン点滴静注用400mg/16mL V [冷]

劇アービタックス注射液100mg 20mL V [冷]

劇アピドラ注ソロスター 300単位キット [冷]

アブニション静注15mg 3mLA

毒アブラキサン点滴静注用100mg V

劇アブリスピボ筋注用 V (溶解液付) [2~8°C]

アブレゾリン注射用20mg A

劇アポカイン皮下注30mg 3mL筒

●劇アボネックス筋注用シリソジ30 μg 0.5mL筒 [冷]

●劇アボネックス筋注30 μgペン 0.5mLキット [2~8°C]

劇アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 3mLA 【後】

アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 2mLA

アミサリジン注100mg 10%1mLA

アミノレバノ点滴静注 500mLP

アミパレン輸液200mL 1袋

アムビトラ皮下注25mgシリソジ 0.5mL筒 [禁凍結]

毒アムビゾーム点滴静注用50mg V [冷]

アラセナ-A点滴静注用300mg V

劇アラノンジ-静注用250mg 50mLV

アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL筒

アリクストラ皮下注7.5mg 0.6mL筒

アリナミン-50注 50mg20mLA

(フルスルチアミン注50mg「日新」へ切替)

アリナミン注射液10mg 2mLA (販売中止)

劇アリムタ注射用100mg V

(ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」へ切替)

劇アリムタ注射用500mg V

(ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」へ切替)

○ アルガトロバンH I注10mg/2mL「ツー」 A 【後】 (スルノンH注)

アルギニン点滴静注30g「AY」 10%300mLP

毒アルケラン静注用50mg V (溶解液付)

アルスロマチック関節手術用灌流液 3L1P

麻劇アルチバ静注用5mg V

(レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」へ切替)

アルツディスピボ関節注25mg 2.5mL筒

劇アルプロスタジル注5 μg「サワイ」 1mLA [冷] 【後】

劇アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μg「カタ」 V

劇アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μg「カタ」 V

献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V

献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V

献血アルブミン20%静注4g/20mL「カタ」 V

献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」 20%50mLV

献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV

献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV

劇アレックスピー筋注用 120 μgV (溶解液付) [2~8°C]

劇アレピアチン注250mg 5mLA

アレルゲンエキス診断用対照液 1.8mLV
アレルゲンエキス治療用希釈液 1.8mLV
アレルゲンスクラッチャエキス陽性対照液「トライ」
ヒスタミン二塩酸塩 2mLV [冷]
診断用アレルゲンスクラッチャエキス「トライ」 1mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」エマ1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」大麦1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カバヤ花粉1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カモヤ花粉1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ケガマ花粉1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」クレマ花粉1:1,000 2mLV [冷]
診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」タマシマ花粉1:1,000 2mLV [冷]
治療用アレルゲンエキス皮下注「トライ」タマシマ花粉1:100 2mLV [冷]
治療用アレルゲンエキス皮下注「トライ」
タマシマ花粉1:1,000 2mLV [冷]
治療用アレルゲンエキス皮下注「トライ」
カモヤ花粉1:100 2mLV [冷]
治療用アレルゲンエキス皮下注「トライ」ベニシリウム1:1,000 2mLV [冷]
治療用アレルゲンエキス皮下注「トライ」
カレハ草花粉1:100 2mLV [冷]
劇アロカリス点滴静注235mg 10mLV [2~8°C]
劇アロキシ静注0.75mg 5mLV
アロフィセル注 4瓶1組 [専用輸送用容器で15~22°C]
(発注管理は診療科で実施)
劇アンカロン注150~150mg 3mLA
(アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」へ切替)
アンサー皮下注20μg 1mLA
安息香酸Naカフェイン注200mg「フリ」 20%1mLA 【後】
(アンナカ注「フリ」-20%より名称変更)
劇アンチレクス静注10mg 1%1mLA
アンナカ注「フリ」-20% 1mLA 【後】
(安息香酸Naカフェイン注200mg「フリ」へ名称変更)
【イ】
イオバク300注100mL 64.71% V 【後】
(イオヘキソール300注100mL「F」へ名称変更)
イオバク300注シリンジ80mL 64.71% 筒 【後】
(イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」へ名称変更)
イオバク350注50mL 75.49% V 【後】
(イオヘキソール350注50mL「F」へ名称変更)
イオバク350注100mL 75.49% V 【後】
(イオヘキソール350注100mL「F」へ名称変更)
イオバク350注シリンジ100mL 75.49% 筒 【後】
(イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」へ名称変更)
イオバミドール300注20mL「F」 61.24%20mL 【後】
(オイパロミン300注20mLより名称変更)
イオバミドール300注50mL「F」 61.24%50mL 【後】
(オイパロミン300注50mLより名称変更)
イオバミドール300注100mL「F」 61.24%100mL 【後】
(オイパロミン300注100mLより名称変更)
イオバミドール370注20mL「F」 75.52%20mL 【後】
(オイパロミン370注20mLより名称変更)
イオバミドール370注50mL「F」 75.52%50mL 【後】
(オイパロミン370注50mLより名称変更)
イオバミドール370注100mL「F」 75.52%100mL 【後】
(オイパロミン370注100mLより名称変更)

イオバミドール300注シリンジ100mL「F」 61.24%100mL筒 【後】
(オイパロミン300注シリンジ100mLより名称変更)
イオバミドール300注シリンジ150mL「F」 61.24%150mL筒 【後】
(オイパロミン300注シリンジ150mLより名称変更)
イオバミドール370注シリンジ100mL「F」 75.52%100mL筒 【後】
(オイパロミン370注シリンジ100mLより名称変更)
イオバミロン注300 61.24%20mLV (販売中止)
イオバミロン注300シリンジ 61.24%100mL筒
※ イオバミロン注370 75.52%20mLV (販売中止)
イオバミロン注370 75.52%100mLV
イオバミロン注370シリンジ 75.52%80mL筒
イオバミロン注370シリンジ 75.52%100mL筒
E O B・プリモピスト注シリンジ 18.143%10mL筒
イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」 62.34%50mL筒 【後】
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 62.34%100mL筒 【後】
イオヘキソール300注100mL「F」 64.71%100mLV 【後】
(イオパーク300注100mLより名称変更)
イオヘキソール350注50mL「F」 75.49%50mLV 【後】
(イオパーク350注50mLより名称変更)
イオヘキソール350注100mL「F」 75.49%100mLV 【後】
(イオパーク350注100mLより名称変更)
イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」 64.71%80mL筒 【後】
(イオパーク300注シリンジ80mLより名称変更)
イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」 75.49%100mL筒 【後】
(イオパーク350注シリンジ100mLより名称変更)
イオメロン300注100mL 61.24%V
イオメロン300注シリンジ100mL 61.24%筒
イオメロン350注100mL 71.44%V
イオメロン350注シリンジ100mL 71.44%筒
イオメロン350注シリンジ135mL (CT・尿路用) 71.44%筒
イケプラ点滴静注500mg 5mLV
(レベチラセタム点滴静注500mg「アル」へ切替)
劇イジュド点滴静注25mg 1.25mLV [2~8°C]
劇イジュド点滴静注300mg 15mLV [2~8°C]
劇イズカーゴ点滴静注用10mg V [2~8°C][禁凍結]
イスコチン注100mg A
劇イストダックス点滴静注用10mg~10mg V (溶解液付)
イソビスト注240 51.26%10mLV
イソビスト注300 64.08%10mLV
毒イダマイシン静注用5mg 5mgV
イデルビオン静注用1000~1000国際単位V (溶解液付) [2~25°C]
イデルビオン静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [2~25°C]
● イデルビオン静注用3500 3500国際単位V (溶解液付) [2~25°C]
劇イノバン注0.3%シリンジ 50mL筒
劇イノバン注100mg 5mLA
劇イブグリース皮下注250mgオートインジェクター 2mLキット [2~8°C]
イベニティ皮下注105mgシリンジ 1.17mL筒 [2~8°C]
劇注射用イホマイド1g V
● 剧イミグランキット皮下注3mg 0.5mL筒
劇イミフィンジ点滴静注120mg 2.4mLV [2~8°C]
劇イミフィンジ点滴静注500mg 10mLV [2~8°C]
劇イムデトラ点滴静注用1mg V (輸液安定化液付) [2~8°C]
劇イムデトラ点滴静注用10mg V (輸液安定化液付) [2~8°C]
劇イムネース注35 35万国内標準単位V (溶解液付) [冷]
劇イムノマックス-γ注100 100万国内標準単位 V (溶解液付)
[凍結を避け10°C以下]
劇イモバックスポリオ皮下注 0.5mL筒 [2~8°C]
劇イラリス皮下注射液150mg 1mLV [2~8°C]

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト-7」 2mLV 【後】
劇イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト-7」 5mLV 【後】
劇イルミア皮下注100mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]
● イロクテイト静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]
● イロクテイト静注用1500 1500国際単位V (溶解液付) [2~8°C]
● イロクテイト静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]
● イロクテイト静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]
● イロクテイト静注用4000 4000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]
インジゴカルミン注20mg「AFP」 0.4%5mLA
劇インスリンアスパルトB S注ソロスターN R「サ/ワイ」
300単位キット [2~8°C] 【後】
●劇インスリングラルギンB S注カート「リ-」 300単位キット [2~8°C] 【後】
●劇インスリングラルギンB S注キット「FFP」 300単位キット [2~8°C] 【後】
劇インスリングラルギンB S注ミリオペン「リ-」
300単位キット [2~8°C] 【後】
劇インスリンリスプロB S注ソロスターH U「サ/ワイ」
300単位キット [2~8°C] 【後】
劇インダシン静注用1mg V
劇インデラル注射液2mg 2mLA
イントラリポス輸液20% 100mLP 【後】
劇インフリキシマブB S点滴静注用100mg「NK」 V [2~8°C] 【後】
劇インフルエンザH Aワクチン 1mLV [冷]
【ウ】
劇ウイフガート点滴静注400mg 20mLV [2~8°C]
ヴィーンD輸液 500mLP (袋)
献血ヴェノグロブリンI H10%静注0.5g/5mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H10%静注2.5g/25mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H10%静注5g/50mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H10%静注10g/100mL V [冷]
献血ヴェノグロブリンI H10%静注20g/200mL V [冷]
劇ウゴービ皮下注0.25mg SD 0.5mLキット [2~8°C]
●劇ウゴービ皮下注0.5mg SD 0.5mLキット [2~8°C]
●劇ウゴービ皮下注1.0mg SD 0.5mLキット [2~8°C]
●劇ウゴービ皮下注1.7mg SD 0.75mLキット [2~8°C]
●劇ウゴービ皮下注2.4mg SD 0.75mLキット [2~8°C]
ウログラフイン注60% 20mLA
ウロナーゼ静注用6万単位 V
ウロミテキサン注100mg 1mLA
ウロミテキサン注400mg 4mLA
【エ】
H MG注用150単位「あすか」 V (溶解液付) [冷] 【後】
H MG注射用75 I U「フェリング」 75単位V (溶解液付) 【後】
(2023年3月現在 供給停止)
乾燥H Bグロブリン筋注射用200単位「ニチケ」 1mLV (溶解液付) [冷]
劇エクザール注射用10mg V [冷]
エクストラニール腹膜透析液 (ツインバッゲ) 1.5LP
エクストラニール腹膜透析液 (UVツインバッゲ) 1.5LP
エクストラニール腹膜透析液 (シングルバッゲ) 2LP
エクストラニール腹膜透析液 (シングルバッゲ・機器専用) 2LP
● エクストラニール腹膜透析液 (ツインバッゲ) 2LP
劇エヌポー注射液750 750国際単位A [冷]
(エポエチナルアルファB S注750「JCR」へ切替)
●劇エタネルセプトB S皮下注25mgベン0.5mL「MA」
25mg0.5mLキット [2~8°C] 【後】
●劇エタネルセプトB S皮下注50mgベン1.0mL「TY」
50mg1.0mLキット [2~8°C] 【後】
劇エトキシスクレロール1%注射液 30mLV
劇エトボシド点滴静注液100mg「サンド」 5mLV 【後】

● エヌジエンラ皮下注60mgベン 1.2mL/キット [2~8°C]
エネフリード輸液 550mLキット
劇エピベン注射液0.15mg 1mg/2mL筒 (注射量は0.3mL)
劇エピベン注射液0.3mg 2mg/2mL筒 (注射量は0.3mL)
劇エビリファイ持続性水懸筋注射用300mgシリンジ 300mgキット
劇エビリファイ持続性水懸筋注射用400mgシリンジ 400mgキット
劇エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 V [2~8°C] 【後】
劇エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 V [2~8°C] 【後】
劇エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 V 【後】
劇エフェドリン「カガヰ」注射液40mg 1mLA
劇エプキンリ皮下注4mg 0.8mLV [2~8°C]
劇エプキンリ皮下注48mg 0.8mLV [2~8°C]
劇エポエチナルファB S注750「JCR」
750国際単位0.5mLV [2~8°C] 【後】
劇エポジン皮下注シリンジ24000 24000国際単位0.5mL筒 [冷]
劇エホチール注10mg 1%1mLA
劇エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」 V 【後】
劇エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」 V 【後】
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液 50mLV
劇エポルトラ点滴静注20mg 20mLV
エムガルティ皮下注120mgオ-トイソ-エクタ- 1mLキット [2~8°C]
劇エムプリシティ点滴静注用300mg V [2~8°C]
劇エムプリシティ点滴静注用400mg V [2~8°C]
注射用エラスパール100 100mg V
劇エラブレース点滴静注液6mg 3mLV [2~8°C]
劇エリル点滴静注液30mg 2mLA
L H-R H注0.1mg「-」 0.1mgA
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ 5mL筒
(レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ト-7」へ切替)
劇エルシトニン注40単位 1mLA
エルネオバN F1号輸液 1000mLキット
エルネオバN F2号輸液 1000mLキット
毒エルペラット点滴静注液100mg 20mLV
(オキサリプラチン点滴静注100mg「ト-7」へ切替)
劇エルレフィオ皮下注44mg 1.1mLV [2~8°C]
劇エルレフィオ皮下注76mg 1.9mLV [2~8°C]
塩化ナトリウム10% 20mLA
塩酸メトクロラミド注射液10mg「タタ」 0.5%2mLA 【後】
劇エンスプリング皮下注120mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]
劇エンタイビオ点滴静注用300mg V [2~8°C]
劇エンタイビオ皮下注108mgベン 0.68mLキット [2~8°C]
劇注射用エンドキサン500mg V [冷]
劇エンハーツ点滴静注用100mg V [2~8°C]
●劇エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL 1カセット [2~8°C]
●劇エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL 1カセット [2~8°C]
劇エヌブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 筒 [2~8°C]
●劇エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL 筒 [2~8°C]
●劇エンブレル皮下注50mgベン1.0mL キット [2~8°C]
【オ】
オイバロミン300注20mL 61.24% V 【後】
(イオバミドール300注20mL「F」へ名称変更)
オイバロミン300注50mL 61.24% V 【後】
(イオバミドール300注50mL「F」へ名称変更)
オイバロミン300注100mL 61.24% V 【後】
(イオバミドール300注100mL「F」へ名称変更)
オイバロミン300注シリンジ100mL 61.24% 筒 【後】
(イオバミドール300注シリンジ100mL「F」へ名称変更)

オイバロニン300注シリソジ150mL 61.24% 筒 【後】
(イオバミドール300注シリソジ150mL「F」へ名称変更)
オイバロニン370注20mL 75.52% V 【後】
(イオバミドール370注20mL「F」へ名称変更)
オイバロニン370注50mL 75.52% V 【後】
(イオバミドール370注50mL「F」へ名称変更)
オイバロニン370注100mL 75.52% V 【後】
(イオバミドール370注100mL「F」へ名称変更)
オイバロニン370注シリソジ100mL 75.52% 筒 【後】
(イオバミドール370注シリソジ100mL「F」へ名称変更)
大塚生食2ポート100mL キット 【後】
毒オキサリプラチニン点滴静注100mg「トワ」 20mLV 【後】
劇オキサロール注5μg 1mLA [冷]
麻剤オキファスト注50mg 1%5mLA
劇オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サド」 1mLA [冷] 【後】
オザグレルN a点滴静注80mg「カタ」 4mLV 【後】
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg 0.75mL筒 [2~8°C]
劇オゼンピック皮下注2mg 1.5mLキット [2~8°C]
劇乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「カタ」 1人用V [冷]
オーツカM V注
劇オニバイド点滴静注43mg 10mLV [2~8°C]
劇オノアクト点滴静注用150mg V
オバホルモンデボー筋注5mg A
オビザー静注用500 500単位V (溶解液付) [2~8°C]
劇オビソート注射用0.1g A (溶解液付)
劇オビドレル皮下注シリソジ250μg 0.5mL筒 [2~8°C]
オフサグリーン静注用25mg V (溶解液付)
劇オブジーボ点滴静注20mg 2mLV [2~8°C]
劇オブジーボ点滴静注120mg 12mLV [2~8°C]
劇オブジーボ点滴静注240mg 24mLV [2~8°C]
オブチレイ320注シリソジ100mL 67.8%筒
オブチレイ350注シリソジ100mL 74.1%筒
オムニパーク240注10mL 51.77%V
オムニパーク300注シリソジ80mL 64.71%筒
オムニパーク300注シリソジ150mL 64.71%筒
オムニパーク350注シリソジ45mL 75.49%筒
オムニパーク350注シリソジ100mL 75.49%筒
オメプラゾール注射用20mg「日医工」 V 【後】
劇オリベス点滴用1% 200mLP 【後】
(リドカイン点滴静注液1%「カタ」へ名称変更)
劇オルダミン注射用1g 10%10gV
劇オルドレブ点滴静注用150mg V
オルプロリクス静注用3000~3000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]
劇オレンシア点滴静注用250mg V [2~8°C]
●劇オレンシア皮下注125mgオトインジエクタ-1mL キット [2~8°C]
●劇オレンシア皮下注125mgシリソジ1mL 筒 [2~8°C]
劇オンキヤスパー点滴静注用3750 3,750国際単位V [2~8°C]
劇オンコビン注射用1mg V [冷]
劇オンドンセトロン注4mgシリソジ「マルイ」 2mL筒 【後】
オンデキサ静注用200mg V [2~8°C]
劇オンペットロ点滴静注2mg/mL 8.8mg4.4mLV [2~8°C]
(アムビトラ皮下注25mgシリソジへ切替)
劇オンボー点滴静注300mg 15mLV [2~8°C]
劇オンボー皮下注100mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]
【カ】
劇カイトリル注3mg 3mLA
(採用薬はグラニセトロン静注液3mg「カイ」へ切替)

毒カイプロリス点滴静注用10mg V [2~8°C]
毒カイプロリス点滴静注用40mg V [2~8°C]
劇カヨージン注100mg 5mLA 【後】
劇ガザイバ点滴静注1000mg 40mLV [2~8°C]
ガスター注射液20mg 2mLA
(ファモチジン静注20mg「日新」へ切替)
注射用カタクリット40mg V
(オザグレルN a点滴静注80mg「カタ」へ切替)
劇カタボンH i注600mg : 0.3% 200mLP
(ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」へ切替)
劇カドサイラ点滴静注用100mg V
ガドテル酸メグルミン静注38%シリソジ11mL「GE」 筒 【後】
ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ5mL 60.47%5mL筒
ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ10mL 60.47%10mL筒
カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 A
●劇ガニレスト皮下注0.25mgシリソジ 0.5mL筒
カブリビ注射用10mg V (溶解液付) [2~8°C]
劇ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「カイ」 V 【後】
劇ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「カイ」 V 【後】
カーポスター透析剤・L 6L瓶
カーミCA液 [KBS-200CA8L(C)] 200mL採血用
カーミCA液 [KBS-400CA8L(C)] 400mL採血用
カーミCA液 [KBT-400CA8L(C)] 400mL採血用
劇カルセド注射用20mg V
カルチコール注射液8.5%5mL A
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」
0.5%10mLA 【後】
カルペニン点滴用0.5g V
毒カルボプラチニン点滴静注液50mg「NK」 5mLV 【後】
毒カルボプラチニン点滴静注液150mg「NK」 15mLV 【後】
毒カルボプラチニン点滴静注液450mg「NK」 45mLV 【後】
劇カンサイダス点滴静注用50mg V [2~8°C]
毒ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 V 【後】 (デノシン)
乾燥H Bグロブリン筋注用200単位「ニヤケ」 1mLV (溶解液付) [冷]
劇乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「カタ」 1人用V [冷]
劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 V (溶解液付) [冷]
劇乾燥弱毒生麻しんワクチン「カタ」 1人分V (溶解液付) [冷]
劇乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン (=ミールビック)
1人分V (溶解液付) [冷]
劇乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V (溶解液付) [冷]
【キ】
劇キイトーダ点滴静注100mg 4mLV [2~8°C]
劇キシロカイン注射液1% 100mLV
劇歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mLA [冷]
劇キシロカイン注ボリアンプ1% 10mLA
(リドカイン塩酸塩1%「日新」へ切替)
劇キシロカイン注ボリアンプ2% 10mLA
(リドカイン塩酸塩2%「日新」へ切替)
劇キシロカイン注射液「1%」ビレミン (1:100,000) 含有 20mLV [冷]
キドバレン輸液
キドミン輸液 200mLP
キムリア点滴静注 1患者あたり [液体室素気相下又は-120°C以下]
(輸血免疫移植部でのみ取扱い)
劇ギャバロン酔注0.005% 1mLA
劇ギャバロン酔注0.05% 20mLA
劇ギャバロン酔注0.2% 5mLA
キモビシソジ静注用350mg V [2~8°C]
(ダブトマイシン静注用350mg「カイ」へ切替)

キューピトル20%皮下注4g/20mL V [冷]
劇キロサイド注20mg A
劇キロサイド注100mg A
劇キロサイドN注1g V
(採用薬はシタラビン点滴静注液1g「NIG」へ切替)
キンダリー透析剤A F 5号 6LV (炭酸水素ナトリウム液付)

【ク】

劇グラニセトロン静注液3mg「アム」 3mLA 【後】
劇グラニセトロン静注液3mg「サウ」 3mLA 【後】
クラビット点滴静注パック500mg/100mL キット
(レボフロキサン点滴静注パック500mg/100mL「DSEP」へ切替)
グランシリンジ75 75μg0.3mL筒 [冷]
グランシリンジ150 150μg0.6mL筒 [冷]
※ グランシリンジM300 300μg0.7mL筒 [冷]
クリアクター静注用80万 80万国際単位V
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mLP 【後】
劇クリースピータ皮下注10mg 1mLV [2~8°C]
劇クリースピータ皮下注20mg 1mLV [2~8°C]
劇クリースピータ皮下注30mg 1mLV [2~8°C]
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 4mLA
グルアセト35注(ソフトパック) 500mLP 【後】
劇グルカゴンGノボ注射用1mg V (溶解液付) [冷]
グルトバ注1200万 1200万国際単位 V (溶解液付)
劇クレキサン皮下注2000IU 0.2mL筒
劇クレセンバ点滴静注用200mg V [2~8°C]
● グロウジェクト皮下注12mg 筒 [冷]
● クロスエイトMC静注用250単位 V (溶解液付)
● クロスエイトMC静注用1000単位 V (溶解液付)
献血グロベニン- I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)
献血グロベニン- I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)

【ケ】

K C L 注20mEqキット「テルモ」 1モル20mLキット 【後】
ケイセントラ静注用500 500国際単位V (溶解液付) [25°C以下]
ケイセントラ静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [25°C以下]
ケイツーニ静注10mg A
劇ケサンラ点滴静注液350mg 20mLV [2~8°C]
劇ケシンタ皮下注20mgベン 0.4mLキット [2~8°C]
麻劇ケタラール静注用50mg 5mLA
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL V
劇ケブザラ皮下注200mgシリンジ 1.14mL筒 [2~8°C]
●劇ケブザラ皮下注150mgオトインジェクター 1.14mLキット [2~8°C]
●劇ケブザラ皮下注200mgオトインジェクター 1.14mLキット [2~8°C]
劇ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サンド」 V [2~8°C] 【後】
献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 V
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 V
献血アルブミン20%静注4g/20mL「タダ」 V
献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」 20%50mLV
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 20%50mLV
献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」 25%100mLV
献血ヴェノグロブリン I H10%静注0.5g/5mL V [冷]
献血ヴェノグロブリン I H10%静注2.5g/25mL V [冷]
献血ヴェノグロブリン I H10%静注5g/50mL V [冷]
献血ヴェノグロブリン I H10%静注10g/100mL V [冷]
献血ヴェノグロブリン I H10%静注20g/200mL V [冷]
献血グロベニン- I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)
献血グロベニン- I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)
献血ノンスロン500注射用 500単位V (溶解液付)
献血ノンスロン1500注射用 1500単位V (溶解液付)

献血ベニロン- I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)
献血ベニロン- I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)
劇ゲンタシン注40 40mgA
【コ】
コアテック注5mg 5mLA
劇コアベータ静注用12.5mg V
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
(=ローブリン) V (溶解液付) [冷]
劇コスメゲン静注用0.5mg V [冷]
劇コセンティクス皮下注150mgベン 1mLキット [2~8°C]
●劇コセンティクス皮下注300mgベン 2mLキット [2~8°C]
コートロシン注射用0.25mg V (溶解液付) [冷]
コートロシンZ筋注0.5mg V [冷]
劇ゴナックス皮下注用80mg V (溶解液付)
劇ゴナックス皮下注用120mg V (溶解液付)
ゴナトロピン注射用5000単位 V [冷] (アンプルからバイアルへ切替)
● ゴナールエフ皮下注ベン300 300国際単位0.5mL筒 [冷]
ゴナールエフ皮下注ベン450 450国際単位0.75mL筒 [冷]
● ゴナールエフ皮下注ベン900 900国際単位1.5mL筒 [冷]
コパキンソウ皮下注20mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]
コバールトリイ静注用250 250国際単位V (溶解液付) [冷]
● コバールトリイ静注用500 500国際単位V (溶解液付) [冷]
● コバールトリイ静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [冷]
● コバールトリイ静注用2000 2000国際単位V (溶解液付) [冷]
● コバールトリイ静注用3000 3000国際単位V (溶解液付) [冷]
劇ゴーピック水性懸濁注シリンジ 0.5mL筒 [10°C以下]
劇コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 0.03mg0.3mL1筒 [2~8°C]
劇コントミン筋注25mg 5mLA
コンファクトF 静注用500単位 500単位V (溶解液付) [10°C以下]

【サ】

ザイポックス注射液600mg 300mLP
劇注射用サイメリン50mg V [冷]
劇サイモグロブリン点滴静注用25mg V [冷]
劇サイラムザ点滴静注液100mg 10mLV [冷]
劇サイラムザ点滴静注液500mg 50mLV [冷]
向サイレース静注2mg A
劇サークリサ点滴静注100mg 5mLV [2~8°C]
劇サークリサ点滴静注500mg 25mLV [2~8°C]
劇ザノサード点滴静注用1g V [2~8°C]
ザバクサ配合点滴静注用 V [2~8°C]
劇サバリックス 0.5mL筒 [冷]
(シルガード9水性懸濁筋注シリンジへ切替)
劇サビーン点滴静注用500mg V
劇サフネロード点滴静注300mg 2mLV [2~8°C]
サブパック血液ろ過用補充液-B i 2020mLキット 【後】
サブラード血液ろ過用補充液B-S-G 2020mLキット
劇サムタス点滴静注用8mg V
劇ザルトラップ点滴静注100mg 4mLV [2~8°C]
劇サンディミュン点滴静注用250mg 5%5mLA
劇サンドスマチニン皮下注用50μg 1mLA [冷]
(採用薬はオクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」へ切替)
劇サンドスマチニンLAR筋注用キット20mg 筒 (溶解液付) [2~8°C]
劇サンラビン点滴静注用250mg V [冷]
劇サンリズム注射液50 50mg5mLA

【シ】

ジアグノグリーン注射用25mg V (溶解液付)
向ジアゼバム注射液10mg「NIG」 A 【後】
シアノキット注射用5gセット 5gV (溶解液付)

注射用G H R P 科研100 100 μgV [10°C以下] [禁凍結]
(注射用G H R P 科研100 (溶解液付) より切替)
注射用G H R P 科研100 100 μgV (溶解液付) [冷]
● ジエノトロビンゴーケイック注用5.3mg キット [冷]
ジエノトロビンゴーケイック注用12mg キット [冷]
● ジエノトロビンT C 注用5.3mg 5.33mg筒 (溶解液付) [冷]
● ジエノトロビンT C 注用12mg 筒 (溶解液付) [冷]
劇ジエノトロビンV (=乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン) V (溶解液付) [冷]
毒ジエノトロビンV 注用60mg 1.5mLV (溶解液付) [15~30°C]
劇ジエノトロビンV 注用1g V
(ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サンド」へ切替)
劇シオゾール注10mg 1mLA (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了 (予定))
劇ジオラン注無痛化剤付 10mLV (希釈液付)
劇ジギラノゲン注0.4mg 2mLA
劇シグニフォーラR筋注用キット40mg 1キット (溶解液付) [2~8°C]
シグマート注2mg V [冷]
シグマート注48mg V [冷]
(ニコランジル点滴静注用48mg「サンド」へ切替)
シザナリン配合点滴静注液 2mLA 【後】
毒シスプラチニン点滴静注10mg「マルコ」 20mLV 【後】
毒シスプラチニン点滴静注50mg「マルコ」 100mLV 【後】
ジスロマック点滴静注用500mg V
劇歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 3%1.8mLA [冷]
○劇シタラビン点滴静注液1g「NIG」 50mLV 【後】
シチコリソル500mg/10mL「日医工」 A 【後】 (販売中止)
(2025年9月30日経過措置終了)
ジトリペナートカル静注1000mg V
シナジス筋注液50mg 0.5mLV [2~8°C]
シナジス筋注液100mg 1mLV [2~8°C]
● ジビイ静注用3000 3,000国際単位V (溶解液付) [2~8°C]
劇ジフォルタ注射液20mg 1mLV [2~8°C]
劇洗降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タダ」 1mLV [冷]
劇ジプレキサ筋注用10mg V
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニフロ」 200mLP 【後】
シベクトロ点滴静注用200mg V
劇シベノール静注70mg 5mL筒
劇シムジア皮下注200mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]
劇シムジア皮下注200mgオートクリックス 1mLキット [2~8°C]
劇シムレクト静注用20mg V (溶解液付) [冷]
シメチジン注200mg「NP」 2mLA 【後】
ジョイカル関節炎30mg 3mL筒 [2~8°C]
ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL筒 [2~8°C]
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド 0.36mLキット [2~8°C]
劇シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]
劇シングリックス筋注用 一人分V (溶解液付) [2~8°C]
劇シンビット静注用50mg V
劇シンボニー皮下注50mgシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]
劇シンボニー皮下注50mgオートインジェクター 0.5mLキット [2~8°C]
【ス】
劇乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビ'ケン」 V (溶解液付) [冷]
水溶性ブレドニン20mg A
スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルシ」 2mL筒 【後】
劇スキャンドネストカートリッジ3% 1.8mLA
劇スカリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL筒 [2~8°C]
劇スカリージ皮下注150mgシリンジ1mL 筒 [2~8°C]
劇スカリージ皮下注360mgオートドーザー 2.4mLキット [2~8°C]
劇スカリージ点滴静注600mg 10mLV [2~8°C]

ステミラック注 1回分 [-80°C以下]
(輸血免疫移植部でのみ取扱い)
劇ステラーラ点滴静注130mg 26mLV [2~8°C]
劇ステラーラ皮下注45mgシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]
ステルライズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ 筒 [2~8°C]
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 V
スピンラザ髓注12mg 5mLV [2~8°C]
劇ズファジラン筋注5mg 0.5%1mLA
劇スミフェロン注D-S 300万IU 筒 (注射針同梱) [冷]
劇スミフェロン注D-S 600万IU 筒 (注射針同梱) [冷]
スルバシリン静注用1.5g V
スルバシリン静注用3g V
スロソノンH I 注10mg/2mL A
(アルガトロバンH I 注10mg/2mL「ツー」へ切替)
【セ】
劇一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25 μgV (溶解液付) [冷]
生食注シリンジ「NP」10mL 筒 【後】
● 生食注シリンジ「オーカ」10mL 筒 【後】
生食注シリンジ50mL「ニフロ」 筒 【後】
生理食塩液 20mLA
生理食塩液 50mLV
生理食塩液 100mLV
生理食塩液 250mLP
生理食塩液 500mLP (プラボトルからバッグへ切替)
生理食塩液「テルモ」 1000mLP
生理食塩液P L「ツー」 2LP
毒ゼオマイン筋注用100単位 V [25°C以下]
● 劇ゼップパウンド皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
● 劇ゼップパウンド皮下注5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
● 劇ゼップパウンド皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
● 劇ゼップパウンド皮下注10mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
● 劇ゼップパウンド皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
● 劇ゼップパウンド皮下注15mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
劇セトロタイト注射用0.25mg V (溶解液付) [2~8°C]
セパセリンテグラC A 400mL採血用 [ABD-400CA8FL]
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 V 【後】
劇セファランチン注10mg 2mLA
セフェビム塩酸塩静注用1g「CMX」 V 【後】
セフォタックス注射用1g V
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 V 【後】
セフタジム静注用1g「VTRS」 V
セフトリニアキソナトリウム静注用1g「NP」 V
セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 V 【後】
※劇ゼブリオン水懸濁筋注25mgシリンジ 25mg1キット
劇ゼブリオン水懸濁筋注50mgシリンジ 50mg1キット
劇ゼブリオン水懸濁筋注75mgシリンジ 75mg1キット
劇ゼブリオン水懸濁筋注100mgシリンジ 100mg1キット
劇ゼブリオン水懸濁筋注150mgシリンジ 150mg1キット
劇ゼブリオンT R I 水懸濁筋注525mgシリンジ 525mg1キット
向セルシシン注射液10mg A (販売中止) (2026年3月31日経過措置終了)
(ジアゼパム注射液10mg「NIG」へ切替)
劇セレネース注5mg 1mLA
【ソ】
● ソグルーヤ皮下注5mg 1.5mLキット [2~8°C]
● ソグルーヤ皮下注10mg 1.5mLキット [2~8°C]
● ソグルーヤ皮下注15mg 1.5mLキット [2~8°C]
ゲン静注用4.5~4.5gV (タゾビペ配合静注用4.5「ニフロ」へ切替)
向劇ソセゴン注射液15mg A

- ゲビラックス点滴静注用—250mgV
(アシクロビル点滴静注液250mg「トワ」へ切替)
ソナゾイド注射用16μL V (溶解液付)
劇ソマチュリン皮下注90mg 筒 [冷]
劇ソマチュリン皮下注120mg 筒 [冷]
● ソマトロビンB S 皮下注5mg「サンド」シュアバル
5mg筒 [2~8°C] 【後】
● ソマトロビンB S 皮下注10mg「サンド」シュアバル
10mg筒 [2~8°C] 【後】
劇ゾメタ点滴静注4mg/100mL—V
(ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トワ」へ切替)
劇ゾラデックス3.6mgデボ 筒 [冷]
劇ゾラデックスL A 10.8mgデボ 筒 [冷]
劇ソリクア配合注ソロスター キット [2~8°C]
劇ソリリス点滴静注300mg 30mLV [冷]
ソルアセトF輸液 500mLP 【後】
ソル・コーテフ注射用100mg V (溶解液付)
ソル・コーテフ静注用500mg V (溶解液付)
劇ソルダクトン静注用100mg A
ソルデム1輸液 200mLP 【後】
ソルデム1輸液 500mLP 【後】
ソルデム3A輸液 200mLP 【後】
ソルデム3A輸液 500mLP 【後】
劇ゾルトファイ配合注フレックススタッチ キット [2~8°C]
ソル・メドロール静注用40mg 40mgV (溶解液付)
ソル・メドロール静注用125mg 125mgV (溶解液付)
ソル・メドロール静注用500mg 500mgV (溶解液付)
ソルラクト輸液 500mLP 【後】
劇ゾレア皮下注150mgベン 1mL1キット [2~8°C]
劇ゾレア皮下注300mgベン 2mL1キット [2~8°C]
劇ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トワ」 P 【後】
【タ】
ダイアニールN P D-2 1.5腹膜透析液(シゲルバッゲ) 2LP (販売中止)
ダイアニールN P D-2 2.5腹膜透析液(シゲルバッゲ) 2LP (販売中止)
● ダイアニール-N P D-4 1.5腹膜透析液(シゲルバッゲ) 1LP
ダイアニールN P D-4 1.5腹膜透析液(シゲルバッゲ) 2LP (販売中止)
● ダイアニール-N P D-4 1.5腹膜透析液(シゲルバッゲ) 5LP
● ダイアニール-N P D-4 2.5腹膜透析液(シゲルバッゲ) 1LP
ダイアニールN P D-4 2.5腹膜透析液(シゲルバッゲ) 2LP (販売中止)
● ダイアニール-N P D-4 2.5腹膜透析液(シゲルバッゲ) 5LP
ダイアニールP D-2 4.25腹膜透析液(シゲルバッゲ) 2LP
ダイアモックス注射用500mg V
劇タイガシル点滴静注用50mg V
劇タイサブリ点滴静注300mg 15mLV [2~8°C]
ダイホルモン・デボ 注 1mLA 【後】 (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了)
タイロゲン筋注用0.9mg V [冷]
劇ダウノマイシン静注用20mg V
タガメット注射液200mg—2mLA (シメチジン注200mg「NP」へ切替)
劇ダカルバジン注用100 100mgV [冷]
タケプロン静注用30mg V
劇注射用タゴシッド200mg—V
(テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」へ切替)
タゾビペ配合静注用4.5「ニブ」 4.5gV
タチオン注射用100mg A
劇ダトロウェイ点滴静注用100mg V [2~8°C]
ダブトマイシン静注用350mg「ニブ」 V 【後】 (キュビシン)
劇ダラキユーロ配合皮下注 15mLV [2~8°C]
劇ダラザレックス点滴静注100mg—5mLV [2~8°C]
劇ダラザレックス点滴静注400mg 20mLV [2~8°C]
ダルテバリンN a 静注5000単位/5mL「日新」
5,000低分子ヘパリン国際単位A 【後】 (フラグミン)
劇ダルビアス点滴静注用135mg V [2~8°C]
○劇ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」
0.5mL筒 【後】 [2~8°C] (ネスブ)
○劇ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」
0.5mL筒 【後】 [2~8°C] (ネスブ)
ダントリウム静注用20mg V
劇タンポコール静注50mg 5mLA
【チ】
チエナム点滴静注用0.5g V
注射用水 20mLA
注射用水 (=大塚蒸留水) 100mLV
注射用水 (=大塚蒸留水) 500mLV (PET専用・物流のみ)
注射用水 (洗浄用) 500mLV
注射用水 (洗浄用) 1000mLV
注射用水バッグ「フュ」 1LP
劇チラーデンS 静注液200μg 1mLA
劇沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mLV [冷]
劇沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「カダ」 1mLA [冷]
(D T ピックへ切替)
【ツ】
劇一般診断用精製ツベルクリン (PPD)
1人用 0.25μg V (溶解液付) [冷]
【テ】
T R H 注0.5mg「ニブ」 A [冷]
○劇テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」 V 【後】
劇D T ピック (=沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド) 0.1mLV [冷]
劇1%ディブリバン注-キット 500mg50mL筒
低分子デキストラン糖注 500mLP 【後】
デカドロン注射液1.65mg—0.5mL [冷]
(院内はデキサート注射液1.65mg)
デカドロン注射液6.6mg—2mL [冷]
(院内はデキサート注射液6.6mg)
○ デキサート注射液1.65mg 0.5mLA 【後】
○ デキサート注射液6.6mg 2mLV 【後】
劇デクスマデミジン静注液200μg「ニブ」 2mLV 【後】
テスチノンデポー筋注用125mg 1mLA
劇テゼスバイア皮下注210mgベン 1.91mLキット [2~8°C]
劇テセントリク点滴静注840mg 14mLV [2~8°C]
劇テセントリク点滴静注1200mg 20mLV [2~8°C]
テタノブリントH静注250単位 V [冷]
テタノブリントH静注1500単位 V [冷]
劇テッペーザ点滴静注用500mg V [2~8°C]
デトキソール静注液2g 20mLV
劇テトラビック皮下注シリンジ—0.5mL筒 [冷]
毒デノンシジ点滴静注用500mg—V
(ガシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」へ切替)
デファイテリオ静注200mg 2.5mLV
劇テブダック点滴静注用40mg V [2~8°C]
テムセルH S 注 10.8mL1P [液体窒素 (気相中)]
(輸血移植免疫部でのみ取扱い)
毒テモダール点滴静注用100mg V [2~8°C]
劇デュピクセント皮下注200mgシリンジ 1.14mL筒 [2~8°C]
劇デュピクセント皮下注300mgベン 2mLキット [2~8°C]

劇テラルビシン注射用10mg V [冷]
劇テラルビシン注射用20mg V [冷]
テリバラチドB S皮下注キット600 μ g「モダ」キット [2~8°C] 【後】
テリポン皮下注28.2 μ gオートインジェクター キット [2~8°C]
テルモ血液バッグC P D A 200mL採血用セット [BB-SCD200J8A]
【ト】
劇ドキシル注20mg 10mLV [冷]
劇ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サド」 5mLV [冷] 【後】
劇ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サド」 25mLV [冷] 【後】
毒ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニブロ」 V 【後】
毒ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニブロ」 V 【後】
ドバストン静注50mg 0.25%20mLA
→劇ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 0.3%200mL袋 【後】
(ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」が無くなり次第切替)
※劇ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」 0.3%200mL袋 【後】
(ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」へ切替予定)
劇ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サウ」 5mLA 【後】
劇ドブタミン持続静注150mgシリソジ「KKC」 50mL筒 【後】
(ドブタミン持続静注150mgシリソジ「テルモ」へ名称変更)
劇ドブタミン持続静注150mgシリソジ「テルモ」 0.3%50mL筒 【後】
(ドブタミン持続静注150mgシリソジ「KKC」より名称変更)
劇ドブトレックス注射液100mg A
(ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サウ」へ切替)
劇ドブボン注0.3%シリソジ 50mL 【後】
(ドブタミン持続静注150mgシリソジ「KKC」へ名称変更)
劇ドブトレックスK注600mgより切替)
劇トブラシン注60mg A
劇ドブラム注射液400mg 20mLV
劇トボテシン点滴静注40mg 2mLV
(院内はイリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トワ」)
劇トボテシン点滴静注100mg 5mLV
(院内はイリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トワ」)
トラヌツズマブB-S点滴静注用60mg「NK」 V [2~8°C] 【後】
トラヌツズマブB S点滴静注用150mg「NK」 V [2~8°C] 【後】
トナネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 10%10mLA 【後】
劇トマール注100 100mgA
トランサミン注10% 10mLA
毒トリセノックス点滴静注12mg 6mLV
劇トリビック (=沈降精製百日せきジフェリア破傷風混合ワクチン)
0.5mLV [10°C以下] [禁凍結]
劇トルツ皮下注80mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]
向ドルミカム注射液10mg 2mLA (ミダゾラム注10mg「サド」へ切替)
劇トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.5mL1キット [2~8°C]
劇トレアキシン点滴静注液100mg/4mL V [2~8°C]
劇トレシーバ注フレックススタッチ 300単位キット [2~8°C]
劇トレプロスト注射液200mg 20mLV
劇トレムフィア点滴静注200mg 20mLV [2~8°C]
劇トレムフィア皮下注100mgシリソジ 100mg1mL筒 [2~8°C]
劇トレムフィア皮下注200mgペン 2mLキット [2~8°C]
劇トロデルビ点滴静注用200mg V [2~8°C]
劇ドロレプタン注射液25mg 10mLV
【ナ】
●劇ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター 0.375mLキット [2~8°C]
劇ナノゾラ皮下注30mgシリソジ 0.375mL筒 [2~8°C]
劇ナファモスタット注射用10mg「SW」 V 【後】
毒ナ-プロ-タ筋注2500単位 0.5mLV [2~8°C]
毒ナベルビン注40 4mLV [冷] (ロゼウス静注液40mgへ切替)

麻劇ナルベイン注2mg 1mLA
劇ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mLA
【ニ】
劇ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 2mLA 【後】
(サリベックス注 0.1% 2mg2mLより名称変更)
劇ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 10mLA 【後】
(サリベックス注0.1% 10mg10mLより名称変更)
● ニコベリック腹膜透析液1.5L 袋 (排液用バッグ付) 【後】
ニコランジル点滴静注用48mg「サウ」 V [冷] 【後】
ニコランジ注射液500mg 10mLA
毒ニトプロ持続静注液6mg 2mLA [冷]
劇ニドラン注射用50mg V
劇ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 A 【後】
劇ニトログリセリン注25mg/50mLシリソジ「テルモ」 筒 【後】
ニトロール注5mgシリソジ 10mL筒
ニトロール持続静注25mgシリソジ 50mL筒
劇乳酸ビペリデン注5mg「シトミ」 0.5%1mLA 【後】
劇ニューモバックスN Pシリソジ 0.5mL筒 [2~8°C]
【ヌ】
劇ヌカラ皮下注100mgペン 1mLキット [2~8°C]
【ネ】
ネオアミュー輸液 200mLP
劇ネオシネジンコーア注1mg 1mLA
劇ネオビタカイン注シリソジ5mL 筒
ネオファーゲン静注20mL A
ネオフィリン注250mg 10mLA
劇ネスブ注射液30 μ g「ラシソジ」 0.5mL筒 [2~8°C]
(ダルベボエチナルファ注30 μ gシリソジへ切替)
劇ネスブ注射液60 μ g「ラシソジ」 0.5mL筒 [2~8°C]
(ダルベボエチナルファ注60 μ gシリソジへ切替)
劇ネスブ注射液120 μ g「ラシソジ」 0.5mL筒 [2~8°C]
【ノ】
ノイアト静注用1500単位 V (溶解液付)
(献血ノンスロン1500注射用へ切替)
ノイトロジン注50 μ g V (溶解液なし)
ノイトロジン注100 μ g V (溶解液なし)
ノイトロジン注250 μ g V (溶解液なし)
ノイロトロビン注射液3.6単位 3mLA
劇ノクサフィル点滴静注300mg 16.7mLV [2~8°C]
ナ-ミン筋注5mg 1mLA (販売中止)
毒ノバントロン注10mg 5mLV
向劇ノーベルバール静注用250mg V
● ノボエイト静注用1500 1500国際単位V (溶解液付) [2~8°C]
ノボセブンH I 静注用5mgシリソジ 5mLV (溶解液付) [冷]
劇ノボラビッド注100単位/mL 10mLV [冷]
●劇ノボラビッド注フレックススタッチ 300単位キット [冷]
(院内はインスリンアスパルトB S注ソロタ-N R「サウ」へ切替予定)
●劇ノボラビッド注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボラビッド30ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボラビッド50ミックス注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボリンR注フレックスペン 300単位キット [冷]
●劇ノボリンN注フレックスペン 300単位キット [2~8°C]
劇ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mLA
● ノルデイトロビン フレックスプロ注5mg キット [冷]
● ノルデイトロビン フレックスプロ注10mg キット [冷]
献血ノンスロン500注射用 500単位V (溶解液付)
献血ノンスロン1500注射用 1500単位V (溶解液付)

【ハ】

劇ハイカムチン注射用1.1mg V
 ハイカリックRF輸液 500mLP
 バイクロット配合静注用 V (溶解液付) [10°C以下]
 ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL V [2~25°C]
 水溶性ハイドロコートン注射液100mg 2mLV
 バクトラミン注 5mLA
 毒パクリタキセル注射液100mg「NP」 16.7mLV 【後】 (販売中止)
 (2026年3月31日経過措置終了 (予定))
 効バーサビブ静注透析用シリソジ5mg 2mL筒 [2~8°C]
 効バージェタ点滴静注420mg/14mL V [2~8°C]
 効沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mLV [冷]
 ハーセブチン注射用150 150mgV (溶解液なし) [2~8°C]
 効パドセブ点滴静注用30mg V [2~8°C]
 パペベリソ塩酸塩注40mg「日医工」 1mLA
 効バビースモ硝子体内注射液120mg/mL 0.05mLV [2~8°C]
 効バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg/0.05mL筒 [2~8°C]
 ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100mLV [冷]
 効ハベカシン注射液200mg 4mLA
 効バベンチオ点滴静注200mg 10mLV [2~8°C]
 パム静注500mg 20mLA
 毒ハラヴェン静注1mg 2mLV
 毒パラプラチニン注射液50mg—5mLV
 (カルボプラチニン点滴静注液50mg「NK」へ切替)
 毒パラプラチニン注射液150mg—15mLV
 (カルボプラチニン点滴静注液150mg「NK」へ切替)
 毒パラプラチニン注射液450mg—45mLV
 (カルボプラチニン点滴静注液450mg「NK」へ切替)
 バル筋注100mg「AFP」 10%1mLA [冷]
 効パルクス注5μg—1mLA [冷]
 (採用薬はアルプロスタジル注5μg「セイ」へ切替)
 効パロノセトロン点滴静注バグ0.75mg/50mL「タロ」 P 【後】
 効ハロマンス注100mg 1mLA
 パンコマイシン点滴静注用0.5g「トワ」 V 【後】
 パンテノール注500mg「KCC」 A 【後】 (供給停止)
 ペントール注射液500mg A
 効ハンプ注射用1000 1000 μgV

【ヒ】

劇ピアスカイ注340mg 2mLV [2~8°C]
 効ピヴラツツ点滴静注液150mg 6mLV
 ピカネイト輸液 500mLP (ピカーボン輸液から切替)
 ピカネイト輸液 1000mLP
 ピカーボン輸液—500mLP (ピカネイト輸液 500mLへ切替)
 効ピキセオス配合静注用 (144mg) V [2~8°C]
 ピクシリソ注射用2g V
 注射用ピクシリソ500 500mgV 【後】
 効ピクトーザ皮下注18mg 3mLキット [冷]
 効BCGワクチン(ディス 乾燥) 12mg 1人用V [冷]
 効ピシバニール注射用1KE V (溶解液なし) [10°C以下]
 効ピシバニール注射用5KE V (溶解液なし) [10°C以下]
 効ビスダイン静注用15mg V
 ヒスタグロビン皮下注用 V (溶解液付) [冷]
 ヒソルボン注4mg—0.2%2mLA
 (プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タロ」へ切替)
 効ピダーザ注射用100mg—V
 (アザチヒジン注射用100mg「セイ」へ切替)
 ヒタシミン注射液500mg A [冷]
 (アスコルビン酸注500mg P B「日新」へ切替)

ピタメジン静注用 V
 ピドキサール注10mg A
 ヒトCRH静注用100 μg「ニフロ」 V (溶解液付)
 ピトレシン注射液20 20単位1mLA [冷]
 効ヒフデュラ配合皮下注 5.6mLV [2~8°C]
 ピーフリード輸液 500mLキット
 ピペラシリンNa注射用1g「NIG」 V 【後】
 (ペントシリン注射用1gVから切替)
 ヒベルナ注25mg 2.5%1mLA
 効ビームゲン注[HBワクチン] 5 μg/0.25mLV [冷]
 効ビームゲン注[HBワクチン] 10 μg/0.5mLV [冷]
 (ヘプタバックス-IIへ切替)
 効ビムバット点滴静注100mg 10mLV
 効ビムバット点滴静注200mg 20mLV
 ● 効ヒューマトローブ注射用6mg 筒 (溶解液付) [冷]
 (販売終了) (2026年3月31日経過措置終了)
 ● 効ヒューマトローブ注射用12mg 筒 (溶解液付) [冷]
 (販売終了) (2026年3月31日経過措置終了)
 効ヒューマリンR注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]
 ● 効ヒューマリンR注カート 300単位筒 [冷]
 効ヒューマリンR注ミリオベン 300単位キット [冷]
 効ヒューマリンN注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]
 効ヒューマリンN注ミリオベン 300単位キット [冷]
 ● 効ヒューマリン3/7注ミリオベン [冷]
 ● 効ヒューマログ注100単位/mL 1000単位10mLV [冷]
 ● 効ヒューマログ注カート 300単位筒 [冷]
 ● 効ヒューマログ注ミリオベン 300単位キット [冷]
 ● 効ヒューマログ注ミリオベンHD 300単位キット [冷]
 ● 効ヒューマログミックス25注ミリオベン 300単位キット [冷]
 ● 効ヒューマログミックス50注ミリオベン 300単位キット [冷]
 ● 効ヒュミラ皮下注20mgシリソジ0.2mL 筒 [冷]
 ● 効ヒュミラ皮下注40mgシリソジ0.4mL 筒 [冷]
 効ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL キット [冷]
 ● 効ヒュミラ皮下注80mgシリソジ0.8mL 筒 [冷]
 効ヒュミラ皮下注80mgベン0.8mL キット [冷]
 ヒリヴィジン10%静注2.5g/25mL V [2~25°C] [禁凍結]
 ヒリヴィジン10%静注5g/50mL V [2~25°C] [禁凍結]
 ヒリヴィジン10%静注10g/100mL V [2~25°C] [禁凍結]
 ヒリスコビン点滴静注50 10.55% 100mLV
 効ビーリンサイト点滴静注用35 μg V [2~8°C]
 ヒルテブン点滴静注250mg 5mL V [冷]
 ヒルトニン0.5mg注射液 A
 効ビロイ点滴静注用100mg V [2~8°C]
 効ビンゼレックス皮下注160mgオトイジエクター 1mLキット [2~8°C]
 ● 効ビンゼレックス皮下注320mgオトイジエクター 2mLキット [2~8°C]
 【フ】
 ファイバ静注用1000 20mLV [2~8°C]
 効5-FU注250mg V [2~8°C]
 (フルオロウラシル注250mg「トワ」へ切替)
 ファーストシン静注用1g V
 効フアセントラ皮下注30mgシリソジ 1mL筒 [2~8°C]
 効フアセントラ皮下注30mgベン 1mLキット [2~8°C]
 効フアラザイム点滴静注用5mg V [冷]
 効フアラザイム点滴静注用35mg V [冷]
 効フアルモルビシン注射用10mg V
 (エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」へ切替)
 フアモチジン静注20mg「日新」 20mLA 【後】

- 劇アシガード点滴用50mg V
(ミカファンギンN a点滴静注用50mg「ニブ 口」へ切替)
フィコンペ点滴静注用2mg V
ライジオ35輸液 500mLP (グルアセト35注 500mLへ切替)
フィジオ140輸液 500mLP
フィニバックス点滴静注用0.5g V
劇ブイフェンド200mg静注用 V
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 V (溶解液付) [冷]
フィブロガミンP静注用 V [冷]
● フィラジル皮下注30mgシリンジ 3mL筒 [冷]
フィルグラスチムB S注75μgシリンジ「NK」
0.3mL/筒 [2~8°C] 【後】
フィルグラスチムB S注150μgシリンジ「NK」
0.6mL/筒 [2~8°C] 【後】
フィルグラスチムB S注300μgシリンジ「F」
0.7mL/筒 [10°C以下 禁凍結] 【後】
劇注射用フィルデシン1mg V [冷]
フェインジェクト静注500mg 10mLV
フェジン静注40mg 2mLA
劇フェスゴ配合皮下注MA 10mLV [2~8°C]
劇フェスゴ配合皮下注IN 15mLV [2~8°C]
劇フェソロデックス筋注250mg 5mL筒 [冷]
フェトロージャ点滴静注用1g V [2~8°C]
劇フェノバル注射液100mg 1mLA
○麻劇フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 0.005%2mLA 【後】
○麻劇フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 0.005%10mLA 【後】
● フォルテオ皮下注キット600μg 0.005%10mLA
劇注射用フサン10~10mg V
(ナファモスタット注射用10mg「SW」へ切替)
劇注射用フサン50 50mg V
劇ブスコパン注20mg 2%1mLA
劇ブスルフェクス点滴静注用60mg V [冷]
ブドウ糖 5% 20mLA
ブドウ糖 5% 50mLV
ブドウ糖 5% 100mLV
ブドウ糖 5% 250mLP (フ ボ' トルからバ' ックへ切替)
ブドウ糖 5% 500mLP (フ ボ' トルからバ' ックへ切替)
ブドウ糖 10% 20mLA
ブドウ糖 20% 20mLA
ブドウ糖 50% 20mLA
ブドウ糖 70% 350mLP
フラグミン静注5000単位/5mL 0.005%10mLA 【後】 (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了)
(ダルテパリンN a静注5000単位/5mL「日新」へ切替)
※劇プラリア皮下注60mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]
(プラリアH I皮下注60mgシリンジ0.5mLへ切替予定)
→劇プラリアH I皮下注60mgシリンジ0.5mL 筒 [2~8°C] [禁凍結]
(プラリア皮下注60mgシリンジが無くなり次第切替)
プリズバインド静注液2.5g 50mLV [2~8°C]
ブリディオン静注200mg 2mLA
(スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルシ」へ切替)
ブリンペラン注射液10mg 2mLA
(塩酸メトクロラミド注射液10mg「カタ」へ切替)
フルオレサイト静注500mg 5mLV 【後】
劇フルオロウラシル注250mg「ト-7」 V [2~8°C] 【後】
劇フルオロウラシル注1000mg「ト-7」 V [2~8°C] 【後】
フルカリック1号輸液 903mLキット
フルカリック2号輸液 1003mLキット
フルカリック3号輸液 1103mLキット
フルコナゾール静注液50mg「カイ」 0.1%50mLV 【後】
フルスルチアミン注50mg「日新」 20mLA 【後】
劇フルダラ静注用50mg V
劇フルデカシン筋注25mg 1mLV
劇フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 5mL筒 【後】
フルマリン静注用1g V
ブレアミン-P注射液 200mLP
劇ブレオ注射用15mg V
劇ブレセデックス静注液200μg「マルシ」 2mLV
(デクスマデトミジン静注液200μg「ニブ 口」へ切替)
劇ブレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイ-」 筒
水溶性ブレドニン20mg A
劇ブレバイミス点滴静注240mg 12mLV
劇ブレピロック注100mg 10mLV
劇ブレベナー20水性懸濁注 0.5mLキット [2~8°C]
プロイメント点滴静注用150mg V [2~8°C]
(ホスアブレピタント点滴静注用150mg「NK」へ切替)
プロギノン・デポー筋注10mg 1mLA
劇ブログラフ注射液2mg 0.4mLA
プロゲデボ-筋注125mg 1mLA (販売中止)
プロゲホルモン筋注用25mg 1mLA (販売中止)
プロジフ静注液200 8%2.5mLV [冷]
劇プロスタルモン・F注射液1000 1mg1mLA
劇プロスタンデイン注射用20μg V
(アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「カタ」へ切替)
劇プロスタンデイン500μg V
(アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「カタ」へ切替)
フロセミド注20mg「ト-7」 A 【後】
劇プロタノールL注0.2mg 0.02%1mLA
プロタミン硫酸塩静注100mg「モダ」 1%10mLV
(ノボ・硫酸プロタミン静注用100mgから名称変更)
プロハンス静注シリンジ13mL 筒
劇プロポフォール静注1%20mL「マルシ」 200mg20mLA 【後】
劇プロポフォール静注1%100mL「マルシ」 1g100mLV 【後】
プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タヨ-」 0.2%2mLA 【後】
劇静注用フローラン0.5mg V (溶解液無)
劇静注用フローラン1.5mg V (溶解液無)
静注用フローラン専用溶解液 50mLV
【ヘ】
ペイフォータス筋注50mgシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C]
ペイフォータス筋注100mgシリンジ 1mL筒 [2~8°C]
劇ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg0.05mL筒 [2~8°C]
劇ペガシス皮下注180μg 1mLV [冷]
劇ベクティビックス点滴静注100mg 5mLV [冷]
ベクルリー点滴静注用100mg V
毒ベスポンサ点滴静注用1mg V [2~8°C]
劇ベスレミ皮下注250μgシリンジ 0.5mL筒 [2~8°C] [禁凍結]
●劇ベタフェロン皮下注射用960万国際単位 V (溶解液付)
麻ペチロルファン注射液 1mLA
麻ペチロルファン配合注HD 1mLA
劇ベナンバックス注射用300mg V
注射用ベニシリンGカリウム100万単位 V
献血ベニロン- I 静注用2500mg 50mLV (溶解液付)
献血ベニロン- I 静注用5000mg 100mLV (溶解液付)

無印：採用薬
※：削除予定薬
●：院外処方専用薬
☆：院外処方専用予定薬
【後】：後発医薬品
○：院内専用後発品である薬

- ベネフィクス静注用1000 1000国際単位V (溶解液付) [1~30°C]
劇ベバシズマブB S点滴静注100mg「CTNK」4mLV [2~8°C] 【後】
劇ベバシズマブB S点滴静注100mg「第一二共」
4mLV [2~8°C] 【後】 (販売中止)
劇ベバシズマブB S点滴静注400mg「CTNK」16mLV [2~8°C] 【後】
劇ベバシズマブB S点滴静注400mg「第一二共」
16mLV [2~8°C] 【後】 (販売中止)
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリソジ「モダ」 筒 【後】
ヘパリンN aロック用10単位/mLシリソジ
「オーツカ」10mL (ルアースリップ タイプ) 筒 【後】
ヘパリンN aロック用100単位/mLシリソジ
「オーツカ」5mL (ルアーロックタイプ) 筒 【後】
ヘパリンN aロック用100単位/mLシリソジ
「オーツカ」10mL (ルアースリップ タイプ) 筒 【後】
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」 A
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」 V
劇ペプシド注100mg 5mLV
(エトボシド点滴静注液100mg「サンド」へ切替)
ヘプスプリンI H静注1000単位 5mLV [冷]
劇ヘプタバックス-II水溶性懸濁注シリソジ0.5mL 筒 [2~8°C]
ヘムライブラ皮下注60mg 0.4mLV [2~8°C]
ヘムライブラ皮下注90mg 0.6mLV [2~8°C]
ヘムライブラ皮下注105mg 0.7mLV [2~8°C]
ヘムライブラ皮下注150mg 1mLV [2~8°C]
劇ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 4mLV 【後】
劇ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 20mLV 【後】
ペラニンデボ 筋注5mg 1mLA (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了)
(プロギノン・デボー筋注10mgへ切替)
● ペリセート360N腹膜透析液 1.5LP (排液用バッグ付)
● ペリセート400N腹膜透析液 1.5LP
(排液用バッグ付) [セーフィヤップシステム用]
ペリナートP静注用500
(正常人血漿1mL中含量の500倍(溶解液付)) V [冷]
毒ペルケイド注射用3mg V
ヘルニコア椎間板注用1.25単位 V [冷]
劇ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トワ」 V [2~8°C] 【後】
ペントシザン注射用1g V
(ピペラシリンN a注射用1g「NIG」 V 【後】へ切替)
劇ベンリスタ点滴静注用120mg V [2~8°C]
劇ベンリスタ点滴静注用400mg V [2~8°C]
劇ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター 1mLキット [2~8°C]
【ホ】
ボカブリア水懸筋注600mg 3mLV
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 V [2~8°C] 【後】
毒点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 6g250mLV
劇ホストイン静注750mg 10mLV [冷]
ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」 V 【後】
劇ボスミン注1mg 0.1%1mLA
● ボックスゾゴ皮下注用0.4mg V (溶解液付) [2~8°C]
● ボックスゾゴ皮下注用0.56mg V (溶解液付) [2~8°C]
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg V (溶解液付) [2~8°C]
劇ボテリジオ点滴静注20mg 5mLV [2~8°C]
毒ボトックス注射用50単位 V [冷]
劇ポートラーザ点滴静注液800mg 50mLV [2~8°C]
劇ボナロン点滴静注バッグ900μg 100mLP

- 劇ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL P
劇ボブスカイン0.5%注50mg/10mL A
劇ボブスカイン0.75%注75mg/10mL A
ホメビゾール点滴静注1.5g「タダ」 V
劇ボライビー点滴静注用30mg V [2~8°C]
劇ボライビー点滴静注用140mg V [2~8°C]
ボララミン注5mg 1mLA
劇ボリドカスカレロール0.5%注2mL A
劇ボリドカスカレロール1%注2mL A
劇ボリドカスクレロール3%注2mL A
毒ボルテゾミブ注射用3mg「トワ」 V 【後】
ボルベニ輸液6% 500mLP
劇ボンビバ静注1mgシリソジ 1mL筒
ボンベンディ静注用1300 1300国際単位V (溶解液付)
【マ】
劇マイトマイシン注用2mg V
毒マイロターグ点滴静注用5mg V [2~8°C]
劇マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mLA
劇マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mLA
注射用マキシペム1g V
(セフェビム塩酸塩静注用1g「CMX」へ切替)
マキュエイド眼注用40mg V
マグセント注100mL V
マグネスコープ静注38%シリソジ13mL 筒
マグネスコープ静注38%シリソジ15mL 筒
劇乾燥弱毒生麻しんワクチン「タダ」 1人分V (溶解液付) [冷]
劇乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン (=ミールビック)
1人分V (溶解液付) [冷]
劇乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 V (溶解液付) [冷]
劇マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
劇マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
●劇マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
●劇マンジャロ皮下注10mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
●劇マンジャロ皮下注12.5mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
●劇マンジャロ皮下注15mgアテオス 0.5mLキット [2~8°C]
20%マンニットール注射液「YD」(袋) 300mL袋
【ミ】
劇ミオコール静注5mg 10mLA 【後】
(ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」へ名称変更)
ミオテクター冠血管注 A液 495mLV
ミオテクター冠血管注 B液 5mLA
劇ミカファンギンN a点滴静注用50mg「ニコ」 V 【後】
(ファンガード点滴用50mgから切替)
向ミダゾラム注射液10mg「ナメ」 2mLA 【後】
向ミダゾラム注射液10mg「ナメ」 2mLA 【後】 (出荷停止)
(ミダゾラム注射液10mg「NIG」へ切替)
向ミダフレッサ静注0.1% 10mg10mLV
劇ミチーガ皮下注用30mgバイアル V [2~8°C]
劇ミチーガ皮下注用60mgシリソジ 筒
ミッドペリック135腹膜透析液 1.5LP (排液用バッグ付)
● ミッドペリック135腹膜透析液 2LP (排液用バッグ付)
ミッドペリック135腹膜透析液 2LP (排液用バッグ無し)
● ミッドペリック250腹膜透析液 1.5LP (排液用バッグ付)
ミッドペリック250腹膜透析液 2LP (排液用バッグ無し)
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」 V 【後】
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タコ」 V 【後】
(ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」へ名称変更)

ニノマイシシ点滴静注用100mg V
(ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」へ切替)
ミラクリッド注射液5万単位 1mLA
ミラクリッド注射液10万単位 2mLA
劇ミリピラ動注用70mg V [冷]
ミリピラ用懸濁用液4mL A
劇ミルセラ注シリソジ25μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミルセラ注シリソジ50μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミルセラ注シリソジ75μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミルセラ注シリソジ100μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミルセラ注シリソジ150μg 0.3mL筒 [冷]
劇ミルリノン注10mg「効々」 10mLA 【後】
劇ミルリーラ注射液10mg 10mLA (ミルリノン注10mg「効々」へ切替)
【ム】
無水エタノール注「ツツ」 5mLA
【メ】
メイロン静注7% 20mLA
メイロン静注7% 250mLP
メイロン静注8.4% 20mLA
劇メグルダーゼ静注用1000 1000単位V [2~8°C]
○ メコバラミン注500μg「NP」 0.5mgA 【後】
劇注射用メソトレキセート50mg V
劇メソトレキセート点滴静注液200mg 8mLV
劇メソトレキセート点滴静注液1000mg 40mLV
メチヨバール注射液500μg A
(院内はメコバラミン注500μg「NP」)
劇メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 0.02%1mLA [冷] 【後】
劇メチレンブルー静注50mg「第一三共」 10mLA
●劇メトジェクト皮下注7.5mgシリソジ0.15mL筒 [25°C以下] [禁凍結]
(院内はメトジェクト皮下注7.5mgペソン0.15mL切替)
●劇メトジェクト皮下注10mgシリソジ0.20mL筒 [25°C以下] [禁凍結]
(院内はメトジェクト皮下注10mgペソン0.20mL切替)
●劇メトジェクト皮下注12.5mgシリソジ0.25mL筒 [25°C以下] [禁凍結]
(院内はメトジェクト皮下注12.5mgペソン0.25mL切替)
●劇メトジェクト皮下注15mgシリソジ0.30mL筒 [25°C以下] [禁凍結]
(院内はメトジェクト皮下注15mgペソン0.30mL切替)
劇メトジェクト皮下注7.5mgペソン0.15mL キット [25°C以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注7.5mgシリソジ0.15mLが無くなり次第切替)
劇メトジェクト皮下注10mgペソン0.20mL キット [25°C以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注10mgシリソジ0.20mLが無くなり次第切替)
劇メトジェクト皮下注12.5mgペソン0.25mL キット [25°C以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注12.5mgシリソジ0.25mLが無くなり次第切替)
劇メトジェクト皮下注15mgペソン0.30mL キット [25°C以下][禁凍結]
(メトジェクト皮下注15mgシリソジ0.30mLが無くなり次第切替)
劇メタカラ筋注 0.5mLV [2~8°C]
(メンクアッドフィ筋注へ切替)
メルカゾール注10mg A
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 V 【後】
メロペネム点滴用ペイアル0.5g V
(メロペネム点滴静注用0.5g「明治」へ切替)
劇メンクアッドフィ筋注 0.5mLV [2~8°C]
(メンクアッドフィ筋注から切替)
【モ】
劇モゾビル皮下注24mg 1.2mLV
モノヴァー静注1000mg 10mLV
モリヘペミン点滴静注 500mLP
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 1%1mLA
麻劇モルヒネ塩酸塩注射液50mg「効々」 1%5mLA

【ヤ】
劇ヤーポイ点滴静注液50mg 10mLV [2~8°C]
【ユ】
ユナシソ静注用1.5g V (スルバシリソ静注用1.5gへ切替)
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g V
劇ユニツキシン点滴静注17.5mg/5mL V [2~8°C]
劇ユブリズナ点滴静注100mg 10mLV [2~8°C]
劇ユルトミリスH I点滴静注300mg/3mL V [2~8°C]
【ヨ】
毒ヨンデリス点滴静注用0.25mg V [2~8°C]
毒ヨンデリス点滴静注用1mg V [2~8°C]
【ラ】
ライザケア輸液 1L袋 (ルタテラ静注専用)
劇ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位キット [2~8°C]
劇ライブリバント点滴静注350mg 7mLV [2~8°C]
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mLキット
ラシックス注20mg A (フロセミド注20mg「ト-7」へ切替)
劇ラスピック点滴静注キット150mg キット (希釈液付)
劇ラスリテック点滴静注用1.5mg V (溶解液付) [冷]
劇ラニビズマブ S 硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
0.5mg0.05mL筒 [2~8°C] 【後】
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg 60mLP
劇ラボナール注射用0.5g A
毒ランダ注 10mg20mLV
(シスプラチニン注「マルコ」10mg20mLへ切替)
毒ランダ注 50mg100mLV
(シスプラチニン注「マルコ」50mg100mLへ切替)
●劇ランタス注ソロスター 300単位キット [冷]
劇ランタスX R 注ソロスター 450単位キット [冷]
劇ランマーク皮下注120mg 1.7mLV [2~8°C]
劇ランマークH I 皮下注120mgシリソジ1.0mL 1mL筒 [2~8°C] [禁凍結]
【リ】
劇リカムビス水懸筋注900mg 3mLV [2~8°C]
劇リクラスト点滴静注液5mg(バッグ) 100mLP
リコモジュリン点滴静注用12800 12800単位 V
劇リサイオ点滴静注液100mg 2.5mLV [2~8°C]
劇リスティーゴ皮下注280mg 2mLV [2~8°C]
劇リスバダルヨンシスカ筋注用25mg キット (懸濁用液付) [冷]
劇リスモダンP 静注50mg 5mLA
リツキサン点滴静注100mg 10mLV [2~8°C]
リツキサン点滴静注500mg 50mLV [2~8°C]
リツキシマブ S 点滴静注100mg「KHK」 10mLV [2~8°C] 【後】
リツキシマブ B S 点滴静注500mg「KHK」 50mLV [2~8°C] 【後】
劇リドカイン点滴静注液1%「効々」 200mLP 【後】
劇リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mLA 【後】
劇リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mLA 【後】
劇リドカイン静注用2%シリソジ「テルモ」 5mL筒 【後】
劇リドカイン塩酸塩点滴静注液50mg「F」 1%5mLA
[2~8°C] 【後】 (販売中止) (2027年3月31日経過措置終了(予定))
劇リドリリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 1%5mLA
[5°C以下] 【後】
リピオドール480注10mL A
劇リブタヨ点滴静注350mg 7mLV [2~8°C]
劇リプレガル点滴静注用3.5mg V [冷]
劇リメタゾン静注2.5mg 1mLA
硫酸M g 補正液1mEq/mL 0.5mL20mLA

劇リュープリン注射用キット1.88mg一筒
(リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」へ切替)
劇リュープリン注射用キット3.75mg一筒
(リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」へ切替)
劇リュープリンP R O 注射用キット22.5mg 筒
劇リュープリンS R 注射用キット11.25mg 筒
劇リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 筒 【後】
劇リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 筒 【後】
リン酸N a 補正液0.5mmol/mL 0.5mL/20mLA
リンデロン注2mg(0.4%) A 【冷】

【ル】

劇ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL 0.5mg/0.05mLV [2~8°C]
劇ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL
0.5mg/0.05mL筒 [2~8°C]
劇ルミセフ皮下注210mgシリンジ 1.5mL筒 [2~8°C]
劇ルムジエブ注ミリオベン 300単位キット 【冷】

【レ】

レギチーン注射液5mg 0.5%1mLV 【冷】
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(ウイバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(UVウイバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(ウイバッグ) 2LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(UVウイバッグ) 2LP
レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(シグルバッグ・機器専用) 2.5LP
※ レギュニールH C a 1.5腹膜透析液(シグルバッグ) 5LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(ウイバッグ) 1.5LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(ウイバッグ) 2LP
レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(シグルバッグ・機器専用) 2.5LP
※ レギュニールH C a 2.5腹膜透析液(シグルバッグ) 5LP
レギュニールH C a 4.25腹膜透析液(シグルバッグ) 2LP
レギュニールL C a 4.25腹膜透析液(UVウイバッグ・排液用バッグ付) 2LP
レクビオ皮下注300mgシリンジ 1.5mL筒
劇レケンビ点滴静注200mg 2mLV [2~8°C]
劇レケンビ点滴静注500mg 5mLV [2~8°C]

- レコベル皮下注12μg/ペン 0.36mLキット [2~8°C]
- レコベル皮下注36μg/ペン 1.08mLキット [2~8°C]
- レコベル皮下注72μg/ペン 2.16mLキット [2~8°C]

劇注射用レザフィリン100mg V 【冷】
レスピア静注・経口液60mg 3mLV
レバーサ皮下注420mgオトミニドーザ
3.5mLキット [2~8°C] (販売中止)
(2026年3月31日経過措置終了)
レバーサ皮下注140mg/ペン 1mLキット [2~8°C]
劇レプロジル皮下注射25mg V [2~8°C]
劇レプロジル皮下注射75mg V [2~8°C]
劇レベスティブ皮下注射0.95mg V (溶解液付) [2~8°C][禁凍結]
向劇レペタノ注0.2mg A
○ レベチラセタム点滴静注500mg「アル」 5mLA 【後】 (イーケプラ)
劇レベミル注フレックスベン 300単位キット 【冷】
●劇レベミル注ベンフィル 300単位筒 【冷】
○ レボカルニチンF F 静注1000mgシリンジ「トワ」5mL/筒(ルアーロック) 【後】
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 キット 【後】
(クラビット点滴静注バッグ500mg/100mLから切替)
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクト」 V 【後】
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクト」 V 【後】
劇レミケード点滴静注用100 100mgV 【冷】
劇レミトロ点滴静注用300μg V [2~8°C]
麻劇レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 V 【後】

【ロ】

ロイコボリン注3mg 1mLA
劇ロイナーゼ注用10000 10000K単位V [冷]
劇ロカイン注1% 5mLA
毒ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルシ」 V 【後】
毒ロゼウス静注液40mg 4mLV 【後】 (ナベルビン注より切替)
ロゼバラミン筋注用25mg V
ロセフイン静注用1g V
(セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」へ切替)
劇ロピオン静注50mg 5mLA
劇ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」 A 【後】
ローブリン (=抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」)
250μg V 【冷】
ロミブレート皮下注250μg調製用 V [2~8°C]
向ロラピタ静注2mg 1mLV [2~8°C]

【ワ】

ワイスター配合静注用1g V 【後】
劇ワソラン静注5mg 2mLA
毒ワントキソテール点滴静注20mg/1mL V
(ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ノブ」へ切替)
毒ワントキソテール点滴静注80mg/4mL V
(ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ノブ」へ切替)

生薬

- ウチダのウイキョウM (茴香)
- 劇ウチダの烏頭 (ウズ)
- ウチダのエンゴサクM (延胡索)
- ウチダのオウギ末M (黃耆)
- ウチダのオウヒM (桜皮)
- ウチダのオンジM (遠志)
- ウチダのガイヨウM (艾葉)
- ウチダのキンギンカM (金銀花)
- ウチダのクコシM (枸杞子)
- ウチダのコウイM (膠飴)
- ウチダのコウカM (紅花)
- ウチダのゴシュユM (吳茱萸)
- ウチダのゴマM (胡麻)
- ウチダのゴミシM (五味子)
- ウチダのシコンM (紫根)
- ウチダのシソシM (紫蘇子)
- ウチダのゼンコM (前胡)
- ウチダのセンコツM (川骨)
- ウチダのソウハクヒM (桑白皮)
- ウチダのテンナンショウM (天南星)
- ウチダのテンマM (天麻)
- ウチダのテンモンドウM (天門冬)
- ウチダのトウドクカツM (唐独活)
- ウチダのニンドウM (忍冬)
- ウチダのビャクゴウM (百合)
- ウチダのビワヨウM (枇杷葉)
- 劇ウチダの附子 (ブシ)
- ウチダのボウコンM (茅根)
- 劇ウチダの炮附子 (ホウブシ)
- ウチダのマンケイシM (蔓荊子)
- ウチダのモッカM (木瓜)
- ウチダのヤクモソウM (益母草)
- ウチダのリュウガンニクM (竜眼肉)
- ウチダのリュウタンM (竜胆)
- ウチダのレンニクM (蓮肉)
- トチモトのアキョウ (阿膠)
- トチモトのイレイセン (威靈仙)
- トチモトのインチンコウ (茵陳蒿)
- トチモトのウバイ (烏梅)
- トチモトのウヤク (烏藥)
- トチモトのオウギ (黃耆)
- トチモトのオウゴン (黃芩)
- トチモトのオウバク (黃柏)
- トチモトのオウレン (黃連)
- トチモトのカシュウ (何首烏)
- トチモトのガジュツ (莪朢)
- トチモトのカッコウ (藿香)
- トチモトのカッコン (葛根)
- トチモトのカッセキ (滑石)
- トチモトのカロコン (栝樓根)
- トチモトのカロニン (栝樓仁)
- トチモトのカンキョウ (乾姜)
- トチモトのカンゾウ (甘草)
- トチモトのキキョウ (桔梗)
- トチモトのキクカ (菊花)
- トチモトのキジツ (枳殼・キコク)
- トチモトのキジツ (枳實)
- トチモトのキッピ (橘皮)
- トチモトのキョウカツ (羌活)
- トチモトのキョウニン (杏仁)
- トチモトのクジン (苦參)
- トチモトのケイガイ (荊芥)
- トチモトのケイヒ (桂皮)
- トチモトのケイヒ末 (桂皮)
- トチモトのケツメイシ (決明子)
- トチモトのゲンジン (玄參)
- トチモトのコウジン (紅參)
- トチモトのコウジン末AM (紅參)
- トチモトのコウブシ (香附子)
- トチモトのコウベイ (粳米)
- トチモトのコウボク (厚朴)
- トチモトのゴシツ (牛膝)
- トチモトのゴボウシ (牛蒡子)
- トチモトのサイコ (柴胡)
- トチモトのサイシン (細辛)
- トチモトのサイチャ (細茶)
- トチモトのサフラン
- トチモトのサンザシ (山楂子)
- トチモトのサンシシ (山梔子)
- トチモトのサンシュユ (山茱萸)
- トチモトのサンショウ (山椒)
- トチモトのサンソウニン (酸棗仁)
- トチモトのサンヤク (山藥)
- トチモトのジオウ (乾地黃)
- トチモトのジオウ (熟地黃)
- トチモトのジオウ (生干地黃)
- トチモトのシオン (紫苑)
- トチモトのジコッピ (地骨皮)
- トチモトのシツリシ (蒺藜子)
- トチモトのシティ (柿蒂)

- トチモトのシャクヤク (芍薬)
- トチモトのシャクヤク末 (芍薬)
- トチモトのジャショウシ (蛇床子)
- トチモトのシャゼンシ (車前子)
- トチモトのジュウヤク (十薬)
- トチモトのシュクシャ (縮砂)
- トチモトのショウキョウ (生姜)
- トチモトのショウバク (小麦)
- トチモトのショウマ (升麻)
- トチモトのシンイ (辛夷)
- トチモトのセッコウ (石膏)
- トチモトのセンキュウ (川芎)
- トチモトのセンキュウ末 (川芎)
- トチモトのセンタイ (蟬退)
- トチモトのソウジュツ (蒼朮)
- トチモトのソボク (蘇木)
- トチモトのソヨウ (蘇葉)
- トチモトのダイオウ (大黃)
- トチモトのダイオウ末 (大黃)
- トチモトのタイソウ (大棗)
- トチモトのタクシャ (沢瀉)
- トチモトのタクシャ末 (沢瀉)
- トチモトのチクジョ (竹茹)
- トチモトのチクセツニンジン (竹節人参)
- トチモトのチモ (知母)
- トチモトのチョウジ (丁字)
- トチモトのチョウトウコウ (釣藤鈎)
- トチモトのチョレイ (猪苓)
- トチモトのチンピ (陳皮)
- トチモトのトウガシ (冬瓜子)
- トチモトのトウキ (当帰)
- トチモトのトウキ末 (当帰)
- トチモトのトウニン (桃仁・原形)
- トチモトのトウニン (桃仁・刻み)
- トチモトのトチュウ (杜仲)
- トチモトのニンジン (人参)
- トチモトのバイモ (貝母)
- トチモトのバクガ (麦芽)
- トチモトのバクモンドウ (麦門冬)
- トチモトのハッカ (薄荷)
- トチモトのハンゲ (半夏)
- トチモトのビャクシ (白芷)
- トチモトのビャクジュツ (白朮)
- トチモトのビャクジュツ末 (白朮)
- トチモトのビンロウジ (檳榔子)
- トチモトのブクリョウ (茯苓)
- トチモトのベッコウ (土別甲)
- トチモトのボワイ (防已)
- トチモトのボウフウ (防風)
- トチモトのボクソク (樸樹)
- トチモトのボタンピ (牡丹皮)
- トチモトのボタンピ末 (牡丹皮)
- トチモトのボレイ (牡蠣)
- トチモトのマオウ (麻黃)
- トチモトのマシニン (麻子仁)
- トチモトのモクツウ (木通)
- トチモトのモッコウ (木香)
- トチモトのヨクイニン (薏苡仁)
- トチモトのリュウコツ (竜骨)
- トチモトのリョウキョウ (良姜)
- トチモトのレンギョウ (連翹)

緊急限定申請薬

緊急限定薬（採用薬および院外処方専用薬）の使用期間は、原則として申請日より3ヶ月間です。継続使用が必要な場合には、次回薬事委員会までに「新規医薬品採用申請書」あるいは「院外処方専用薬登録申請書」を提出し、薬事委員会での承認が必要です。

記号なし：緊急限定採用薬

●：緊急限定院外処方専用薬

プリンペラン錠5	薬剤	25.08.20
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg 「サワイ」	薬剤	25.07.17
●劇プレバイミス顆粒分包20mg	小児	25.08.27
●劇プレバイミス顆粒分包120mg	小児	25.08.27
劇ボシュリフ錠100mg	血内	24.03.06
ミコブティンカプセル150mg	呼内	24.09.19

内用薬

品名	申請科	申請日
劇アトモキセチン錠5mg「トワ」	薬剤	25.09.19
劇アトモキセチン錠25mg「トワ」	薬剤	25.09.19
劇アルンブリグ錠90mg	呼外	24.03.22
アラグリオ顆粒剤分包1.5g	泌尿	24.01.22
劇イスツリサ錠1mg	糖内	25.05.09
イソプリノシン錠400mg	脳内	24.01.22
イノベロン錠200mg	小児	25.02.28
麻劇イーフェンバッカル錠100μg	麻酔	25.04.25
コレチメント錠9mg	消内	25.09.04
劇ジスバルカプセル40mg	心身	24.01.30
●スリンダ錠28	産婦	25.09.01
劇タグリッソ錠40mg	呼内	24.02.18
劇タブレクタ錠200mg	呼外	24.11.29
劇タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アル」	薬剤	25.09.12
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 [治験用]	乳腺 腫内	25.08.18
テラムロ配合錠AP「EE」	薬剤	25.09.08
劇ドグマチール細粒50%	薬剤	25.08.01
ネオドバストン配合錠L100	脳内	25.09.22
バルミコート吸入液0.5mg	小児	25.08.08
●ビヨントラ錠400mg	循内	25.08.27
●ブリモボラン錠5mg	甲内	25.07.17

外用薬

品名	申請科	申請日
ジクアス点眼液3%	薬剤	25.09.01
ステロネマ注腸3mg	消内	25.05.07
劇タリムス点眼液0.1%	眼科	25.07.15
チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	薬剤	25.07.24
●ニトロールスプレー1.25mg	循内	25.08.15

注射薬

品名	申請科	申請日
劇アイリーア硝子体内注射液40mg/mL [冷]	眼科	25.04.25
アクチバシン注600万	小外	24.11.06
劇アクテムラ皮下注162mg オートインジェクター [冷]	リ膠	25.08.19
劇エアウィン皮下注用45mg [冷]	循内	25.08.20
劇エアウィン皮下注用60mg [冷]	循内	25.08.20
劇エジャイモ点滴静注1.1g [冷]	血内	25.09.01
劇おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 [5°C以下]	薬剤	25.09.01
劇ジルビスク皮下注23.0mgシリソ [冷]	脳内	25.07.07
劇テクベイリ皮下注30mg [冷]	血内	25.08.29
劇テクベイリ皮下注153mg [冷]	血内	25.08.29
劇テビムプラ点滴静注100mg [冷]	消外	25.09.16
劇テブダック点滴静注用40mg [冷]	婦人	25.09.02

無印：採用薬
 ※：削除予定薬
 ●：院外処方専用薬
 ☆：院外処方専用予定薬
 【後】：後発医薬品
 ○：院内専用後発品である薬

デボ・メドロール水懸注40mg	薬剤	25.01.14
劇ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg 「NK」	薬剤	25.09.16
劇トリビック [10°C以下] (=沈降精製百日 せきジフテリア破傷風混合ワクチン)	産婦	25.08.21
劇ニトログリセリン静注25mg/50mL RFIDシリソジ「テルモ」	薬剤	25.08.01
毒パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	薬剤	25.09.16
劇パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「セイ」	周産	25.09.17
ピリドキサール注10mg「セイ」	薬剤	25.09.16
麻劇フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	薬剤	25.02.13
50%ブドウ糖注射液「ニッショウ」	薬剤	25.07.17
プリンペラン注射液10mg	薬剤	25.09.16
フロセミド注20mg「NIG」	薬剤	25.08.06
劇メキシチール点滴静注125mg	周産	25.02.21
レギュニール LCa1.5腹膜透析液 2.5L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	25.09.11
レギュニール LCa1.5腹膜透析液 5L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	25.09.11
レギュニール LCa2.5腹膜透析液 2.5L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	25.09.11
レギュニール LCa2.5腹膜透析液 5L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	25.09.11
レギュニール LCa4.25腹膜透析液 2L/袋 (シングルバッグ・機器専用)	小児	25.09.10
麻劇レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」	薬剤	25.06.10

※R6.9.9の薬事委員会で緊急限定採用薬の運用ルールの変更が決定されました。

- ①一つの診療科から申請され承認された緊急限定採用薬は、その診療科限定又は患者指定でのみ使用可能となる。
- ②緊急限定期間は3ヶ月間であり、購入期間は3ヶ月間で終了するが、その承認期間を終了しても在庫が残っている間はオーダ（処方・注射等）可能とする。
- ③供給停止等により直ちに代用薬を採用する必要がある場合等は、薬剤部より申請が可能となる。
- ④DPC対象病院における持参薬の取扱いに係る医薬品購入依頼書については、当該患者の入院期間が購入期間となる。他の診療科は使用不可。